











## ANNALES

DE LA

# SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE

### DE FRANCE

FONDÉE LE 29 FÉVRIER 1832

RECONNUE COMME INSTITUTION D'UTILITÉ PUBLIQUE

PAR DÉCRET DU 23 AOUT 1878

Natura maxime miranda in minimis.

VOLUME LXXIII. - ANNÉE 1904

1er et 2e TRIMESTRES




AU SIÈGE DE LA SOCIÉTÉ

HOTEL DES SOCIÉTÉS SAVANTES

28, rue Serpente, 28

NOVEMBRE 1904



## Librairie de la Société entomologique de France

Hôtel des Sociétés savantes, rue Serpente, 28 La Société dispose des ouvrages suivants : (Le premier prix est pour les membres de la Société, le deuxième, pour les personnes étrangères à la Société.) Annales de la Société entomologique de France, années 1843 à 1846 et 1859 à 1890. 12 et 15 fr. Les années 1847, 1848, 1856 et 1858, dont il 50 fr. 25 et 30 fr. Annales (années 1891 à 1902)........ Tables générales alphabétiques et analytiques des Annales de la Société entomologique de France (1832-2 et 3 fr. Tables générales des Annales de 1861 à 1880 inclusi-40 et 42 fr. Tables générales des Annales de 1881 à 1890 inclusi-50 et 40 fr. 18 fr. 1 fr. 1 et Bulletin comptes rendus du Congrès (4 ou plus. Nos). 5 et L'Abeille (série complète in-12, vol. 1 à 27. . . . . . . 150 et 175 fr. L'Abeille (série in-12, la plupart des volumes) chacun. . 8 et 12 fr. L'Abeille (série in-8°). Prix de l'abonnement par volume 10 et 12 fr. Faune des Coléoptères du bassin de la Seine, par L. BEDEL: (Carnivora, Palpicornia) épuisé. . . . . . . 5 et 8 fr. 8 et 40 fr. 8 et 10 fr. Catalogue raisonné des Coléoptères du Nord de l'Afrique, par Louis Bedel, t. I, 1er fasc., pp. 1-208, in-8°, 1895-1900..... 10 et 12 fr. Catalogue syn. et géogr. des Coléoptères de l'Anc. Monde : Europe et contrées limitrophes en Afrique et en Asie. 5 et 7 fr. 8 et 12 fr. Catalogus Coleopterorum Europae et confinium. . . . . . 0 fr. 50 Id. avec Index (Suppl. au Catalogus) . . . . . . . . . . 1 fr. 25 Monographie de la famille des Eucnémides, par H. de Bonvouloir, in-8° avec 42 planches gravées. . . . . . 5 et 7 fr. Monographie générale des Mylabres, 1872, 6 pl., dont 8 et 10 fr. 10 et 12 fr. Étude sur les Malachides d'Europe et du bassin de la Médi-4 et 5 fr. Mylabrides d'Europe (Monogr. des), par de MARSEUL, 2 pl. : 4 et 5 fr. 5 et 6 fr. Telephorides et Malthinides (Monogr. des), par de Mar-4 et 5 fr. Silphides (Précis des genres et espèces des), p. de Marseul. 3 et 4 fr. Tableaux synoptiques des Paussides, Clavigérides, Psélaphides et Scydmenides, par Reitter (trad. E. Leprieur). 3 et 4 fr. Nouveau Répertoire contenant les descriptions des espèces de l'Ancien Monde : 3 et 4 fr.

(Voir la suite, page 3 de la couverture.)

2 fr.

1 et

\$95.70644 V.73 1904-05

## ANNALES

DE LA

## SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE

#### GENERA ET CATALOGUE DES PSÉLAPHIDES

PAR ACH. RAFFRAY (1)

Avec 3 planches.

#### 6º Tribu Batrisini.

TABLEAU DES GENRES

- (85). Corps plus ou moins allongé, cylindrique, ovale ou aplati.
- (76). Hanches postérieures plus ou moins rapprochées ou très légèrement distantes, le métasternum en pointe ou arrondi entre elles, jamais tronqué.
- 3. (66). Abdomen plus ou moins marginé latéralement, cette marge d'ailleurs très variable.
- 5. (4). Marge latérale de l'abdomen formée simplement par une ou deux carènes; dans ce dernier cas, l'espace compris entre ces deux carènes est plat, non relevé en bourrelet s'étendant sur un ou plusieurs segments.
- 6. (59). Deux carènes latérales d'ailleurs fort variables.
- Voyez le commencement dans les Ann. Soc. ent. Fr., 1903, p. 484.
   Ann. Soc. Ent. Fr., LXXIII [1904].

- 7. (18). Les deux carènes latérales sensiblement parallèles entre elles et d'égale longueur, s'étendant de la base au sommet du segment.
- 8. (16). Corps plus ou moins épais et aplati, obtus en arrière. Quatre segments dorsaux seulement visibles en dessus, le 5° étant défléchi. Palpes maxillaires médiocres, à dernier article ovoïde ou fusiforme.

- - 14. (13 et 15). Deux sillons longitudinaux au prothorax. Tête transversale, à tempes arrondies. Dernier article des palpes ovoïde, fortement acuminé au sommet. Élytres carrés

à épaules très marquées et dentées. Hanches postérieures très peu distantes. Corps couvert de tubercules sétifères. Gen. **Diaugis** n. gen.

45. (14). Un seul sillon longitudinal au prothorax. Tête allongée, presque triangulaire. Dernier article des palpes ovoïde, acuminé. Élytres carrés, épaules arrondies. Hanches postérieures un peu distantes. Corps ponctué......

..... Gen. Batrisoplatus Raffray.

- 16. (8 et 47). Corps assez allongé, subcylindrique, assez convexe et parallèle, épais en arrière. Tête carrée, yeux situés au milieu. Prothorax assez allongé, trisillomé, un peu noueux sur les côtés en avant, et assez brusquement atténué tout à fait en avant. Élytres carrés. Abdomen à côtés parallèles, arrondi en arrière, assez aplati, premier segment dorsal plus grand que les suivants... Gen. Batriplica n. gen.
- (7). La carène interne de la marge latérale de l'abdomen est plus ou moins oblique : toutes les deux varient de longueur.
- 49. (20). La carène latérale externe n'est visible que sur le premier tiers du premier segment dorsal qui est brusquement rétréci à cet endroit; c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une carène sur les 2° et 3° segments (facies de *Batrisodes*)....

  Gen. **Diaposis** n. gen.
- 20. (49 et 53). La carène externe de la marge latérale de l'abdomen est presque toujours entière, et s'étend, au moins, sur les deux tiers de la longueur du segment.
- 21. (51). La carène interne de la marge de l'abdomen est généralement aussi longue que l'externe, ou seulement un peu plus courte.
- 22. (43). Les deux carènes sont visibles seulement sur le premier segment dorsal; sur les segments suivants il n'y a qu'une simple carène plus ou moins distincte.
- (37). Élytres sans strie dorsale et même sans dépression basale la remplaçant.

- 24. (29). Élytres assez longs, très atténués à la base, absolument sans épaules, plus ou moins en forme de cloche. Corps très atténué en arrière et en avant, allongé.
- 25. (28). Premier segment dorsal très grand.
- 26. (27). Carènes latérales de la marge du premier segment dorsal fines, peu obliques et rapprochées l'une de l'autre. Yeux remplacés par une épine... Gen. Amaurops Fairmaire.

- 29. (24 et 34). Élytres plus courts, pas beaucoup plus longs que larges, toujours très atténués à la base, épaules arrondies ♀, marquées ♂. Corps plus court et plus épais, obtus en arrière. Un sillon transversal au prothorax qui n'a pas d'épines. Premier segment dorsal très grand. Trois fossettes basales aux élytres. Tète plus ou moins carrée, généralement armée chez les mâles.
- 30. (31). Prothorax entaillé de chaque côté, pas de sillons, ni latéral, ni médian............ Gen. **Syrmocerus** Raffray.
- 31. (30). Prothorax entier sur les côtés. Gen. Arthmius Leconte.
- 32. (31 et 33). Prothorax sans sillons, ni latéral ni médian...

  Subg. Arthmius s. str.
- 34. (29). Élytres plus ou moins carrés, épaules très marquées.
- 36. (35). Tête carrée, yeux très gros, situés vers le milieu.

- 37. (23 et 40). Élytres avec une strie dorsale courte, confuse, parfois remplacée par une dépression basale longitudinale.
- 39. (38). Les deux carènes du premier segment dorsal un peu plus courtes que le segment lui-même. Tête transversale, armée généralement chez les ♂, yeux situés en arrière. Prothorax simplement cordiforme, non échancré, parfois avec une très petite épine latérale, sans épines antébasales, ni sillons; trois fossettes libres. Premier segment dorsal aussi long que les deux suivants réunis, souvent une carène longitudinale médiane... Gen. Cliarthrus Raffray.
- 40. (37. Élytres avec une strie dorsale bien marquée.
- 41. 42). Les deux carènes latérales du premier segment dorsal aussi longues que le segment lui-mème, qui est grand, un peu étranglé à la base, arrondi au sommet; abdomen court, obtus à l'extrémité. Prothorax avec un sillon seulement de chaque côté, pas de sillon médian, pas d'épine ni de dents. Tête assez allongée, yeux situés au milieu, tempes obliques. Dernier article des palpes régulièrement ovoïde, un peu allongé et acuminé, pas plus épais après le milieu qu'à la base................................. Gen. Iteticus n. gen.
- 42. (41). Les deux carènes latérales du premier segment dorsal plus courtes que le segment lui-mème, l'interne très oblique et curviligne, premier segment dorsal pas aussi grand que deux fois le suivant; abdomen assez allongé, subconique, atténué à l'extrémité. Prothorax avec trois sillons longitudinaux, sans épines. Tête carrée ou un peu allongée, tempes obliques. Dernier article des palpes

- aminci à la base, plus épais au delà du milieu, un peu obtus au sommet (en forme de massue . . . . . Gen. **Batrisus** Aubé.
- 43. (22). Les deux carènes latérales de l'abdomen, dont l'interne est toujours oblique, sont visibles sur les trois ou quatre premiers segments dorsaux.
- 44. (45). Tête variable, mais toujours aussi longue que large, avec les yeux situés vers le milieu et les tempes obliques. Prothorax plus long que large, généralement avec trois sillons et deux épines antébasales, le sillon médian pou vant parfois disparaître, ainsi que les latéraux, et les épines se réduire à des tubercules; le prothorax est simplement cordiforme etmutique ou plus ou moins échancré et denté sur les côtés, il a parfois jusqu'à cinq sillons longitudinaux. Élytres toujours avec une strie dorsale et les épaules bien marquées. Dernier article des palpes plus gros à la base, parfois même un peu épaissi en dedans, aminci et atténué à partir du milieu, avec le sommet très pointu. Premier segment dorsal toujours plus grand que les suivants......

..... Gen. Batrisodes Reitter.

- 45. (44 et 46). Tête à peu près aussi longue que large avec les yeux situés au milieu, tempes obliques. Prothorax un peu transversal, un peu échancré au-dessous du milieu où il est denté; deux sillons longitudinaux, base déprimée, deux tubercules épineux, pas de sillon transversal, disque plan. Élytres sans strie dorsale. Segments dorsaux égaux. Corps assez parallèle et aplati... Gen. Batrisophyma n. gen.
- 47. (46 et 50). Tête transversale, yeux situés en arrière du milieu, tempes carrées, mais arrondies. Palpes comme chez Batrisodes. Prothorax allongé, plus ou moins cordiforme. Premier segment dorsal à peine plus grand que les sui-

vants: abdomen allongé, conique, avec les segments plus ou moins en anneaux transversalement convexes.

- 51. 21 et 52. La carène latérale externe de la marge de l'abdomen s'étend sur plusieurs segments, l'interne est extrèmement courte et visible seulement à la base du premier. Tête atténuée en avant, yeux gros avec une forte épine orbitale située près des tempes. Prothorax sans sillons, mais avec deux très fortes épines antébasales. Élytres avec une strie dorsale longue, bien marquée. Premier segment dorsal très grand. Dernier article des palpes un peu plus épais à la base, atténué après le milieu, très acuminé....

  Gen. Adiastulus Raffray.
- 53. (20). Les deux carènes de la marge latérale de l'abdomen, l'interne comme l'externe, extrèmement courtes et visibles seulement à la base du premier segment dorsal.
- 54. (57). Dernier article des palpes assez long, fusiforme, un peu

- sinué ou même flagelliforme. Corps assez allongé, cylindrique, convexe.
- 56. (55). Premier segment dorsal très grand, très brusquement étranglé à la base, ses deux carènes latérales extrèmement courtes, et visibles, seulement à l'endroit étranglé de la base. Prothorax cordiforme, sillon longitudinal médian nul, ou interrompu, ou obsolète, pas de sillons latéraux, pas d'épines. Tête un peu plus longue que large, avec les côtés obliques, les tempes carrées, les yeux très gros, légèrement rétuse en arrière près du cou... Gen. **Apobatrisus** Raffray.
- 57. (54 et 58.) Dernier article des palpes bien moins long, un peu épaissi à la base, atténué après le milieu, très acuminé. Corps allongé, cylindrique, convexe. Premier segment dorsal deux fois plus grand que le suivant, rétréci à la base, deux carènes latérales à la base, très rapprochées l'une de l'autre, atteignant à peine le milieu du segment. Prothorax simplement cordiforme, un sillon longitudinal médian et un autre transversal, 4 épines mousses antébasales. Tête carrée, non rétuse en arrière, tempes obliques. Une strie dorsale raccourcie aux élytres. . . . Gen. **Probatrisus** Raffray.
- 58. (57). Dernier article des palpes régulièrement ovoïde. Corps allongé, aplati, parallèle. Premier segment dorsal grand, deux carènes latérales très courtes à sa base, l'interne tres oblique, les deux formant, entre elles, un petit triangle surélevé. Prothorax cordiforme, profondément échancré après le milieu, avec, seulement, un fin sillon longitudinal médian, pas de sillon transversal ni d'épines antébasales. Tête beaucoup plus longue que large, atténuée en avant, fortement rétuse près du cou, côtés obliques, tempes carrées, presque nulles, yeux gros, placés près de l'angle postérieur.

  Gen. Amana Raffray.

- 39. (6 et 60). Marge latérale de l'abdomen formée seulement par la caréne interne, d'ailleurs extrémement courte, sur les quatre premiers segments dorsaux. Tête carrée, yeux situés à peu près au milieu. Prothorax sans sillons ni tubercules. Élytres atténués à la base, sans épaules. Segments dorsaux décroissant légérement de la base à l'extrémité...
  - ..... Gen. Ophelius n. gen.
- 60. (59). Marge latérale de l'abdomen formée par une simple carène qui n'est généralement visible qu'à la base du premier segment dorsal. Tête grande, carrée, yeux situés en arrière du milieu, généralement tout à fait à l'angle postérieur.
- 62. (61 et 65). Palpes normaux, articles. 3 très brièvement triangulaire, 4 plus épais à la base, atténué après le milieu, très acuminé au sommet.
- 63. (64). Corps un peu aplati. Abdomen assez allongé, atténué à l'extrémité, au moins de quatre segments visibles en dessus, le premier moins grand que tous les autres réunis, la carène latérale aussi longue que lui.....
  - ..... Gen. Trisinus Raffray.

- 66, (3). Abdomen entièrement immarginé.
- 67. 68). Palpes longs, articles, 3 brièvement triangulaire,
  4 très long, mince à la base, un peu épaissi après le
  milieu, flagelliforme. Corps peu allongé, assez aplati.
  Tête légèrement rétuse près du cou, tempes un peu obtuses. Prothorax brièvement cordiforme, sans sillons ni
  épines. Premier segment dorsal très grand, un peu arrondi en arrière, les suivants peu distincts en dessus....
  Gen. Atheropterus Raffray.
- (67). Palpes normaux, articles, 3 petit, 4 ovoïde, plus ou moins acuminé.
- 69. (75). Antennes nullement géniculées, à premier article pas beaucoup plus grand que le suivant.
- 70. (71). Quatrième article des palpes mince à la base, épaissi après le milieu, légèrement acuminé au sommet. Tête très transversale, tempes très obliques, s'allongeant extérieurement, vers le milieu, en forme de canthus qui enveloppe les yeux postérieurement. Prothorax sans sillons longitudinaux. Premier segment dorsal un peu plus grand que le suivant ou subégal; abdomen un peu rétréci à la base, obtus au sommet. Corps convexe... Gen. Batrisinus Raffray.
- 74. (70 et 72). Quatrième article des palpes médiocre, simplement ovoïde. Corps allongé, gros, subcylindrique à côtés parallèles, un peu aplati en dessus. Tête en quadrilatère allongé, yeux situés près des tempes. Prothorax sans sillons ni épines, à peu près cordiforme. Élytres sans strie dorsale, épaules carrées. Premier segment dorsal à peu près double du suivant.............. Gen. Batoxyla Raffray.
- 72. (74). Quatrième article des palpes plus gros, ovoïde, un peu atténué après le milieu et plus ou moins acuminé au sommet.
- 73. (74). Corps allongé, assez parallèle. Tête au moins aussi longue que large, tempes obliques, yeux situés un peu en arrière. Prothorax cordiforme, deux sillons latéraux et un transversal. Élytres non atténués à la base, à côtés parallèles, avec une strie dorsale. Abdomen assez court, premier segment dorsal plus grand. Palpes acuminés.....

  Gen. Batrisomina Raffray.
- 74. (73). Corps oblong, ovoïde. Tête grande, transversale,

tempes arrondies, yeux situés au milieu. Prothorax plus atténué en arrière qu'en avant, sans sillons, épines ni fossettes. Élytres grands, très atténués à la base, sans épaules ni fossettes basales, ni stries, pas même la suturale. Abdomen plus court que les élytres, premiers segments ventraux subégaux. Palpes peu acuminés. Gen. Batrisopsis Raffray.

- [2]. Hanches postérieures toujours plus ou moins distantes, le métasternum tronqué entre elles.
- 77. (80). Marge de l'abdomen formée d'une seule carène, qui n'existe qu'à la base du premier segment dorsal. Tête grande, carrée, yeux situés près des angles postérieurs. Prothorax cordiforme avec trois sillons longitudinaux. Premier segment dorsal grand. Corps convexe (facies de Batrisocenus).

main de deux control

- (77 et 83). Marge de l'abdomen formée de deux carènes limitées au premier segment dorsal qui est très grand.
- 81. (82). Carène interne extrêmement oblique, réunie à l'externe avant le sommet du premier segment dorsal. Tête carrée, yeux situés sur les tempes, tout à fait en arrière. Palpes variables suivant les sexes, le dernier article plus

- 82. (84). Carène interne à peine oblique, aussi longue que l'externe. Tête un peu transversale, yeux médiocres, situés en arrière, mais pas sur les tempes. Dernier article des palpes ovoïde, très acuminé. Prothorax avec trois sillons longitudinaux. Élytres avec une forte carène basale s'étendant jusque sur l'épaule. Premier segment dorsal très grand. Corps assez aplati......... Gen. Borneana Schaufuss.
- 83. (80 et 84). Marge de l'abdomen formée de deux carènes, dont l'interne oblique, mais aussi longue que l'externe, s'étendant sur les trois premiers segments dorsaux. Tête trapézoïdale, un peu atténuée en avant et légèrement arrondie, tempes à peu près carrées, mais à angle arrondi, yeux petits, situés en arrière du milieu, mais avant les tempes. Dernier article des palpes un peu épaissi à la base, plus ou moins atténué après le milieu et acuminé au sommet. Prothorax légèrement cordiforme, échancré après le milieu, trois sillons longitudinaux très profonds et deux carènes, pas de sillon transversal. Élytres relativement courts, atténués à la base, sans épaules. Abdomen plus long que les élytres, premier segment dorsal au moins deux fois aussi long que le suivant. Corps déprimé.....

..... Gen. Batrisomalus n. gen.

- 85. (4). Corps court, épais, globuleux.
- 86. (87). Hanches postérieures largement distantes, métasternum tronqué entre elles. Tête en quadrilatère allongé, yeux très gros. Palpes petits, dernier article gros, briève ment ovoïde, mais très acuminé. Prothorax subovoïde, sans sillons. Élytres à peu près carrés, épaules bien mar-

quées, quatre fossettes basales, ni strie dorsale, ni suturale. Abdomen immarginé, premier segment dorsal bien plus grand que les suivants. Derniers articles des antennes beaucoup plus gros et plus ou moins anormaux chez les mâles. Corps entièrement couvert d'une grosse ponctuation confluente; pubescence courte et assez dense.....

..... Gen. Sathytes Westwood.

- 87. (86). Hanches postérieures contigués ou subcontigués.
- 88. 91). Élytres sans bourrelet basal s'étendant de chaque côté en calus huméral.
- 89. (90). Palpes forts, assez épais, articles, 3 relativement gros et triangulaire, 4 épais à la base, atténué vers le sommet. Métasternum non caréné............ Gen. Arnyllium Reitter.

#### TABLEAUX, NOTES ET DESCRIPTIONS.

#### Hypochraeus n. gen.

Brevis, crassus, nitidus, plus minusve totus granulis setiferis disperse ornatus. Caput mediocre, deplanatum, elongato-quadratum, oculi postice siti. Palporum articulo quarto oblongo-ovato, acuminato. Prothorax lateribus valde dentatus et postice emarginato-constrictus, longitudinaliter trisulcatus. Elytra basi trifoveata, sulco dorsali obsoleto, humeris dentatis. Abdomen apice rotundatum, segmentis tribus primis latere bicarinatis, istis carinis integris, subparallelis, segmento primo dorsali paululum majore. Coxae posticae leviter distantes, metasternum inter eas rotundatum.

Ce nouveau genre est très voisin de Batrisoschema; mais il en diffère par la bordure des segments dorsaux, qui, au lieu d'être relevée, consiste simplement en deux carènes parallèles, par la tête plus longue que large, au lieu d'être transversale, et par la forme du corps plus épaisse.

**Hypochraeus granosus** n. sp. — Oblongo-ovatus, crassus, parum convexus, castaneus, nitidus, totus disperse granosus et ciliatus. Caput mediocre, deplanatum, subquadrato-elongatum, antice leriter



Fig. 16.

attenuatum, fronte rotundatum, postice retusum, fere totum longitudinaliter carinatum. inter oculos magnos foveis duabus validis, sulco tenui et tenniter carinato, circulari, junctis. Antennae mediocres, articulis 1 valido, quadrato, 2 orato, 3-8 moniliformibus, 9, 10 paulo majoribus et leviter transversis, 11 longo, obconico. Prothorax capite fere duplo et longitudine sua paulo latior, margine antica et lateribus una rotundatus, paulo pone medium acute dentatus, dein ad basin profunde emarginato-constrictus et leviter sinuatus; sulcis tribus longitudinalibus quorum medio integro, tenuiter bicarinato: ante basin utrinque obtuse gibbosus. Elytra leviter transversa, lateribus et humeris leviter rotundata, istis dentatis, basi tri-

foreata, sulco dorsali obsoletissimo et brevissimo. Abdomen elytris longius, postice obtusum, segmento primo dorsali paulo majore, utrinque basi late impresso. Metasternum profunde sulcatum. Femoribus crassis. tibiis subrectis. — Long. 2,20 mill. — Fig. 46.

#### Sumatra.

Cette espèce diffère de *H. humeralis* et *obesus* Raffr., par la forme plus allongée, moins convexe, et par les tubercules pilifères qui ornent la surface plus accentués.

#### Diaugis n. gen.

Crassa, brevis, parum convexa, tota confertim granis setiferis vestita. Caput transversum, genis posticis rotundatis. Oculi medio siti. Palporum articulo ultimo oblongo, valde acuminato. Prothorax transversus, medio dentatus et postice valde angustatus, bisulcatus (interdum attamen sulci medii vestigia videntur). Elytra plus minusve quadrata, basi trifoveata, sulco dorsali nullo, humeris elevatis. Abdomen apice rotundatum, segmentis tribus primis dorsalibus latere bicarinatis, istis carinis integris et subparallelis, segmento primo paulo majore. Coxae posteriores subapproximatae.

Ce genre est très voisin du précédent dont il diffère surtout par la forme de la tète.

Les genres Batrisodema, Trichonomorphus, Panaphysis, Ceroderma,

Diaugis, Batrisoplatus, se ressemblent beaucoup. Dans Batrisodemu, Ceroderma et Diaugis la tête est transversale; Hypochraeus et Batrisoplatus l'ont plus longue que large et plus ou moins atténuée en avant : des différences secondaires mais constantes séparent les uns des autres les genres de ces deux groupes.

**Diaugis granulosa** n. sp. — D. opacae valde affinis. Differt attamen statura majore; antennarum articulis 9, 10 brevioribus, fere transversis; capite paulo minus transverso; prothorace basi media foreato et disco obsolete abbreviatim sulcato, spinis lateralibus validioribus; elytris latitudine sua longioribus et femoribus crassioribus; granulis majoribus, magis confertis et setis longioribus. — Long. **2.80** mill.

Sumatra: Palembang.

relevés en carènes.

#### Tableau du genre Amaurops (1)

A	2.	Abdomen avec trois fossettes à la base du premier		
		segment dorsal.		
B	2.	Tout le corps brillant, sans ponctuation.		
C	2.	Sillon médian du prothorax très court ou nul	Groupe I.	
C	1.	Sillon médian du prothorax toujours bien marqué.		
		Carinules du front non crénelées	Groupe II.	
D	1.	Carinules du front crénelées	Groupe III.	
B	1.	Tête et prothorax fortement ponctués	Groupe IV.	
Λ	1.	Abdomen avec deux fossettes seulement, situées au		
		milieu de la base	Groupe V.	
		Tableau du sgenre Syrbatus		
A	31.	Tableau du sgenre <b>Syrbatus</b> Tète à côtés et tempes simples, arrondis, non re-		
A	2.			
		Tête à côtés et tempes simples, arrondis, non re- levés en carènes.	Groupe 1.	
13	2.	Tête à côtés et tempes simples, arrondis, non re-	Groupe 1.	
B B	2.	Tête à côtés et tempes simples, arrondis, non re- levés en carènes.  Antennes différentes dans les deux sexes		
B B C	2.	Tête à côtés et tempes simples, arrondis, non re- levés en carènes.  Antennes différentes dans les deux sexes  Antennes simples dans les deux sexes.		
B B C	2. 1. 2. 1.	Tête à côtés et tempes simples, arrondis, non re- levés en carènes.  Antennes différentes dans les deux sexes  Antennes simples dans les deux sexes.  Tête excavée, surtout chez les mâles		
B B C C D	2. 1. 2. 1. 2.	Tête à côtés et tempes simples, arrondis, non re- levés en carènes.  Antennes différentes dans les deux sexes.  Antennes simples dans les deux sexes.  Tête excavée, surtout chez les mâles  Tête non excavée.	Groupe II.	

<sup>(1)</sup> Plusieurs espèces m'étant restées inconnues, ce tableau ne peut être considéré que comme provisoire.

B12.	Antennes anormales	Groupe	V.
B14.	Antennes simples et normales	Groupe	VI.
	Tableau du sgenre Arthmius		
A 2.	Prothorax comprimé de chaque côté, le disque		
	étant élevé au milieu en une carène longitudinale		
	très obtuse, ou tout au moins longitudinalement		
	gibbeux.		
B 2.	Antennes anormales, le 4° article étant plus gros		
	que les adjacents	Groupe	
	Antennnes simples	Groupe	11.
	Prothorax à disque simplement arrondi.		
	Antennes plus ou moins anormales.		
	Pieds plus ou moins anormaux	Groupe	
C 4.	Pieds simples	Groupe	IV.
B11.	Antennes simples.		
C12.	Pieds plus ou moins anormaux	Groupe	٧.
C14.	Pieds simples.		
1) 2.	Tête plus ou moins excavée ou armée.		
E 2.	Épistome simple	Groupe	VI.
E 4.	Épistome armé, tuberculé ou anormal	Groupe	VII.
D 1.	Tête simple	Groupe	VIII.

**Arthmius pedestrianus** n. sp. — Oblongus, convexus, obscure castaneus, elytris dilutioribus, pedibus rufis, parce pubescens.



16

Fig. 17.

Caput quadratum, deplanatum, fronte declinata et triangulari, foveis quatuor inter se multo magis quam a latere distantibus, posterioribus majoribus, medio in vertice foveola obsoleta, irregulari. Antennae validae, medio tortae, articulis 1 subquadrato, 2 subcylindrico, longitudine sua paulo longiore, 3 et 4 leviter obconicis, longioribus, et paulutum crescentibus, 5 majore, cylindrico, 6 leviter arcuato, eadem longitudine, sed fere dimidio angustiore, 7 longiore et validiore, irregulariter obconico, apice oblique truncato, angulo externo apicali producto et acuto, 8 minuto, transverso, 9 et 10 majoribus, quadratis, 11, ovato, basi truncato, apice acuminato. Prothorax subovato-cordatus, sulco transverso recto tenui. Ely-

tra subquadrata, convexa, basi attenuata, humeris obliquis et obtuse notatis. Abdomen etytris panto tongius, segmento primo dorsali magno. basi utrinque rotundatim et medio transversim impresso. Metasternum profunde sulcatum. Segmento ultimo ventrali late nec profunde impresso. Pedum anticorum femoribus extus subangulatim incrassatis, tibiis medio crassioribus et extus, tuberculo magno apice truncato et carinula circumdato, armatis, tibiis intermediis apice acute calcaratis, posticis leviter incurvis, ad apicem incrassatis et intus ciliatis 5.—Long. 1.90 mill. — Fig. 47.

Mexique : Sierra de Durango.

Cette espèce vient à côté de A. geniculatus Sharp, dont elle diffère par les antennes beaucoup plus arquées au milieu et le 7° article obliquement aigu en dehors, au sommet.

Arthmius transversalis n. sp. — Brevis, convexus, piceus, antennis pedibusque rufo-castaneis, sat longe, disperse flavo-pubescens. Caput quadratum, leviter transversum, subdeplanatum, fronte media antice obtuse tuberculatum, antice transversim de-

antice obtuse tuberculatum, antice transversim deplanatum et medio obtuse tuberculatum, in vertice inter oculos sulco transverso, integro, profundissimo, leviter arcuato: postice, medio, fovea magna media cum sulco juncta; in occipite punctis aliquot magnis dispersis. Antennae mediocres, articulis 3-7 ovatis, 8 fere globoso, 9 et 10 fere duplo majoribus, subglobosis, leviter transversis, 11 obconico. Prothorax capite latior, late-



Fig. 18.

ribus postice leviter obliquis, latitudine maxima ante medium, sulcis lateralibus validis, transverso valido, medio obtuse angulato. Elytra convexa, latitudine sua longiora, basi attenuata, humeris nullis. Abdomen elytris brevius, apice rotundatum. Metasternum sulcatum. Segmento ultimo ventrali magno, subquadrato, leviter transversim toto concavo. Pedes magni, femoribus crassis, trochanteribus intermediis squamoso-ciliatis 3.— Long. 1.23 mill.— Fig. 18.

Brésil: Theresopolis.

Cette espèce ne ressemble à aucune autre, en ce qu'elle a le corps court, ramassé, les élytres sans épaules chez la ç, alors que l'armature de la tête et la forme des segments ventraux caractérisent, sans doute possible, le sexe J. L'armature de la tête la différencierait aussi suffisamment et la rangerait dans le voisinage de A. vividus Schaufuss.

Archmius labiatus n. sp. — Elongatus, convexus, castaneus.
elytris paulo dilutioribus, antennis pedibusque rufis, tenuissime et
parce albido-pubescens. Caput quadratum, utrinque supra antennas
leviter expansum, margine frontali depressa et late bifoveolata, inter
Ann. Soc. Ent. Fr., exxum [1907].

oculos foveis duabus, inter se duplo magis quam ab oculis distantibus, sulco semicirculari junctis, epistomate producto, semi arcuato, transversim carinato. Antennae validae, articulis 3-7 ovatis, 8 paulo minore, subquadrato, 9 majore, breviter ovato, 10 adhuc majore, subquadrato, intus perparum prominulo, 11 ovato, basi truncato. Prothorar cordatus, lateribus rotundatus, sulcis lateralibus fere nullis, sulco transverso recto. Elytra latitudine sua longiora, humeris obtuse notatis. Segmento primo dorsali basi transversim impresso. Metasternum late sulcatum. Segmento ultimo ventrali impressione profunda, subquadrato-elongata praedito. Trochanteres intermedii parce fasciculati 3. — Long. 4,70 mill.

Brésil: Theresopolis.

Cette espèce est voisine de A. carinatus Schauf., mais elle est plus petite et elle diffère en outre par l'armature de la tête.

#### Exallus n. gen.

Oblongus, sat convexus. Caput subquadratum. Oculi maximi, medio siti. Palporum articulo ultimo subfusiformi, attamen leviter securiformi, acuminato. Prothorax cordatus, absque sulcis et spinis, basi trifoveatus. Elytra absque striis, humeris elevatis. Abdomen elytris subaequale, postice attenuatum, segmento dorsali 1 majore, lateribus tenuiter bicarinato, istis carinis, quarum interna leviter obliqua, integris, segmento 2 lateribus unicarinato.

L'unique espèce du genre avait été décrite par moi comme forme aberrante d'*Oxarthrius*: mais le prothorax absolument dégarni d'épines et la tête plus petite obligent à l'en séparer.

Cliarthrus semirugosus n. sp. — Oblongus, totus rufo-castaneus, fulvo-pilosus, in capite prothoraceque confertim rugoso punctatus. Caput longitudini aequilongum, antrorsum attenuatum, lateribus obliquum, vix convexum, fronte triangulutatim breviter productum et tate nec profunde impressum, posterius inter oculos foveis duabus. Antennae mediocres, articulis 2 ovato, 3-8 obvonicis, apice rotundatis, longitudine decrescentibus et latitudine leviter crescentibus, 3 latitudine sua dimidio longiore, 8 quadrato-rotundato, 9 et 10 paulo majoribus, subglobosis, 11 majore, conico. Prothorax latitudine sua longior, valde cordatus, paulo ante medium lateribus spinosus, dein ad basin leviter sinuatus, utrinque valde foveatus, disco medio ante basin deplanatus et medio foveatus, basi ipsa transversim impressa. Elytra latitudine sua paululum longiora, basi vix attenuata, trifoveata, sulco dorsali brevi.

Abdomen elytris paulo longius, postice attenuatum, totum longitudinaliter et tenuiter medio carinatum, segmentis dovsalibus gradatim decrescentibus. Metasternum profunde sulcatum. Segmento ultimo centrali sulde impresso. Pedes validi, femoribus anticis crassioribus, tibiis anticis ad apicem leviter incrassatis, pedum intermediorum trochanteribus leviter gibbosis, tibiis extus ad medium leviter incrassatis et dein, ad apicem sinuatis, tibiis posticis leviter incurvis, ad apicem magis incrassatis et ciliatis 5.— Long. 2,50 mill.

Afrique australe et orientale : Umtali.

Cette espèce diffère de toutes les autres par sa forme plus allongée, plus fusiforme et par la ponctuation grosse, confluente et rugueuse du prothorax et de la tête.

#### Iteticus n. gen.

Ce nouveau genre qui a été confondu, jusqu'à ce jour, avec les genres Batrisus, Batrisodes, Syrbatus, et dans ce dernier cas, à cause des deux sillons longitudinaux du prothorax, se distingue des uns et des autres par plusieurs points. Il diffère de Batrisodes, par les carènes latérales de l'abdomen, visibles seulement sur le premier segment; de Batrisus par les deux carènes aussi longues que le segment et dont l'interne est beaucoup moins oblique; de Syrbatus par la présence de carènes latérales à l'abdomen. Le dernier article des palpes est régulièrement ovoïde, mais acuminé et plus court que chez Batrisodes; il n'y a pas de sillon médian au prothorax qui est entièrement mutique, mais avec un sillon latéral de chaque côté; la strie dorsale des élytres est fine et bien marquée, longue; l'abdomen est déprimé et rétréci à la base, très convexe en arrière, avec le premier segment dorsal grand.

Ce genre comprend quelques belles espèces de l'Amérique méridionale, où elles semblent remplacer les *Batrisodes*, nombreux dans l'Amérique septentrionale, mais ne dépassant pas au Sud les frontières nord du Mexique.

Batrisus asteriscus Schaufuss, Tijds. Ent. XXX, 1887, p. 146.

Le type unique de cet insecte, quand je l'ai trouvé dans la collection Schaufuss, n'avait plus que les élytres et l'abdomen.

Les caractères des carènes abdominales correspondent bien, en effet, au genre Batrisodes, mais cela ne suffit pas pour se prononcer, et le fait que je ne connais pas de Batrisodes de l'Amérique méridionale augmente encore les doutes. En tout cas l'espèce ne semble pas devoir rentrer dans le genre Iteticus.

Batrisus crassipes Sharp, Biol. Centr. Am. 11 (1), p. 17. pl. 1. f. 7.

Batrisus lamellipes Sharp, Biol. Centr. Am. II (1), p. 18.

Il est très probable que ces deux espèces devront rentrer dans le genre *Heticus*.

Batrisus euplectiformis Sharp. Trans. Ent. Soc. Lond. 1883, p. 303. Cette espèce semble, d'après la description, se rapprocher plutôt des des Batrisoschema que des vrais Batrisus.

Batrisus conspicuus King, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales, 1865.

King rapproche cette espèce de son *Batrisus barbatus*, qui est un *Mesoplatus* de la tribu des *Trichonychini*; il serait fort possible qu'elle dût aussi rentrer dans ce genre.

#### Tableau du genre Batrisodes

Dry. I. Jamais plus de trois sillons longitudinaux au prothorax.

		Espèces paléarctiques.		
A	2.	Tibias postérieurs mutiques.		
В	2.	Antennes épaisses, articles moniliformes	Groupe	1.
		Antennes plus grêles	Groupe	11.
A	1.	Tibias postérieurs armés d'un éperon	Groupe	III.
		Espèces nord-américaines.		
A	2.	Tibias postérieurs mutiques	Groupe	IV.
		Tibias postérieurs armés d'un éperon.		
В	2.	Tête et antennes simples; pygidium plus ou		
		moins armé chez les mâles; prothorax sans		
		carènes	Groupe	V.
		Tête ou antennes plus ou moins anormales.		
C	3.	Tête normale, antennes plus ou moins anor-		
		males	Groupe	
		Tète anormale, antennes simples	Groupe	VII.
C	1.	Tête et antennes anormales	Groupe	VIII.
		Espèces australiennes.		
A	2.	Prothorax presque ovale-oblong, à peine cordi-		
		forme, nullement sinué, ni élargi, ni denté sur		
		les côtés	Groupe	IX.
A	1.	Prothorax plus ou moins cordiforme, sinué sur		

les côtés, après le milieu, où il est plus ou moins dente		
B 2. Tête armée; prothorax assez fortement denté sur les côtés	Groupe	Χ.
B 1. Tête simple; prothorax moins fortement denté sur les côtés	Groupe	XI.
Espèces indo-malaises.		
A 1. Forme du corps moins allongée, plus atténuée, surtout en arrière, plus fusiforme ou ovale; tête moins arrondie; sillons du prothorax et	Groupe	XII.
B 1. Dernier article des palpes régulièrement ovoïde allongé ou plus ou moins fusiforme, acuminé. C 2. Prothorax avec trois sillons longitudinaux en-	Groupe	XIII.
tiers et deux très forts tubercules pointus; en avant de ceux-ci, un sillon longitudinal supplémentaire raccourci en avant et en arrière C. 1. Prothorax sans le sillon raccourci en avant des tubercules. D. 6. Pas de sillons au prothorax, ni longitudinaux	Groupe	XIV.
ni transversal, deux tubercules caréniformes très obsolètes; forme du corps très épaisse; élytres à épaules très arrondies; arrière-corps parallèle, cylindrique; prothorax presque ovoide	Groupe Groupe	

sillon transversal ni de tubercule sur le disque, ni d'épine sur le côté au prothorax
sillons, ni médian ni transversal, des tubercules à la base, mais pas d'épine sur le côté au prothorax
cules à la base, mais pas d'épine sur le côté au prothorax
au prothorax
<ul> <li>D 2. Prothorax avec un sillon longitudinal de chaque côté, pas de sillon médian, mais trois carènes longitudinales sur le disque, pas de sillon transversal ni d'épine latérale, deux forts tubercules pointus sur le disque</li></ul>
que côté, pas de sillon médian, mais trois carènes longitudinales sur le disque, pas de sillon transversal ni d'épine latérale, deux forts tubercules pointus sur le disque Groupe XIX.  D 1. Toujours trois sillons longitudinaux au prothorax, le médian parfois raccourci en avant, mais ne manquant jamais complètement, simple ou bicaréné.  E 2. Prothorax absolument mutique sur les côtés.  F 2. Antennes à articles pas plus longs que larges ou même presque transversaux; sillon prothora-
lon transversal ni d'épine latérale, deux forts tubercules pointus sur le disque Groupe XIX.  D 1. Toujours trois sillons longitudinaux au prothorax, le médian parfois raccourci en avant, mais ne manquant jamais complètement, simple ou bicaréné.  E 2. Prothorax absolument mutique sur les côtés.  F 2. Antennes à articles pas plus longs que larges ou même presque transversaux; sillon prothora-
tubercules pointus sur le disque Groupe XIX.  D 1. Toujours trois sillons longitudinaux au prothorax, le médian parfois raccourci en avant, mais ne manquant jamais complètement, simple ou bicaréné.  E 2. Prothorax absolument mutique sur les côtés.  F 2. Antennes à articles pas plus longs que larges ou même presque transversaux; sillon prothora-
<ul> <li>D 1. Toujours trois sillons longitudinaux au prothorax, le médian parfois raccourci en avant, mais ne manquant jamais complètement, simple ou bicaréné.</li> <li>E 2. Prothorax absolument mutique sur les côtés.</li> <li>F 2. Antennes à articles pas plus longs que larges ou même presque transversaux; sillon prothora-</li> </ul>
rax, le médian parfois raccourci en avant, mais ne manquant jamais complètement, simple ou bicaréné.  E 2. Prothorax absolument mutique sur les côtés.  F 2. Antennes à articles pas plus longs que larges ou même presque transversaux; sillon prothora-
ne manquant jamais complètement, simple ou bicaréné.  E 2. Prothorax absolument mutique sur les côtés.  F 2. Antennes à articles pas plus longs que larges ou même presque transversaux; sillon prothora-
bicaréné. E 2. Prothorax absolument mutique sur les côtés. F 2. Antennes à articles pas plus longs que larges ou même presque transversaux; sillon prothora-
<ul> <li>E 2. Prothorax absolument mutique sur les côtés.</li> <li>F 2. Antennes à articles pas plus longs que larges ou même presque transversaux; sillon prothora-</li> </ul>
F 2. Antennes à articles pas plus longs que larges ou même presque transversaux; sillon prothora-
même presque transversaux; sillon prothora-
F 1. Antennes à articles plus longs que larges.
G 2. Sillon prothoracique médian caréné de chaque
côté Groupe XXI.
G 1. Sillon prothoracique médian simple Groupe XXII.
E 1. Prothorax toujours armé d'une dent ou d'une
épine plus ou moins fortes sur les côtés, au-
dessus de la sinuosité et du rétrécissement pos-
térieurs.
F <sup>+</sup> 2. Un éperon aux tibias postérieurs.
G12. Sillon prothoracique médian très court, ne dé-
passant pas le milieu Groupe XXIII
G <sup>1</sup> 1 Sillon prothoracique médian caréné de chaque
côté Groupe XXIV
F <sup>1</sup> 1. Tibias postérieurs mutiques G <sup>2</sup> 2. Huitième article des antennes toujours nota-
blement plus court que le 7°.
H 4. Articles des antennes grèles et longs, cylin-
driques, trois à quatre fois plus longs que
larges.
1 3. Sillon prothoracique médian court, atténué
avant le milieu Groupe XXV.
1 2. Sillon prothoracique médian entier, simple Groupe XXVI.

1 1. Sillon prothoracique médian caréné de cha-		
que côté	Groupe	XXVII.
H 3. Antennes plus épaisses, articles simplement		
un peu plus longs que larges, cylindriques		
ou oblongs.		
I' 2. Sillon prothoracique médian simple	Groupe	XXVIII.
1 1. Sillon prothoracique médian caréné de chaque		
côté	Groupe	XXIX.
H 2. Antennes épaisses, articles carrés ou pas plus	1	
longs que larges; sillon prothoracique mé-		
dian simple	Groupe	XXX.
H 1. Antennes à articles moniliformes, globuleux	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
ou transversaux	Groupe	XXXI.
G <sup>2</sup> 1. Huitième article des antennes pas plus long		,,,,,,,,,
que le 7°.		
III 3. Sillon prothoracique médian entier simple.	Groupe	XXXII.
H <sup>1</sup> 2. — caréné de chaque côté.	1	XXXIII.
II 1. — très court, obsolète	Groupe	
ir i. — Hes coult, observe		
Espèces du Japon (d'après D. Sh		
Espèces du Japon (d'après D. Sh. A. 2. Corps toujours plus ou moins pubescent.		
Espèces du Japon (d'après D. Sh		
Espèces du Japon (d'après D. Sh. A. 2. Corps toujours plus ou moins pubescent.		
Espèces du Japon (d'après D. Sh A 2. Corps toujours plus ou moins pubescent. B 4. Premier segment dorsal environ seulement	narp).	XXXV.
Espèces du Japon (d'après D. Sh. A. 2. Corps toujours plus ou moins pubescent. B. 4. Premier segment dorsal environ seulement deux fois plus long que le 2°; tibias postérieurs sans éperon apical	narp).	
Espèces du Japon (d'après D. Sh. A. 2. Corps toujours plus ou moins pubescent. B. 4. Premier segment dorsal environ seulement deux fois plus long que le 2°; tibias postérieurs sans éperon apical	narp).	
Espèces du Japon (d'après D. Sh. A. 2. Corps toujours plus ou moins pubescent.  B. 4. Premier segment dorsal environ seulement deux fois plus long que le 2°; tibias postérieurs sans éperon apical	narp). Groupe	
Espèces du Japon (d'après D. Sh. A. 2. Corps toujours plus ou moins pubescent.  B. 4. Premier segment dorsal environ seulement deux fois plus long que le 2°; tibias postérieurs sans éperon apical	narp). Groupe	XXXV.
Espèces du Japon (d'après D. Sh. A. 2. Corps toujours plus ou moins pubescent.  B. 4. Premier segment dorsal environ seulement deux fois plus long que le 2°; tibias postérieurs sans éperon apical	narp). Groupe	XXXV.
Espèces du Japon (d'après D. Sh. A. 2. Corps toujours plus ou moins pubescent.  B. 4. Premier segment dorsal environ seulement deux fois plus long que le 2°; tibias postérieurs sans éperon apical.  B. 3. Premier segment dorsal 2 à 3 fois plus long que le 2°; tibias postérieurs avec un éperon apical.  B. 2. Premier segment dorsal environ 2 fois aussi long que le 2°; tibias postérieurs sans éperon apical; tête armée.	Groupe Groupe	XXXV.
Espèces du Japon (d'après D. Sh. A. 2. Corps toujours plus ou moins pubescent.  B. 4. Premier segment dorsal environ seulement deux fois plus long que le 2°; tibias postérieurs sans éperon apical.  B. 3. Premier segment dorsal 2 à 3 fois plus long que le 2°; tibias postérieurs avec un éperon apical.  B. 2. Premier segment dorsal environ 2 fois aussi long que le 2°; tibias postérieurs sans éperon apical; tête armée.  B. 4. Premier segment dorsal de 2 à 3 fois aussi	Groupe Groupe	XXXV. XXXVI.
Espèces du Japon (d'après D. Sh. A. 2. Corps toujours plus ou moins pubescent.  B. 4. Premier segment dorsal environ seulement deux fois plus long que le 2°; tibias postérieurs sans éperon apical.  B. 3. Premier segment dorsal 2 à 3 fois plus long que le 2°; tibias postérieurs avec un éperon apical.  B. 2. Premier segment dorsal environ 2 fois aussi long que le 2°; tibias postérieurs sans éperon apical; tête armée.  B. 4. Premier segment dorsal de 2 à 3 fois aussi long que le 2°; tibias postérieurs avec un	Groupe Groupe	XXXV. XXXVI.
Espèces du Japon (d'après D. Sh. A. 2. Corps toujours plus ou moins pubescent.  B. 4. Premier segment dorsal environ seulement deux fois plus long que le 2°; tibias postérieurs sans éperon apical.  B. 3. Premier segment dorsal 2 à 3 fois plus long que le 2°; tibias postérieurs avec un éperon apical.  B. 2. Premier segment dorsal environ 2 fois aussi long que le 2°; tibias postérieurs sans éperon apical; tête armée.  B. 4. Premier segment dorsal de 2 à 3 fois aussi long que le 2°; tibias postérieurs avec un éperon apical; tête armée, fréquemment,	Groupe Groupe Groupe	XXXV. XXXVI. XXXVII.
Espèces du Japon (d'après D. Sh. A. 2. Corps toujours plus ou moins pubescent.  B. 4. Premier segment dorsal environ seulement deux fois plus long que le 2°; tibias postérieurs sans éperon apical.  B. 3. Premier segment dorsal 2 à 3 fois plus long que le 2°; tibias postérieurs avec un éperon apical.  B. 2. Premier segment dorsal environ 2 fois aussi long que le 2°; tibias postérieurs sans éperon apical; tête armée.  B. 4. Premier segment dorsal de 2 à 3 fois aussi long que le 2°; tibias postérieurs avec un éperon apical; tête armée, fréquemment, 4° article des antennes anormal	Groupe Groupe Groupe Groupe	XXXV.  XXXVII.  XXXVIII.
Espèces du Japon (d'après D. Sh.  A 2. Corps toujours plus ou moins pubescent.  B 4. Premier segment dorsal environ seulement deux fois plus long que le 2°; tibias postérieurs sans éperon apical.  B 3. Premier segment dorsal 2 à 3 fois plus long que le 2°; tibias postérieurs avec un éperon apical.  B 2. Premier segment dorsal environ 2 fois aussi long que le 2°; tibias postérieurs sans éperon apical; tête armée.  B 4. Premier segment dorsal de 2 à 3 fois aussi long que le 2°; tibias postérieurs avec un éperon apical; tête armée, fréquemment, 4° article des antennes anormal	Groupe Groupe Groupe Groupe	XXXV. XXXVI. XXXVII.
Espèces du Japon (d'après D. Sh. A. 2. Corps toujours plus ou moins pubescent.  B. 4. Premier segment dorsal environ seulement deux fois plus long que le 2°; tibias postérieurs sans éperon apical.  B. 3. Premier segment dorsal 2 à 3 fois plus long que le 2°; tibias postérieurs avec un éperon apical.  B. 2. Premier segment dorsal environ 2 fois aussi long que le 2°; tibias postérieurs sans éperon apical; tête armée.  B. 4. Premier segment dorsal de 2 à 3 fois aussi long que le 2°; tibias postérieurs avec un éperon apical; tête armée, fréquemment, 4° article des antennes anormal	Groupe Groupe Groupe Groupe	XXXVI. XXXVII. XXXVIII. XXXIX.

**Batrisodes obesus** n. sp. — Oblongus, crassus, convexus, obscure castaneus, capite prothoraceque piceo, sat longe setis fulvis, depressis vestitus. Caput quadratum, angulis anticis rotundatis, fronte

medio leviter deflexa, temporibus pone oculos valde obliquis et setosis, lateribus et antice valde rugoso-punctatum, occipite et vertice una leviter elevato et laevi, sulco parabolico lateraliter recto et postice usque ad collum extenso circumdato, medio longitudinaliter carinato. Antennae breves, crassae, articulis 2 quadrato, 3-8 leviter transversis, 9, 10 perparam majoribus, vir transversis, 11 ovato, basi truncato, apice obtuse acuminato. Prothorax convexus, suboratus, antice plus et postice minus attenuatus, absque sulcis, utrinque pone medium forea laterali mediocri, prope basin fovea altera laterali, foveis duabus antebasalibus, tuberculis duobus acutis, antrorsum carinulis obtusis prolongatis. Elytra grosse punctata, basi ralde attenuata, humeris nullis et valde rotundatis, basi vix perspicue foreata, stria suturali tenui, dorsali vix perspicua et brevi, Abdomen elytris fere brevius, segmento primo dorsali sequente dimidio longiore, carinis marginalibus parallelis et approximatis, basi utringue obsolete impresso. Pedes parum elongati, femoribus crassis Q. — Long. 2,50 mill.

Sumatra: Palembang.

Cette espèce ne peut être confondue avec aucune autre. Le prothorax n'a aucun sillon, mais seulement deux tubercules peu développés et prolongés en avant en une carène peu marquée; les élytres sont convexes, rétrécis à la base en une courbe régulière, les stries suturale et dorsale sont très fines et peu visibles.

Batrisodes luteolus n. sp. — Oblongus, pallide testaceus (immaturus), sat longe setosus. Caput subquadratum, angulis anticis supra antennas obtuse nodosis, fronte medio declinata, temporibus pone oculos magnos rotundato-obliquis, inter oculos foreis duabus inter se et ab oculis subaequaliter distantibus, sulco parabolico antice angulato, occipite hand carinato. Antennae validae, articulis 3, 4, 5, 7, leviter obconicis, latitudine sua paulo longioribus, 6 breviore, 8 quadrato, 9, 10 majoribus, ovatis, 11 oblongo-ovato, apice acuminato. Prothorax elongato-cordatus, multo ante medium latior et spina longa, tenui, recurra armalus, lateribus haud emarginatus nec constrictus, ad basin obliquus, sulcis nullis, lateribus fovea mediocri, ante basin spinis duabus retrorsum incurvis et inter eas, posterius, fovea magna, basi ipsa quadrifoveata. Elytra disperse et grosse punctata, subquadrata, basi leviter attenuata, humeris rotundatis sed dentatis, stria dorsali ante medium abbreviata. Segmento primo dorsali sequentibus multo longiore, carinis marginalibus subparallelis et parum distantibus. Metasternum valde sulcatum. Pedes validi, femoribus crassis, tibiis anticis medio leviter

incrassatis et nonnihil sinuatis, posticis leviter arcuatis 3. — Long. 4.40 mill.

Sumatra: Palembang.

Cette espèce est très voisine de *B. edentatus* Raffr., de Singapore elle en diffère par la tête moins large, les fossettes plus rapprochées l'une de l'autre, les articles intermédiaires des antennes plus longs, obconiques, au lieu d'être ovales et presque moniliformes et entin. l'absence totale de sillon transversal au prothorax.

Batrisodes tricarinatus n. sp. — Oblongus, sat convexus, ferrugineus, sat longe subhirsute rufo-pubescens. Caput subquadratum, leviter transversum, lateribus elevatum et supra antennas utrinque obtuse elevatum, fronte antice transversim impressa et declinala, vertice medio convexo, occipite et vertice carinato, in linea postica oculorum foreis duabus mediocribus, epistomate prominulo. Antennae elongatae, validae, articulis 1 elongato, 2 et 3 subconicis, longitudine crescentibus, 4-7 culindricis, basi truncatis, apice rotundatis, latitudine sua fere triplo longioribus, 8 cylindrico, praecedente duplo breviore, 9 et 10 paulo crassioribus et septimo brevioribus, basi truncatis, apice leviter incrassatis et rotundatis, 11 elongato, fusiformi, basi truncato, apice acuminato. Prothorax capite vix latior sed longior, cordatus, obsolete et irregulariter tuberculosus, sulcis lateralibus validis, carinis discoidalibus tribus (sulco medio deficiente), ante basin tuberculis duobus validis, acutis, foceis lateralibus paulo pone medium sitis et alteris duabus utringue. Elytra disperse et obsolete subrugoso-punctulata, elongata, humeris obliquis, notatis, lateribus leviter rotundatis, sulco dorsali obsoletissimo et brevi. Abdomen obsolete et subrugose punctatum, elytris brevius, postice attenuatum, segmento primo sequente fere duplo majore. utringue late ner profunde depresso, carinulis marginalibus apice con vergentibus. Metasternum late deplanatum. Pedes validi, femoribus incrassatis, tibiis subrectis, posticis haud aculeatis. — Long. 1.80-2 mill.

Sumatra : Palembang.

Cette espèce, chez laquelle le silfon longitudinal médian du prothorax est remplacé par une carène, forme un groupe à part entre *B. bispina* et *B. simplex* Raffray.

Batrisodes tuberculatus n. sp. — Oblongus, parum convexus, castaneus, sat dense rufo-pubescens. Caput irregulariter et minute tuberculatum, transversum, antice leviter attenuatum, lateribus obsolete carinatum, supra antennas angulatum, sed non tuberculatum, fronte medio declinata, in linea postica oculorum foveis duabus mediocribus.

inter se magis quam ab oculis distantibus, sulco parabolico valido, in fronte angulato, vertice transversim convexo, foveis, sulco transverso obsoletissimo et carinula longitudinali interrupto, una junctis, occipite transverso. Antennae validae, crassae, articulis 2-7 latitudine sua duplo longioribus, 8 fere quadrato, 9, 10 paulo majoribus, obovatis et bitruncatis. 11 ovato, basi truncato, apice valde acuminato. Prothorax sat dense, praesertim in disco, tuberculatus, capite haud latior, valde cordatus, lateribus muticus et postice leviter sinuatus, sulcis tribus longitudinalibus, tuberculis duobus acutis, foreis lateralibus mediocribus, basi ipsa utrinque bifoveata. Elytra minute subrugoso-punctata, basi et apice attenuata, humeris obliquis, parum notatis, stria dorsali conspicua, paulo ante medium abbreviata, Abdomen minute subrugosonunctatum, elutris vix longius, postice attenuatum, seamento 1 dorsali sequente haud duplo majore, utrinque deplanato, carinulis marginalibus duabus convergentibus, basi media carinulis duabus brevissimis et approximatis. Metasternum sulcatum. Pedes elongati, validi, femoribus incrassatis, tibiis subrectis, intermediis minute et breviter calcaratis. Segmento ultimo ventrali impresso. — Long. 2,30 mill.

Sumatra: Palembang.

Cette espèce est voisine de *B. sylvicola* Raffr., mais la tête est plus courte, les articles des antennes sont plus longs et le disque du prothorax est couvert de petits tubercules.

**Batrisodes acinosus** n. sp. — Oblongus, ferrugineus, elytra paulo pallidiora, sat longe et dense fulro-setosus. Caput rugoso-punctatum, fere transversum, lateribus carinatum, supra antennas obtuse



Fig. 19.

nodosum, fronte medio valde declinata, temporibus obliquis, foveis duabus postice sitis et magis inter se quam ab oculis distantibus, sulco parabolico subquadrato, vertice et occipite carinato. Antennae breves, crassae, articulis 2 breviler obconico, 3-8 longitudine decrescentibus, 3 quadrato, 8 transverso, 9 magno, irregulariter trapezoidali et transverso, angulo superiore interno leviter producto, infra valde depressso, 10 paulo minore, transverso, 11 subobconico. Prothorax tuberculatus, cordatus, lateribus muticus et pone medium leviter constrictus, sulcis tribus longitudinalibus validis, medio integro, foveis lateralibus validis, sulco transverso parum profundo, tuberculis duobus mediocri-

bus, acutis, basi ipsa quadrifoveata. Elytra minute punctata, latitudine sua paulo longiora, humeris obliquis, elevatis et dentatis, basi trifoveata, stria dorsali brevissima. Abdomen disperse punctatum, segmento dorsali I sequente dimidio longiore, carinis marginalibus subparallelis, parum distantibus. Metasternum late sulvatum. Segmento ultimo ventrali impresso. Pedes breves, crassi, tibiis anticis medio ampliatis, supra deplanatis et medio nodosis, intus compressis, sinuatis et acute medio minute spinosis, intermediis et posticis leviter incurvis 3. — Long. 1,60 mill. — Fig. 19.

Sumatra: Palembang.

Cette espèce est en réalité voisine de l'espèce précédente, bien qu'elle en diffère beaucoup en apparence par les antennes et les tibias antérieurs.

Batrisodes ferinus n. sp. — Oblongus, ferrugineus vel rufocastaneus, nitidissimus, totus laevis, sat longe, disperse brunneosetosus, cum setis aliquot longioribus rufis. Caput transversum, tempo-

ribus oblique rotundatis, in linea postica oculorum foveis duabus inter se magis quam ab oculis distantibus, liberis, fronte declinata et antice triangulari, utrinque supra antennas valde tuberculata, isto tuberculo extus, postice, incisione laterali definito, occipite longe varinato. Antennae elongatae, graciles, articulis 3-8 cylindricis, 3-7 triplo, 8 vix duplo latitudine sua longioribus, 9 et 10 ovatis, latitudine crescentibus, 11 elongato, obconico, basi rotundato, intus, ante apicem, leviter sinuato. Prothorar cordatus, lateribus, pone medium, minute dentatus, longitudinaliter trisulcatus, sulco medio integro. bicarinato, ante basin tuberculis duobus



Fig. 20.

magnis et acutissimis, basi ipsa quadrifoveata. Elytra subquadrata, basi leviter attenuata, humeris valde obliquis et prominulis, sed muticis, lateribus pone humeros sinuatis et postice rotundatis, basi trifoveata, sulco dorsali fere nullo, elytris attamen inter suturam et humeros depressis. Abdomen elytris longius, subconicum, segmento dorsali 1 paulo majore, cavinis marginalibus duabus parum distantibus, istis obliquis et ad apicem convergentibus. Pedes sat elongati, femoribus clavatis, tibiis posticis breviter calcaratis 3. Metasternum triangulatim impressum. Trochanteribus intermediis spina magna com-

pressa armatis, posticis magnis, carinatis et lamella magna praeditis. — Long. 2 mill. — Fig. 20.

Sumatra: Palembang.

Cette espèce vient se ranger auprès de B. platycephalus Raffray.

Batrisodes tenuicornis n. sp. — Fere fusiformis, rufo-castaneus, nitidus, parce setosus, antennis pedibusque testaceis. Caput leviter transversum, antice quadratum, lateribus subcristatum et supra antennas subcarinatum, fronte medio leriter depressa, temporibus obliquis, inter oculos sulco transverso profundo, lato et leviter arcuato, occipite deplanato, tenuiter et longitudinaliter carinato, antrorsum circuiter cristato. Antennae elongatae, graciles, articulis 3-7 triplo et 8 vir latitudine sua longioribus, 9 et 10 paulo majoribus, truncatoovatis, 11 elongato, cylindrico et apice acuminato, basi truncato. Prothorax cordatus, lateribus medio minute dentatus et dein leviter constrictus, sulcis longitudinalibus lateralibus validis, medio obsoleto, transverso obsoleto, spinis duabus antebasalibus et carinulis duabus discoidalibus, foreis lateralibus magnis, basi ipsa quadriforeata, Elutra latitudine sua longiora, postice convexa, lateribus postice rotundata, humeris elevatis et carinatis; basi bifoveata, stria dorsali brevi et obsoleta. Abdomen conicum, segmento dorsali 1 seguente paulo majore, carinis marginalibus parum distantibus (interna obliqua), utrinque basi transversim impresso. Metasternum late concavum. Segmento ventrali ultimo obsolete impresso. Pedes elongati, femoribus leviter incrassatis, tibiis gracilibus, subrectis 3. — Long. 4.50 mill.

Sumatra: Palembang.

Cette espèce est voisine des *B. elegans* et *quadrispina* Raffr., mais les antennes sont encore plus grèles, à articles plus allongés, les épines du prothorax beaucoup moins fortes, le sillon longitudinal médian prothoracique très obsolète. l'occiput est déprimé avec une fine carène un peu ogivale, limitant son pourtour antérieur.

Batrisodes multiforus n. sp. — Oblongus, robustus, ferrugineus, pedibus castaneis, tenuiter ciliatus. Caput quadratum, planum, confluenter rugoso-punctatum, angulis supra antennas rotundatis et planis, fronte medio leviter declinata, temporibus leviter rotundatis. vertice et occipite obsolete carinato, sulco parabolico profundo, antice rotundato. Antennae, validae, articulis, 2, 3 quadratis, 4-6 cylindricis latitudine sua dimidio longioribus, 8 quadrato, 9 et 10 subcylindricis, paulo crassioribus, latitudine sua vix dimidio longioribus, 11 praecedente haud crassiore, paulo longiore, basi cylindrico, apice conico. Prothorax irregulariter strigoso-tuberculatus, cordatus, lateribus medio minute et obtuse dentatus, dein ad basin leviter emarginatus, sulcis tribus longitudinalibus validis, quorum medio integro, simplice, foreis lateralibus magnis, quadrato-transversis, sulco transverso nullo, tuberculis subacutis duobus minutis, carinulis duabus obsoletis et irregularibus, utringue ante basin forea magna triangulari et foreolis duabus internis basalibus. Elytra profunde et grosse punctata (punctis setiferis, latitudine sua paulo longiora, basi et apice aequaliter attenuata, humeris obliquis, minute et obtuse nodosis, basi biforeata, stria dorsali recta, profunda, medio abrupta. Abdomen confertim rugosopunctatum, postive attenuatum, segmento dorsali I tantummodo paulo longiore, carinulis marginalibus sat distantibus, interna leviter obliqua. Metasternum impressum. Segmento ultimo ventrali vix depresso, punctato. Pedes validi, trochanteribus leviter angulatis. 2.80 mill.

Sumatra: Palembang.

Cette belle espèce se rapproche de *B. verticinotus* Baffr., mais sa tête est plus plane, sans armature, sa ponctuation est bien plus forte, les articles des antennes sont plus cylindriques.

Batrisodes infandus n. sp. — Oblongus, parum convexus, ferrugineus, sat longe et dense ciliatus. Caput irregulariter et minute tuberculosum, quadratum, lateribus deplanatum, angulis supra antennas rectis et deplanatis, fronte medio paululum declinata, occipite convexo, carinato, postice foreis duabus magnis, inter se multo magis quam a latere distantibus, sulco parabolico profundo, antice vix angutato, inter oculos sulco altero transverso, obsoleto. Antennae parum rlongatae, articulis 2-7 quadratis, 7 paulo majore, 8 minore, subtransverso, 9 et 10 paululum majoribus, subcylindricis, latitudine sua paulo longioribus, 11 ovato, apice acuminato et basi truncato. Prothorax irregulariter tuberculosus, breviter cordatus, lateribus medio dentatus, dein ad basin emarginato-constrictus, sulcis tribus longitudinalibus quorum medio integro, late et postice ampliato, foreis lateralibus magnis, transversis, sulco transverso obsoleto, medio interrupto, tuberculis duobus minutis, subacutis, basi quadriforeata. Elytra parum convexa, minute et disperse, subrugose et setifero-punctata, basi rix attenuata, humeris leviter obliquis, carinatis et dentatis, basi triforeata, stria dorsali ante medium evanescente. Segmento primo dorsali sequente fere duplo longiore, carinis marginalibus leviter distantibus, interna leviter obliqua, basi rotundatim triimpressa. Metasternum profunde sulcatum. Segmento ultimo ventrali ovatim foveato. Pedes parum elongati, validi, tibiis intermediis apice calcaratis. — Long. 2,30 mill.

Sumatra: Palembang.

Cette espèce est plus plate et plus parallèle que la précédente, sa ponctuation est très différente et ses antennes plus courtes. Elle ressemble davantage à *B. satelles* Raffr., mais sa forme et surtout ses élytres sont plus courts.

Batrisodes patranus n. sp. - Oblongus, convexus, ferrugineus vel castaneus, ciliatus. Caput irregulariter et disperse tuberculosum, quadratum, lateribus postice deplanatum, supra antennas angulis leviter elevatis, fronte medio declinata, in occipite utrinque carina obliqua, lata, brevi, rotundata, in medio carina tenui, in vertice cornu elongato, acuto et retrorsum arcuato, sulco parabolico profundo, antice angulato, postice usque ad collum utrinque producto. Antennae ralidae, articulis 3-7 latitudine sua fere dimidio, 8 tantummodo paulo longioribus, 9 et 10 latioribus, breviter truncato-ovatis, 11 ovato, apice acuminato, basi truncato. Prothorax plus minusve obsolete et disperse tuberculosus, cordatus, lateribus medio minute dentatus et dein ad basin leviter emarginato-constrictus, sulcis tribus longitudinalibus quorum medio obsoleto, plus minusve abbreviato, foreis lateralibus magnis, sulco transverso obsoleto sed medio postice maxime angulato, tuberculis duobus spinosis et, in disco, spinis duabus minutis, retrorsum recurvis, basi ipsa quadrifoveata. Elytra tenuissime et disperse punctata, latitudine sua longiora, humeris obliquis, minute dentatis, basi biforeata, stria dorsali tenui, tertia parte anteriore abbreviata. Abdomen postice attenuatum, segmento dorsali 1 seguente tantummodo paulo longiore, carinis marginalibus paululum distantibus, interna obliqua. Metasternum sulcatum. Pedes validi.

7 Trochanteribus anticis apice minutissime acutis. Segmento ultimo ventrali late, sed parum profunde impresso. — Long. 2.30 mill.

Sumatra: Palembang.

Cette espèce est presque en tout semblable à *B. auriculatus* Raffr., mais elle est plus grande, les articles des antennes sont plus longs. l'occiput est moins convexe et la corne plus forte.

**Batrisodes nodosus** n. sp. — Praecedenti valde affinis. Caput similiter sulcatum, occipite et vertice una plano, carinula tenui circumdato, inermi. Antennarum articulis 2, 3, 4, 6, 7 subcylindricis,

latitudine sua paulo longioribus, 5 praecedente fere duplo longiore, orato, infra deplanato, 8 praecedente angustiore et breviore, 9 et 10 duplo latioribus, basi ralde truncatis, intus leviter ampliatis, apice attenuatis, 11 orato, basi truncato, apice valde acuminato, Caeterum sicut in praccedente, elytris attamen paulo brevioribus.

of Trochanteribus intermediis medio minute spinosis, tibiis intermediis apice minute calcaratis. - Long. 2,10 mill. — Fig. 21.

Sumatra: Palembang

surtout au côté interne.

Cette espèce est extrèmement voisine de la précédente, dont elle est cependant très facile à distinguer. Le vertex et l'occiput forment ensemble une plaque ovale entourée par une petite arête; le 5° article des antennes est beaucoup plus grand que les adjacents, ovale et aplati en dessous,



Fig. 21.

Batrisodes indecorus n. sp. - Praecedenti proximus, Inter oculos foreis duabus, sulco parabolico valido, posterius pone foreas haud producto, antice angulato, vertice et occipite simplici, convero et vix perspicue carinato. Antennarum articulis 2-7 latitudine sua longioribus, 8 quadrato, 9 et 10 breviter truncato-ovatis, majoribus, 11 ovato, basi truncato, apice valde acuminato. Prothorax paulo brevior et latior, sulco medio longitudinali toto deficiente. - Long. 4,90 mill.

Sumatra: Palembang.



Fig. 22.

Batrisodes mavortius B. Sp. Oblongus, validus, parum converus, dense pilosus, ferrugineus. Caput rugoso-punctatum, leviter transversum, antrorsum, nonnihil attenuatum, lateribus perparum sinuatum et late deplanatum, supra antennas leviter elevatum et rotundatum, fronte medio longitudinaliter carinata, inter verticem et occiput sulco profundo, aurantiaco-piloso, occipite medio elevato, antrorsum tuberculato et aurantiaco-piloso, utrinque abrupto et foreato, istis foveis sulcum tenuem et extus arcuatum emittentibus, Antennae crassae, articulis 2-6 fere quadratis, 7 quadrato, 8 transverso, 9 et 10 majoribus et minus transversis, 11 orato, basi truncato,

breviter acuminato. Prothorax confertim tuberculosus, cordatus, medio lateribus minute dentatus, sulcis tribus longitudinalibus validis. sulco transrerso nullo, foveis lateralibus validis, tuberculis duobus acutis mediocribus, basi ipsa obsolete quadrifoveata. Elytra minute setifero-punctata, latitudine sua longiora, basi parum attenuata, humeris parum notatis sed minute dentatis, basi trifoveata, stria dorsali ante medium abbreviata. Segmento dorsali 1 sequente paulo majore, carinis marginalibus leviter distantibus, interna paululum obliqua, basi triimpressa. Metasternum sulcatum. Pedes validi, trochanteribus posticis apice longe et perparum arcuatim productis, intermediis medio tenuiter sat longe spinosis. — Long. 2,70 mill. — Fig. 22.

Sumatra: Palembang.

Cette espèce est voisine de *B. dux* Raffr., à laquelle elle ressemble beaucoup, sauf pour l'armature de la tête qui est très différente.

**Batrisodes irritus** n. sp. — Oblongus, fere fusiformis, ferrugineus, nitidissimus, luevis et parce pubescens. Caput subquadratum, antice perparum attenuatum, supra antennas nodosum, fronte medio



Fig. 25.

late deplanata, occipite transversim convexo, inter oculos sulco transverso et transversim angulato. Antennae ralidae, articulis 2-8 moniliformibus, 8 paulo minore, 9 et 10 majoribus, ovatis, 11 oblongo-orato, Prothorar cordatus, lateribus minutissime dentatus, sulcis tribus longitudinalibus, medio antice et postice abbreviato et utringue carinato, tuberculis duobus minutis, acutis, sulco transverso nullo, foreis lateralibus magnis, basi quadrifoveata. Elytra latitudine sua longiora, postice leviter convera et lateribus rotundata, humeris elevatis, obliquis et muticis, basi triforeata, sulco dorsali obsoleto. Abdomen elongatum, convexum, postice attenuatum, segmento dorsali 1 sequente paulo majore, carinis marginalibus distantibus, interna obliqua. Pedes validi,

 Capitis sulco transverso multo profundiore, medio fasciculato, occipite magis elevato et an-

trorsum abrupto. Antennarum articulis 5 paulo majore, 9 oblongoovato, multo longiore et paulo crassiore, 10 magno, irregulariter obconico. Metasternum late concavum. Segmento ultimo ventrali impresso, rugoso. Trochanteribus posticis apice tumidis et acutis, tibiis posticis, intus, media parte apicali, sinuatis et dense longeque ciliatis. — Fig. 25. 2 Metasternum sulcatum.

Long. 2.10-2.15 mill.

Sumatra: Palembang.

Cette espèce vient à côté de *B. cribratus* Raffr., dont elle est d'ailleurs très différente par l'armature de la tête et par la sculpture du corps.

Batrisodes demissus n. sp. — Oblongo-ovatus, sat convexus, ferrugineus, nitidus, pilosus. Caput leviter transversum, lateribus subrectis, ante angulum externum anteriorem subnodosum incisis, fronte medio deplanata et minute biforeata, inter oculos foreis duabus magnis, sulco parabolico obsoleto, vertice et occipite leviter convexo, toto carinato. Antennae breves, articulis omnibus moniliformibus, perparum attamen obconicis, 8 paulo breviore, 9 et 10 paululum majoribus, 11 ovato, acuminato, basi haud truncato. Prothorar convexus, cordatus, medio dentatus et postice emarginato-constrictus, sulcis tribus longitudinalibus quorum medio obsoleto, tuberculis duobus acutis, sulco transverso medio interrupto, basi quadrifoveata. Elutra convexa, latitudine sua longiora, basi attenuata, humeris parum notatis, subrotundatis, basi biforeata, sulco dorsali obsoleto. Abdomen sat latum, conrexum, postice obtusum, segmento dorsali I sequente dimidio longiore, carinulis marginalibus parum 'distantibus, interna leviter obliqua. Metasternum foveatum. Pedes crassi, tibiis anticis et intermediis ad medium et posticis pone medium crassioribus, istis leviter incurvis Q. - Long. 1.60-1.70 mill.

Sumatra: Palembang.

Cette espèce vient à côté de *B. transversalis* et *crenulatus* Raffr., mais elle diffère des deux par l'absence de tubercules sur la tête et le prothorax et, de la première, par la tête sans sillon transversal.

Batrisodes sagax n. sp. — Oblongo-ovalus, sat convexus, ferrugineus, breviter setosus, antennis rufis. Caput obsolete rugosum, tranversum, lateribus leviter obliquis, fronte medio declinata, interoculos foveis duabus, sulco parabolico valido, angulato, occipite transversim convexo, carinato. Palporum articulo ultimo leviter securiformi. Antennae crussae, articulis 2-6 cylindricis, latitudine sua vix longioribus, 8 fere transverso, 9 et 10 multo majoribus, truncato-ovatis, 11 magno, oblongo-ovato, basi truncato, apice longe sed obtuse acuminato. Prothorax seriatim tuberculosus, cordatus, lateribus medio minutissime dentatus, sulcis tribus longitudinalibus quorum medio bicarinato, in disco carinis duabus alteris, postice tuberculis duobus Ann. Soc. Ent. Fr., LXXIII [1904].

munutis, acutis, foveis lateralibus mediocribus, basi quadrifoveata. Elytra punctis profundis maximis, setiferis ornata, latitudine sua paulo longiora, convexa, basi vix attenuata, humeris obliquis, notatis sed muticis, basi trifoveata, sulco dorsali brevi et diffuso. Abdomen breve, postice obtusum, segmento dorsali primo sequente duplo majore, carinis marginalibus paulo distantibus, interna obliqua, basi utrinque impresso. Metasternum oblonge foveatum. Pedes sat crassi, tibiis ad apicem leriter incrassatis, posticis paululum incurvis.

© Capitis sulco transverso multo profundiore, magis angulato, rertice magis elevato et antrorsum abrupto. Antennarum articulis, 5 paulo majore, 9 majore, infra impresso et fundo rugoso, 10 paulo latiore et intus apice nonnihil producto, 11 majore et longiore. — Long. 4,60 mill.

#### Sumatra.

Cette espèce se range à côté de B. hispidulus Raffr., mais la ponctuation des élytres est encore plus forte, les articles des antennes 9 et 40 (surtout 9 chez le mâle) sont plus longs que larges, au lieu d'être globuleux.

Le D' Sharp a décrit beaucoup d'espèces du Japon dont malheureusement très peu me sont connues. J'ai tout lieu de croire que les groupes qu'il a adoptés sont bons : en tout cas celui qui renferme B. ornatus et dans lequel je range les deux espèces nouvelles suivantes est tout à fait naturel.

**Batrisodes Harmandi** n. sp. — Elongatus, subcylindricus, laete castaneus, nitidus, laeris, parce pubescens. Caput quadrato-elongatum, lateribus punctatum, supra antennas rotundatum, haud ele-



Fig. 23.

vatum, fronte deplanata et antice producta, epistomate trifido et setis recurvis ornato, postice foreis duabus magnis, sulco parabolico profundo, antice angulato, occipite verticeque parum convexo, carinato. Antennae crassae, articulis 1 brevi, lato, 2 quadrato, 3 brevissimo, obconico, 4-8 moniliformibus, leviter transversis, 9 paulo majore, infra acute dentato, 10 magno, transverso, intus ampliato, supra convexo, infra excavato, 11 ovato, acuminato. Prothorux cordatus, lateribus medio rotundatus, dein sinuatus et tuberculose dentatus, longitudinaliter trisulcatus et breviter bicarinatus, tuberculis quatuor

mediocribus et subacutis, sulco transverso obsoleto, angulato, medio foceato. Elytra elongata, lateribus postice leriter rotundata, humeris obliquis, prominulis, obtuse dentatis, basi triforeata, stria dorsali brevi et obseteta. Segmento dorsali 1 magno, carinis marginatibus distantibus, interna valde obliqua, basi carinulis duabus brevissimis deplanatis, subapproximatis. Pedes crassi, femoribus crassis, intermediis basi spinosis, tibiis ad apirem incrassatis, intermediis apire calcare crasso, valido, armatis, postiris leviter incurvis, tenuiter et breviter calcaratis of.—Long. 2,20 mill.— Fig. 23.

Japon central.

Je suis heureux de dédier cette jolie espèce à M. Harmand, ministre de France, qui a recueilli au Japon de très intéressantes collections dont il a enrichi le Muséum de Paris.

Batrisodes epistomalis n. sp. — Elongatus, subcylindricus, rubro-ferrugineus, nitidus, laevis, parce flavo-setosus. Caput quadratum. lateribus punctatum, supra antennas rotundatum et haud elevatum, fronte medio obsolete sulcata et valde declinata, epistomate magno, dilatato, medio angulato et utrinque angulo externo

acuto, temporibus valde obliquis, foveis duabus postice sitis, sulco parabolico profundo, antice angulato, occipile verticeque conve.co, carinato. Antennae validae, articulis 1 magno, intus perparum ampliato et leviter compresso, 2 quadrato. 3 breviter obconico, 4-9 quadratis, 9 paululum majore, 10 paulo majore, subtrapezoidali, 11 ovato, acuminato, basi haud truncato. Prothorax elongato-ovatus, lateribus pone medium tuberculo obtuso sinuatis, longitudinaliter trisulcatus et bicarinatus, sulco transverso obsoleto, angulato, tuberculis quatuor mediocribus et muticis. Elytra elongata, lateribus postice rotundata, humeris obliquis, prominulis et minute dentatis, basi trifoveata, stria dorsali tenui, brevi. Abdomen elytris



Fig. 21.

brevius, segmento primo dorsali magno, carinis marginalibus distantibus, interna valde obliqua, basi carinulis duabus brevissimis deplanatis, approximatis. Pedes validi, elongati, femoribus crassis, tibiis ad apicem incrassatis, posticis leviter incurvis et apice tenuiter sat longe calcaratis. — Long. 2,10 mill. — Fig. 24.

Japon central (M. Harmand), (Coll. Muséum de Paris).

Cette espèce, comme la précédente, appartient à un groupe assez nombreux au Japon et bien tranché, dans lequel la tête et les antennes sont plus ou moins anormales. C'est avec les *Batrisodes*, paléarctiques et nord-américains qu'elle présente le plus d'analogies.

# Ophelius n. gen.

Oblongus, antice posticeque attenuatus. Caput magnum, quadratum. Oculi magni, medio siti. Palporum articulis 3 minuto, 4 valido, fusiformi. Antennae elongatae, clara parum distincta. Prothorax valde cordatus, postice valde attenuatus, aequalis, absque sulcis et foveis. Elytra magna. basi maxime attenuata, humeris fere nullis, absque foveis, sutura tantummodo striata. Abdomen conicum, segmentis dorsalibus quatuor primis longitudine aequalibus, carinis marginalibus deficientibus, plicula interna brevissima, a margine distante, tantummodo basi conspicua. Segmentis ventralibus 2-5 aequalibus, coxis posticis approximatis, sed non contiguis. Tarsis elongatis, gracilibus, unguibus binis quorum interno paulo minore.

Ce genre rappelle un peu comme forme le genre Namunia Reitt., mais ses hanches postérieures sont très peu distantes et le métasternum n'est pas tronqué entre elles. Il n'y a pas réellement de marge latérale à l'abdomen; on voit seulement, à la base des quatre premiers segments, un vestige de carinule excessivement courte et relativement très éloignée du bord. Les deux ongles des tarses sont presque aussi développés l'un que l'autre, l'interne étant un peu plus petit. C'est à côté de Batrisopsis Raffr., que ce genre doit prendre place, mais c'est en réalité une forme aberrante.

# Ophelius simplex n. sp. — Fere fusiformis, castaneus, nitidus,



Fig. 26

laevis, breviter pubescens. Caput magnum, quadratum, subdeplanatum, angulis anticis externis rotundatis, temporibus post oculos valde obliquis. Antennae validae, elongatae, articulis 1 brevi, 2-8 subcylindricis, latitudine sua longioribus, 9 et 10 obconicis, paulo crassioribus, 9 duplo. 10 fere triplo latitudine sua longioribus, 11 eadem longitudine, fusiformi. Prothorax capite paulo angustior, latitudine sua longior, cordatus, postice valde attenuatus. Elytra prothorace fere duplo latiora, latitudine sua longiora, ad basin valde et regulariter attenuata, humeris obtuse notatis, Abdomen conicum, elutris longitudine subaequale. Pedes elongati et validi, tibiis ad apicem leviter et regulariter incrassatis. Metasternum sulcatum.

3 Caput in vertice depressum, ista depressione cum foreis magnis, utrinque pone oculos sitis, sulco transverso, profundo juncta, occipite inter foreas elevato, antrorsum truncato et citiato. Antennarum articulo 11 paulo majore et intus leviter ampliato. Trochanteribus posticis apice spinosis, intermediis nodosis, tibiis intermediis apice breviter calcaratis. — Fig. 26.

Q Vertex planus, foveis et sulco transverso obsoletis, occipite multo minus elevato. — Long. 2.70 mill,

Sumatra: Palembang.

#### Nenemeca n. gen.

Crassa, subparallela, subdeplanata. Caput transversum, vertice postice retusum. Oculi paulo pone medium siti. Palporum articulis 3 subtriangulari, telongato, vix fusiformi, leviter intus incurro, basi perparum crassiore, apice acuminato. Antennae breves, crassae, clava triarticulata, parum conspicua. Prothorax transversus, lateribus pone medium, valde, emarginato-constrictus, dentatus, sulcis tribus longitudinalibus et altero transverso angulato. Elytra subquadrata, basi trifoveata, stria suturali integra, sulco dorsali nullo. Abdomen elytris fere longius, segmentis dorsalibus 1, 2, 3 aequalibus, margine laterali deplanata, carina interna maxime obliqua, leviter incurva. Pedes breves, coxis posticis approximatis.

Ce genre, que je suis obligé de séparer de Batrisodema Raffr., auquel il ressemble d'ailleurs beaucoup par sa forme courte, épaisse et parallèle, en diffère surtout par la marge abdominale, qui constitue un caractère très important dans la tribu des Batrisini. Dans Batrisodema cette marge est formée de deux carénes élevées et rapprochées, parallèles, avec l'espace compris entre elles creusé en gouttière; dans Nenemeca, les carènes sont faibles, l'interne, très distante à la base et touchant l'externe au sommet, est très oblique, ce qui rapproche ce geure des vrais Batrisus.

Nenemeca bidentata n. sp. — Oblonga, crassa, castanea, nitida, setis validis dispersis et depressis hirsuta. Caput transversum, trapezoidale, anterius attenuatum, lateribus obliquis, margine frontali perparum arcuata et medio minutissime dentata, inter oculos, pone medium sitos, foceis duabus sulco transverso junctis, sulco altero parabolico antice angulato, occipite transversim, obtuse carinato-elevato et crenulato, medio profunde inciso et fundo minute carinato. Antennae breves, articulis I majore, nitido, caeteris opacis. 27 quadratis, 8 trans-



verso, 9 et 10 septimo paulo majoribus, 11 elongalo, subconico. Prothorax disperse tuberculosus, valde transversus, margine antica leviter arcuata, lateribus ante medium obliquis, medio dentatis, dein coarctatis et profunde et abrupte biemarginatis, sulcis tribus longitudinalibus, foveis duabus lateralibus validis, sulco transverso medio angulato junctis, inter basin et sulcum disco bigibboso, basi depressa et bifoveata. In elytris et abdomine tuberculis minutissimis, dispersis, setiferis. Elytra quadrata, lateribus parallela, humeris rotundatis, leriter elevatis, sulco dorsali brevissimo. Abdomen elytris paulo longius, apice obtusum. — Long. 2.30 mill. — Fig. 28.

Sumatra: Palembang.

Cette espèce est voisine de *N. orbata* Raffr., mais elle en diffère par les points suivants. Tête et prothorax plus transversaux, ce dernier à côtés obliques avant le milieu et ensuite plus profondément biéchancré, ce qui fait paraître les côtés dentés; en arrière du sillon transversal il y a seulement deux gibbosités au lieu de tubercules épineux; les tubercules sétifères des téguments sont moins forts.

# Diaposis n. gen.

Ce nouveau genre ressemble tellement à Batrisodes, qu'il n'en diffère

que sur un point (d'ailleurs très important) dans la classification des nombreuses formes en apparence homogènes, mais réellement distinctes, qui gravitent autour de l'ancien genre Batrisus, aujourd'hui fort réduit, et en dérivent. Dans Batrisodes, la marge latérale de l'abdomen est formée de deux carènes entières qui s'étendent sur les trois premiers segments dorsaux, la carène interne étant plus ou moins oblique sur le premier segment. Dans ce nouveau genre il n'y a qu'une seule carène aux 2º et 3e segments et, au premier segment. la carène interne seule est entière, tandis que l'externe, très forte et très accentuée à la base, est brusquement raccourcie et disparaît au premier tiers; ce qui fail que le premier segment est brusquement plus étroit sur les deux tiers postérieurs qu'à la base.



Fig. 29.

Ce genre ne renferme que *Diaposis carinicoltis* Raffr. (sub *Batrisus*). — Fig. 29.

Batoctenus dimidiatus n. sp. — Elongatus, cytindricus et convexus, castaneus, dense sed breviter pubescens, capite prothoraceque confertim rugoso-punctato. Caput elongatum, deplanatum, lateribus medio arcuatim angustius, fronte medio impressa, postice foreolis duabus parum distinctis. Oculi permagni, facetis magnis constantibus. Antennae validae, articulis 1 majore, 2 quadrato, 3-5 leviter transversis, 6 paulo minore, subquadrato, 7 majore, quadrato, 8 angustiore. latitudine sua paulo longiore, 9 et 10 praecedenti similibus, sed perparum majoribus, 11 ovato, basi truncato. Prothorax suborato-truncatus, lateribus leviter rotundatus, antice paulo plus quam postice attenuatus, basi leviter trisinuata, pone medium foveis duabus a latere distantibus. Elytra valde elongata, fere subparallela, convexa, humeris obliquis et notatis, basi quadriforeata, stria dorsali recta, fere integra. Abdomen cylindricum, apice obtusum, carinis marginalibus tenuibus, approximatis, parum distinctis, in duobus primis segmentis dorsalibus, basi, carinulis duabus brevibus, tertiam partem disci includentibus. Metaslernum profunde sulcatum. Pedes graciles, femoribus anticis crassis, caeteris et tibiis gracilibus, rectis.

3 Antennae validiores, articulis 7 majore, 8 angustiore, 11 intus dilatato-dentato, basi emarginato. Metasternum magis profunde sulvatum. Segmentis ventratibus 4 utrinque dente fasciculato armato, 6 maxime et oratim excavato. — Long. 2,50 mill.

Haute Bolivie: Yuracaris.

Cette espèce diffère des *B. simplex* et *puncticollis* Sharp, principalement par le 41° article des antennes chez le mâle, qui présente à la base, au côté interne, une échancrure qui le fait paraître denté au milieu.

Batoctenus incertus n. sp. — Cette espèce dont je ne connais malheureusement que la femelle, est extrèmement voisine de la précédente. La tête est plus large, moins rétrécie au milieu, sur les côtés. Les antennes sont plus allongées, les articles 3, 4 transversaux, 5, 6 car rés, 7 plus long que large, tous de même épaisseur, 8 de même lon gueur que le précédent, mais un peu plus étroit, 9 et 40 un peu obconiques et légèrement dilatés intérieurement. Le prothorax est plus cordiforme et plus convexe. La taille 2,20 mill. est sensiblement plus petite.

Amazones.

40

# Adiastulus n. gen.

Ce genre est créé pour l'Oxarthrius ophthalmicus Raffr., déjà décrit et figuré. La carène latérale externe de la marge abdominale est entière et s'étend sur plusieurs segments dorsaux, mais l'interne très courte, n'est visible qu'à la base du premier. Le canthus postérieur des yeux se prolonge en une très longue épine. Les palpes sont assez longs, avec le 4° article régulièrement ovoïde et très acuminé. Le prothorax n'a pas de sillon, mais deux très fortes et longues épines anté-basales. Les élytres ont une stric dorsale dépassant le milieu.

# Tableau du genre Batrisocenus

A 2.	Tête médiocre, carrée, yeux situés presque				
	au milieu; deux sillons seulement au pro-				
	thorax; premier segment dorsal excavé à				
	sa base	Groupe	1.		
		Groupe	1.		
A 1.	Tête grande avec les yeux situés tout à fait				
	en arrière, près des tempes.				
B 2.	Prothorax normal, simplement plus ou				
	moins sillonné.				
C 2.	Épistome simple, non prolongé en avant;				
	premier article des tarses non dilaté chez				
	les mâles.				
D 5	Deux sillons longitudinaux, seulement, au				
0 0.	prothorax, le médian faisant totalement dé-				
	fant.				
12 0					
	Abdomen sculpté ou armé chez les mâles.				
	Antennes simples.				
(i 5.	Premier segment dorsal seul sculpté ou				
	armé	Groupe	11.		
(i 4.					
	Premier et deuxième segments dorsaux				
	Premier et deuxième segments dorsaux sculptés ou armés	Groupe	Ш.		
	sculptés ou armés	Groupe Groupe	III. IV.		
G 3.	sculptés ou armés	A			
G 3.	sculptés ou armés	Groupe	IV.		
G 3.	sculptés ou armés	A			
G 3.	sculptés ou armés. Segments dorsaux 3, 4, 5 sculptés ou armés. Quatrième segment dorsal entaillé au sommet. Quatrième segment dorsal mucroné au	Groupe Groupe	IV.		
G 3. G 2.	sculptés ou armés. Segments dorsaux 3, 4, 5 sculptés ou armés. Quatrième segment dorsal entaillé au sommet. Quatrième segment dorsal mucroné au sommet.	Groupe Groupe Groupe	IV. V. VI.		
G 3. G 2. G 1. F 1.	sculptés ou armés.  Segments dorsaux 3, 4, 5 sculptés ou armés.  Quatrième segment dorsal entaillé au sommet.  Quatrième segment dorsal mucroné au sommet.  Articles 5 et 6 des antennes dentés en dedans.	Groupe Groupe	IV. V. VI.		
G 3. G 2. G 1. F 1. E 1.	sculptés ou armés. Segments dorsaux 3, 4, 5 sculptés ou armés. Quatrième segment dorsal entaillé au sommet. Quatrième segment dorsal mucroné au sommet.	Groupe Groupe Groupe	IV. V. VI. VII.		

F <sup>+</sup> 2. Pieds plus ou moins anormaux; antennes		
simples.		
G <sup>1</sup> 3. Cuisses postérieures excisées en dessus	Groupe	IX.
G <sup>1</sup> 2. Cuisses postérieures simplement renflées ou		
mucronées	Groupe	Ν.
G <sup>1</sup> 1. Cuisses postérieures simples.		
H 3. Tibias postérieurs excisés ou armés	Groupe	.1%
H 2. Tibias postérieurs simplement très renflés	Groupe	XII.
H 1. Tibias postérieurs simples, antérieurs ren-		
flés, excisés et carénés en dessus	Groupe	XIII.
F <sup>1</sup> 1. Pieds simples; antennes plus ou moins anor-		
males	Groupe	XIV.
D 4. Les deux sillons longitudinaux et latéraux		
du prothorax entiers et bien marqués, le		
médian variable mais toujours très court		
ou obsolète, rudimentaire, sans cependant		
faire entièrement défaut.		
E <sup>1</sup> 2. Abdomen, antennes et pieds simples	Groupe	XV.
E <sup>1</sup> 1. Tibias postérieurs très fortement renflés, le		
reste simple	Groupe	XVI.
D 3. Prothorax avec trois sillons longitudinaux		
bien marqués et entiers, le médian cepen-		
dant très légèrement raccourci parfois, en		
avant.		
E <sup>2</sup> 2. Coloration d'un brun foncé irisé, avec une		
pubescence d'un blanc argenté, très épaisse		
à certains endroits; segments dorsaux 3 et		
4 excavés et armés	Groupe	XVII.
E <sup>2</sup> 1. Coloration fauve ou testacée; pubescence		
fauve, peu abondante.		
F <sup>2</sup> 2. Abdomen sculpté ou armé.		
G <sup>2</sup> 2. Antennes simples.		
H <sup>1</sup> 6. Premier segment dorsal seul-sculpté ou armé.	Groupe	ZAIII.
<sup>115</sup> . Premier et 2e segments dorsaux sculptés ou		
armés	Groupe	XIX.
H¹4. Premier segment dorsal anormal, 2 <sup>e</sup> et 3 <sup>e</sup>		
armés	Groupe	7.7.
W 3. Premier et 2° segments dorsaux simples, 3°		
et 4° armés ou anormaux	Groupe	XXI.
11 <sup>1</sup> 2. Premier, 2 <sup>e</sup> et 3 <sup>e</sup> segments dorsaux simples.		
¼° sculpté et armé	Groupe	XXII.

H <sup>1</sup> 4. Dernier segment dorsal seul sculpté; tibias		
antérieurs dilatés et fasciculés	Groupe	HYZ
G <sup>2</sup> 1. Antennes anormales chez les mâles.	on out	
H <sup>2</sup> 2. Article 5 des antennes seulement un peu		
plus gros et plus long que les adjacents	Groupe	XXIV.
H <sup>2</sup> 1. Articles des antennes 5 à 7 formant une	cu ou pe	7711.
courbe. 5 et 7 armés	0	1.1.1.
	Groupe	ZZL.
F <sup>2</sup> 4. Abdomen simple.		
G <sup>3</sup> 3. Antennes anormales; pieds simples.	0	31 31 311
H <sup>3</sup> 4. Articles des antennes 5 et 6 dilatés	Groupe	77/1
H <sup>3</sup> 3. Article des antennes 5 un peu dilaté; tête	0	********
grande déprimée en avant, squameuse	Groupe	XXVII.
H <sup>3</sup> 2. Articles des antennes 8 et 9 plus gros, ciliés		
et auriculés	Groupe	XXVIII.
H <sup>3</sup> 1. Articles des antennes 9 et 40 simplement		
beaucoup plus gros, globuleux	Groupe	XXIX.
G <sup>3</sup> 2. Antennes simples; pieds plus ou moins anor-		
maux.		
W5. Cuisses intermédiaires très renflées et inci-		
sées, en dessous, à l'extrémité, les autres		
pieds simples	Groupe	XXX.
H <sup>1</sup> 4. Cuisses intermédiaires simples, postérieures		
simplement mais très fortement renflées	Groupe	XXXI.
H-3. Cuisses postérieures dilatées et fortement		
dentées en dedans	Groupe	XXXII.
H <sup>1</sup> 2. Cuisses postérieures dilatées, excavées et		
armées en dessus	Groupe	XXXIII.
H14. Toutes les cuisses simples, tibias posté-		
rieurs rentlés ou dilatés	Groupe	XXXIV.
G <sup>3</sup> 4. Antennes, pieds et abdomen, simples dans	,	
les deux sexes.		
H <sup>5</sup> 2. Tête simple, normale	Groupe	XXXV.
H <sup>5</sup> 4. Tête anormale avec une dépression trans-		
versale	Groupe	XXXVI.
D 2. Cinq sillons longitudinaux au prothorax		XXXVII,
D 1. Sept sillons longitudinaux au prothorax		XXXVIII
C 4. Épistome prolongé, en avant, en pointe;		
2º article des tarses antérieurs dilaté chez		
les mâles	Gronne	XXXIX.
B 4. Prothorax anormal.		
C <sup>1</sup> 2. Prothorax cordiforme avec une carène lon-		
ti a. 110tholax tolaholine avet tim tateme lon-		

**Batrisocenus siamensis** n. sp. — Oblongus, rubro-castaneus, tenuiter et breviter pubescens, antennis rufis. Caput magnum, quadra tum, inter oculos, postice, foreis duabus. in vertice sulco obsoleto longi-

tudinali, anterius sulco brevi, transverso. Antennae elongatae, articulis oblongis et obconicis, 3, 4, et 6 fere duplo, 5, 7 fere triplo latitudine sua longioribus, 9 et 10 paulo majoribus, oblongovatis, 11 paulo majore, fusiformi. Prothorax valde cordatus, sulcis lateralibus integris, medio deficiente, transverso medio angulato, basi bifoveata. Elytra quadrata, convexa, lateribus rotundata, humeris valde obliquis, dentatis, stria dorsali medium superante. Abdomen elytris paulo angustius, segmento dorsali 1 magno, simplice. Metasternum subgibbosum, lateribus postice subcarinatum. Pedes validi, femoribus incrassatis, libiis anticis et intermediis rectis,



Fig. 30.

posticis maxime incrassatis, fusiformibus. Segmento ultimo ventrali transversim depresso. — Long. 2 mill. — Fig. 30.

Siam.

Cette espèce est voisine de *B. excisus* Schauf., du même pays; elle en diffère par ses tibias postérieurs qui ne sont pas entaillés, mais simplement fortement renflés.

Batrisocenus furcifer n. sp. — Oblongus, convexus, castaneus vel rufo castaneus, sat dense pubescens antennis pedibusque rufos. Caput leviter transversum, lateribus incurrum, supra antennas utrinque nodoso-elevatum, inter oculos anterius foveis duabus valde distantibus, sulco parabolico in fronte quadrato et anterius transverso, occipite mugno, convexo. Antennnae breves, articulis 3-7 longitudine sua tantummodo paulo longioribus, 8 fere quadrato, 9 et 10 majoribus, ovatis, 11 ovato, acuminato. Prothorax capite latior, ovatus, convexus, sulcis tribus longitudinalibus integris et validis, foveis tateralibus magnis, sulco transverso arcuato, hand angulato, basi transversim bifoveata. Elytra minute et disperse punctata latitudine sua longiora, stria dorsali trientem posticum attingente, recta. Metasternum sulcatum. Pedes sat elongati, femoribus leviter claratis, tihiis subrectis, hand incrassatis.



Fig. 31.

S Elytra lateribus rotundata, humeris ralde obliquis et dentatis. Segmento dorsali 1 elytris paulo angustiore, transverso, basi deplanato, medio postice producto-elevato, isto processu bifido et acute bidentato. Segmento ultimo ventrali minute ovatim foreato. — Fig. 31.

\(\phi\) Elytra basi valde attenuata, humeris nullis, lateribus magis obliquis. Segmento dorsali primo minus transverso, simplice. — Long. 4,60 mill.

Sumatra: Palembang.

Batrisocenus tumorosus n. sp. — Oblongus, rufo-castaneus, breviter pubescens. Caput quadratum, lateribus incurrum, supra antennas leviter elevatum, inter oculos medio foveis duabus, sulco parabolico lateribus parallelo, antice quadrato et transverso, vertice et occipite tenuissime sulcato. Antennae mediocres, sicut in praecedente. Prothorax ovato-cordatus, sulco longitudinali medio antice paululum attenuato, transverso medio leviter angulato. Elytra obsolete et minute rugosulo-punctata, latitudine sua multo longiora, ad basin leviter attenuata, humeris obliquis haud dentatis, stria dorsali trientem posticum attingente. Segmento dorsali primo latitudine sua longiore, postice perparum altenuato, postice, medio, tuberculato et infra late foveato. Metasternum parum profunde sulcatum. Pedes minus elongati, femoribus, praesertim anticis, crassis, tibiis anticis et intermediis subrectis, posticis perparum crassioribus et incurvis o. — Long. 1,40-1,60 mill.

Sumatra: Palembang.

Dans cette espèce, toute l'armature du premier segment dorsal consiste en un tubercule recouvrant une grande fossette et situé un peu en avant et au-dessus du rebord postérieur.

Batrisocenus triangulatus n. sp. — Praecedenti forma simi-

lis, magis castaneus. Caput leviter transversum et supra antennas magis elevatum (sicut in B. furcifero). Segmento dorsali primo elytris paulo angustius et multo brevius postice leviter attenuato, postice cava magna triangulari, cujus lateribus leviter sinuatis, angulo superno bifasciculato. Metasternum late deplanatum, lateribus obtuse carinatum et, medio, parum profunde sulvatum. Femoribus, praeser-



Fig. 32.

tim anticis, incrassatis 3. — Long. 1,20 à 1,30 mill. — Fig. 32

Sumatra: Palembang.

Cette espèce a les anntennes, le prothorax et les élytres de *B. tumo-rosus* et la tête de *B. furcifer*: l'armature du premier segment dorsal ressemble beaucoup à celle de *B. excavatus* Raffr., mais l'excavation est triangulaire, les côtés du triangle sont bisinués et l'angle du sommet présente deux pinceaux de poils; en outre, la base est ornée d'un tubercule fasciculé.

Batrisocenus truncatus n. sp. — Rubro-castanens. Prothorax, elytra et antennae sicut in B. tumoroso. Caput sicut in B. furci-

fero. Segmento primo dorsali elytris paulo angustiore, transverso, basi carinulis duabus tertiam partem disci includentibus et usque ad truncaturam extensis, disco inter eas deplanato, apice toto oblique truncato, ista truncatura fere tota rhomboidaliter excavata, cavae margine superiore plurisinuata et minute fasciculata, fundo carinula transversa, fasciculata. Metasternum deplanatum.



Fig. 33

Femoribus parum incrassatis &. - Long. 1,40 mill. - Fig. 33.

Sumatra: Palembang.

Cette espèce est voisine de B. quadratus Raffr., mais l'armature du premier segment dorsal est différente.

Batrisocenus mitratus n. sp. — Oblongo-ovatus, sat crassus, rufo-castaneus, breviter et parce pubescens, antennis pedibusque rufis. Caput quadratum, supra antennas elevatum, lateribus incurvum, fronte transversim impressa, inter oculos, anterius, foveis duabus inter se maxime distantibus, occipite transversim convexo, carinulato. Antennae mediocres, articulis 3-8 leviter obconicis, 5-7 latitudine sua duplo, 3, 4, 8 tantummodo paulo longioribus, ovatis, 11 majore, ovato, acuminato. Prothorax capite latior, lateribus valde rotundatus, sulcis tribus longitudinalibus integris, transverso fere recto, foveis lateralibus validis, forea media antebasali mediocri, basi bifoveata. Elytra magna, subquadrata, convexa, humeris obliquis et dentalis,



Fig. 34.

stria discoidali fere integra et extus ad apicem leviter curvata. Segmento primo dorsali magno, toto depresso, a medio ad apicem oblique attenuato, carinis duabus longitudinalibus integris, apice utrinque, angulum cum margine postica interrupta formantibus, inter eas tertiam partem disci haud includentibus, inter eas disco basi depresso et apice exeavato, ista cava fundo carinulata, apice emarginata et carina erecta praedita. Metasternum sulcatum. Pedes sat elongati, femoribus parum incrassatis 3. — Long. 1.30 mill. — Fig. 34.

Sumatra: Palembang.

Cette espèce vient se ranger auprès de *B. cicatricosus* Raffr., mais elle s'en éloigne par sa taille beaucoup plus petite, ses autennes plus courtes et la singulière armature de l'abdomen qui la distingue de toutes les espèces connues.

Batrisocenus vulneratus n. sp. — Oblongus, validus, castanens, sat longe pubescens. antennis pedibusque rufis. Caput subquadratum, lateribus incurvum, fronte deplanata. profunde impressa, inter oculos foveis duabus magnis, inter se parum distantibus, occipite haud carinato. Antennae elongatae, articulis 1 magno, anterius leviter ampliato et angulo apicali interno spinoso, 2 obconico, 3-8 obconicis, latitudine sua fere triplo longioribus, 8 paulo breviore, 9 et 10 elongatoovatis, majoribus, 11 fusiformi, acuminato. Prothorax capite latior. ovatus, lateribus valde rotundatus et fere lobatus, sulcis tribus longitudinalibus lateralibus sinuatis, foveis tribus sulco transverso recto junctis, basi foveata. Elytra magna, subquadrata, convexa, lateribus rotundata, humeris obliquis, dentatis, stria dorsali ante apicem abbre-



Fig. 35.

ciata, subrecta. Segmento primo dorsali elytris paulo angustius, postice obtuso, basi medio transversim et utrinque rotundatim impresso, postice cava magna, angulatim transversa, cujus marginibus intus sinuatis, apice tuberculo magno, intus bifido et breviter ciliato, basi cornu erecto apice bifido et truncato, lateribus utrinque, sulco obliquo sat profundo et dense ciliato. Metasternum deplanatum, obsolete sulcatum. Pedes clongati, femori-

bus clavatis, anticis crassioribus, trochanteribus anticis minute nodosis 3. — Long. 2 mill. — Fig. 35.

Sumatra : Palembang.

Par l'armature abdominale, cette espèce se rapproche beaucoup de B. tritunatus Raffr., mais l'excavation est plus large, plus transversale, à marge simplement sinuée et non trilobée, et la taille est plus grande.

Batrisocenus carinatus n. sp. — Oblongo-oratus, crassus, castaneus, tenuiter et parce pubescens, antennis pedibuque rufis.

Caput quadratum, lateribus leviter incurrum, supra antennas obtuse elevatum, fronte late deplanata et transversim impressa, inter oculos foreis duabus mediocribus, inter se magis quam ab oculis distantibus, vertice occipiteque sulcato. Antennae graciles, elongatae, articulis 4. 5, 6, 7 longitudine sua triplo, 3 et 8 paulo plus quam duplo tongioribus, 9 et 10 elongato-subconicis, 11 fusiformi. Prothorax capite latior, orato-cordatus, sulcis tribus longitudinalibus rectis, transverso perparum angulato, foveis lateralibus mediocribus, media minore, basi foveata. Elytra magna, convexa, subquadrata, lateribus rotundata, humeris obliquis, muticis, stria dorsali recta, ad apicem abbreviata. Segmento dorsali primo, elytris vix angustiore sed multo breviore, transverso, valde obconico, lateribus leviter depresso, apice medio fovea mediocri breviter ovata, cujus margine superiore transversim carinata, postice carina valida erecta, rotundata et recurra, utrinque ciliata. Metasternum late concavum, lateribus carinato-elevatum. Pedes elongati, femoribus, praesertim anticis, crassioribus, clavatis, tibiis rectis. intermediis sat longe et acute calcaratis o. - Long. 1.80 mill.

Sumatra: Palembang.

Cette espèce se range près de *B. erectus* Reitt., mais les antennes sont beaucoup plus grêles et allongées, le prothorax est bien moins dilaté sur les côtés, et l'armature abdominale, quoique assez voisine, est différente.

**Batrisocenus trigona** n. sp. — Praecedenti valde affinis, sed multo magis elongatus, magis parallelus. Elytra latitudine sua lon-

giora. Segmento primo dorsali elytris paulo angustiore et perparum breviore, haud transverso, postice lateribus rotundatim attenuato et valde depresso, medio cava minore, triangulata, cujus angulo superno tuberculo bifido ornato, postice, ante marginem posticam, carinis tribus superne convergentibus, quarum media magis evecta, rotundata, ciliata, lateralibus minoribus et obsoletis. Metasternum tantummodo deplanatum. Segmento ultimo ventrali valde transversim impresso. Pedes sicut i



Fig. 36.

ventrali valde transversim impresso. Pedes sicut in praecedente 5. -Fig. 36.

2 Elytra paulo breviora, basi gradatim attenuata, humeris nullis. Segmento primo dorsali simplice, minute punctato. — Long. 2.50 mill.

Sumatra: Palembang.

Batrisocenus longipes n. sp. — Breviter ovatus, converus.

rufo-castaneus, sat longe pubescens, antennis pedibusque testaceis. Caput leviter transversum, lateribus valde incurvum, supra antennas obtuse auriculatum, fronte medio depressa, foveolis duabus anterius sitis et inter se magis quam ab oculis distantibus, occipite convexo. Antennae mediocres, articulis, 2 ovato, 3-8 obconicis, 5 et 7 paulo longioribus. 8 praecedente fere dimidio breviore, 9 et 10 ovatis majoribus, 11 magno, ovato, acuminato. Prothorax capite major, fere ovatus, lateribus rotundatus, sulcis tribus longitudinalibus integris, sulco transverso medio interrupto, foveis lateralibus et basalibus magnis. Elytra disperse et obsolete punctata, magna, valde convexa, lateribus rotun-



Fig. 37.

data, humeris obliquis, dentatis, stria dorsali recta, multo ante apicem abbreviata. Abdomen elytris longitudine et latitudine fere dimidio minus, lateribus obliquum, postice attenuatum et rotundatum, segmento dorsali 1, medio, inter carinas duas tertiam partem disci includentes, deplanato et postice rotundatim excavato, utrinque basi impresso, segmento 2, carina valida, recurva, obtusa et in primi cavam

fundo desinente armato. Metasternum sulcatum. Pedes elongati, femoribus medio claratis, tibiis et tarsis elongatis, gracilibus 5. — Long. 1.20 mill. — Fig. 37.

Sumatra: Palembang.

Cette petite espèce est voisine de *B. tarsalis* Reitt., mais elle est encore plus convexe, l'armature abdominale est très différente et les tibias sont plus longs et plus grèles.

Batrisocenus cameratus n. sp. — Oblongus, sat convexus, castaneus, antennis pedibusque rufis, parce pubescens. Caput quadratum, leviter elongatum, fronte deplanata, transversim impressa, lateribus parum sinuatum, supra antennas parum elevatum, inter oculos medio, foveis duabus magis inter se quam ab oculis distantibus, occipite sat longe sulcato. Antennae graciles, articulis 2 subcylindrico, caeteris conicis, 5 et 7 longitudine sua circa triplo longioribus. 6 et praesertim 8, brevioribus, 9 et 10 oblongo-ovatis, majoribus, 11 oblongo-ovato, acuminato. Prothorax capite major, cordatus, convexus, lateribus rotundatus, sulcis tribus longitudinalibus integris, sulco transverso integro, angulato, basi utrinque impressa. Elytra elongata, basi attenuata, humeris fere nullis, stria dorsali recta, ante apicem abbreviata. Abdomen elytris brevius el paulo angustius, segmentis dorsalibus 1 apice sicut tectum rotundatim porrecto, caeteris, supra visis, inconspicuis, verticalibus, 2 medio transversim impresso, 3 transversim excarato et

utrinque dense citiato, lateribus foveato, 4 majore, basi impresso et medio carinato. Metasternum late depressum, squamosum. Segmento ventrali 3 margine apicali medio lamella erecta, transversa praedito, uttimo profunde arcuatim impresso. Trochanteribus intermediis obtuse dentatis, femoribus crassis, tibiis rectis, intermediis apice calcare minuto praeditis 3. — Long. 2,20 mill.

Sumatra: Palembang.

Le premier segment dorsal s'avance en toit au-dessus des autres, qui sont placés perpendiculairement au-dessous, avec leur tranche plus ou moins sculptée. La femelle reste inconnue.

Batrisocenus fornicatus n. sp. — Praecedenti affinis et simillimus. Differt antennis paulo brevioribus, prothorace breviore et magis rotundato, elytris basi minus attennatis. humeris magis obliquis et notatis. Segmentis dorsalibus 1 simplice, postice rotundato, caeteris perpendicularibus et, supra visis, inconspicuis, 2 et 3 minutis, simplicibus, 4 magno, medio rotundatim carato, margine postica obtusa, medio, tuberculo erecto, longe ciliato, praedita. Metasternum depressum, squamosum, Segmento ventrali ultimo transversim, irregulariter impresso. Trochanteribus et tibiis inermibus 3.

Sumatra: Palembang.

Le premier segment est grand, un peu convexe, arrondi au bout, les autres sont placés perpendiculairement; le 4° est très grand, avec une cavité médiane un peu conique, son rebord postérieur, ou plutôt inférieur, est convexe avec, au milieu, un gros tubercule longuement cilié et dont le pinceau dirigé en haut cache en partie la cavité.

Batrisocenus binodosus n. sp. — Oblongus, fere fusiformis, rubro-castaneus, subtiliter (in capite fortius) punctatus, brevissime griseo-pubescens. Caput quadratum, deplanatum, lateribus sinuatum, supra antennas obtuse nodosum, fronte medio late deplanata, declivi, sulco brevi transverso, inter oculos medio foveis duabus parum profundis, occipite haud sulcato. Antennae elongatue, articulis 1 crasso, 2-7 obconicis, latitudine sua duplo, 8 dimidio, longioribus, 9 et 10 maximis, 9 breviter obconico. 10 ovato, longiore, 11 fusiformi, praecedente haud longiore et dimidio angustiore. Prothorax cordatus, convexus, lateribus rotundatus et pone medium leviter sinuatus, sulcis longitudinalibus tribus, quorum medio antice abbreviato, sulco transverso obsoleto, recto, basi impressa. Elytra latitudine sua vix longiora, lateribus leviter rotundata, basi allenuata, humeris muticis, parum notatis, stria Aun. Soc. Eot. Fr., exxiii 1904).

dorsali ad quartam partem posticam abbreriata. Abdomen elytris paulo longius, postice attenuatum, segmentis dorsalibus, 1 simplice, valde transverso, basi medio transversim et utrinque rotundatim impresso, caeteris multo minoribus et, supra visis, conspicuis. Metasternum sulcatum. Pedes simplices, femoribus medio clavatis, tibiis rectis, gracilibus 2.— Long. 2,60 mill.

Sumatra : Palembang.

Cette espèce se distingue par la grosseur des 9° et 10° articles des antennes, qui sembleraient indiquer un mâle, tandis que l'exemplaire unique que je possède est certainement une femelle. Il est probable que le mâle doit avoir des antennes très anormales.

Batrisocenus calcaratus n. sp. — Oblongus, sat crassus, castanens, breviter pubescens, antennis rufis, Caput quadratum, deplanatum, angulis omnibus rotundatis, supra antennas vix elevatum. fronte medio depressa et declivi, lateribus sinuatum, antice sulco transverso, inter oculos foreis duabus et medio sulco longitudinali sat profundo, antice posticeque abbreviato. Antennae elongatae, graciles, articulis 1 magno, cylindrico, 2-10 obconicis, 2, 3, 4, 6, 8 latitudine sua duplo longioribus, 2 paulo crassiore, 5, 7, 9, 10 triplo longioribus, 9 et 10 apice paululum clavatis, 11 fusiformi, acuminato. Prothorax cordatus, longitudinaliter trisulcatus, sulco medio antice abbreviato et postice in foream mediocrem desinente, sulco transverso obsoleto, recto, basi utrinque transversim impressa. Elytra latitudine sua longiora, lateribus vix rotundata, humeris obliquis, muticis, stria dorsali ante apicem abbreviata. Abdomen elytris brevius, postice obtusum, segmentis dorsalibus 1 magno, simplice, caeteris, supra visis, parum conspicuis, Metasternum sulcatum. Segmento ultimo ventrali leviter impresso. Femoribus anticis et posticis medio claratis, intermediis tumidis et ante apicem utrinque compressis, tibiis rectis, intermediis, apice longe et oblique calcaratis. trochanteribus intermediis dente brevi praeditis 3. — Long. 2.30 mill.

Sumatra : Palembang.

Cette espèce se distingue par ses cuisses intermédiaires très grosses, comprimées latéralement de chaque côté avant l'articulation et le long éperon oblique des tibias aux mêmes pieds.

Batrisocenus saucitpes n. sp. — Oblongus, castaneus, sat longe pubescens, disperse et parum profunde punctatus. Caput deplanatum, lateribus parum sinuatum, temporibus valde rotundatis, angulis anticis supra antennas leviter expansis, auriculatis et apice truncatis, fronte late deplanata et anterius producta, leviter deflexa, obsolete biimpressa, inter oculos medio foveis duabus inter se magis quam ab oculis distantibus. Antennae sat crassae, articulis 1 crassiore, 3-7 subobconicis, latitudine sua duplo longioribus, 2, 5, 7, prasertim 2, paulo crassioribus, 8 praecedente paulo breviore, 9 et 10



Fig. 38.

majoribus, ovatis, 11 ovato, basi leriter truncato, apice acuminato. Prothorax breviter cordatus, convexus, longitudinaliter trisulcatus, sulco transverso integro, recto. Elytra latitudine sua longiora, lateribus parum rotundata, humeris obliquis, minute dentatis, stria dorsali recla, ante apicem abbreviata. Abdomen elytris brevius, segmento dorsali 1 magno. Metasternum sulcatum et utrinque minute et oblique carinatum. Segmento ultimo ventrali foveato. Femoribus anticis crassis intermediis mediocribus, posticis crassis et supra deformatis, extus circa medium profundissime, oblique excavatis, margine superiore contorta et membrana-

cea, irregulari J. - Long. 4.90 mill. - Fig. 38.

Chine: Haining.

Cette espèce ressemble à *B. septemfoveolatus* Schauf.. qui est répandue dans toute la région indo-malaise : mais la tête est très différente, beau coup plus plate, un peu élargie en avant : l'armature des cuisses postérieures est différente ; il y a à la face supérieure, entre la base et le milieu, un sillon longitudinal, aboutissant dans un sillon oblique situé à la face externe, du double plus large et plus profond; l'une des marges de ce grand sillon est épaisse, arrondie et munie d'une membrane tordue, l'autre est plus irrégulière et plus tranchante.

Batrisocenus deformipes n. sp. — Oblongus, sat convexus, castaneus, antennis rufis, breviter pubescens. Caput quadratum, lateribus sinuatum, supra antennas nodosum, fronte late deplanata, transversim sulcata et antrorsum declinata, vertice et occipite sat convexo, inter oculos foveis duabus mediocribus, magis inter se quam ab oculis distantibus, occipite postice breviter sulcato. Antennae mediocres, articulis obconicis latitudine sua haud duplo longioribus, 3 et 7 paulo longioribus, 8 fere quadrato, 9 et 10 paulo majoribus, ovatis, 11 orato, acuminato. Prothorax convexus, breviter cordatus, longitudinaliter trisulcatus, sulco medio antice ralde atlenuato, sulco transverso recto. Elytra latitudine sua multo longiora, lateribus parum rotundata, basi attenuata, humevis fere nullis, stria dorsali apicem fere attingente.



Fig. 39.

Abdomen elytris brevius, postice obtusum. Pedes mediocres, femoribus clavatis.

of Metasternum late depressum, lateribus minute carinatum, fundo forea oblonga. Trochanteres intermedii ad apicem fasciculati, tibii intermedii apice minute et breviter calcarati, femora postica tumida, pone medium compressa et oblique laminata, ista lamina fasciculata, dein ad apicem abrupte emarginata et angustiore. Humeris paulo magis obliquis. — Fig. 39.

Q Metasternum sulcatum, Humeris nullis, elutris basi magis attenuatis. — Long. 1,60-1,80 mill.

Sumatra : Palembang.

Cette espèce est voisine de la précédente et de B. septemforeolatus, Schauf., mais l'armature des cuisses postérieures est différente : la cuisse est fortement renflée, puis, au delà du milieu, comprimée en dessus. comme si elle avait été pincée, la partie pincée du tégument formant une carène oblique et ciliée; cette compression est suivie immédiatement d'un étranglement brusque qui se prolonge jusqu'à l'extrémité.

Batrisocenus cultripes n. sp. - Oblongus, rufo-castaneus,

subtiliter et breviter pubescens. Caput quadratum, supra antennas teriter elevatum, in fronte parum deplanatum, transversim sulcatum, inter oculos medio foreis tribus, quarum media sulciformi. Antennae elongatae, articulis obconicis, latitudine sua duplo longioribus, 6 et 9 paulo longioribus, 10 fusiformi, eadem longitudine, vix crassiore, 11 paulo majore, fusiformi, acuminato. Prothorax convexus, cordatus, sulcis tribus longitudinalibus integris, medio postice foreato, sulco transverso integro, tenui, angulato. Elytra latitudine sua longiora, lateribus parum rotundata, humeris obliquis sed obtusis et muticis, stria dorsali tertia parte evanescente. Abdomen elytris brevius, postice obtusum, seqmento primo dorsali transverso, basi, medio, late transversim et utrinque rotundatim impresso. Metasternum anguste concavum. Segmento ultimo ventrali toto transversim et subarcuatim profunde impresso, margine apicali minute medio carinata. Pedes etongati, femoribus clavatis, tibiis anticis et intermediis rectis, istis apice breviter calcaratis, trochanteribus intermediis dense citiatis, tibiis posticis irregularibus, ad medium crassioribus, dein extus late, profunde et sinuatim

sulvatis, isti sulvi margine superiore dilatata et cul-



Fig. 40.

trata, apice obtique truncata, intus rugoso-punctata 3. — Long. 2.20 mill. — Fig. 40.

Sumatra : Palembang.

La forme des tibias postérieurs fera immédiatement reconnaître cette espèce.

**Batrisocenus major** n. sp. — Praecedenti simillimus. Differt attamen femoribus magis clavatis, fovea media sulciformi in capite obsoletissima, segmento primo dorsali basi rotundatim quadriimpresso.

- 3 Antennae elongatae, articulis, 3, 4, 8, 9, 10 latitudine sua duplo longioribus, 3 et 4 conicis, 8 cylindrico, 9 et 10 paulo crassioribus, oblongo-ovatis, 5, 6, 7, subcylindricis, latitudine sua triplo longioribus, 11 oblongo-ovato, valde acuminato. Metasternum late concarum. Segmento ultimo ventrali vix impresso. Tibis simplicibus.
- Antennae multo breviores, articulis obconicis, 3, 4, 8 latitudine sua haud duplo longioribus, 5, 6, 7 duplo longioribus, 7 paulo majore, 9 et 10 paulo majoribus, oblongo-ovatis. Elytra basi attenuata, humeris nullis, rotundatis. Long. 2.40 mill.

Sumatra: Palembang.

La femelle pourrait aussi bien être considérée comme celle de *B. cultripes*; c'est là un fait qui n'est pas rare chez les Psélaphides : cependant, dans le cas présent, il y a une différence dans les impressions basales du premier segment dorsal et dans la fossette médiane sulciforme de la tête, qui est très obsolète chez *B. major*, tandis qu'elle est très marquée chez *B. cultripes*. Les cuisses sont aussi plus épaisses, quoique simples dans les deux sexes, chez *B. major*.

Batrisocenus sinensis n. sp. — Oblongus, subparallelus, obscure castaneus, sat dense pubescens, setis aliquot longioribus erectis. Caput fere transversum, angulis anticis supra antennas leviter elevatis et oblique truncatis, fronte medio late deplanata, leviter prominente et declinata, inter ocutos medio foveis duabus inter se valde distantibus, sulco parabolico in fronte angulato, occipite simplice. Antennae validae, articulis 3-10 conicis, 3-8 inter se aequalibus et latitudine sua dimidio longioribus, 5 et 7 paulo longioribus, 9 et 10 majoribus, 8 fere duplo longiore. 11 majore, ovato, acuminato. Prothorax convexus, cordatus, lateribus parum rotundatus, sulco medio tenui, antrorsum attenuato, sulco transverso obsoleto, sed integro, leviter angulato, basi rugosula. Elytra latitudine sua longiora, lateribus subparallela, humeris leviter obliquis, obtuse dentatis, stria dorsali ante apicem evanescente. Abdomen elytris paulo brevius, lateribus subparallelum, postice rotundatum

segmento primo dorsali magno, basi, medio, transversim et utrinque rotundatim impresso. Metasternum deplanatum, breviter sulcatum. Segmento ultimo ventrali carinula brevi basi praedito. Pedes elongati, femoribus medio clavatis, tibiis subrectis, simplicibus, coxis anterioribus seta elongata munitis 5? — Long. 4,70 mill.

Chine: Hong-Kong.

La forme de l'abdomen assez convexe en dessous semblerait indiquer une femelle, mais d'autre part les épaules sont dentées et obliques, ce qui est normalement l'apanage exclusif des mâles : le sexe reste donc douteux, mais l'espèce se distingue de toutes les autres par la forme du sillon céphalique composé de deux sillons obliques se réunissant sur le front, en dessinant une ogive au lieu d'un fer à cheval, dont la partie antérieure est généralement carrée, le sillon frontal étant transversal.

Batrisocenus indecorus n. sp. — Oblongus, rufo-castaneus. sat breviter pubescens, Caput subquadratum, lateribus sinuatum, supra antennas subauriculatum et angulatum, fronte late deplanata, parum declinata, antice obtuse triangulari, vertice convero, inter oculos medio foveolis duabus inter se ralde distantibus, utrinque sulco obsoleto obliquo cum sulco frontali juncto, occipite tenuiter carinato. Antennae mediocres, articulis vix conicis, latitudine sua tantummodo saulo longioribus, 5 et 7 paulo longioribus, 8 breviore, 9 et 10 paulo majoribus, ovatis, 11 ovato, parum acuminato. Prothorar convexus, subovatus, lateribus rotundatus, sulco medio longitudinali fere integro, sulco transverso valido, integro, angulato. Elutra latitudine sua multo longiora, lateribus vix rotundata, humeris fere rotundatis, muticis, stria dorsali fere integra. Abdomen elytris brevius et paulo angustius, lateribus leviter obliquum, postice attenuatum, segmento primo dorsali magno, rix transverso, basi carinis duabus brevibus, inter se tertiam partem disci deplanatam includentibus, utrinque depressione lata, subrotundata, parum profunda. Metasternum sat convexum, profunde sulcatum, Segmento ventrali ultimo simplice. Pedes sat elongati, femoribus claratis, tibiis ad apicem leviter crassioribus, intermediis apice teviter calcaratis, trochanteribus intermediis spina minuta praeditis ♂. - Long, 1,60 mill.

Sumatra: Palembang.

La forme de la tête, obtusément triangulaire en avant, le fera facilement reconnaître

Batrisocenus annamita n. sp. — Oblongus, postice subparal-

tellus, rubro-castaneus, parce pubescens, antennis pedibusque rufis. Caput quadratum, lateribus vix sinuatum, supra antennas parum nodosum. fronte deplanata et leviter declinata, breviter transversim impressa. inter oculos medio foveis duabus, inter se plus quam ab oculis distanti bus et utrinque sulco obliquo cum sulco frontali transverso juncto, occipile verticeque tenuiter carinalo. Antennae mediocres, articulis 3-8 subaequalibus, vix conicis et latitudine sua circa dimidio longioribus. 9 et 10 majoribus, ovatis, 11 ovato, acuminato. Prothorax convexus. breviter ovatus, antice plus quam postice attenuatus, lateribus rotundatus, sulcis lateralibus leviter sinuatis, medio profundo, integro, transverso profunde angulato et valido, basi postice leviter elevata et profunde utrinque impressa. Elytra latitudine sua parum longiora, lateribus fere parallela, humeris obliquis, minute dentatis, stria dorsali ante apicem abbreviata. Abdomen elytris vix brevius, postice obtusum, segmento primo dorsali magno, vir transverso, basi, medio, transversim impresso et deplanato, utrinque rotundatim impresso. Metasternum sulcatum. Segmento ultimo ventrali simplice. Pedes mediocres, femoribus parum clavatis, tibiis, praesertim posticis, ad apicem incrassatis 3? -Long. 4,80 mill.

Annam : Hué.

Cette espèce est évidemment voisine de *B. sinensis*, mais les antennes sont beaucoup moins fortes, avec leurs articles à peine coniques; le prothorax est assez régulièrement ovale avec le sillon médian très profond.

Batrisocenus quadraticeps n. sp. — Breviter ovatus, castaneus, sat dense pubescens, antennis pedibusque rufis. Caput magnum leviter transversum, supra antennas vix elevatum et fronte parum deplanatum, sulco transverso frontali valido, inter oculos, medio, foveis duabus latis sed parum profundis, inter se haud multo magis quam ab oculis distantibus, occipite parum convexo, longe carinato. Antennae breves, articulis 3-8 subovatis, 9 et 10 majoribus, breviter ovatis, 11 orato, acuminato. Prothorax longitudine sua latior, lateribus valde rotundatus, antice posticeque subaequaliter valde attenuatus, sulco medio profundo, integro, transverso profundo, angulato. Elytra latitudine sua longiora, lateribus vix rotundata, humeris obliquis, minute dentatis, stria dorsali post medium abbreviata. Abdomen elytris brevius, postive nonnihil attenuatum, obtusum. Metasternum medio oblonge foveatum. Segmento ultimo ventrali et pedibus simplicibus, femoribus clavatis, anticis multo crassioribus, tibiis rectis Q. — Long, 4,60 mill.

Sumatra: Palembang.

Batrisocenus immundus n. sp. — Breviter ovatus, obscure castaneus, antennis pedibusque rufis, sat dense griseo-pubescens. Caput mediocre, leviter transversum, supra antennas parum nodosum et fronte leviter deplanatum, sulco frontali transverso valido, utrinque foreato. inter oculos medio foveis duabus profundis, liberis, inter se magis quam ab oculis distantibus, occipite carinato. Antennae breves, articulis 3-8 obconicis, latitudine sua tantummodo paulo longioribus, 9 et 10 majoribus, breviter ovatis, 11 ovato, acuminato. Prothorax convexus, breviter cordatus, postice plus quam antice attenuatus, lateribus rotundatus, sulco medio integro, valido, transverso parum profundo, leviter angulato. Elytra latitudine sua vix longiora, basi attenuata, lateribus et humeris rotundata, stria dorsali quarta parte posteriore abbreviata. Abdomen elytris subaequale, postice attenuatum, segmento primo dorsali magno, basi transversim late sed obsolete et lateribus rotundatim minute impresso. Metasternum sulcatum. Pedes mediocres, simplices Q. - Long. 4,50 mill.

Sumatra nord.

Cette espèce se fait remarquer par la forme de son prothorax qui, contrairement à la forme normale, est plus étroit en arrière à la base, qu'auprès du cou en ayant.

Batrisocenus capitatus n. sp. - Oblongus, cinnamomeus, pubes mediocris, depressa. Caput confertim rugoso-punctatum, postice parum convexum, antice deplanatum, supra antennas angulo externo rotundatum, fronte triangulatim productum, utrinque ante oculos valde impressum, sulco transverso profundissimo cujus margo anterior carinata est, occipite vix perspicue sulcato. Antennae crassae, articulis 1 brevi, extus latiore et rotundato, 2-8 obconicis, latitudine sua vix longioribus, 9 et 10 majoribus, breviter ovatis, 11 majore, ovato, acuminato. Prothorar disperse et minute punctatus, fere transversus, lateribus rotundato-ampliatus, antice posticeque valde attenuatus, sulvis lateralibus leviter sinuatis, medio integro, profundo, transverso valido, arcuato et medio angulato. Elytra substrigosa et transversim sat grosse punctata, latitudine sua longiora, lateribus subparallela, humeris obliquis, valde notatis et muticis, stria dorsali pone medium evanescente. Abdomen sat dense et minute punctatum, elytris paulo angustius, postice attenuatum, segmento primo dorsali leviter transverso, basi, medio, transversim et utringue rotundatim impresso. Metasternum concavum et fundo sulcatum. Segmento ultimo ventrali vix impresso. Femoribus. praesertim anticis, crassis, tibiis subrectis intermediis apice, calcare longo, recurro, armatis - .. Long. 2 mill.

Sumatra nord.

Cette espèce se distingue de toutes les autres par la forme de sa tête et sa ponctuation.

Batrisocenus carinicollis n. sp. — Oblongus, antice angustior, capite prothoraceque nigro, elytris rubris, abdomine castaneo, pedibus antennisque rufis, longe, parum dense ciliatus. Caput quadratum,

supra antennas vix nodosum, fronte depressa et declinata, inter oculos, foveis duabus, inter se paulo magis quam ab oculis distantibus, sulco parabolico antice transversim rotundato. Antennae elongatue, validae, articulis subcylindricis, 2, 4, 6 latitudine sua duplo, 5, 7 fere triplo, 3, 8 dimidio longioribus, 9 et 10 majoribus, ovatis, 11 majore, ovato, acuminato. Prothorax anguste et irregulariter truncato-ovatus, disco irregulari, anterius depressione profunda, magna, carina brevi et postice fasciculata, interrupta, utrinque sulco laterali arcuato, prolongata, disco utrinque oblique depresso, basi media transversim et utringue subrotundatim impressa. Elytra quadrata, basi parum attenuata, humeris obliquis, parum prominulis et muticis, stria dorsali pone medium evanescente. Abdomen elutris paulo angustius et brevius, lateribus parallelum et postice rotundatum, segmento primo dorsali transverso, basi, medio, transversim et utrinque rotundatim impresso, Metasternum sulcatum, Seg-



Fig. 41.

mento ultimo ventrali transversim toto parum profunde deplanato. Femoribus clavatis, trochanteribus anticis plus et intermediis minus dentatis, tibiis rectis, intermediis apice minute calcaratis ♂. — Long. 2 mill. — Fig. 41.

Australie : Botany Bay.

Le prothorax, beaucoup plus étroit que d'habitude, est très bizarrement sculpté: tout à fait en avant il y a une grande dépression transversale et profonde que divise en deux une carène longitudinale, courte, recourbée et fasciculée en arrière: la dépression se prolonge, de chaque côté, par un sillon arqué, large et profond qui suit la courbure des côtés et se perd en arrière; sur le disque il y a deux impressions beaucoup moins profondes, larges, placées obliquement et se touchant par le sommet.

Batrisinus elegans n. sp. - Elongatus, gracilis, convexus, nitidissimus, obscure castaneus, setis dispersis et depressis. Caput latitudine sua longius, antice paulo latius, supra antennas convexo-elevatum, fronte profunde depressa, temporibus parum obliquis, inter oculos foreis duabus a latere parum distantibus, sulco parabolico antice angulato, occipite tenuiter carinato, ista carina in vertice crassiore et magis elevata, Oculi medio siti, conici, prominentes. Antennae validae, elytrorum apicem fere attingentes, articulis 1 crassiore, sequentibus cylindricis, 3, 4, 8 latitudine sua duplo, 5, 6, 7 triplo longioribus, 9 et 10 septimo paulo brevioribus, leviter obconicis et crassitudine crescentibus, 11 fusiformi, basi truncato. Prothorax suboratus, antice plus et postice minus attenuatus, lateribus pone medium minute foreatus, ante basin in disco tuberculis duobus minutissimis et acutis, basi ipsa obsolete bifoveata. Elytra latitudine sua longiora, subovata, lateribus rotundata, antice posticeque aequaliter attenuata, stria suturali integra, caeterum absque foveis et striis. Abdomen elytris minus, suboratum, basi valde attenuatum, postice obtusum, segmentis aequalibus. Metasternum late convexum et obsolete sulcatum, segmento ultimo ventrali magno, subquadratim toto depresso. Pedes validi, elongati, femoribus leviter clavatis, tibiis subrectis, intermediis et praesertim posticis, ad apicem leviter incrussatis 3. - Long. 2,20 mill.

Sumatra: Palembang.

Batrisinus gravidus n. sp. — Oblongus, ferrugineus, nitidus. longe fulvo-ciliatus. Caput trapezoidale, leriter transversum et antice paulo attenuatum, postice foreis duabus profundis, inter se et ab oculis subaequaliter distantibus, sulco parabolico lateribus profundo et obliquo, in fronte obsoleto et subangulato, occipite verticeque carinato. Oculi prominuli, obtuse conici. Antennae validae et elongatae, clava inconspicua, articulis 1 brevi, caeteris latitudine sua longioribus, 2-10 eadem longitudine, 2-8 subobconicis 9 et 10 valde obconicis, 11 longiore, fusiformi, basi truncato. Prothorax latitudine sua longior, lateribus anlice rotundatus, medio obtuse angulatus, dein perparum emarginatus et ad apicem parallelus, tuberculis duobus obtusis et fovea media magna, subtransversa, basi transversim convexa et utrinque bifoveata, forea externa oblonga. Elutra latitudine sua longiora, basi et apice aequaliter attenuata, lateribus leriter rotundata, humeris elevato-carinatis et obtuse dentatis, basi trifoveata, sulcis duobus dorsalibus obsoletis et brevibus. Abdomen elytris longius, parum convexum, subovatum, basi angustius, apice attenuatum, segmentis dorsalibus subaequalibus, attamen leviter decrescentibus, primo, basi in margine, brevissime bivarinato, caelerum immarginatis. Metasternum sulcalum. Segmento ultimo ventrali utrinque emarginato et medio rotundatim sublobato. Pedes validi, femoribus valde clavatis, tibiis rectis Q?. — Long. 3,60 mill.

Sumatra: Palembang.

Dans cette espèce, la tête est plus trapézoidale, les yeux sont moins acuminés, le prothorax plus rétréei en arrière, les élytres ont trois fossettes basales et deux sillons courts et diffus.

Mina nasuta n. sp. — Elongata, minus convexa, rufo-castanea, nitida, disperse pubescens. Caput deplanatum, antice vir attenuatum, rugoso-punctatum, fronte recte truncata et medio obtuse producta, inter oculos foreis duabus minutis, sulco parabolico elongato, lateribus recto, anterius rotundato. Antennae validae, articulis 1 cylindrico, apice leviter sinuato, quatuor sequentes longitudine fere aequante, 2 ovato, 3, 4 minoribus, 5 ovato, secundum fere aequante, 6 et 8 quadratis, 7 paulo longiore, 9 et 10 majoribus, 9 globoso, 10 transverso, 11 subconico. Prothorax capite multo latior, latitudine sua tantummodo paulo longior, subcordatus, simplex. Elytra disperse, grosse, sed obsolete punctata, latitudine sua longiora, lateribus leviter rotundata, basi et postice parum attenuata, humeris subquadratis et notatis, basi impressa. Abdomen elytris brevius, basi valde attenuatum et angustius, lateribus rotundatum, postice attenuatum, segmento primo dorsali magno, basi inaequaliter triimpresso, impressione media transversa et latiore. Metasternum elevatum sed deplanatum et oblonge foveatum. Segmento ultimo ventrali impresso. Pedes parum elongati, femoribus clavatis, tibiis subrectis et simplicibus of. - Long. 1,30 mill.

Sumatra nord.

Cette espèce se rapproche beaucoup de *M. rugiceps* Raffr., mais les élytres sont plus courts, plus carrés. l'abdomen plus étranglé à la base et le prothorax sans aucune sculpture.

#### Batrisiella n. gen.

L'unique espèce de ce genre nouveau, B. caviventris Raffr., que j'avais rangée parmi les Eubatrisus, en est en effet très voisine; mais elle doit cependant en être séparée, à cause du dernier article des palpes qui est absolument simple et assez régulièrement fusiforme. Le genre Batrisiella présente la plus grande analogie avec le genre Batrisocenus, dont il s'éloigne cependant par ses hanches postérieures tres distantes et le métasternum largement tronqué entre elles.

#### Batribolbus n. gen.

Ce nouveau genre est extrêmement voisin de *Eubatrisus* avec lequel je l'avais confondu jusqu'à ce jour : le dernier article des palpes est



Fig. 42.

gros dans les deux sexes, plus fort et plus ou moins angulé chez le mâle; les hanches postérieures sont distantes et le métasternum tronqué, comme chez Eubatrisus: mais les différences existent surtout dans la marge latérale de l'abdomen qui fournit, dans cette tribu, des caractères



Fig. 43.

très importants. Chez *Eubatrisus*, il n'y a qu'une carène marginale limitée au premier segment dorsal; chez *Batribolbus*, il y en a deux, dont l'interne très oblique, arquée comme dans le genre *Batrisodes*.

Je tigure les palpes de deux espèces, B. palpator (fig. 42) et pubescens Raffray (fig. 43).

# Batrisomalus n. gen.

Les espèces qui rentrent dans ce nouveau genre et qui, jusqu'à ce



Fig. 41.

jour, semblent confinées à Ceylan et dans l'Inde méridionale, avaient été rapportées par moi au genre Batrisodes (Batrisus olim), comme y constituant un groupe à part et très tranché (Ann. Soc. ent. Fr. 4893, p. 448). En dehors de leur facies particulier déjà signalé et des différences déjà indiquées, il devient indispensable de les séparer des Batrisodes et même de les en éloigner considérablement, en raison des hanches postérieures écartées et du métasternum tronqué, caractère qui est spécial à un petit nombre de genres dans cette tribu, et les range dans un groupe à part qui semble devoir établir le passage à la tribu des Brachyglutini (Bryaxini olim). Je donne la figure de Batrisomatus hemipterus Raffray. — Fig. 44.

Aux espèces déjà connues il faut ajouter la suivante.

**Batrisomalus infossus** n. sp. — Oblongus, subdepressus et subparallelus, castaneus, pedibus antennisque paululum pallidioribus,

setis dispersis, sat longis et adpressis, flavis, ornatus. Caput leviter transversum et trapezoidale, antice attenuatum, lateribus obliquis, fronte medio ralde depressa, temporibus rotundatis, inter oculos foreis duabus. sulco parabolico lato et profundo, leviter sinuato et in fronte obtuse angulato, occipite postice medio depresso, carinula longitudinali a collo usque ad verticem extensa. Oculi paulo pone medium siti, mediocres, Antennae mediocres, articulis 1 crassiore, 2-7 latitudine sua paulo longioribus, 5 et 7 perparum longioribus, 8 quadrato, 9 et 10 paulo majoribus et leviter transversis, 11 breviler orato. Prothorax capite latior, transversus, breviter cordatus, lateribus antice rotundatus, pone medium forea laterali, profunde emarginatus et abrupte constrictus, muticus, trisulcatus, sulcis lateralibus arcuatis, in fovea laterali desinentibus et intus univarinatis, sulvo medio integro, bicarinato, posterius in foren punctiformi terminato, carinis duabus alteris postice tuberculo acuto terminatis, basi ipsa medio breviter carinulata et utrinque bifoveata. Elytra punctis magnis, dispersis, setiferis, ornata, latitudine sua longiora, deplanata, lateribus subparallela, humeris subquadrata et obtuse dentata, basi triforeata, stria dorsali tenui ad medium abbreviata. Abdomen elytris subaequale, lateribus parallelum et postice fere rotundatum, segmento primo dorsali magno, basi utrinque impresso, carinula marginali interna vix obliqua. Metasternum breviter sulcatum, Pedes breves et crassi Q. - Long. 2,10 mill.

Inde méridionale.

Cette espèce diffère des autres par ses élytres bien plus longs et ornés de gros points sétifères assez clairsemés.

# Tableau du genre Euphalepsus

- A 2. Calus huméral très prononcé, s'avancant sur l'élytre et très abrupt.
- B 2. Calus huméral prolongé sur l'élytre en fine carène. Groupe 1.
- B 1. Calus huméral simple, non prolongé en carène.
- C 3. Prothorax gibbeux, pas plus long que large..... Groupe II.
- C 2. Prothorax gibbeux, plus long que large, ...... Groupe III.
- C. 1. Prothorax non gibbeux, plus long que large..... Groupe IV.
- A 1. Calus huméral bien moins prononcé, atténué à son extrémité et ne s'étendant pas sur les élytres. Groupe V.

**Euphalepsus tricarinatus** n. sp. — Breviter ovatus, convexus, obscure castaneus, elytris rubro-castaneis, antennis pedibusque dilutioribus, longe et hirsute brunneo-pubescens. Caput obsolete et dis-

perse punctulatum, parvum, supra antennas utrinque elecatum, transrersim et angulatim impressum, juxta oculos utrinque et in vertice medio



Fig. 45.

foreatum. Antennae crassae, articulis 3-8 moniliformibus, 9 suborato, crassiore et articulos tres praecedentes longitudine aequante, 10 simili sed paulobreviore, 11 praecedente dimidio longiore, subovato, basi truncato, apice acuminato, articulis tribus ultimis obscurioribus. Prothorax vix perspicue punctatus, fere pyriformis, elongatus, antice valde attenuatus. parum convexus, sulco transverso valido, medio valde ampliato, utringue forea elongata, coniciformi, basi ipsa longitudinaliter et tenuiter tricarinata. Elytra disperse, parum profunde, sed sat g rosse punctata, latitudine sua panlo longiora, parum convexa, tuberculo humerali valido, carina interna obtusa, fere usque ad medium prolongata. lateribus rotundatis, basi marginato-elevata et quadriforeata. Abdomen elytris multo brevius, postice rotundatum. Metasternum convexum. Segmento

ultimo ventrali leriter depresso. Pedes anteriores simplices (intermediis e posticis deficientibus) 3. — Long. 2 mill. — Fig. 45.

Brésil : Bahia.

Cette espèce qui, par son tubercule huméral prolongé en carène sur les élytres, appartient au même groupe que *E. bilineatus, bistriatus* et *longicornis* Reitter, en diffère par les trois carènes de la base du prothorax.

Euphalepsus fasciculatus n. sp. — Brevis, crassus, totus rufus (forte immaturus), obscure hirsutus. Caput mediocre, transversum, lateribus rectum, angulis supra antennas obliquum et obtuse nodosum, fronte vix depressa, foveolis duabus minutis sulco transverso junctis, vertice haud foveato. Antennae crassae, articulis 1 subcylindrico, et globoso, 3 leviter obconico, 4-8 globosis et moniliformibus, 9 et 10 plus quam duplo majoribus, subglobosis, 10 leviter transverso, 11 praecedente fere duplo longiore, subconico, basi valde truncato, apive avuminato. Prothorax latitudine sua multo longior, irregulariter ovatus, antice valde et postice leviter attenuatus, sulco transverso medio parum angulato et vix ampliato, sulcis lateralibus brevibus, disco gibboso, basi media minutissime carinata. Elytra obsoletissime punctata, subquadrata, convexa, lateribus rotundata, tuberculo humerali valido, ubrupto, haud carinato, basi marginato-elevata, valde trifoveata. Abdo-

men brere, rotundatum. Metasternum postice foveatum. Segmento ultimo ventrali impresso. Pedum intermediorum femoribus basi fasciculatis et dein subrectis, tibiis, medio, dente valido armatis et postea emarginatis, tibiis posticis, medio, extus leviter crassioribus, intus ante apicem leviter emarginato-sinuatis 5. Long. 1,60 mill.

Brésil: Bahia.

Cette espèce doit être voisine de *E. centralis* Sharp, qui m'est inconnu : la tête est plus transversale, très faiblement noucuse au-dessus des antennes.

Euphalepsus dentipes n. sp. - Brevis, crassus, convexus, obscure rubro-castaneus, totus laerissimus, dense et longe obscure pubescens. Caput subquadratum, anterius nonnihit attenuatum, supra antennas utrinque nodosum, fronte medio depressa, ista depressione transversa, arcuata, utringue foveata. Antennae validae, artivulis 3-8 moniliformibus, 9 et 10 globosis, haud duplo majoribus, 11 praecedente fere triplo longiore, subcylindrico, basi truncato, apice acuminato. Prothorax latitudine sua paulo longior, disco convexus, antice plus et postice viv attenuatus, sulco transverso leviter arcuato, sulcis lateralibus antice abruptis. Elytra subquadrata, convexa, tuberculo humerali maximo, abrupto, hand carinato, lateribus leviter rotundatis, basi parum attenuata, elevato-marginata et trifoveata. Abdomen breve, rotundatum, Metasternum rotundatim foveatum, Pedum intermediorum femoribus infra, paulo ante medium, minute fasciculatis, tibiis dente ralido et fasciculato praeditis, tibiis posticis cylindricis, nonnihil sinuatis 3. - Long. 2.10 mill.

Amérique septentrionale : Louisiane?

Cette espèce est certainement très voisine de *E. centralis* Sharp, mais je crois qu'elle doit en être différente : chez *E. centralis*, d'après la description, la dent des tibias intermédiaires doit être très petite et située après le milieu, les tibias postérieurs sont renflés, en dehors, après le milieu; chez *E. dentipes*, la dent des tibias intermédiaires est très forte, fasciculée et située au milieu et les tibias postérieurs ne sont nullement renflés.

L'exemplaire unique sur lequel est basée cette description, provient de la collection Reiche où il était étiqueté, de la main de Reiche !ui-même « Hamotus!!! humeralis Reiche. Louisiane ». C'est seulement un nom in litteris, Reiche ne l'ayant jamais décrit. Il n'a rien de commun avec un Hamotus et ne peut être confondu avec Tyens humeralis Aubé, qui est bien connu. Il constitue certainement une espèce

nouvelle, mais la provenance « Louisiane » est plus douteuse. Il serait bien étonnant que les entomologistes américains n'eussent jamais rencontré cet insecte qui les aurait frappés. Cependant les *Euphalepsus* remontent jusqu'au Mexique et il n'y a rien d'impossible à ce qu'on en rencontre dans le Sud des États-Unis.

Euphalepsus tibialis n. sp. — Ovatus, convexus, rufo-castaneus, fulvo-hirtus, antennis pedibusque rufo-testaceis. Caput mediocre, antice valde attenuatum, fronte transversim elevatum, utrinque magis nodosum et medio vix deplanatum, postea transversim impressum, vertice medio foveato, temporibus obtuse angulatis et infra mucronatis. Antennae validae, elongatae, articulis 1 elongato, cylindrico, 2 paulo minore, 3-5 obconicis, latitudine aequilongis, 6-8 ovatis, 9 et 10 ovatis, majoribus, praecedente plus quam triplo longioribus, 11 praecedente



Fig. 16.

duplo longiore, leviter orato, basi truncato, apice acuminato. Prothorax latitudine sua longior, disco convexus, antice valde et abrupte, postice perparum attenuatus, sulco transverso leviter arcuato et medio postice foreato, sulcis lateralibus brevibus. Elytra obsolete, disperse et irregulariter punctata, breviter orata, lateribus rotundata, basi plus quam ad apicem attenuata, tuberculo humerali mediocri, sat elongato, basi marginato-elevata et minute triforeata. Abdomen brevissimum. Metasternum deplanatum. Segmento ultimo ventrali toto obsolete impresso. Pedum intermediorum femoribus crassis, tibiis intus ante medium acute dentatis, dein emarginato-sinuatis et

ante apicem crassioribus, intus carinatis, tibiis posticis leviter sinuatis 5. — Long. 1,40 mill. — Fig. 46.

#### Amazones.

Dans cette espèce les tubercules supra-antennaires se rejoignent presque au milieu du front, les antennes sont longues et fortes, les élytres sont plus longs que larges et la conformation des tibias intermédiaires est extrèmement remarquable.

# Tableau du genre Arnyllium

A	2.	Antennes	pectinées	Groupe I.
Α	1.	Antennes	simples, non pectinées	Groupe II.

Sathytes gracilis n. sp. - Oblongus, antice angustior, totus crebre punctatus, opacus, rufo-castaneus, sat dense breviter griseo-pubescens. Caput quadrato-elongatum, subdeplanatum, aequale, lateribus

leviter sinuatum. Oculi magni. Antennae validae, leriter sinuatae, articulis 1 magno, 2 minore, ambobus quadratis, 3 leviter transverso, 4-8 transversis, 9 maximo, quadrato-elongato, 10 minore, transverso. 11 elongato-orato, basi truncato, intus ante medium profunde emarginato et breviter bidentato, apice obtuso. Prothorar ovatus, latitudine sua longior. Elutra magna elongato-quadrata, lateribus vix rotundata, humeris obliquis, subcarinatis, basi quadriforeata, striis omnibus deficientibus. Abdomen elytris brevius, segmentis dorsalibus primo majore, transverso, ultimo mucronato. Metasternum sulcatum. Segmento ultimo ventrali leviter impresso. Pedes breves, crassi, simplices of. - Long. 1,30 mill. - Fig. 47.



Fig. 47.

Singapore.

Sumatra: Palembang.

Cette espèce ressemble beaucoup à S. rufus Raffr., mais le dernier article des antennes est beaucoup plus long, avec une entaille profonde et dentée en dessus et en dessous; le prothorax est plus étroit.

#### CATALOGUE.

#### BATRISINI

RAFFRAY, Rev. d'Ent. 1890, pp. 82, 108. — GANGLBAUER. Käf. Mitteleur, 1895, p. 800.

#### BATRISOSCHEMA

Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 4883, p. 399. — RAFFRAY, Rev. d'Ent. 1890, pp. 108, 112.

lateridentata Reitter, loc. cit. p. 400, pl. XX. f. 11. Borneo.

filiformis Raffray (Trichonyx), Rev. d'Ent. 1882, Jara. denticollis Raffray, Rev. d'Ent. 1894, p. 222.....

3 Ann. Soc. Ent. Fr., LXXIII [1904].

# BATRISODEMA

(187)

BATRISODEMA	
RAFFRAY, Rev. d'Ent. 4890, p. 409; 4894, p. 224	4.
tuberculata Raffray, loc. cit. 4890, p. 428, pl. II,	
f. 11	Singapore
1	
PANAPHYSIS	
Reitter, Deuts. Ent. Zeits. 4882, p. 485. — Raffray. Rev. d'Ent. 4890, p. 408.	
Koppi Reitter, loc. cit. p. 486, pl. IX, f. 4 Afr. occale:	Côtedel Or
1	
HYPOCHRAEUS	
obesus Raffray (Batrisoplatus), Rev. d'Ent. 1894.	
р. 227	Singapore.
granosus n. sp	Palembang.
humeralis Raffray (Batrisoschema), Rev. d'Ent.	
1894, p. 222	Singapore.
3	
TRICHONOMORPHUS	
RAFFRAY, Rev. d'Ent. 1890, p. 109.	
ursinus Raffray, loc. cit. p. 429, pl. II, f. 9	Penany.
porcinus Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 1896, p. 232.	
Sumatra :	Palembang.
2	
CERODERMA	
Raffray, Rev. d'Ent. 4890, p. 408.	
asperata Raffray, loc. cit. 4890, p. 427, pl. II, f. 49.	Penany.
1	
DIAUGIS	
opaca Raffray (Batrisodema), Rev. d'Ent. 4894,	
p. 225	Singapore.
granutosa n. sp	
9	

#### BATRISOPLATUS

RAFFRAY, Rev. d'Ent. 1894, p. 226.

Penang.

4

Penang.

#### CONNODONTUS

RAFFRAY, Rev. d'Ent. 1882, p. 52; 1890, p. 109.

4

#### BATRIPLICA

Porhni Schaufuss, Tijds. Ent. XXX, p. 137. — Raffray, Rev. d'Ent. 1894, p. 238, pl. I, f. 5........

Birmanie. Penang. Singapore. Sumatra. pticatula Motsch. Bull. Nat. Mosc. 1851, p. 489.

termitophila Raffray, loc. cit. p. 239...... Penang. Singapore.

3 Penang. Singapore.

Penang. Singapore.

#### AMAUROPS

Fairmaire, Ann. Soc. ent. Fr. 4852, p. 74. — Jacq. Duval., Gen. Col. Eur. I, p. 429. — Sauley, Spec. I, 4874, p. 408. — Baudi, Act. R. Soc. Taurin. XI, 1875, p. 236. — Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien. 4881, pp. 451, 454. — Baffray, Rev. d'Ent. 4890. pp. 410, 413. — Ganglbauer, Käf. Mitteleur. II, 4895, p. 804.

## Groupe 1.

Sicile.

Diecki (1) Saulcy, Spec. I, p. 413. — Reitter, Verh.

(1) J'ai trouvé dans la collection Reitter deux exemplaires d'Amaurops sans nom et étiquetés « Algérie, Bousada ». Ces deux insectes sont absolument identiques aux A. Dicchi de Toscane. Je suis donc porté a croire qu'il y a eu erreur de localité, car il faudrait admettre que la même espece

z. b. Ges. Wien, 1881, p. 467
Groupe H.
gallica Delarouzée, Ann. Soc. ent. Fr. 1859, p. 68,
pl. I, f. 2. — Sauley, Spec. I, p. 116. — Reitter,
Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, p. 461
France méridionale : Nice, Fréjus, Toulon, Ste-Baume.
Abeillei Saulcy, Pet. nouv. ent. 1875, p. 539. —
Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 4881, p. 461.
Kaufmanni Ganglbauer, Käf. Mitteleur. II, 1895,
p. 858 Dalmatie.
leptoderina Reitter, Wien. Ent. Zeit. 4904, p. 22. Dalmatie
Apfelbecki Ganglbauer, Wiss. Mitt. Bosn. 4897,
p. 494
exarata Baudi, Act. R. Soc. Taurin, 1875, p. 244. —
Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 4881, p. 461. Halie septentrionale.
dentatithorax Pic, Bull. Soc. Hist. Nat. d'Autun. 4900, p. 24
Var. rufipennis Pic, loc. cit. p. 25
carinata Baudi, Act. R. Soc. Taurin. XI, 1875,
p. 244. Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881,
p. 461. — GANGLBAUER Käf. Mitteleur. H. 1895.
p. 805
corcyrea Reitter, Deuts. Ent. Zeits. 1884, p. 406 Corfou.
Groupe III.
sardoa Sauley, Spec. I, p. 412. — Reitter, Verh. z. b.
Ges. Wien, 1881, p. 461 Sardaigne.
corsica Sauley, loc. cit. p. 414 Reitter, loc. cit.
p. 461 Corse. Sardaigne.
Koziorowiczi Saulcy, Pet. nouy, entomol, 1875.
p. 539
Revelierei Sauley, loc. cit. p. 539
alpina Dodero. Ann. Mus. Civ. Gen. 4900, p. 406. Italie: Piémont.
temperate Debiad. Alli, alis. Care tich. 1,00, p. 200. Tilla . Fellow.
se retrouvât en Algérie et dans le nord de l'Italie. Les Amaurops sont géné-
ralement très localisés et cette extension d'habitat paraît peu probable.

## Groupe IV.

## Groupe V.

syriaca Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 4881, p. 332.

Syrie: Beyrouth.

## BERGROTHIELLA

REITTER, Wien. Ent. Zeit. 1897, p. 241.

Bergrothia | REITTER, Wien. Ent. Zeit. III, p. 207.

Amicrops | SAULCY, Ver. z. b. Ges. Wien, 1879, p. 467.

— REITTER, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, p. 454.

 Saulcyi
 Reitter, Deuts. Ent. Zeits. 1877, p. 291;

 Verh. nat. Ver. Brünn, XVI, 4878, pl. II, f. 42;

 Verh. z. b. Ges. Wien. 4881, p. 462. — Saulcy,

 Verh. z. b. Ges. Wien, 4879, p. 467.

 Lederi
 Saulcy, Verh. z. b. Ges. Wien, 1879, p. 467.

 Reitter, Ver. z. b. Ges. Wien, 4881, p. 462.
 Caucase.

 Lenkorana
 Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 4881, p. 462.

 Lenkoran.
 Lenkoran.

mingrelica Reitter, Deuts. Ent. Zeits. 1884, p. 65. Mingrélie.

4

#### ARIANOPS

Brendel, Trans. Am. Ent. Soc. 4893, p. 278.

Anops | Brendel, Bull. Un. Iowa, II, 1890, p. 80.

plectrops Casey, Col. Not. VII, p. 582.....

2 Amér, septle : Caroline nord.

#### ARTHMIUS

Leconte, Bost. Journ. Nat. Hist. VI, p. 91. — Raffray. Ann. Soc. ent. Fr. 1897, p. 441.

# Subg. Syrbatus

Reitter, Verh. naturf. Ver. Brünn. XX, 1884 p. 205. — Raffray, Rev. d'Ent. 4894, p. 234; Ann. Soc. ent. Fr. 4897, p. 443.

# Groupe I.

or oupe 1.
antennator Reitter, Deuts. Ent. Zeits. 1888, p. 249.
- Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 1897, p. 444, pl. 17,
f. 12 Brésil : Blumenau.
Groupe II.
bubalus Raffray, loc. cit. p. 444, pl. 17, f. 1 Brésil : Bahia.
Grouvellei Raffray, loc. cit. p. 445, pl. 47, f. 3 Brésil : Bahia.
hiatusus Reitter, Deuts. Ent. Zeits. 4888, p. 257. —
Raffray, loc. cit. p. 445 Brésil : Blumenau.
centralis Raffray, loc. cit. p. 443 Brésil : Blumenau.
brevispina Reitter, Deuts. Ent. Zeits. 4882, p. 437,
pl. V, f. 8. — Raffray, loc. cit p. 446 Brésil : So-Paolo.
mashona Raffray, Trans. S. Afr. Phil. Soc. 4897,
p. 86, pl. XVII, f. 3; Ann. Soc. ent. Fr. 4897,
p. 446 Rhodesia : Salisbury.
Hetschkoi Reitter, Deuts. Ent. Zeits. 1888, p. 250.
- Raffray, loc. cit. p. 446, pl. 47, f. 8 Brésil : Blumenau.
Groupe III.
transversalis Raffray, loc. cit. p. 447 Brésil : So-Antonio.
quadrioculatus Reitter, Deuts. Ent. Zeits. 1888,
p. 254. — Raffray, loc. cit. p. 447, pl. 47, f. 6, J.
Brésil : Blumenau.
♀ atricapillus Reitter, loc. cit. p. 253.
auritulus Westwood (Bryaxis), Trans. Ent. Soc.
Lond. 4870, p. 430; Thes. Ent. Ox. pl. 4, f. 9 <sup>h</sup> Bresil.
phantasma Reitter, Deuts. Ent. Zeits. 4882, p. 453,
pl. V, f. 7. — Raffray, loc. cit. p. 448, pl. 47,
f. 7, 5 Brésil : Sº-Paolo.
Q soror Reitter, loc. cit. 4888, p. 254.
sublaminatus Reitter, loc. cit. 4888, p. 256. —
Raffray, loc. cit. p. 448 Brésil : SPaolo.

scitus Reitter, loc. cit. 1888, p. 251. — Raffray, loc.
cit. p. 449, 5
⊋ solivagus Reitter, loc. cit. p. 232.
curvispina Reitter, loc. cit. 4888, p. 254. — Raf-
FRAY, loc. cit. p. 449 Brésil : Blumenau.
Groupe IV.
calcarifer Reitter, loc. cit. 4882, p. 436. — Raffray,
loc. cit. p. 450 Brésil : Blumenau, So-Paolo.
Marthae Reitter, loc. cit. 4888, p. 252. — Raffray,
loc. cit. p. 457 Brésil : Blumenau.
Simplicifeons Reitter, loc. cit. 1882, p. 136. — Raffray, loc. cit. p. 450 Brésil : Blumenau, Colonia Alpina.
Groupe V.
spathulatus Raffray, loc. cit. p. 451, pl. 47, f. 5 Brésil.
divergens Reitter, loc. cit. 1888, p. 248. — Raffray,
loc. cit. p. 452, pl. 17, f. 4 Brésil : Blumenau.
<b>clypeatus</b> Reitter, loc. cit. 4882, p. 434, pl. V, f. 66.  — Raffray, loc. cit. p. 452, pl. 47, f. 9 Brésil.
sublyratus Reitter, loc. cit. 4882, p. 135. — Raf-
FRAY, loc. cit. p. 458 Bresil : So Paolo.
nasutus Reitter, loc. cit. 1888, p. 249. — Raffray.
loc. cit. p. 452, pl. 47, f. 40 Brésil : Blumenau.
mirabilis Reitter, loc. cit. 4885, p. 336, pl. III, f. 25.
— Raffray, loc. cit. p. 453 Brésil : Blumenau.
Groupe VI.
demoniacus Raffray, loc. cit. p. 453, pl. 17, f. 2.
Brésil : Bahia.
Espèce inconnue d'affinités douteuses.
trinodulus Schaufuss, Tijds. Ent. XXX, 4887, p. 144.
Brésil : Minas Geraes.
Subg. Arthmius s. str.
Leconte, Bost. Journ. Nat. Hist. VI, p. 91. — Raffray, Rev. d'Ent. 4894, p. 231; Ann. Soc. ent. Fr. 4897,

Leconte, Bost. Journ. Nat. Hist. VI, p. 91. — Raffray,
Rev. d'Ent. 1894, p. 231; Ann. Soc. ent. Fr. 4897,
pp. 441, 462. — Brendel, Bull. Un. Iowa, 1890,
II, p. 4. — Casey, Col. Not. V, 4893, p. 472.

# Groupe I.

plicicollis Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 1882,
p. 376. — Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 1897, p. 463,
pl. 47, f. 44
primarius Reitter, Deuts. Ent. Zeits. 4888, p. 254.
- Raffray, loc. cit. p. 464, pl. 47, f. 45, J. Brésil : Blumenau.
♀ rostellatus Reitter, loc. cit. p. 258.
.crassicornis Raffray, loc. cit. pp. 492, 498 Mexique.
Groupe II.
dichrous Reitter, loc. cit. 1888, p. 259. — Raffray,
loc. cit. p. 464 Brésil : Blumenau.
Groupe III.
Dicolor Reitter, loc. cit. 1882, p. 139. — RAFFRAY,
loc. cit. p. 493 Brésil : Sº-Paolo.
bubalus Raffray, loc. cit. p. 465 Mexique.
globicollis Leconte, Bost. Journ. Nat. Hist. VI, p. 94.
— Casey, Col. Not. V, p. 473, pl. I, ff. 5, 5a. —
Brendel, Bull. Un. Iowa, II, 1890, p. 5, pl. IX,
ff. 76, 77
gracition Casey, Col. Not. V, p. 473, pl. I, ff. 6, 6a.  — Raffray, loc. cit. p. 466
bulbifer Caser, loc. cit. p. 474, pl. I, ff. 7, 7a
Amér. septle: Texas.
involutus Casey, loc. cit. p. 474, pl. I, ff. 8, 8a
singularis Schaufuss (Bryaxis), Nunq. ot. III, p. 488.
- Raffray, loc. cit. p. 493
geniculatus Sharp (Batrisus), Biol. Centr. Amer.
Col. II (1), 4887, p. 44. — Raffray, Ann. Soc. ent.
Fr. 1897, p. 466
pedestrianus n. sp Mexique : Sierra de Durango.
curvicornis Schaufuss (Batrisus), Nunq. ot. II, p. 286.
— Sharp. Biol. Centr. Amer. Col. II (1), p. 44. —
RAFFRAY, loc. cit. p. 467 Mexique: Yucatan.
simplicior Raffray, loc. cit. p. 466

truncaticeps Sharp (Batrisus), Biol. Centr. Amer.
Col. II (1), p. 43 Guatemala.
scaphiger Sharp (Batrisus), loc. cit. p. 14 Mexique.
inflatipes Raffray, loc. cit. p. 467 Brésil.
platycerus Reitter, Deuts. Ent. Zeits. 4888, p. 255.
- Raffray, loc. cit. p. 468 Brésil : Blumenau.
articularis Raffray, loc. cit. p. 468. Haute-Bolivie: Yurucaris.
Groupe IV.
lamellatus Raffray, loc. cit. 1890, p. 308; 1897,
p. 469 (non Reitter) Venezuela.
<b>bison</b> Raffray, loc. cit. 4897, p. 469, pl. 47, f. 47 <i>Brésil</i> .
bythinoceros Reitter, Deuts. Ent. Zeits. 1888.
p. 249. — Raffray, loc. cit. p. 469, pl. 17, f. 25, 3. <i>Brésil : Bhumenau</i> .
♀ quinqueforeolatus Reitter ‡ (nec Schaufuss), loc.
cit. p. 247.
Reitteri Raffray, loc. cit. p. 470 Brésil : Blumenau.
quadripunctatus Schaufuss (Batrisus), Nunq. ot.
II, p. 274. — Raffray, loc. cit. p. 470 Mexique: Yucatan.
bituberculatus Reitter, Deuts. Ent. Zeits. 1888,
p. 256. — Raffray, loc. cit. p. 474, pl. 47, f. 21  Brésil : Blumenau.
Orion Schaufuss (Batrisus), Nunq. ot. II, p. 271. —
RAFFRAY, loc. cit. p. 470, pl. 17, f. 22, J
Brésil : Nouveau-Fribourg.
© carinifrons Schaufuss (Batrisus), loc. cit. p. 283.
Groupe V.
manifestus Reitter, Deuts. Ent. Zeits. 1888, p. 259.
— Raffray, loc. cit. p. 472, J Brésil : Blumenau. Q lubricus Reitter, loc. cit. p. 258.
cristulatus Reitter, Not. Leyd. Mus. XI, 4889, p. 3. Brésil.
eleatricosus Raffray, loc. cit. p. 472 Paragnay central.
brevicollis Raffray, loc. cit. p. 473 Brésil méridional.
femoratus Raffray, loc. cit. p. 473 Brésil méridional.
eruralis Raffray, loc. cit. p. 473 Brésit : Matto-Grosso.

(195)

74

hydropicus Raffray, loc. cit. p. 474 Brésit.
simplicicornis Sharp (Batrisus), Biol. Centr. Amer.
Col. II (4), p. 12, pl. I, f. 6. — RAFFRAY, loc. cit. p. 475
castaneus Sharp (Batrisus), loc. cit. p. 43 Guatemala.
latipes Raffray, loc. cit. p. 475 Mexique.
tibialis Raffray, loc. cit. p. 476, pl. 47, f. 26
Haute-Bolivie : Yuracaris.
bicornis Raffray, loc. cit. p. 476, pl. 47, f. 34 Brésil.
Groupe VI.
Edithae Reitter, Deuts. Ent. Zeits. 4888, p. 256. —
RAFFRAY, loc. cit. p. 477, pl. 47, f. 23, J., Brésil : Blumenau. p. minax Reitter, loc. cit. p. 257.
patruelis Reitter, loc. cit. 1888, p. 258. — Raffray,
loc. cit. p. 495 Brésil : Blumenau.
cerastes Raffray, loc. cit. p. 477 Brésil: Petropolis. cornutus + Reitt. (nec Schaufuss), Deuts. Ent. Zeits. 4888, p. 246.
COPNUTUS SCHAUFUSS (Batrisus), Nunq. ot. II, p. 282.  — Raffray, loc. cit. p. 478, pl. 47, f. 20, ♂. Brésil: Minas Geraes.  ⊋ stultor Schaufuss, Tijds. Ent. XXX, p. 144.
vulneratus Raffray, loc. cit. p. 479, pl. 47, f. 19.
Haute-Bolivie : Yuracaris.
vividus Schaufuss ( <i>Batrisus</i> ), (nec Motsch.), Nunq. ot. II, p. 282, ♀. — Baffray, loc. cit. p. 479, pl. 47, f. 32
rivularis Motschulsky (in. litt.), (nec Schaufuss).  & coronifer Reutter, Verh. z. b. Ges. Wien, 1882, p. 375.
transversatis n. sp
armatellus Sharp (Batrisus), Biol. Centr. Amer.
Col. II (4), p. 45. — RAFFRAY, loc. cit. p. 480, pl. 47, f. 24
Aubei Schaufuss (Batrisus), Nunq. ot. II, p. 284. — Raffray, loc. cit. p. 480, pl. 47, f. 29, S. Brésil: Rio de Janeiro, Petropolis, NouvFriboury, Minas Geraes.
♀ quinqueforeatus Schaufuss, loc. cit. p. 247.

areolatus Raffray, loc. cit. p. 481 Brésil méridional.
cinnamomeus Schaufuss (Batrisus , Tijds. Ent.
XXX, 1887, p. 146. — Raffray, loc. cit. p. 481,
pl. 47, f. 36 Brésil : Minas Geraes.
Wasmanni Raffray, Bull. Soc. ent. Fr. 1898, p. 288.
Brésil : Rio Grande det Sot
rhinoceros Schaufuss (Batrisus), Nunq. ot. II,
p. 281. — Raffray, Ann. Soc. ent. Fr., 1897, p. 482, pl. 47, f. 43
** US Schaufuss (Batrisus), Tijds, Ent. XXX, p. 144. —  Raffray, loc. cit. p. 482, pl. 47, f. 40
Brésil : Minas Geraes. Petropolis.
peniculus # Reitter (nec Schaufuss), Deuts. Ent.
Zeits. 1888, p. 246.
Groupe VII.
carinatus Schaufuss (Batrisus), Nunq. ot. II, p. 281:
Tijds. Ent. XXX, p. 145. — Raffray, loc. cit.
p. 483, pl. 47, f. 41 Brésil : Minas Geraes, Theresopolis,
Petropolis, Rio de Janeiro, Nouveau-Friboury.
labiatus n. sp Brésil : Theresopolis.
cristatifrons Reitter, Not. Leyd. Mus. XI, 1889,
p. 3 Brésil.
auriculatus Raffray, loc. cit. p. 483, pl. 47, f. 48.
Haute-Bolivie : Yuracaris.
peniculus Schaufuss (Batrisus), Nunq. ot. II, p. 271.
- Raffray, loc. cit. p. 484 Brésil : Nouveau-Fribourg.
erectus Raffray, loc. cit. p. 484, pl. 47, f. 27. Brésil méridional.
circumscriptus Raffray, loc. cit. p. 485, pl. 17,
f. 42 Brésil : Blumenau.
honestus Schaufess (Batrisus), Nunq. ot. II, p. 272.
— Raffray, loc. cit. p. 485, pl. 17, f. 35  Brésil : Petropolis, Nouveau-Fribourg.
elephas Raffray, loc. cit. p. 486, pl. 47, f. 34 Brésil.
melanocephalus Reitter, Deuts. Ent. Zeits. 1888, p. 255. — Raffray, loc. cit. p. 486, pl. 47, f. 30.
Brésil : Blumenau, Rio Grande.

ciliatus Raffray, loc. cit. p. 487, pl. 47, f. 33 Brésil.
rufipes Raffray, loc. cit. p. 487, pl. 47, f. 39
triangularis Raffray, loc. cit. p. 488, pl. 47, f. 38.
Colombie: Bogota.
elevatus Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 4890, p. 308,
pl. VI, f. 6; loc. cit. 1897, p. 488
boliviensis Raffray, loc. cit. 1897, p. 489, pl. 47, f. 28
Germaini Raffray, loc. cit. p. 489, pl. 47, f. 37
Groupe VIII.
Fauveli Raffray, loc. cit. p. 490, pl. 47, f. 44  Haute-Bolivie: Yuracaris.
planifrons Schaufuss (Batrisus) Nunq. ot. II, p. 270.
— RAFFRAY, loc. cit. p. 490 Colombie : Bogota.
tripunctatus Reitter, Deuts. Ent. Zeits. 4882, p. 437.  trifoveolatus Schaufuss (Batrisus), Nunq. ot. II,
p. 269. — Raffray, loc. cit., p. 490 Colombie: Bogota.
Luzerae Reitter, Deuts. Ent. Zeits. 4882, p. 438 Colombie.
modestus Raffray, loc. cit., p. 491 (manifestus, error, p. 512)
Edmundi, nom. nov
Reitteri Raffray, loc. cit. p. 491
carinatus ‡ Reitter (nec Schaufuss), Deuts. Ent. Zeits. 1888, p. 247
humilior Reitter, loc. cit. 1888, p. 258. — Raffray,
loc. cit. p. 495 Brésil : Blumenau.
resectus Raffray, loc. cit. p. 492 Brésil.
infirmus Raffray, loc. cit. pp. 495, 513 Brésil.
<b>adulator</b> Reitter, loc. cit. 4888, p. 258. — Raffray, loc. cit. p. 496
punctatus Raffray, loc. cit. pp. 496, 514 Mexique.
macrocephalus Schaufuss (Batrisus), Nunq. ot. II,
p. 273. — Raffray, loc. cit. p. 514. Bresil: Nouveau-Fribourg.

productus Raffray, loc. cit. p. 514 Haute-Bolivie : Yuravaris.
peruvianus Raffray Batrisus), Rev. d'Ent. 4882,
p. 75; Ann. Soc. ent. Fr. 1897, p. 494 Pérou central.
breviceps Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 4897, pp. 494,
515 Haute-Bolivie: Yuracaris.
parallelus Raffray, loc. cit. p. 516. Haute-Bolivie: Yuracaris.
Espèces inconnues d'affinités douteuses
coronatus Westwood (Bryaxis), Trans. Ent. Soc.
Lond. 4870, p. 430; Thes. Ent. Oxon. pl. IV, f. 9. Brésil.
rugiceps Schauffus (Batrisus), Nunq. ot. II, p. 274.
113
SYRMOCERUS
Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 1897, p. 439.
cervus Raffray, loc. cit. p. 460, pl. 17, f. 16
Brésil : Minas Geraes.
dama Raffray, loc. cit. p. 460 Brésil.
gazella Raffray, loc. cit. p. 461, pl. 47, f. 43 Brésil.
rugiceps Raffray, loc. cit. p. 461, pl. 17, f. 14 Brésil.
1/4
OXARTHRIUS
Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 1882, p. 378. — Raffray,
Rev. d'Ent. 1894, p. 330; Ann. Soc. ent. Fr. 1897, p. 436.
hamaticollis Share [Batrisus], Biol. Centr. Amer.
Col. II (1), p. 16, pl. I, 1 5 Guatemala.
rugosus Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 1897, p. 437.
Haute-Bolivie : Yuracaris.
anthicoides Schaufuss (Batrisus), Tijds, Ent. XXX,
1887, p. 142 Brésil.
rivularis Schaufuss (Batrisus), Nunq. ot Raf-
FRAY, loc. cit. p. 438 Panama.
bispinosus Reitter. Verh. z. b. Ges. Wien, 1882,
p. 376. — Raffray, loc. cit. p. 439. Brésil : Blumenau, Sta Rita.
armatus Raffray, loc. cit. p. 439 Haute-Bolivie: Yuracaris.

forticornis Raffray, loc. cit. p. 440.... Haute-Bolivie: Yuracaris

Forticornis Raffray, loc. cit. p. 440. Haute-Bolivie: Yuracaris.

EXALLUS

Semiopacus Raffray (Oxarthrius), Ann. Soc. ent.

Fr. 1896. p. 242....... Afrique occidentale: Gabon.

## EXEDRUS

#### CLIARTHRUS

Raffray, Rev. Mag. Zool. 1877, p. 290; Ann. Soc. ent. Fr. 4896, p. 242.

**Dicolor** Raffray, Rev. Mag. Zool. 4877, p. 290, pl. XIII, f. 4; Ann. S. e. Fr. 4896, p. 243... Zanzibar: Bayamoyo. **spinicollis** Raffray (Batrisus), Rev. d'Ent. 4882.

p. 51; Ann. Soc. ent. Fr. 4896, p. 243...... Abyssinie: Bogos.

palmarum Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 4896, p. 243. Zanzibar.

semirugosus n. sp....... Afr. australe et orientale: Umtali.

#### ITETICUS

200 Genera et catalogue des Pselaphules. 79	)
regius Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 4896, p. 237; 4897, p. 433	
imperialis Raffray, loc. cit. 1897, p. 433  Haute-Bolivie: Yuracaris.	
laeviceps Raffray, loc. cit. p. 433 Haute-Bolivie: Yuracaris.	
7 BATRISUS	
Acbé, Psel. Mon. 1833, p. 45; Ann. Soc. ent. Fr. 4844, p. 80. — Erichson, Käf. Mk. Brandenb, I, p. 264. — Jacq. Duval, Gen. Col. Eur. I, p. 430. — Thomson, Skand. Col. III, p. 229. — Saulcy, Spec. I, p. 90. — Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, pp. 451, 454. — Raffray, Rev. d'Ent. 4890, pp. 410, 114; 1894, p. 230. — Ganglbauer, Käf. Mitteleur. H. 1895, p. 800.	
formicarius Aubé, Psel, Mon. 4833, p. 46, pl. 46,	
f. 1; Ann. Soc. ent. Fr. 4844, p. 61 SAULGY,	
Spec. I, p. 93. — Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien,	
1881, p. 463. — Ganglbauer, Käf. Mitteleur, II, 1895,	
p. 802 France, Allemagne, Autriche, Grèce.	
Ormayi Reitter, Deuts. Ent. Zeits. XXIX, 4885, p. 367.	
— Ganglbauer, Käf. Mittel. II, 1895, p. 801 Transylvanie.	
conophthalmus Reitter, Deuts. Ent. Zeits. XXXI,	
1887, p. 265 Sibérie : Vladivostock. Chine : Pékin.	
Espèces inconnues décrites comme Batrisus, mais apparte-	
nant très probablement à un autre genre.	
crassipes Sharp, Biol. Centr. Amer. Col. II, (4) p. 47,	
pl. 1. f. 7 Panama.	
tamettipes Sharp, loc. cit. p. 48	
euplectiformis Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 4883,	
р. 303	
angulatus (1) Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. 1856,	
p. 273, pl. XVI, ff. 6, 7	

(1) Espèce décrite comme *Batrisus*, à cause de ses deux ongles inégaux, mais qui, malgré cela, devrait probablement rentrer dans la tribu des *Tyrini* où elle formerait, sans doute, un genre nouveau.

#### BATRISODES

(201)

Reitter, Verh. nat. Ver. Brünn, XX., p. 205. — Ganglbauer, Käf. Mitteleur. II, 1895, p. 801. — Raffray, Ann. Mus. Nat. Hung. Budapest, 1903, p. 45.

Batrisus, Leconte, Bost. Journ. Nat. Hist. VI, 1848,
p. 92. — Brendel, Bull. Un. Iowa, 1890, II, p. 5.
— Raffray, Rev. d'Ent. 1894, p. 230.

# Espèces paléarctiques

## Groupe I.

Laportei Aubé, Psel. Mon. 4833, p. 46, pl. 82, f. 2;
Ann. Soc. ent. Fr. 4844, p. 84. — Sauley, Spec. I,
p. 94. — Erichson, Käf. Mk. Branbg. I, p. 463. —
Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 4881, p. 463. —
Ganglbauer, Käf. Mittel. II, p. 802 (sub Detaportei) emend...... France. Allemagne. Autriche. Suisse. Grèce. puncticollis Tournier, Ann. Soc. ent. Fr. 4867, p. 564.
Schwabii Reitter, Berl. Ent. Zeits. 4870, p. 213....

moreanus Reitter, Wien. Ent. Zeit. 1893, p. 474. Grèce: Morée. Groupe II.

Adnexus Hampe, Wien. Ent. Monats. 1863, p. 285. —
Sauley, Spec. I, p. 401. — Reitter, Verh. z. b. Ges.
Wien, 1881, p. 463. — Ganglbauer, Käf. Mittel. II,
p. 803. . . . . . . . . . Autriche, Toscane, France méridionale, Grèce.

insularis Baudi, Berl. Ent. Zeits. 1869, p. 407.  Saulcy, Spec. I, p. 403. — Reitter, Verh. z. b.  Ges. Wien, 1881, p. 463.	Chypre.
Groupe III.	
circassicus Reiter, Deuts. Ent. Zeits. XXXI, 1887,	
p. 266 Caucase (	occidental.
exsculptus Hampe, Stett. Ent. Zeit. 1850, p. 357.	
Saulcy, Spec. I, p. 403 Reitter, Verh. z. b.	
Ges. Wien, 4881, p. 464	Chypre.
elysius Reitter, Deuts. Ent. Zeits. XXVIII, 1884,	Grèce.
p. 47	Greev.
Oculatus Aubé, Psel. Mon. 4833, p. 48, pl. 89, f. 4; Ann. Soc. ent. Fr. 4844, p. 86. — Sauley, Spec. I,	
p. 106. — Jacq. Duval, Gen. Col. II, pl. 40, f. 199.	
- Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, p. 464.	
Ganglbacer, Käf. Mittel. II, p. 803	Europe.
Ruprechti Kolenati, Melet. Ent. III, p. 34, pl. 42,	y 7
1. 3. Transcaucasie.	Lenkoran.
pruinosus Reitter. Hor. Soc. Ent. Ross. XXIII, p. 558	a . Anula
Espèces de l'Amérique du Nord.	e , muu.
Especes de l'Amerique du Noru.	
Groupe IV.	
DEL, Bull. Un. Iowa, II, p. 9, pl. X, f. 79. Pensylvanio	e, Géorgie.
armiger Leconte, loc. cit. p. 94 Brendel, loc. cit.	
p. 10 Pe	ensylvanic.
monstrosus Leconte, loc. cit. p. 95.	
Var. ferox Leconte, loc. cit. p. 95 Brendel, loc. cit. p. 44, pl. X, f. 78	Ohio.
Var. cristatus Leconte, loc. cit. p. 96	
cavierus Casey, Col. Not. V, 1893, p. 468. Caroline septi	
confinis Legonte, loc. cit. p. 96.	Géorgie.
Carolinae Casey, Col. Not. V, p. 468 Caroline septo	· ·
juvencus Brendel, Proc. Ent. Soc. Phil. 1865, p. 258.	ner wnuar.
Amer. septe	entrionale.
septe	, rece concert.

Ann. Soc. Ent. Fr., LXXIII [1904].

# Groupe V.

monticola Casey, Bull. Cal. Ac. Sc. 4886, p. 477	Californie.
occiduus Casey, loc. cit. p. 178. — Brendel, Bull.	
Un. Iowa, II, p. 46, pl. X, f. 85	Californie.
albionicus Aubé, Psel. Mon. 4833, p. 49, pl. 90, f. 2.	
— Brendel, Bull. Un. Iowa, p. 46, pl. X, f. 84 ♀ aculeatus Leconte, List. Col. N. Amer. I, p. 21.	Colombie.
zephyrinus Casev, Bull. Cal. Ac. Sc. 4886, p. 475.	
- Brendel, Bull. Un. Iowa, p. 43, pl. X, f. 82. pl. XII, f. 444.	Californie,
mendocinus Casey, loc. cit. p. 174.	,
Var. speculum Casey, loc. cit. p. 476.	
cicatricosus Brendel, Bull. Un. Iowa, II, p. 45,	0.114
pl. X, f. 83	Californie.
pygidialis Casey, Col. Not. V, 4893, p. 470	Californie.
denticauda Casey, loc. cit. p. 471	Californie.
Groupe VI.	
Schaumi Aubé, Ann. Soc. ent. Fr. 1844, p. 84.	
Brendel, Bull. Un. Iowa, II, p. 48, pl. X, f. 84,	
pl. XII, f. 436	anie Illinois
punctatus Leconte, Bost. Journ. Nat. Hist. VI, 1848,	tener. receives.
р. 97.	
riparius Say, Journ. Ac. Phil. IV, p. 98 Brendel,	
Bull. Un. Iowa, II, p. 49, pl. X, f. 80, pl. XII, f. 440.	Missouri.
uncicornis Casey, Col. Not. VII, 4897, p. 576	New York.
scabriceps Leconte, Bost. Journ. VI, p. 98 Bren-	
DEL, Bull. Un. Iowa, p. 49, pl. X, f. 86, pl. XII,	
f. 438 Pensylvanie.	Illinois, Iowa.
Groupe VII.	
temporalis Casey, Col. Not. VII. 4897, p. 573	Pensylvanie.
frontalis Leconte, loc. cit. p. 96 Brendel, loc.	
cit. p. 23, pl. X, f. 89, pl. XII, f. 434	Pensylvanie.
Groupe VIII.	
lineatocollis Aubé, Psel. Mon. 1833, p. 60, pl. 90,	
f. 3. — Leconte, Bost. Journ. VI, p. 401. — Brex-	

DEL, Bull. Un. Iowa, II, p. 20, pl. X, f. 87..... Pensylvanie.

bistriatus Leconte, Bost. Journ. VI, p. 401 Bren-
DEL, Bull. Un. Iowa, II, p. 22 Pensylvanie.
? fossicauda Casey, Col. Not. VII, 1897, p. 275.
Harringtoni Casey, Col. Not. VII, 4897, p. 578
Canada, Visconsin, Pensylvanie,
globosus Leconte, loc. cit. p. 400. — Brendel, loc.
cit. p. 26, pl. X, f. 89, pl. XII, f. 135. Est du Mississipi. Géorgie.
spretus Leconte, loc. cit. p. 100. — Brendel, loc. cit.
p. 26, pl. X, f. 92 Virginie. Ohio. Kentucky.
foveicornis Casey, Bull. Cal. Ac. Sc. 4887, p. 462.
- Brendel, loc. cit. p. 83 Tennessee. Ohio.
cavicornis Casey, Col. Not. VII, 1897, p. 379 Pensylvanie.
punctifrons Casey, Bull. Cal. Ac. Sc. 4887, p. 463.
- Brendel, loc. cit. p. 84 Pensylvanie.
Virginiae Casey, Contr. Descr. Col. N. Amer. II, 1884.
furcatus Brendel, Bull. Un. Iowa, p. 82 Pensylvanie.
sinuatifrons Brendel, Trans. Am. Ent. Soc. XX.
1893. p. 280 Tennessee.
clypeonotus Brendel, Trans. Am. Ent. Soc. XX,
1893, p. 280, Ponchatoula.
Tuculentus Casey, Bull. Cal. Ac. Sc. 1887, p. 460. Colombie.
denticollis Casey, Contr. Descr. Col. N. Amer. 1884,
p. 89. — Brendel, Bull. Un. Iowa, p. 27, pl. X,
f. 93a, pl. XII, f. 437 Iowa, Washington, Colombie.
triangulifer Brendel, Bull. Un. Iowa, II, p. 29,
pl. X. f. 93b, pl. XII, f. 133 Long Island.
spinifer    Brendel.
nigricans Leconte, Bost. Journ. VI, p. 99. — Bren-
DEL, loc. cit. p. 30, pl. X, f. 93c Caroline du Sud.
Schmitti Casey, Col. Not. VII, 1897, p. 581 Pensylvanie.
striatus Leconte, Bost. Journ. VI, p. 99 Géorgie.
The state of the s
cephalotes Casey, Bull. Cal. Ac. Sc. 4887, p. 439.
Brendel, loc. cit. p. 31, pl. X, f. 90, pl. XII, f. 132. (Californie).
aterrimus Casey, Contr. Descr. Col. N. Amer. II,
1884, p. 91 (Massachusets).

84

simpler Leconte, Proc. Am. Phil. Soc. XVII, 1878. p. 598. - Brendel, loc. cit. p. 23 (Détroit).

#### Espèces d'Australie.

#### Groupe IX.

ursinus Schaufuss, Ann. Soc. ent. Belg. 1880, p. 31; Nunq. ot. III, p. 507. — RAFFRAY, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 4900, p. 438, pl. X, f. 27. Queensland: Wide Bay. asperulus Raffray, loc. cit. p. 439, pl. X, f. 26.... Queensland.

## Groupe X.

cyclops King, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales, 1866, p. 306. — Rapfray, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 1900, p. 137, pl. X, f. 28...... Paramatta: Pine Mountain. giraffa Schaufuss, Nunq. ot. III, p. 507.

Groupe XI. hirtus Mac Leay (Bryaxis), Trans. ent. Soc. N. S. Wales, 1873, p. 452. - Raffray, loc. cit. p. 139. Queensland: Gayndah. hamatus King, loc. cit. 4863, p. 45, pl. 46, f. c. -Raffray, loc. cit. p. 140...... Sydney. Paramatta. speciosus King, loc. cit. 1863, p. 45. - Raffray, loc. cit. p. 141 ...... New South Wales : Forest Reefs. Leai Raffray, loc. cit. p. 142..... New South Wales: Tamworth. Dimucronatus Raffray, loc. cit. p. 142..... ..... New South Wales : Clarence River. rugicornis Raffray, loc. cit. p. 143 ...... New South Wales. falsus Raffray, loc. cit. p. 444.. New South Wales: Forest Reefs. Espèces inconnues, d'affinités douteuses. australis Erichson, Wigm. Arch. 1842, I. p. 243.... Tasmanie. Elizabethae King, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales, 1864, p. 104.... Sydney. gibbosus King, loc. cit. 1866, p. 307..... Australie.

nobilis Kang, loc. cit. 4865, p. 470..... Paramatta.

# Espèce de genre douteux.

conspicuus King, loc. cit. 1865, p. 471,..... Paramatta.

# Espèces indo-malaises.

(ir	ou	)6	X	11.
-----	----	----	---	-----

Groupe XII.
cavicola Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 4891, p. 476,
pl. 14. f. 1 Manille.
Groupe XIII.
latipalpus Raffray, Rev. d'Ent. 1894, p. 237 Singapore.
Groupe XVI.
armatus Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 1893, p. 447 Ceylan.
Groupe XV.
obesus n. sp Sumatra: Palembang.
Groupe XVI.
edentatus Raffray (Oxarthrius), Rev. d'Ent. 1894.
p. 263 Singapore.
Iutcolus n. sp Sumatra : Palembang.
penangensis Raffray (Oxarthrius), Rev. d'Ent.
1894, p. 261
faustus Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 1896, p. 237 Birmanie.
galeatus Raffray, Rev. d'Ent. 4894, p. 252, pl. 1.
f. 11
tropicus Raffray, loc. cit. p. 260 Penang.
indecorus n. sp
Groupe XVII.
muticus Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 4893, p. 479 Sumatra.
Groupe XVIII.
papuanus Raffray, Rev. d'Ent. 1882, p. 41: Ann.
Mus. Nat. Hung. Budapest, 4903, p. 45
longipennis Raffray, Rev. d'Ent. 1882, p. 64 Java.
Dispina Raffray, Rev. d'Ent. 1894, p. 234 Singapore.
Groupe XIX.
uroupe Arx.

tricarinatus n. sp. . . . . . . . . . . . Sumatra : Palembang.

# Groupe XX.

testaceus Raffray, Rev. d'Ent. 4882, p. 59	$N^{the}$ Guinée.
simplex Raffray, Rev. d'Ent. 1882, p. 58	Nue Guinee.
anthicathedrus Schaufess, Bull. Soc. ent. Fr. 4883,	
p. cxvi.	
Raffrayi Casey, Contr. Descr. Col. N. Amer. 4884,	
p. 92.	
acinosus n. sp	Palembany.
Groupe XXI.	
persimilis Raffray, Rev. d'Ent. 4894, p. 235	Penang.
parens Raffray, loc. cit. 1894, p. 236	Singapore.
carbunculus Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 4896,	
p. 239 Sumatra :	Palembang.
Groupe XXII.	
sylvicola Raffray, loc. cit. 4894, p. 336.	Singapore.
	мицироге.
AchiHei Schaufuss, Ann. Mus. Civ. Gen. XVIII. p. 386.	Java.
tuberculosus n. sp	
tubercurosus n. sp	rawmoung.
Groupe XXIII.	
clavicornis Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 1893,	
p. 480, pl. X, f. 6	Sumatra.
singapuriensis Raffray, Rev. d'Ent. 4894, p. 241.	Singapore.
Groupe XXIV.	
platycephalus Raffray, loc. cit. p. 242	Singapore
ferinus n. sp Sumatra:	Palembang.
Groupe XXV.	
bicolor Raffray, Rev. d'Ent. 4882, p. 63	Jura.
Raffray Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 1882.	7111111
p. 285.	
elegans Raffray, Rev. d'Ent. 1894, p. 244, pl. 1, f. 7.	Singapore.
tenuicornis n. sp Sumatra :	Palembang.
rudis Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 1896, p. 240	Sumatra.

#### Groupe XXVI.

Groupe XXVI.
quadeispina Raffray, Rev. d'Ent. 1894, p. 243 Singapore.
paradoxus Raffray, loc. cit. p. 244 Penang.
semisulcatus Schaufuss, Ann. Mus. Civ. Gen. XVIII,
p. 391
Groupe XXVII.
griscopubescens Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 1896.
p. 238 Sumatra : Palembang.
alacer Raffray. Rev. d'Ent. 1894, p. 245 Singapore.
Groupe XXVIII.
javanicus Raffray, Rev. d'Ent. 1882, p. 63
Java. Sumatra : Palembang.
rajah Raffray, loc. cit. 1894, p. 246 Singapore.
verticinus Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 1891, p. 477. Manille.
multiforus n. sp Sumatra : Palembang.
infandus n. sp Sumatra : Palembang.
satelles Raffray, Rev. d'Ent. 4894, p. 248
Singapore. Sumatra : Palembang.
auriculatus Raffray, loc. cit. p. 247, pl. 1, f. 9
Singapore, Sumatra : Palembang,
patranus n. sp
nodosus n. sp Sumatra : Palembang.
Groupe XXIX.
montivagus Raffray, Rev. d'Ent. 1894, p. 248 Penang.
geminus Raffray, loc. cit. 1894, p. 249 Penang. Singapore.
miles Raffray, loc. cit. p. 251 Singapore.
merulus Raffray, loc. cit. p. 250, Penang.
angusticollis Raffray, loc. cit. 1882, p. 74 Jara.
capitatus Raffray, loc. cit. 1882, p. 73 Java.
verticicornis Raffray, loc. cit. 1894, p. 250, pl. f.
(. 10

# Groupe XXX.

praeclarus Raffray, loc. cit. 4894. p. 253
Singapore, Penang, Sumatra.
pubescens Raffray, loc. cit. 1882, p. 62 Java.
mavortius n. sp Sumatra : Palembang.
dux Raffray, loc. cit. 1894, p. 254 Singapore.
vagepunctatus Raffray, loc. cit. p. 254 Singapore.
asper Raff., Ann. S. ent. Fr. 1896, p. 240. Sumatra: Palembang.
vulneratus Raffray, Rev. d'Ent. 1894, p. 254 Penang.
Groupe XXXI.
holosericeus Schaufuss, Ann. Mus. Civ. Gen. XVIII.
p. 387 Sumatra.
Molucearum Raffray, Rev. d'Ent. 1882, p. 61 Moluques.
Horvathi Raffray, Ann. Mus Nat. Hung. 1903, p. 46,
pt. II, f. 4 N <sup>the</sup> -Guinée: Sattelberg, Friedrich-Wilhemshafen.
incertus Schf., Ann. Mus. Civ. Gen. XVIII, p. 392 Borneo.
hatamensis Schaufuss, loc. cit. p. 397 N <sup>th</sup> -Guinée: M <sup>ts</sup> Hatam.
irritus n. sp Sumatra : Palembang.
Groupe XXXII.
eavifrons Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 1893, p. 478. Sumatra.
transversatis Raffray, loc. cit. p. 241 Sumatra.
hirtellus Raffray, Rev. d'Ent. 4894, p. 256 Penang.
demissus n. sp Sumatra : Palembang.
Groupe XXXIII.
crenatulus Raffray, Rev. d'Ent. 4894, p. 259 Penang.
hepaticus Raffray, loc. cit. p. 257 Singapore. Penang.
hispidulus Raffray, loc. cit. p. 258 Penang.
sagax n. sp Sumatra.
Groupe XXXIV.
exiguus Raffray, Rev. d'Ent. 1882, p. 61 Java.
nicolianus Schaufuss, Ann. Mus. Civ. Gen. XVIII.
p. 393 (Sumatra).

Japon.

(210)	Genera et catalogue des Psélaphides.	89
lateridens (Bornéo)	s Витт. Verh. z. b. G. Wien, 1883, p. 398	
dispar RAF	FRAY, Ann. Soc. ent. Fr. 1893, p. 478; Rev.	
d'Ent. 18	894, p. 259	Sumatra
cribratus	RAFFRAY, Rev. d'Ent. 1894, p. 260,	Penany.
	Espèces du Japon.	
	Groupe XXXV.	
	S C. Schaufuss, Cal. Psel. p. 12 S Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1883, p. 304.	Japon.
longicorn	is Sharp, loc. cit. p. 304	Japan.
angustus	Sharp, loc. cit. 1874, p. 113	Japon.
	Groupe XXXVI.	
punctiper	nis Sharp, loc. cit. 1883, p. 305	Japon.
palpalis 8	Sharp, loc. cit. p. 306	Japan.
acuminat	us Sharp, loc. cit. p. 307	Japan.
vestitus 8	макр, loc. cit. p. 307	Japon.
	Groupe XXXVII.	
caviceps 8	SHARP, loc. cit. p. 308	Japon.
oscillator	• Sharp, loc. cit. p. 309	Japon.
	Groupe XXXVIII.	
	Vaternouse, Aid Ident. Insects, pl. 146	Japon .
concolor	Sharp, loc. cit. p. 310	Japon.
	Groupe XXXIX.	
fissifrons	Suarp, loc. cit. p. 311	Japon.
Harmand	<b>16</b> n. sp	pon central.
ornatus S	илгр, loc. cit. 1874. p. 414	Japon.
epistoma	lis n. sp Jaj	non central.
basicorni	Sharp, loc. cit. 1883. p. 312	Japon.
rugicollis	Sharp, loc. cit. p. 313	Japan.

ornatifrons Sharp, loc. cit. p. 313.....

punctatissimus Raffray, loc. cit. 4882, p. 50....

Nto-Guince : Amberbaki.

denticollis Raffray, loc. cit. p. 31 N <sup>ne</sup> -Guinée : Amberbaki.
corrugatus Raffray, Ann. Mus. Nat. Hung. Buda- pest. 4903, p. 44
pest, 1905, p. 44
PODUS
Raffray, Rev. d'Ent. 1882, p. 52; 4890, pp. 409, 443.
femoralis Raffray, loc. cit. p. 54 N <sup>ne</sup> -Guinée: Amberbaki.
1 DIAPOSIS
carinicollis Raffray (Balrisus), Ann. Soc. ent. Fr.
1896, p. 238 Sumatra: Palembang.
BATOCTENUS
Sharp, Biol. Centr. Amer. Col. II (4) 1887, p. 49.
puncticollis Sharp, loc. cit. p. 19, pl. 1, f. 9 Panama.
simplex Sharp, loc. cit. p. 49 Panama.
dimidiatus n. sp Haute Bolivie : Yuracaris.
Oberthüri n. sp
ADIASTULUS
ophthatmicus Raffray (Oxarthrius), Ann. Soc. ent.
Fr. 4896, p. 241, pl. X, f. 12 Afr. occidentale : Gabon.
OXYOMERA
Raffray, Rev. d'Ent. 1890, p. 109.
denticollis Raffray, loc. cit. p. 203, pl. II, f. 16;
1894, p. 228
coxalis Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 1892, p. 473, pl. X, ff. 4, 4
y
TRABISUS
Raffray, Rev. d'Ent. 4890, p. 410; 1894, p. 230. Trans. S. Air. Phil. Soc. 4897, p. 84.
giganteus Raffray (Batrisus), Rev. d'Ent. 4882,
p. 41

Singapore.

Sumatra.

Theodoros Raffray (Batrisus , Rev. Mag. Zool. 1877.
p. 291 Abyssinie : Godjam.
Dregei Aubé, Ann. Soc. ent. Fr. 1844, p. 82. — DE-
JEAN, Cat. Ed. 3. p. 466. — RAFFRAY, Trans. S. Afr. Phil. Soc. 1897. p. 84
foveicollis Raffray (Batrisus, , Rev. d'Ent. 4882, p. 56
zanzibaricus Raffray (Batrisus), Rev. Mag. Zool. 4877, p. 292. Zanzibar.
aethiopicus Raffray (Batrisus), Rev. d'Ent. 1882, p. 59
hydropicus Raffray Batrisus , loc. cit. p. 56. Abyssinie : Boyos.
jugutaris Raffray, Ann. S. Afr. Mus. H. 4904, p. 422.
Afr. australe : Natal.
8 APOBATRISUS
Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 1896, p. 235; Trans. S. Afr. Phil. Soc. 4897, p. 128.
gabonicus Raffray, loc. cit. p. 235, pl. X. f. 14 Gabon.
p. 128
PROBATRISUS
RAFFRAY, Rev. d'Ent. 1890, p. 410; 4894, p. 230.
sulcatus Raffray Butrisus , Rev. Mag. Zool. 1877,
p. 294 Zanzibar.
AMANA
Raffray, Rev. d'Ent. 4890, pp. 109, 112.

crassicornis Raffray, loc. cit. p. 203, pl. II. f. 28.

cephalotes Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 1893, p. 474.

#### CYLINDROMA

Ann.	Soc.	ent.	Fr.	1896,	p. 232.
------	------	------	-----	-------	---------

excavata Raffray, loc. cit. p. 233, pl. X, f. 43.....

Sumatra: Palembang.

#### TRISINUS

Raffray, Rev. d'Ent. 1894, pp. 231, 255.

cratocerus Raffray, Rev. d'Ent. 4894, p. 265, pl. 1, f. 3.

Singapore.

cribraticollis Raffray [Batrisodes], Ann. Soc. ent. Fr. 4893, p. 484.

Sumatra.

7

#### BATRISOCENUS

RAFFRAY, Ann. Mus. Nat. Hung, Budapest, 1903, p. 48.

Batrisodes ‡ Raffray, Rev. Ent. 1894, pp. 231, 266. — Reftter (pro parte), Verh. z. b. Ges. Wien, 1883, p. 9.

Syrbatus Reitter (pro parte), Verh. z. b. Ges. Wien, 1883, p. 9.

## Groupe I.

gracilicornis Raffray, Rev. Mag. Zool. 1877, p. 294.

...... Abyssinie : Semiene, Lalibella, Lasta.

# Groupe II.

morutus Reitter (Syrbatus), Verh. z. b. Ges. Wien, 4882, p. 285

fenestratus Raffray (Batrisodes), Rev. d'Ent. 4894,

p. 268 ..... Singapore.

p. 71; Not. Leyd. Mus. IV, p. 452.....

Java.

Bataria

#### Groupe III.

celebensis Schaufuss (Batrisus), Ann. Mus. Civ. Gen. XVIII, 4882, p. 373.

Célèbes.

#### Groupe IV.

94 A. RAFFRAY. (215)
Groupe V.
validicornis Raffray, loc. cit. p. 53
Groupe VI.
mucronatus Raffray, loc. cit. p. 54 Nue-Guinée : Golfe Huon
Groupe VII.
serraticornis Raffray, loc. cit. p. 50 Nile-Guinée : Golfe Huon
Groupe VIII.
trivialis Raffray, loc. cit. p. 53 Nue-Guinée : Baie de l'Astrolabe
chloroticus Raffray, loc. cit. p. 52 Nue-Guinée : Golfe Huon
gantongensis Schaufuss (Batrisus), Ann. Mus. Civ. Gen. 1882, p. 389
Beccarii Schaufuss (Batrisus), loc. cit. p. 390 Amboine
Groupe IX.
deformis Reitter, Deuts. Ent. Zeits. 4882, p. 484, pl. XVIII, f. 4
incisus Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 1896, p. 244. Gabon
Groupe X.
tumidipes Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 1891, p. 479, pl. XIV, f. 4
clavipes Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 4891, p. 480, pl. XIV, f. 3
Groupe XI.
excisus Schaufuss (Batrisus), Psel. Siams, 1877, pl. 46; Ann. Mus. Civ. Gen. 1882, p. 379
hamatipes Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 1891, p. 480, pl. XIV, f. 5
spinidens Reitter (Syrbatus), Verh. z. b. Ges. Wien, 1883, p. 398, pl. XX, f. 7

Groupe XII.

Siam.

siamensis n. sp.....

#### Groupe XIII.

**tiblatis** King (Batrisus), Trans. Ent. Soc. N. S. Wales, 4865, p. 471. — Raffray, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 1900, pl. X, f. 29. Australie: Maitland, Clarence River.

## Groupe XIV.

## Groupe XV.

irregularis Raffray, loc. cit. p. 52... N<sup>ue</sup>-Guinee : Baie de l'Astrolabe.
irregularis Raffray, loc. cit. p. 51.......
N<sup>lle</sup>-Guinée : Baie de l'Astrolabe.

# Groupe XVI.

**Disulcatus** Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 4893, p. 481. Sumatra. Groupe XVII.

## Groupe XVIII.

caudatus Raffray (Batrisus), Rev. d'Ent. 1882, p. 77. Abyssinie.
tumorosus n. sp. Sumatra: Palembang.
stigmosus Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 1893, p. 487,
pl. X, f. 10. Sumatra.

Mondherae Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 1896, p. 246.

Afr. orientale: Mondhera.

custos Schaufuss (Batrisus), Tijds. Ent. XXX, p. 438. Bornéo.
excavatus Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 1893, p. 486.

natalensis Raffray, Trans. S. Afr. Phil. Soc. 1897,	
1 / 1	Natal.
truncatus n. sp Sumatra :	Palembang.
saucius Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 4904, p. 27.	
, Ceylan :	Trincomali.
quadratus Raffray, loc. cit. 4896, p. 247, pl. X, f. 6.	
Sumatra	: Palembang.
caviventris Raffray, loc. cit. 1893, p. 486, pl. X,	Carriedan
f. 9	Sumatra.
Gestroi Schafuuss (Batrisus), Ann. Mus. Civ. Gen.           4882, p. 374	Guinée nord.
septemdentatus Schaufuss (Batrisus), loc. cit.	
p. 376	Bornéo.
margaritifer Schaufuss (Batrisus), loc. cit. p. 377.	Sumatra.
bipunctulus Reitter (Batrisodes), Verh. z. b. Ges.	
Wien, 1883, p. 394	Bornéo.
trilobatus Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 1896, p. 247,	
pl. X, f. 7	Célèbes.
cicatricosus Raffray, loc. cit. p. 238, pl. X, f. 5.	to also would
So	
mitratus n. sp	
circellaris Raffray, Rev. d'Ent. 1894, p. 271	Penang.
<b>vestigifer</b> Reitter ( <i>Batrisodes</i> ), Verh. z. b. Ges. Wien, 4883, p. 394, pl. XX, f. 3	Bornéo.
	DOTREO.
1882, p. 375, Mus. Civ. Gen.	Bornéo.
Schaufussi Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 1893, p. 485,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
pl. X, f. 8	Sumatra.
claviger Reitter (Batrisodes), Verh. z. b. Ges. Wien,	
4883, p. 395	Bornéo.
vulneratus n. sp Sumatra	: Palembang.
trilunatus Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 1896, p. 245,	
pl. X, f. 4	Birmanie.
cursitans Raffray, Rev. d'Ent. 1894, p. 270, pl. 1.	
f. 17	Singapore.

carinatus n. sp	
optatus Sharp (Butrisus), Trans. Ent. Soc. Lond.	
1874, p. 112	
erectus Raffray Ann. Soc. ent. Fr. 1896, p. 244,	
pl. X, f. 2 Bornéo.	
trigona n. sp Sumatra : Palembany.	
angulatus Raffray, loc. cit. 4893, p. 487, pl. X, f. 41. Sumatra.	
elongatus Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 4896, p. 245,	
pl. X, f. 3 Gabon.	
Groupe XIX.	
monoceros Raffray, loc. cit. 1893, p. 488, pl. X,	
f. 43 Sumatra.	
tarsalis Reitter (Butrisodes), Verh. z. b. Ges. Wien,	
4883, p. 396, pl. XX, f. 6 Bornéo	
longipes n. sp Sumatra : Palembang.	
laminidens Reitter Batrisodes', Verh. z. b. Ges.	
Wien, 4883, p. 396, pl. XX, f. 5	
architectus Reitter (Batrisodes), loc. cit. p. 396.	
pl. XX, f. 4 Bornéo.	
Groupe XX.	
cameratus n. sp Sumatra: Palembang.	
Groupe XXI.	
tricuspidatus Raffray, Rev. d'Ent. 1882, p. 76	
Nue-Guinée : Dorey.	
Bironis Raffray, Ann. Mus. Nat. Hung. Budapest,	
1903, p. 50, pl. I. fig. 7 N <sup>ne</sup> -Guinée : Baie de l'Astrolabe.	
fallax Sharp (Batrisus), Ann. Ent. Soc. Lond. 4883,	
р. 318 Japon.	
fragilis Sharp (Batrisus), loc. cit. p. 317 Japon.	
similis Sharp (Butrisus), Trans. Ent. Soc. Lond. 1883,	
р. 319	
Sharpi Schauf: Bull. Soc. ent. Fr. 1883, p. cxvi.	
japonieus Sharp (Batrisus), Trans. Soc. Ent. Lond.	
4883, p. 348.,	

Groupe XXII.
fornicatus n. sp Sumatra : Palembang.
Groupe XXIII.
modestus Sharp ( <i>Batrisus</i> ), Trans. Ent. Soc. Lond. 4874, p. 416; 1883, p. 320
Groupe XXIV.
clavatus Raffray, Rev. d'Ent. 1894, p. 271, pl. I, f. 14
Groupe XXV.
cavifer Reitter (Batrisodes), Verh. z. b. Ges. Wien. 4883, p. 395
torticornis Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 1893, p. 489,
pl. X, f. 44 (Sumatra).  induratus Raffray, Rev. d'Ent. 4894, p. 272, pl. I, f. 46
Groupe XXVI.
Mastersi Raffray, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 4900, p. 446, pl. X, f. 30
Groupe XXVII.
p. 478, pl. XIV, f. 2
Groupe XXVIII.
p. 97. — Waterhouse, Aid Identif. Insect. pl. 146 Japon.
Groupe XXIX.
binodosus n. sp.,,
Groupe XXX,
calcaratus n. sp Sumatra : Palembang
Groupe XXXI.
Reitteri Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 4896, p. 249 Bornéo: Telang.
abbreviatus, Reitter (Batrisodes), Verh. z. b. Ges. Wie., 4882, p. 285

## Groupe XXXII.

sarawackensis Schaufuss (Batrisus), Ann. Mus.
Civ. Gen. 1882, p. 381 Bornéo.
Groupe XXXIII.
saucites n. sp Chine : Haining.
septemfoveolatus Schaufuss (Batrisus), Psel.
Siams, 1877, p. 15 Siam.
fundaebraceatus Schaufuss (Batrisus), Tijds. Ent. XXV, 4882, p. 71; Notes Leyd. Mus. IV, p. 451;
Ann. Mus. Civ. Gen. 1882, p. 383, 5
nephriticus Schaufuss, loc. cit. p. 384 (Célèbes).  Q similis Schaufuss, loc. cit. p. 395 (Sumatra).
deformipes n. spec Sumatra: Palembang.
pedator Sharp (Batrisus), Trans. Ent. Soc. Lond.  4883, p. 306
Groupe XXXIV.
batavianus Reitter (Batrisodes), Verh. z. b. Ges.
Wien, 1882, p. 284 Batavia.
sulcipes Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 4893, p. 483 Sumatra.
cultripes n. sp Sumatra: Palembang.
decipiens Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 1893, p. 483. Sumatra.
Groupe XXXV.
major n. sp Sumatra : Palembang.

# sinensis n. sp. Chine: Hong-Kong, indecorus n. sp. Sumatra: Palembang. annamita n. sp. Annam. sulcipennis Raffray (Batrisus), Rev. Mag. Zool. 4877, p. 293. Abyssinic. quadraticeps n. sp. Sumatra. Galsus Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 4896, p. 249. Bataria. birmanus Schaufuss (Batrisus), Ann. Mus. Civ. Gen. 4882, p. 395. Birmanic.

semipunctatus Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 4893,	
p. 484 Sumat	ra.
immundus n. sp Sumat	ra.
pallidus Raffray (Batrisus), Rev. d'Ent. 1882, p. 74.  Java. Nue-Guin	ie?
quaestus Schaufuss (Batrisus), Tijds. Ent. XXX,	
p. 439 Birman	iie.
semisulcatus Мотscн. (in litt.), Bull. Nat. Mosc. 4851, р. 487 (ex Schaufuss).	
Dasalis Schaufuss (Batrisus), Ann. Mus. Civ. Gen.	
4882, p. 396 Sumat	ra.
dissimilis Sharp (Batrisus), Trans. Ent. Soc. Lond.	
4883, p. 316 Jap	
puncticollis Sharp, loc. cit. 1874, p. 416 Japa	m.
Groupe XXXVI.	
capitatus n. sp Sumat	ru.
Groupe XXXVII.	
quinquesuleatus Raffray, Rev. d'Ent. 1894,	
p. 274 Penar	ıg.
Groupe XXXVIII.	
septemsulcatus Raffray, loc. cit. p. 274, pl. I,	
f. 43	re.
Groupe XXXIX.	
epistomalis Raffray, Ann. Soc. Ent. Fr. 1896,	
p. 250, pl. X, f. 4 Sumatra : Palembar	
p. 200, pr. X, 1. 1 Partient a facilitation	ug.
	ıy.
Groupe XL.	
Groupe XL.  carinicollis n. sp	
Groupe XL.  carinicollis n. sp	
Groupe XL.  carinicollis n. sp	les.
Groupe XL.  carinicollis n. sp	les.
Groupe XL.  carinicollis n. sp	les.
Groupe XL.  carinicollis n. sp	les. éo.

proportionis Schaufuss (Batrisus), Ann. Mus. Civ.	
Gen. 4882, p. 395 Sumatra : Ajer Mante	ior.
brevis Schaufuss (Batrisus) loc. cit. p. 396 Born	via.
122	
CRATNA	
Raffray, Rev. d'Ent. 4890, p. 409; 4894, p. 275.	
denticornis Raffray, Rev. d'Ent. 1894, p. 276	
Penang. Singap	ore.
torticornis Raffray, loc. cit. 4890, p. 203, pl. II,	
1. 16; 1894, p. 277	ore.
foveiventris Raffray, loc. cit. 1894, p. 277 Penu	
	ny.
mora Schaufuss (Batrisus), Ann. Mus. Civ. Gen.	l. a
1882, p. 388	DPS.
variabilis Raffray, Ann. Mus. Nat. Hung. Buda-	
pest, 1903, p. 36 N <sup>th</sup> Guinée : Wilhemhafen, M <sup>ts</sup> Hansema	nn.
5 ATHEROPTERUS	
RAFFRAY, Rev. d'Ent. 4882, p. 77.	
longipalpis Raffray, loc. cit. 4882, p. 78, pl. I, f. 49.	
Abyssinie : Bog	108.
BATRISINUS	
Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 1893, p. 476;	
Rev. d'Ent. 1894, p. 230.	
Bouchardi Raffray, Ann. S. ent. Fr. 193, p. 476.	
pl. X, f. 5	rd.
setulosus Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 1896, p. 235.	
Sumatra : Palemba	110
elegans n. sp Sumatra : Palemba	
gravidus n. sp	47
4	ng.
BATRISOMINA	
Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 1903, p. 316.	
strigicollis Raffray, loc. cit. p. 316 et fig	
Madagascar : Forêt Tanala, Baie d'Anton	gil.
T	

# BATOXYLA

]	RAFFRAY, Trans. S. Afr. Phil. Soc. 1897, p. 83.		
punctata	RAFFRAY, loc. cit. p. 83, pl. XVII, f. 4		
	Rhodesia : Salisbury.		
1			
	BATRISOPSIS		
	RAFFRAY, Rev. d'Ent. 1894, p. 264.		
	ophila Raffray, loc. cit. p. 264, pl. I, f. 4.		
	Penang. Sumatra.		
4			
	MINA		
	Raffray, Rev. d'Ent. 1890, pp. 108, 112.		
elegans I	RAFFRAY, loc. cit. p. 128, pl. II, f. 15 Singapore.		
	RAFFRAY, Ann. Soc. ent. Fr. 1896, p. 233.		
	Sumatra : Palembang.		
rugiceps	RAFFRAY, loc. cit. p. 234 Sumatra nord.		
nasuta n.	sp Sumatra.		
4			
	BATRISIELLA		
cavivent	PIS RAFFRAY (Eubatrisus), Ann. Soc. ent.		
Fr. 189	3, p. 452 Ceylan : Nuwara-Elyia.		
1			
	EUBATRISUS		
Raffra	y, Rev. d'Ent. 1890, p. 410; Ann. Soc. ent. Fr. 1893,		
	p. 449; Rev. d'Ent. 1894, p. 231.		
pubifer l	Reitter (Batrisodes), Verh. z. b. Ges. Wien,		
	. 397 Borneo.		
1			
	BATRIBOLBUS		
palpator	Raffray (Eubatrisus), Ann. Soc. ent. Fr.		
1893. p. 451 Ceylan : Wakwele.			
dentipes	Raffray (Eubatrisus), loc. cit. p. 450		

pubescens	RAFFRAY	(Eubatrisus).	loc. ci	t. p.	451.	Ceylan :	Kandy.
3							

## BATRISOMALUS

microphthalmus Raffray (Batrisus). Ann. Soc.	
ent. Fr. 1893, p. 448	Ceylan.
depressus Raffray, loc. cit. p. 448	Ceylan.
hemipterus Raffray (Batrisus), loc. cit. p. 449	Ceylan.
infossus n. sp Inde méridionale ; Mª	Kodikanel.

#### BORNEANA

## NAMUNIA

REITTER, Verh. naturf. Ver. Brünn, 4881, p. 198.

myrmecophila Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien,
4884, p. 81: Deuts. Ent. Zeits. 1885, pl. III, f. 33.

Syrie: Smyrne.

### EUPHALEPSUS

REITTER, Verh. z. b. Ges. Wien, 1883, p. 378.

## Groupe I.

tricarinatus n. sp Brése	il : Bahia.
<b>bilineatus</b> Reitter, Deuts, Ent. Zeits, 4888, p. 237, Brésil :	Blumenau.
Distriatus Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 4883, p. 380	Brésil.
longicornis Reitter, Deuts. Ent. Zeits. 4885, p. 336, pl. II, f. 19: 4888, p. 237	Blumenau.
Groupe II.	
rugipes Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 1890, p. 309	Venezuela.
globipennis Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 1883, p. 379	Me vique.

humeralis Raffray, Rev. d'Ent. 1887, p. 39., Colombie: Bogota.

Groupe III.
fasciculatus n. sp
Groupe IV.
fuscocapillus Reitter, Deuts. Ent. Zeits. 1888.
p. 236. Brésil : Blumenau.
Hetschkoi Reitter, loc. cit. 1888, p. 237 Brésil : Blumenau.
Reitteri Sharp, Biol. Centr. Amer. Col. II (1), p. 21.
pl. 1, f. 8
cruratis Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 1890, p. 310, pl. VI, f. 7
centralis Sharp, Biol. Centr. Amer. Col. II (1). p. 20. Guatemala.
dentipes n. sp
tibialis n. sp
Groupe V.
Lothari Reitter, Deuts. Ent. Zeits. 1888, p. 239. Brésil: Blumenau.
Taevicollis Reitter, loc. cit. p. 238 Brésil : Blumenau.
puncticollis Referen, loc. cit. p. 238 Brésil : Blumenau.
19 PHALEPSOIDES
Raffray, Rev. Ent. 4890, pp. 111, 116.
Phalespoïdes Raffray, loc. cit. (emend.).
punctatissimus Reitter (Euphalepsus). Deuts. Ent.
Zeits, 4888, p. 239 Brésil : Blumenau.
laevissimus Reutter (Euphalepsus), loc. cit. p. 239.
Brésil : Blumenaut.
longiceps Reitter (Euphalepsus), loc. cit. p. 240
Brésil : Blumenau.
3 ARNYLLIUM
REITTER, Verh. z. b. Ges. Wien, 1883, p. 378.
tonetian, term, is b. etcs. when, reco, p. mo.

Groupe I

forcipifer RAFFRAY, Ann. Soc. ent. Fr. 4896, p. 251,

(**20) Where it editingle ten i maplitude.		
citipes Raffray, loc. cit. p. 251, pl. X. f. 41. Sumatra: Palembang,		
pectinatum Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 1883,		
p. 392, pl. XX, f. 9. — Raffray, Ann. Soc. ent. Fr.		
1896, p. 251 Sumatra nord : Palembang. Singapore. Bornéo.		
1850, p. 201 Samaera nora . Lau moung. Sengapore Borney.		
Groupe II.		
ensipes Reitter, loc. cit. p. 392, pl. XX, f. 10		
Sumatra nord : Palembang Singapore. Bornéo.		
cultratum Raffray, Rev. d'Ent. 1894, p. 280, pl. I.		
f. 24 Singapore. Penany.		
ciliatum Raffray, loc. cit. p. 279 Singapore. Penang.		
parviceps Reitter. Verh. z. b. Ges. Wien, 4883,		
p. 392 Bornéo.		
1. 2.2.		
longipile Raffray, Ann. Soc. Ent. Fr. 1893, p. 490 Sumatra.		
7		
.2 A PROCESS PROS.3		
SATHYTES		
Westwood, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, II, p. 128. —		
Raffray, Rev. d'Ent. 1890, p. 416.		
? Plagiophorus Morsen. Bull. Nat. Mosc. 4851, p. 496.		
Tractiophoras moralin man mace femile person		
punctiger Westwood, loc. cit. 1870, p. 428: Thes.		
Ent. Oxon. pl. IV, f. 3 Bornéo.		
vespertinus Raffray, Rev. d'Ent. 1890, p. 204 Penang.		
rufus Raffray, Rev. d'Ent. 1894, p. 281 Penang.		
gracilis n. sp		
4		
4		
Genre d'affinites douteuses appartenant		
probablement à la tribu Batrisini.		
probablement a la tribu buttestut.		
MORANA		
MOULL		
Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 417; 1883, p. 321.		

## 7º Tribu Metopiini n. trib.

Cette nouvelle tribu correspond au groupe A. 1. de mon genera (Rev. d'Ent. 4890). La conformation de la tête et des antennes suffirait à justifier cette séparation, mais celle des segments ventraux est encore plus importante : il en existe 6 chez la femelle et 7 très marqués chez le mâle; le 7° est grand, plus ou moins en losange et toujours fendu longitudinalement au milieu.

#### TABLEAU DES GENRES

1. (2). Prothorax et élytres sans épines.... Gen. Metopias Gory.

2. (1). Prothorax et élytres plus ou moins armés de grandes épines...... Gen. Metopioxys Reitter.

## DESCRIPTION ET NOTE

Metopias carinipes n. sp. - Oblongus, obscure castaneus, laevis, nitidus, setis fulvis erectis, apice leviter recurvis, totus vestitus. Caput pone oculos quadratum, antice valde attenuatum, nasutum, tuberculo antennario transverso, fronte tenuiter et breviter sulcata, vertice foreis duabus inter se et a latere subaequaliter distantibus, sulco transverso profundissimo junctis, juxta collum leviter medio emarginatum. Antennae graciles, articulis 1 media parte antennae paulo breviore, basi paulo clavato et apice abrupte crassiore, 2 valde obconico, latitudine sua duplo longiore, 3 leviter obconico, latitudine sua plus quam triplo longiore, 4 simili, sed multo breviore, 5 praecedente fere dimidio breviore, 6 et 7 subquadratis, 8 leviter transverso, 9 paulo crassiore, breviter subovato, 10 haud crassiore, leviter transverso, 11 haud crassiore, longiore, conico. Prothorax breviter cordatus, sulco transverso recto, utrinque profundissime foveato. Elytra subquadrata, humeris nodosis, basi biforeata, stria suturali integra, sulvo dorsali lato, brevi. Abdomen elytris longius, postice attenuatum, segmentis dorsalibus 1-4 leviter crescentibus, 5 conico, apice obtuso, ventralibus 6 rugosulo, deplanato, profunde arcuatim emarginato, angulis obtusis et ciliatis, 7 subtriangulari, profunde longitudinaliter sulcato. Pedes elongati, femoribus ad apicem clavatis, tibiis anticis crassioribus leviter sinuatis, intus carinula nigra et denticulata praeditis 3. - Long. 2,80 mill.

Haute-Bolivie: Yuracaris.

Cette espèce est voisine de *M. elongatus* Schauf., mais elle est bien plus petite, la tête, en arrière des yeux, est bien plus carrée. l'impression occipitale est différente, les antennes sont plus grèles et le prothorax n'a pas de sillon longitudinal apparent sur le disque.

### CATALOGUE.

#### METOPIINI

### METOPIAS

GORY, Mag. Zool. 1832, pl. 42. — LACORDAIRE, Gen. Col. II, p. 169. Marnax Laporte, Ét. ent. p. 137.

## METOPIOXYS

Reitter, Deuts. Ent. Zeits. 4885, p. 334.

gladiator Reit. loc. cit. 4885, p. 335, pl. II, f. 48. Brésil : Blumenau., longipennis Schaufuss, Nunq. ot. II, p. 268. Brésil : Santarem. bellicosus Westwood. Trans. Ent. Soc. Lond. p. 278. pl. 47, f. 7. Brésil. Subcapinatus Schaufuss, Nunq. ot. II, p. 269. Brésil : Santarem. hamatus Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 4896, p. 252. Amazones : Cavallo Cocho. Reichei Schaufuss, Nunq. ot. II, p. 267. Amazones : Iquitos. trabeculatus Schaufuss, loc. cit. p. 266. Amazones : tricuspidatus Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 4896, p. 253. Amazones : Iquitos. spiculatus Schaufuss. Tijds. Ent. XXIX. 4886.

p. 278, pl. II, f. 3, 3a, 3b. Amazones.

## 8º Tribu Brachyglutini nom. nov.

(sub Bryaxini).

Il devient malheureusement indispensable de changer le nom de cette tribu, puisqu'elle ne renfermera plus le nom, si universellement connu, de *Bryaxis*, qui s'appliquera désormais aux *Bythinus*, appellation qui tombe en synonymie et disparait.

En 4794, Kugelann, dans un mémoire intitulé « Verzeichniss der in einigen Gegenden Preussens bis jetzt entdeckten Küfer-Arten etc. » et publié dans le Neuestes Magasin de Schneider, a décrit sous le nom de Bryaxis Schneideri, un insecte d'Allemagne qu'il n'est pas possible d'identifier spécifiquement, avec certitude, mais qui est incontestablement un Bythinus; ce dernier nom doit donc disparaître et céder la place à Bryaxis.

Je n'ai pas beaucoup d'enthousiasme pour ces restitutions de noms en quelque sorte archéologiques, qui ne vont pas sans bouleverser la nomenclature adoptée depuis des années. De ces deux genres si connus et si nombreux, *Bryaxis* et *Bythinus*, le premier prend la place du second qui disparaît! Il en résultera fatalement une grande confusion.

Il faut cependant avant tout être logique et puisque la priorité descriptive est adoptée par tout le monde, il n'y a, quoi qu'il en coûte, qu'à s'y conformer, jusqu'à ce qu'on ait unanimement décidé que les insectes jouiront, eux aussi, de la prescription, après une certaine période, qu'il serait d'ailleurs difficile de fixer.

C'est à l'obligeante érudition de mon ami M. L. Bedel que je suis redevable de ce curieux renseignement bibliographique.

#### TABLEAU DES GENRES

- (98). Hanches postérieures généralement très distinctes, jamais contiguës.
- 2. (17). Abdomen à marge latérale très étroite, caréniforme ou même nulle.
- 3. (40). Abdomen grand, plus ou moins allongé, premier segment dorsal beaucoup plus grand que tous les autres réunis. Palpes relativement petits, articles, 3 globuleux, 4 fusiforme, acuminé. Forme du corps plus ou moins allongée.
- (9). Appendice terminal des palpes petit, peu distinct, toujours beaucoup moins long que la moitié du dernier article.
- 5. (6). Abdomen totalement immarginé, même sans carène la-

- (5) Abdomen avec une carène latérale plus ou moins entière, premier segment dorsal beaucoup plus grand que tous les autres réunis.

- (4) Appendice terminal des palpes aussi long que la moitié du dernier article. Pas de carinules médianes à la base du premier segment dorsal...... Gen. Diroptrus Motschulsky.
- 10. (3). Abdomen court, généralement déclive, avec le premier segment dorsal seulement un peu plus grand que le suivant, ou même subégal. Forme moins globuleuse.
- (14). Appendice terminal des palpes presque aussi long que le dernier article. Épistome grand, carré, recouvrant le labre.

- 14. (11). Appendice terminal des palpes très petit, peu distinct. Abdomen totalement immarginé, premier segment dorsal à peine plus grand que le suivant.
- 45. (46) Palpes irréguliers, article 3 verticalement lenticulaire, avec la surface concave garnie d'une pubescence spongieuse. Hanches intermédiaires légèrement distantes; métasternum à peine transversal. Gen. Bythinogaster Schaufuss.

- (2). Abdomen toujours marginé latéralement, cette marge d'ailleurs très variable.
- (93). Une carène longitudinale médiane à la face inférieure de la tête.
- (39). Hanches intermédiaires très distantes; le mésosternum s'avance largement entre elles et est presque toujours tronqué.
- 20. (23). Palpes irréguliers.
- 22. (21). Articles des palpes 2 renflé à l'extrémité, 3 assez petit, trapézoïdal, 4 très grand, large à la base qui est dentée au côté interne et profondément excavée en dessous, côté interne concave, côté externe convexe, entaillé au milieu, atténué vers l'extrémité.......... Gen. Berlara Reitter.
- 23. (20). Palpes réguliers et normaux.
- 24. (29). Pas de strie dorsale aux élytres. Prothorax et élytres sans fossettes, parfois des vestiges de fossettes à la base des élytres.
- 25. (28). Mésosternum large et tronqué entre les hanches intermédiaires, presque toujours plat; quand il y a une carène, celle-ci est large et plate.
- - a. Antennes de 11 articles ♂ et ♀...... Subg. Eupines s. str.
  - b. Antennes de 10 articles  $\emptyset$ , de 11  $\circ$ ,... Subg. Byraxis Reitter.

Obs. — lei viendrait se placer probablement le genre suivant qui m'est inconnu.

- Eutrichites Lec. Tête trifovéolée. Prothorax triimpressionné. Antennes à massue uniarticulée. Élytres sans strie dorsale ni suturale. Premier segment dorsal plus grand.
- (24 et 35). Une strie dorsale extrêmement courte et diffuse aux élytres, plutôt une impression oblongue ou accentiforme à leur base.
  - 30, (34). Une scule fossette médiane au prothorax.
  - 31. [32]. Corps très convexe, ovale. Élytres très longs. Abdomen extrèmement court, premier segment dorsal à peine plus grand que le suivant...... Gen. **Eupinopsis** Raffray.

- 34. (30). Trois fossettes à la base du prothorax; des fossettes à la base des élytres. Corps assez globuleux et court. Élytres pas allongés, plus ou moins carrés. Abdomen assez grand, premier segment dorsal plus grand que les autres...

  Gen. Xybaris Reitter.
- 35. (29 et 36). Une strie dorsale aux élytres plus ou moins longue, mais toujours raccourcie, fine, nette et bien marquée. Pas de fossette médiane au prothorax. Elytres courts. Pre-

- mier segment dorsal grand. Tête carrée, tronquée en avant. Antennes épaisses, dernier article généralement très grand et parfois irrégulier J...... Gen. Cryptorhinula Schaufuss.
- 36. (35). Une strie dorsale entière aux élytres. Trois fossettes fortes et égales au prothorax.
- 38. (37). Quatrième article des palpes ovoïde-allongé. Corps assez allongé, un peu aplati. Antennes très épaisses.....

  Gen. Bryaxella Raffray.
- 39. (49 et 59). Hanches intermédiaires peu distantes, le mésosternum formant entre elles une lame étroite, plus ou moins pointue à l'extrémité.
- 40. (43). Pas de strie dorsale aux élytres.
- 41. (42). Corps plus ou moins ovale. Antennes à massue pluriarticulée, généralement différentes dans les deux sexes. Pas de fossette au prothorax...... Gen. Eupinoda Raffray.
- 43. (40). Une strie dorsale aux élytres, plus ou moins entière.
- 44. (57). Articles 3 des palpes petit ou triangulaire.
- 45. (51). Article 4 des palpes brièvement ovoïde, très acuminé au sommet. Trois fossettes au prothorax. Strie dorsale des élytres raccourcie vers le milieu.
- 46. (47). Corps très globuleux. Trois fossettes subégales au prothorax. Élytres assez grands. Abdomen court.......

  Gen. Strombopsis n. gen.
- (46). Corps plus ou moins aplati, allongé et parallèle. Élytres assez carrés, strie dorsale bien marquée, raccourcie.
- 49. (48 et 50). Segments dorsaux de l'abdomen égaux. Tête

- 52. (51 et 53). Article 4 des palpes régulièrement et assez longuement ovoïde. Tête grande, simple, une seule fossette médiane au prothorax. Élytres avec deux fossettes basales et la strie dorsale raccourcie. Premier segment dorsal plus grand. Deuxième article des tarses antérieurs plus grand, aplati, spongieux en dessous. Gen. Braxyda n. gen.
- 53. (52 et 56). Article 4 des palpes plus longuement ovoide, plus épais au sommet qu'à la base et plus ou moins obtus. Tête rétuse en avant. Strie dorsale des élytres entière. Des fossettes latérales au prothorax, mais pas de médiane.
- (35). Articles 1 et 2 des antennes subégaux dans les deux sexes. Mésosternum non caréné... Gen. Anarmoxys Raffray.
- 56. (53). Article 4 des palpes très long, conique, très acuminé. Trois fossettes au prothorax. Strie dorsale un peu raccourcie. Corps allongé, convexe. Gen. Tribatus Mostchulsky.

- 59, (39). Hanches intermédiaires contiguës, lame mésosternale plus ou moins invisible entre elles.
- 60. (64). Troisième article des palpes plus long que large, gros, très légèrement obconique, 4 un peu plus étroit, inséré un peu obliquement, conique, obtus au sommet. Corps allongé, étroit, aplati, euplectiforme. Tête trilobée en avant. Prothorax avec deux fossettes latérales, la médiane très petite. Élytres avec deux fossettes basales et une strie dorsale très longue. Premier segment dorsal plus grand que le suivant. Genre très aberrant.) Gen. Pedinopsis Raffray.
- 61. (60). Troisième article des palpes globuleux ou subtriangulaire, jamais plus long que large, le 4° jamais inséré obliquement.
- 63. (62). Prothorax et élytres jamais entièrement dépourvus de fossettes, de sillons ou de stries.
- 64. (92). Pas de sillon susépipleural aux élytres.
- (91). Fossettes du prothorax libres, jamais reliées par un sillon transversal.
- 66. (67). Article 4 des palpes un peu flagelliforme et comprimé, un peu élargi au sommet.... Gen. Drasinus n. gen.
- (66 et 85). Article 4 des palpes régulièrement ovoïde ou fusiforme, acuminé au sommet.
- 68. (80). Une strie dorsale plus ou moins raccourcie, mais très nette et très marquée aux élytres.
- 69. (74). Trois fossettes égales au prothorax.
- (70). Antennes de 41 articles dans les deux sexes. Tête régulière, avec trois fossettes, très rarement avec deux.
- 72. (73). Élytres avec une strie dorsale courte. Métasternum

- très court. Corps globuteux. Hanches postérieures un peumoins distantes..... Gen. Ephymata n. gen. 73. (72). Élytres avec une strie dorsale longue, plus ou moins entière. Métasternum grand, carré. Corps assez allongé. plus ou moins parallèle..... Gen. Brachygluta Thomson. 74, (69 et 79). Trois fossettes toujours de grandeur différente et souvent très inégales au prothorax. Strie dorsale très marquée. 75. (76). Prothorax plus ou moins caréné longitudinalement. Corps assez allongé, aplati, parallèle. Fossette médiane du prothorax relativement grande. Tarses très longs et grèles. ..... Gen. Bunoderus n. gen. 76, (75). Prothorax simple, fossette médiane très petite. Corps assez convexe, plus ou moins globuleux. 77. (78). Épistome très grand, dilaté et tronqué en avant.... ...... Gen. Nodulina n. gen. 78. (77). Épistome simple ou indistinctement dilaté..... ..... Gen. Reichenbachia Leach. 79. (74). Deux fossettes latérales seulement au prothorax; la médiane manque et est remplacée par une dépression transversale, tout à fait à la base. Corps assez court et épais... ...... Gen. Acamaldes Reitter. 80, (68). Strie dorsale des élytres nulle ou très obsolète. 81, (82). Élytres un peu carrés, à épaules très marquées, pas de strie dorsale. Fossettes latérales du prothorax médiocres, la médiane très petite. Quatrième article des palpes assez grêle, fusiforme...... Gen. Phoberus n. gen. 82. (81). Élytres presque triangulaires, courts, épaules nulles, strie dorsale nulle ou très obsolète. Fossettes du prothorax fortes et spongieuses sur les côtés, la médiane médiocre. Quatrième article des palpes brièvement ovoïde. 83. (84). Forme très courte. Tête atténuée en avant. Élytres avec la marge postérieure droite. Une fossette médiane au
- 84. (83). Forme oblongue. Tête atténuée en arrière. Élytres avec la marge profondément sinuée. Pas de fossette médiane au prothorax...... Gen. Gastrobothrus Broun.

prothorax..... Gen. Eremomus n. gen.

- 85. (67 et 88). Article 4 des palpes noueux ou dilaté extérieurement à la base. 86. (87). Deux fossettes latérales au prothorax, la médiane nulle ou très petite...... Gen. Anasis Raffray. 87. (86). Trois fossettes subégales au prothorax, la médiane parfois transversale...... Gen. Anasopsis n. gen. 88. (85). Article 4 des palpes très grand, palpes grands. Trois grandes fossettes libres au prothorax. 89. (90). Article 4 des palpes ovoïde-allongé, un peu atténué à l'extrémité, 3 presque globuleux, mais un peu pédonculé à la base, 2 brusquement renflé au sommet...... ..... Gen. Startes Broun. 90. (89). Deuxième article des palpes progressivement épaissi vers le sommet, 3e un peu obconique, 4e très long, cylindrique et acuminé au sommet..... Gen. Bryaxina Raffray. 91, (65). Fossettes du prothorax reliées par un sillon transversal. Élytres courts, triangulaires, épaules nulles, pas de strie dorsale...... Gen. Physa Raffray. 92. (64). Un sillon susépipleural aux élytres qui sont plus ou moins carrés, avec les épaules bien marquées et une strie dorsale. Les fossettes du prothorax sont toujours reliées par un sillon transversal, parfois obsolète, parfois la fossette médiane est à peine visible . . . . Gen. Ryxabis Saulcy. 93. (18). Face inférieure de la tête avec une fossette ovale, grande, dont les bords sont carénés et qui remplace la carène médiane. Antennes de 10 articles dans les deux sexes. 94. (95). Troisième article des palpes ovale, bien plus long que large, dernier article plus gros, assez brièvement fusiforme. ..... Gen. Euteleia n. gen. 95. (94). Troisième article des palpes assez variable, gros, transversalement triangulaire, ou petit, globuleux, mais jamais ovoïde, ni plus long que large.
- 96. (97). Tête normale, front tronqué ou plus ou moins proéminent, joues inférieures et latérales, pas plus larges que la tête, sans sillon latéral et antérieur..... ..... Gen. Decarthron Brendel.

- 97. (96). Tête grande, transversale, joues latéralement plus larges que le dessus de la tête, dont elles sont séparées par un profond sillon latéral qui se prolonge en avant et sépare profondément le front de l'épistome.... Gen. Itamus n. gen.
- (1). Hanches postérieures contigués ou tout au moins très peu distantes.
- 99. (400). Palpes moyens, article 4 beaucoup plus gros, ovoide et légèrement sécuriforme. Antennes courtes, massue formée presque exclusivement du dernier article qui est très grand, allongé, conique. Corps épais, court, très atténué en avant. Élytres plus ou moins carrés, épaules très marquées. Premier segment dorsal plus grand que les autres. Joues non mucronées, en dessous. Gen. Eupsenius Leconte.
- 100. (99). Palpes petits, dernier article petit, fusiforme. Antennes longues, massue triarticulée, très distincte, dernier article ovoïde. Corps ovale, convexe. Élytres plus longs que larges. Premier segment dorsal égal aux suivants. Joues fortement mucronées, en dessous. Gen. Barada Raffray.

## TABLEAUX, NOTES ET DESCRIPTIONS.

# Tableau du genre Batraxis

A 5. Dermer article des antennes simple, ovoide, par-		
fois très légèrement triangulaire, mais jamais		
sillonné ni échancré.		
B 2. Pas de pubescence	Groupe	1.
B 1. Pubescence longue, clair-semée	Groupe	11.
A 4. Dernier article des antennes irrégulièrement		
ovoïde, un peu triangulaire, presque transver-		
salement impressionné, avant le sommet	Groupe	III.
A 3. Dernier article des antennes plus ou moins échan-		
cré, ou même denté à l'extrémité.		
B <sup>1</sup> 2. Pubescence indistincte	Groupe	IV.
B <sup>1</sup> 4. Pubescence longue, clairsemée	Groupe	V.
A 2. Dernier article des antennes toujours plus ou		
moins oblique, triangulaire et sillonné au côté		
interne.		

B<sup>2</sup>2. Tibias postérieurs simples, non dilatés ni com-

primés.

C 2. Abdomen sans impression basale fovéiforme mé-		
diane.		
D 2. Corps absolument glabre, au moins sur l'avant-		
corps, parfois une pubescence à peine distincte		
sur l'abdomen.		
E 2. Abdomen assez brusquement et plus ou moins		
fortement rétréci, à la base, près des élytres,		
avec ses côtés arrondis	Groupe	VI.
E 1. Abdomen non rétréci à la base, côtés générale-	······································	
ment assez rectilignes, parfois un peu obliques.		
F 2. Tibias antérieurs armés d'une dent pointue au		
	Comme	7.11
côté interne	Groupe	V 11.
F 1. Tibias antérieurs simples.		
G 2. Dixième article des antennes carré, trapézoïdal ou		
légèrement transversal.		
H 2. Carinules de la base du premier segment dorsal		
excessivement courtes, à peine visibles	Groupe	VIII.
H 4. Carinules du premier segment dorsal de lon-		
gueur variable, mais toujours très visibles.		
I 2. Carinules du premier segment dorsal renfermant,		
entre elles, 1/3 de la largeur du disque	Groupe	IX.
I 1. Carinules renfermant, entre elles, 1/2 ou 2/3 de		
la largeur du disque	Groupe	X.
G 1. Dixième article des antennes lenticulaire	Groupe	
D 4. Corps toujours avec une pubescence bien mar-		
quée.		
E <sup>1</sup> 2. Pubescence assez longue, soyeuse, clairsemée.	Groupe	их
E <sup>1</sup> 1. Pubescence serrée, courte, ràpeuse	Groupe	
C 1. Abdomen présentant à la base une impression	oroupe	27111.
profonde, fovéiforme, étroite, un peu allongée	Groupe	1.11.
B <sup>2</sup> 4. Tibias postérieurs élargis et comprimés	Groupe	
	oroupe	-11.
A 4. Dernier article des antennes long, très oblique,	(7	
mais non sillonné, antennes longues, grèles	Groupe	711.

**Batraxis tumorosa** n. sp. — Cette espèce est extrèmement voisine de *B. quadrata* Raffr., avec laquelle on pourrait facilement la confondre. Elle en diffère par les points suivants. La tète est plus grosse et plus convexe en arrière, avec le bourrelet frontal relevé au-dessus des antennes, tronqué carrément et auriculé en arrière, interrompu assez brusquement au milieu, mais étroitement, conformation analogue à celle de *B. quadrata*, mais beaucoup plus accentuée. Les carinules

abdominales sont aussi longues que le tiers du segment, tandis que chez B. quadrata, elles sont excessivement courtes. Enfin la couleur châtain est beaucoup plus foncée. Elle ressemble aussi à B. Dorine Schauf., mais elle est plus petite; dans cette dernière les tubercules frontaux sont plus arrondis, surtout extérieurement, et bien plus largement séparés, au milieu, en ayant.

Sumatra nord

Batraxis indica n. sp. — Breviter oblonga, sat crassa, nitida, taevis et glabra, ferruginea. Caput quadratum, angulis anticis rotundatis, fronte recte truncata, ante oculos foveis quatuor, quarum anterioribus minus distantibus et sulcum transversum, brevem, tenuem, lateraliter emittentibus, occipite et vertice una convexo. Antennae validae, articulis 3-9 cylindricis, latitudine sua perparum longioribus, 10 triplo majore, leviter transverso, 11 leviter obliquo et obsolete sulculo. Prothorax breviter cordatus, convexus, puncto minutissimo antebasali, basi transversim depressa. Elytra quadrata, nonnihil transversa et leviter convexa, margine postica medio late nec profunde emarginata. Abdomen elytris majus, lateribus vix et postice magis rotundatum, carinulis duabus brevibus, plus quam tertiam partem disci includentibus. Metasternum foveatum. Pedes elongati, femoribus clavatis, tibiis posticis apice incrassatis et leviter incurvis. — Long. 1,40 mill.

Inde.

Cette espèce est voisine de *B. instabilis* Raffray; les articles des antennes sont un peu plus longs, les fossettes céphaliques plus fines et plus nettes, la tête plus convexe en arrière, l'abdomen plus long, moins élargi et moins arrondi sur les côtés, les carinules plus longues et plus distinctes.

Batraxis parvispina n. sp. — Oblonga, postice magis acuminata, nitidissima, glabra, ferruginea, antennis pedibusque rufis. Caput latitudine aequilongum, antice leviter attenuatum et subdeplanatum, postice leviter convexum, in fronte sulco transverso, profondo, medio interrupto, postea foveolis duabus punctiformibus, a latere parum distantibus. Antennae validae et elongatae, articulis 3-9 latitudine sua dimidio longioribus, 10 magno, transverso, 11 magno, obliquo et sulcato. Prothorax parum convexus, valde cordatus, puncto antebasali fere inconspicuo. Elytra subquadrata sed latitudine sua paulo longiora, parum convexa, humeris valde notatis, margine postica trisinuata. Abdomen elytris paulo brevius, postice attenuatum et lateribus leviter obliquum, carinulis duabus paululum convergentibus, tertiam partem disci inclu-

dentibus et dimidiam attingentibus. Metasternum sulcatum. Pedes elongati, tibiis anticis et intermediis ante apicem leviter crassioribus, posticis apice incrassatis et leviter incurvis, trochanteribus anticis spina longa, tenui, recta, armatis,  $\circlearrowleft$ . — Long. 4,30 mill.

### Sumatra.

Cette espèce est assez voisine de *B. currispina* Raffray, mais elle est moins massive, le prothorax est beaucoup plus cordiforme, l'abdomen moins convexe, atténué en arrière, avec les carinules plus longues et convergentes, enfin l'épine des trochanters antérieurs est fine et droite, au lieu d'être épaisse et recourbée en hamecon.

Batraxis obesa n. sp. — Brevis, convexa, postice subparallela, fulvo-pubescens. Caput transversum, in fronte sulco transverso integro, postice valde impresso, postice transversim convexum. Antennae mediocres, articulis 3-9 cylindricis, latitudinė sua vix longioribus, 10 mediocri, leviter transverso, 11 magno, extus rotundato et leviter obliquo, haud sulcato. Prothorax transversus, antice plus, postice minus. attenuatus, puncto antebasali magno, basi transversim impressa. Elytra convexa, leviter transversa, basi attenuata et humeris parum notala, margine postica haud sinuata. Abdomen elytris subaequale, subcylindricum, lateribus parallelum et postice truncatum, carinulis duabus brevibus, parallelis, quartam partem disci includentibus. Metasternum sulcatum. Pedes sat elongati, femoribus clavatis, tibiis posticis apice incrassatis, perparum incurvis. — Long. 4.30 mill.

# Philippines.

Cette espèce vient auprès de *B. hirtella* Raffray, mais le dernier article des antennes est un peu oblique, au lieu d'être presque régulièrement ovale comme chez *hirtella*.

Comatopselaphus parcepunctatus n. sp. — (watus, testaceus, parce pubescens. Caput longitudine sua paulo latius, antice leriter altenuatum, supra antennas valde nodosum, fronte medio late depressa, inter oculos, medio, foveis duabus, inter se paulo magis quam ab oculis distantibus. Antennae validae, elytrorum mediam partem attigentes, articulis 1, 2 ovatis, 3 duplo longiore, obconico, 4-9 cylindricis, longitudine decrescentibus, 4 praecedente dimidio breviore, 9 fere quadrato, 10 breviter obconico, praecedente haud longiore sed apice fere duplo latiore, 11 magno, ovato. Oculi magni. Prothorax capite (cum oculis) haud multo angustior, breviter ovato-truncatus, disperse, sat grosse punctatus. Elytra magna, basi leviter attenuata, humeris notatis, lateribus leviter rotundatis, basi bifoveata, sulco dorsali lato, bre-

vissimo. Abdomen elytris brevius, postice rotundatum, carinulis fere inconspicuis. Metasternum convexum. Segmento ultimo ventrali minute impresso. Pedes elongati, graciles, tibiis posticis medio et apice perparum crassioribus. — Long. 1,30 mill.

#### Sumatra.

Favais considéré (Ann. Soc. ent. Fr. 1896, p. 255 cet insecte comme la femelle de C. longicornis Raffray, mais ce dernier appartient à un autre genre où le dernier article des palpes est différent. Dans cette nouvelle espèce, le dernier article des palpes est régulièrement, quoique brièvement ovoïde et elle est plus petite que les autres espèces.

## Atenisodus n. gen.

Ce genre que j'avais confondu avec Comatopselaphus Schaufuss, en diffère par les caractères suivants. Antennes très longues. Tête beaucoup plus étroite, avec les yeux énormes. Dernier article des palpes maxillaires court, renflé à la base et sinué avant le sommet, au côté externe, ce qui lui donne un aspect un peu oblique, tandis qu'il est régulièrement ovoïde chez Comatopselaphus. Abdomen plus ou moins conique en arrière.

Atenisodus macrophthalmus n. sp. — Oratus, testaceus, parum pubescens, Caput angustum, elongatum, lateribus parallelum, fronte obsolete binodosa et medio sulcata, jurta oculos foreis duabus punctiformibus et altera majore in vertice. Antennae corpus longitudine fere aequantes, concolores, articulis 1, 2 brevibus, 3 plus quam triplo longiore, obconico et leviter sinuato, sequentibus brevioribus inter se longitudine subaequalibus, sed gradatim crassioribus, clava nulla, 11 fusiformi, praecedente longiore, sed haud crassiore. Oculi permagni, facetis convexis et magnis, Prothorax, capite (cum oculis) multo angustior, breviter ovato-truncatus, irregulariter et disperse punctatus. Elytra magna, convexa, basi attenuata, humeris notatis, lateribus rotundatis, basi biforeata, sulco dorsali obliquo, divergente et brevi. Abdomen elytris multo brevius, lateribus parallelum et postice truncatum. carinis duabus validis parallelis, plus quam quartam partem disci includentibus et mediam attingentibus. Metasternum convexum. Pedes elongati, femoribus parum clavatis, tibiis gracilibus, rectis, medio vix incrassatis. - Long. 1,20 mill.

#### Sumatra.

Cette espèce que j'avais considérée comme une variété de At. longicornis, en est réellement différente. La tête est en quadrilatère allongé. au lieu d'être élargie en arrière, les yeux sont beaucoup plus gros et leur diamètre égale celui de la tête; les carinules abdominales enferment seulement un peu plus de 1 4 de la largeur du disque, tandis que chez longicornis, elles en renferment largement 1 3.

Globa laevis n. sp. — Breviter oblonga, valde convexa, glabra, nitidissima, laevis. ferruginea, antennis pedibusque rufis. Caput magnum, quadratum, deplanatum, antice leviter rotundatum, antice foveis duabus parum distantibus et in depressione frontali sitis, inter oculos, medio, foveolis punctiformibus, inter se multo magis quam ab oculis distantibus. Antennae sat elongatae, articulis 1 quadrato, 2 longiore, cylindrico, 3 eadem longitudine, graciliore, leviter obconico, 4-8 quadratis, 9 obconico, majore, latitudine aequilongo, 10 transverso, 11 magno, ovato, basi truncato, apice acuminato, intus ante apicem leviter sinuato. Prothorax latitudine aequilongus, sat crassus, antice attenuatus et postice lateribus subrectus. Elytra magna, convexa, basi leviter attenuata, humeris notatis. Abdomen breve, rotundatum, apice simplex. Pedes mediocres, tibiis subrectis. — Long. 1,40 mill.

Haute Bolivie: Yuracaris.

Dans cette espèce, l'abdomen est simple, la tête ressemble à celle de G. longipes Raffray, le 9° article des antennes est plus conique et plus long, tandis que le 10° est plus transversal, le 11° est moins long et plus ovoïde. Comparativement à G. brecicornis Raffray, la tête et le prothorax sont plus courts et plus larges, les antennes plus longues, moins épaisses, le 9° article est plus grand et plus conique, le 10° plus transversal, le 11° plus ovoïde.

# Tableau du genre Eupines

*	Eupines	s. sti
A 2. Corps plus ou moins ovale ou ovoïde, toujours		
assez épais.		
B 2. Antennes simples ♂.		
C 2. Antennes unicolores.		
D 3. Articles intermédiaires des antennes plus longs		
que larges	Groupe	1.
D 2. Articles intermédiaires des antennes à peine		
plus longs que larges, antennes plus épaisses;		
tête carrée	Groupe	11.
D 4. Articles intermédiaires des antennes monilifor-		
mes antennes plus ou moins grêles	Groupe	111.

C 4. Antennes plus ou moins bicolores.		
D12. Derniers articles des antennes rembrunis.		
E 2. Articles intermédiaires des antennes plus longs		
que larges	Groupe	IV.
E 4. Antennes moniliformes	Groupe	V.
D <sup>1</sup> 1. Dernier article des antennes plus clair	Groupe	V1.
B 4. Antennes différentes dans les deux sexes.		
C12. Articles intermédiaires des autennes simples.		
D <sup>2</sup> 2. Article 10 des antennes anormal, gros	Groupe	VII.
D <sup>2</sup> 1. Articles des antennes 40 et 11 très gros	Groupe	VIII.
C <sup>1</sup> 1. Articles intermédiaires gros.		
D <sup>3</sup> 4. Articles des antennes 5 assez gros, 40 très gros.	Groupe	IX.
D <sup>3</sup> 3. Articles des antennes 5 gros, 40 transversal	Groupe	X.
D <sup>3</sup> 2. Articles des antennes 5 et 40 très gros	Groupe	X1.
D <sup>3</sup> 1. Articles des antennes 5 très gros, 9, 40, 41		
anormaux	Groupe	XII.
A 1. Forme allongée, spéciale et un peu anormale	Groupe	XIII.
Div. II. Antennes de 10 articles ♂, de 11 articles ♀.		
Subg. By	yraxis	Reitter.
A 7. Neuvième article des antennes prolongé en		
dehors	Groupe	XIV.
A 6 article des antennes grand, oblong		
ou allongé	Groupe	7.1.
A 5. — article des antennes grand, carré	Groupe	XVI.
A 4 article des antennes grand, subtrian-		
gulaire	Groupe	XVII.
A 3. Articles des antennes 4-8 transversaux	Groupe	XVIII.
A 2. Articles des antennes 9 transversal, 10 grand.	Groupe	XIX.
A 1. Articles des antennes 8 gros, transversal, 9		
grand, carré, échancré en dessous, 40 grand,		
ovoïde	Groupe	XX.

Eupines (s. str.) minima n. sp. — Oblonga, antice attenuata, rufa, nitida, antennis pedibusque testaceis, setis aliquot. Caput latitudine sua longius, lateribus parallelum, antice valde quadrifoveatum. foveis frontalibus transversis, occipite minute et brevissime carinato. Antennae mediocres, articulis 1, 2 majoribus, 3 obconico, latitudine sua dimidio longiore, 4, 6, 7 subquadratis, 5 paulo longiore, 8 leviter transverso, 9 paulo majore, et magis transverso, 10 duplo majore, leviter transverso, 11 mediocri, ovato. Prothorax subcordatus, latitudine maxima anteriore, lateribus obliquus. Elytra magna, elongata, basi leviter

attenuata, humeris carinalo-notatis. Abdomen brevissimum. Metasternum deplanatum. Pedes simplices et mediocres ♀. — Long. 1 mill.

Australie: Adelaide River.

Cette espèce est une des plus petites connues. Elle se rapproche évidemment de *E. picta* Schauf., par les antennes et les fovéoles céphaliques placées très en avant, mais beaucoup plus fortes; le prothorax a sa plus grande largeur tout à fait en avant et ses côtés sont obliques et rectilignes; les épaules sont carénées. C'est sans aucun doute une espèce très distincte, malheureusement la femelle seule est connue.

**Eupines (Byraxis) longiceps** n. sp. — Oblonga, antrorsum attenuata, glabra, nitida, capite prothoraceque nigro-piceo, elytris et abdomine rubris, pedibus et antennis basi rufis, istis apice castaneis.



Fig. 48.

Caput latitudine sua dimidio longius, leviter converum, lateribus parallelis, angulis anticis obliquis, fronte recte truncata, obsolete bifoveata. Antennae 10-articulatae, crassae, articulis 1 magno, subcylindrico, 2 subquadrato, sequentibus majore, 3 obconico. 4, 5 quadratis, 6 leviter transverso, 7 fere duplo latiore, haud longiore, leviter obliquo, 8 haud latiore sed magis transverso, intus acuto, 9 maximo, tres praecedentes longitudine uequante, irregulariter subquadrato, latere externo recto, latere interno obtuse producto et apice, transversim longe appendiculato et fasciculato, supra transversim impresso, 10 valde irregulari, latitudine sua duplo longiore, intus basi profunde et abrupte emarginato, dein ad apicem latere leviter ar

cuato, apice rotundato et extus recurvo, latere externo leviter concavo, infra irregulariter biimpresso. Prothorax ovatus, ante plus attenuatus. Elytra latitudine sua multo longiora, convexa, basi attenuata, humeris vix notatis, lateribus leviter rotundatis. Abdomen brevissimum. Metasternum totum parum profunde concarum et tenuiter sulcatum. Segmento 2 ventrali, tuberculis duobus validis, longe recurvatim fasciculatis, armato. Pedes sat elongati, femoribus anticis magis et intermediis minus, posticis minime clavatis, tibiis gracilibus, rectis 3.—Long. 1,70 mill.— Fig. 48.

Nouvelle-Zélande.

Cette espèce est voisine de *E. decens* Broun. Dans l'une et dans l'autre le 9° article des antennes porte un appendice spiniforme et fasciculé, mais les antennes sont, malgré cela, très différentes. La lon-

gueur inusitée de la tête, qui est presque cylindrique, suffirait à la faire reconnaître.

### Genre Scalenarthrus Lec.

Le Rév. J. Schmitt ayant eu la générosité de m'abandonner deux exemplaires de *Scalenarthrus (Horni* Lec.), j'ai pu constater l'identité du genre *Cylindrembolus* Schauf., avec *Scalenarthrus*.

## Tableau des Groupes

A	2.	Dernier article des antennes simple.		
B	2.	Dernier article des antennes régulièrement ovoïde.		
C	2.	Deux carinules très fines, courtes, mais bien visi-		
		bles à la base du premier segment dorsal, renfer-		
		mant environ 1/4 de la largeur	Groupe	1.
C	1.	Pas de carinules visibles à la base du premier	•	
		segment dorsal	Groupe	II.
В	1.	Dernier article des antennes irrégulièrement ovoïde	•	
		et très obliquement tronqué à la base	Groupe	III.
A	1.	Derniers articles des antennes et surtout le 11°,		
		plus ou moins irréguliers et anormaux	Groupe	IV.

Scalenarthrus subcarinatus n. sp. — Laete ferrugineus, nitidus, antennis pedibusque rufis, brevissime et sparsim pubescens. Caput quadratum, latitudine sua attamen paulo longius, inter oculos haud perspicue biimpressum, sulco transversali frontali valido, integro. Antennae validae, articulis duobus primis majoribus, 3 subconico, 4-8 quadratis, 9 paulo majore, transverso, 10 majore, trapezoidali, minus transverso, 11 ovato, tribus praecedentibus, simul sumptis, breviore. Prothorax breviter cordatus. Elytra subquadrata, humeris prominulis. In segmento primo dorsali carinulis duabus plus quam quartam partem disci includentibus. Metasternum obsolete longitudinaliter impressum. Segmento primo (apparente) carinato. — Long. 1,40 mill.

Yucatan.

Cette espèce vient se ranger auprès de *Sc. marginalis* Schaufuss, dans le groupe qui a le dernier article des antennes simple, et des carinules à la base du premier segment dorsal. Elle diffère de *Sc. marginalis* par le prothorax plus cordiforme, la tête sans impressions et les antennes bien plus épaisses.

Scalenarthrus Schaufussi n. sp. — Ferrugineus, minus nitidus, pedibus antennisque obscure rufis, brevissime et sparsim pu-

bescens. Caput quadratum, inter oculos biimpressum, sulco frontali transverso, medio obsoleto. Antennae mediocres, apice minus incrassatae, articulis duobus primis majoribus, 3 obconico, 4-8 quadratis, 9 breviter obconico, 10 maxime transverso, praecedente fere duplo breviore, 11 orato suboblongo et quatuor praecedentes longitudine aequante. Prothorax valde cordatus, basi punctatus. Elytra latitudine sua paulo longiora, ad basin attenuala, humeris notalis. Segmento primo dorsali absque carinulis. Metasternum convexum. Segmento primo (apparente) ventrali minutissime carinato. — Long. 1,10 mill.

Brésil.

Cette espèce et la suivante rentrent dans le groupe où les derniers articles des antennes sont simples, mais où il n'y a pas de carinules à la base du premier segment dorsal.

**Scalenarthrus simplex** n. sp. — Castaneus, nitidus, pedibus antennisque rufis, rix perspicue pubescens. Caput quadratum, inter oculos bifoveatum, sulco frontali medio minus profundo. Antennae graciles, clava sat abrupta, articulis duobus primis majoribus, 3-7 latitudine sua fere longioribus, 8 quadrato, 9 transverso, 10 valde transverso, 11 magno, ovato, basi suboblique truncato, praecedentes quinque longitudine aequante, extus ad apivem leviter emarginato. Prothorax valde cordatus, impunctatus. Elytra latitudine sua longiora, basi minus attenuata, humeris subquadratis et prominulis. Segmento primo dorsali absque carinulis. Metasternum convexum. Segmento primo (apparente) ventrali vix perspicue carinato. — Long. 1,20 mill.

Haute-Bolivie: Yuracaris.

Cette espèce diffère de la précédente par les antennes, dont le dernier article un peu oblique fait le passage au groupe dans lequel les derniers articles des antennes sont anormaux.

scalenarthrus obliquus n. sp. — Rufo-castaneus, minus nitidus, subtilissime coriaceus, elytris dilutioribus, brevissime pubescens. Caput magnum, angulis rotundatis, inter oculos bifoveatum, fronte medio late et obsolete impressa sed non transversim sulcata. Antennae validae, articulis duobus primis majoribus, 3-6 latitudine sua paulo longioribus, gradatim decrescentibus, 7 et 8 quadratis, 9 transverso, 10 valde transverso, 11 magno, oblique ovato, basi oblique truncato, intus ad apicem leviter emarginato. Prothorax breviter cordatus, basi punctatus. Elytra latitudine sua longiora, ad basin leviter attenuata, humeris prominulis. Segmento primo dorsali carinulis duabus vix

perspicuis, quartam partem disci includentibus, Metasternum parum convexum.

- Antennarum articulo ultimo majore, quinque praecedentes simul sumptos longitudine paulo superante, magisobliquo et angulo basali externo acuto. Segmento ultimo ventrali transversim leviter impresso. Fig. 49.
- Q Antennarum articulo ultimo minore, quatuor praecedentes longitudine aequante, magis ovato. — Long. 4,20-4.25 mill.

Mexique: Guanajuato.



Fig. 49.

**Scalenarthrus clavatus** n. sp. — Brevis, crassus, brevissime et sublente pubescens, rufo-castaneus. Caput subquadratum, fronte transversim sulcata, inter oculos foveolis duabus. Antennae crassae, articulis duobus primis majoribus, 1 quadrato, 2 cylindrico, latitudine



Fig. 50.

sua longiore, 3-7 compactis, leviter transversis 8-10 crescentibus, magis ac magis transversis, 11 in utroque sexu dissimili. Prothorax leriter transversus, lateribus rotundatus. Elytra latitudine sua vix longiora, basi leviter attenuata, lateribus rotundatis et humeris notatis. Abdomen brevissimum, segmento primo dorsali absque varinulis.

3 Antennarum articulis 9 et 10 valde transversis, 11 maximo, dimidiam partem antennae fere aequante, elongato, leviter obliquo, latere interno sinuato, latere externo fere recto, supra depresso, basi oblique, sat late sulvato, infra convexo, apice obluso. — Long. 4 mill. — Fig. 50.

Antilles : Grenada.

La forme bizarre des antennes fera reconnaître, sans difficulté, ce petit insecte.

**Scalenarthrus pectinicornis** n. sp. — Suboralus, antrorsum attenuatus, sat convexus, testaceus vel rufus, glaber, nitidus. Caput quadrato-transversum, occipite convexum, fronte transversim sulcata, inter oculos anterius foveis duabus latere approximatis. angulis externis anticis leviter elevalis. Antennae crassae, in utroque sexu dissimiles. Prothorax latitudine sua longior, subovato-cordatus. Elytra magna, postice ampliato-rotundata, tateribus obliquis, humeris quadratis, carinato-elevalis, basi minutissime trifoveata. Abdomen

breve, rotundatum. Metasternum convexum. Pedes sat elongati et gra-

ciles, femoribus parum crassis, tibiis anticis et intermediis subrectis, posticis ad apicem leviter incrassatis, incurvis.



Antennae sinuatae, articulis 1 quadrato, 2 duplo longiore, leviter obliquo et irregulariter subobconico, angulo interno apicali obtuse et leviter producto, 3-6 subquadratis et leviter crescentibus, 7-10 transversis, 7,8 majoribus, intus leviter productis et fasciculatis, 9 minore et magis transverso, intus parum producto, 10 majore, intus obliquo, 11 ovato, leviter sinuato, basi truncato, apice acuminato. — Fig. 51.

Fig. 51.

2 Antennae minus crassae et haud sinuatae, articulis 1 quadrato, 2 duplo longiore, leviter obconico, 3 dimidio minore, leviter obconico, 4-8 subquadratis

ct crescentibus, 5 et 7 paululum longioribus, 9 et 10 majoribus, transversis, 11 ovato, basi truncato, apice acuminato, intus ante apicem leviter sinuato. — Long. 1,25 mill.

Antilles: Grenada.

Pselaptus politissimus n. sp. — Rufo-ferrugineus, vix perspicue, brevissime et disperse pubescens, in antennis et pedibus longius. Caput subquadratum, angulis omnibus leviter rotundatis, inter oculos posterius minute bifoveatum et fronte late impressum. Antennae elongatae, articulis duobus primis majoribus, 3-8 latitudine sua multo longioribus, 9 obconico, longiore, 10 subquadrato, vix transverso, 11 oblongo-ovato. Prothorax subcordatus et convexus lateribus ante medium ralde rotundatus. Elytra magna, humeris subcarinata. Abdomen simplex. Pedes elongati, graciles, tibiis rectis ad apicem leviter incrassatis, posticis longe calcaratis, isto calcare tarsi articulum secundum longitudine aequante.

3 Metasternum altum et triangulare. — Long. 1,40 mill.

Brésil : Blumenau.

Voisin de *Ps. calcaratus* Raffray, mais le corps est plus court, les antennes plus courtes et l'éperon des tibias postérieurs moins long.

**Pselaptus sternalis** n. sp. — Oblongus, convexus, rufus, brerissime albido-pubescens, in antennis longius. Caput elongato-quadratum, fronte late depressum, supra antennas angulo externo obtuse nodosum, inter oculos medio foveolis duabus. Antennae elongatae, graciles, articulis 1 majore, cylindrico, 2 angustiore, cylindrico, latitudine sua plus quam duplo longiore, sequentibus perparum obconicis, 3 plus quam duplo, 4 et 8 dimidio, 5, 6, 7 fere duplo latitudine sua longioribus, 9 paulo crassiore, obconico, latitudine sua paulo longiore, 10 subquadrato, 11 magno, fusiformi, quatuor praecedentes longitudine aequante. Prothorax suborato-cordatus. Elytra suborata, humeris subcarinato-clevata. Abdomen multo brevius, postice attenuatum. Metasternum magnum, totum concacum, depresso-squamosum, circuiter leviter carinatum. Abdomen totum infra, late et profunde, subquadratim excavatum, segmento dorsali ultimo magno, transverso, infra recurvo, apice leviter sinuato et brevissime ciliato. Pedes mediocres, femoribus anticis crassio-ribus, tibiis anticis et intermediis rectis et sat crassis, posticis leviter incurvis, intus ad apicem ciliatis, haud calcaratis 5.— Long. 1,40 mill.

Antilles : Grenada.

C'est de Ps. cristatus Schaufuss, que cette espèce se rapproche le plus; mais ses antennes sont encore plus longues et plus grêles, le métasternum est plus largement concave, squameux et l'excavation ventrale plus grande et plus carrée.

## Mitona n. gen.

Corpus breve, parum convexum. Caput inter oculos bifoveatum, absque fovea frontali. Palpi mediocres, articulo ultimo breviter fusiformi, ralde acuminato. Antennae breves, clava subtriarticulata. Prothorax cordato-ovatus, fovea antebasali media valida, lateralibus deficientibus. Elytra subquadrata, basi plurifoveata, stria suturali ralida. dorsali deficiente. Abdomen breve, margine laterali leriter elevata, segmento dorsali primo majore. Mesosternum bicarinatum. Metasternum latum et planum. Coxae intermediae distantes. Pedes mediocres.

Par sa forme courte et la marge de l'abdomen, ce genre s'éloigne de de Pselaptus et rappelle davantage Brachygluta; mais ses hanches intermédiaires sont distantes. Il en diffère encore par les autres caractères énumérés. Très voisin de Xybaris Reitter, il s'en écarte par forme moins convexe, un facies assez différent, et surtout par l'absence des fortes fossettes latérales du prothorax.

Mitona quadraticeps n. sp. — Brevis, crassa, parum convexa, castaneo-picea, elytris dilutioribus, antennis pedibusque rufo-castaneis, breviter et depresse pubescens. Caput magnum, quadratum, angulis externis supra antennas obtique elevatum et intus impressum, fronte medio anterius leviter depressa, inter oculos paulo ante medium foveis duabus latis, sed parum profundis, a latere parum distantibus. Anten-Ann. Soc. Ent. Fr., LXXII [1904].



nae sat elongatae, albido-pubescentes, articulis 1 quadrato, brevi, 2 sub-ovato-elongato, 3-7 subcylyndricis, 3, 5, 6, fere duplo, 4, 7 vix latitudine sua longioribus, 8 quadrato, 9 majore, quadrato, 10 fere duplo majore, subquadrato, leviter transverso, 11 breviter ovato, basi truncato. Prothorax latitudine sua longior, ovato-cordatus, fovea media antebasali punctiformi, profunda. Elutra quadrata, humeris notatis, obliquis, foreis basalibus externis geminatis et depressionem formantibus. Segmento primo dorsali valde transverso, basi media carinulis duabus tenuissimis, divergentibus, approximatis et tertiam partem disci attingentibus. Metasternum simplex. Pedes mediocres et simplices Q. - Long. 1.40 mill. — Fig. 52.

Haute-Bolivie: Yuracaris.

Mitona Disulciceps n. sp. — Praecedenti valde affinis. Differt attamen colore pallidiore, toto castaneo. Caput latitudine sua longius, anterius leviter attenuatum, lateribus obliquum, angulis anticis externis haud elevatis, rectis, fronte recte truncata, transversim sulcata, utrinque sulco profundo et lateribus parallelo, posterius in foveam inter oculos sitam et anterius in sulcum frontalem transversum desinente, inter sulcos vertice leviter elevato. Antennae sicut in praecedente, sed paulo crassiores, articulis 4-9 moniliformibus. Metasternum apice medio foveatum. Caeterum sicut in praecedente.

Haute-Bolivie: Yuracaris.

Mitona Mniszechi n. sp. — Castanea, sparsim et breviter griseo-pubescens. Caput latitudine aequilongum, antice angustius, lateribus obliquum, supra antennas angulo externo recto, minute nodoso,
fronte anterius medio leviter depressa, inter oculos medio foveis duabus
magnis, latere approximatis, sulcis duobus obsoletissimis obliquis. Antennae breves, articulis duobus primis multo majoribus, 3 breviter
obconico, 4-8 moniliformibus, 9 transverso, paulo latiore. 10 duplo majore, subquadrato-transverso, 11 breviter ovato, basi late truncato. Prothorax capite latior, subcordatus, fovea media basali punctiformi.
Elytra magna, latitudine sua paululum longiora et basi leviter attenuata, humeris parum notatis, basi quadrifoveata. Abdomen breve,
postice rotundatum, segmento primo dorsali transverso, carinulis basa-

libus inconspicuis. Metasternum deplanatum. Pedes mediocres, tibiis omnibus subrectis. — Long. 4,30 mill.

Colombie : Santa-Fé de Bogota.

Cette espèce est voisine de *M. bisulviveps*, mais elle est plus arrondie, plus convexe et plus massive; la tête est plus courte, moins atténuée en avant, avec les côtés moins régulièrement obliques et les sillons sont irréguliers et obsolètes.

Mitona nigra n. sp. — Tolu nigro-picea, brevissime albido-pubescens, antennis pedibusque obscure castaneis. Caput subquadratum, anterius perparum attenuatum, lateribus leviter obliquum, angulis anticis rectis, leviter nodosis, fronte transversim impressa, inter oculos foveis duabus validis. Antennae breves, articulis duobus primis majoribus, 1 subcylindrico, 2 ovato, 3 brevissime obconico, 4-7 moniliformibus, 8 hand majore, transverso, 9 paulo majore, transverso, intus leviter acuto, 10 duplo majore, leviter transverso, 11 brevissime ovato, basi truncato. Prothorax breviter ovatus, latitudine aequilongus, fovea media antebasali mediocri. Elytra subquadrata, humeris subnodoso-elevatis, foveis quatuor basalibus liberis. Metasternum postice late subtriangulatim impressum. Abdomen et pedes sicut in praedecentibus. — Long. 1.40 mill.

Venezuela.

**Xybaris quadraticeps** n. sp. — Crassa, convera, rufo-castanea. longe et disperse griseo-hirta, antennis pedibusque rufis. Caput latitudine sua longius, anterius paululum attenuatum et lateribus obliquum, subdeplanatum, lateribus ante oculos leviter elevatis, fronte medio anquete impressa, sulcis duobus profundis obliquis, in fronte connexis et postice valde foreatis, occipite medio brevissime sulcato, temporibus postice obtusis. Antennae crassae, articulis duobus primis multo majoribus, 2 subcylindrico, 3 leviter obconico, 4-8 moniliformibus leviter quadratis, 9 paulo majore et leviter transverso, 10 fere duplo majore, quadrato, 11 breviter orato, basi truncato. Prothorax capite multo latior, subquadratus, foreis lateralibus magnis, oblique transversis, media rotundata. Elytra magna, latitudine sua longiora, convexa, basi leviter attenuata, humeris rotundatis, obtusis, foreis duabus basalibus magnis, sulco dorsali lato, fere geminato, medio abbreviato. Abdomen breve, segmento primo dorsali transverso, absque carinis. Metasternum medio juxta coxas intermedias altum, dein ad apicem declive, angustum et medio longitudinaliter impressum. Pedes mediocres, femoribus anticis et intermediis leviter crassioribus, tibiis anticis et intermediis subrectis,

leviter ad apicem incrassatis, posticis incurris \( \sigma \). — Long. 1,40 mill. Brésil.

Les espèces du genre *Xybaris* se distinguent facilement entre elles par la forme de la tête qui varie considérablement. Chez *X. spiniceps, triangulifera, Salhbergi*, la tête est très irrégulière; dans cette nouvelle espèce, au contraire, elle est simple, ainsi que les antennes, bien qu'il s'agisse d'un màle; le métasternum, au milieu, forme un plan incliné des hanches intermédiaires aux hanches postérieures.

**Nybaris atomaria** n. sp. - Orata, valde convexa, rufo-castanea vel rufa, breviter pubescens. Caput magnum, quadrato-elongatum, lateribus parallelum, angulis anticis externis supra antennas nodosoelevatum, fronte medio valde depressa et transversim arcuatim sulcata, isto sulco utrinque minute foreato, inter oculos posterius foreis duabus latere approximatis, occipite transversim convexo, temporibus elongatis, quadrato-rotundatis, infra obtuse productis. Antennarum articulis duobus primis majoribus, cylindricis, 3-7 subcylindricis, longitudine sua longioribus, 3 et 5 paulo longioribus, 8 quadrato, 9 paulo majore, transverso, 10 multo majore, transverso, 11 breviter ovato, basi late truncato, apice parum acuminato. Prothorax subhexagonus, lateribus medio rotundatus, foveis tribus subaequalibus. Elytra latitudine sua maxima haud longiora, basi valde attenuata, humeris parum notatis, basi quadriforeata, foreis duabus externis in depressione magna intra humerali. Abdomen breve, postice rotundatum, segmento primo dorsali majore, transverso, carinulis duabus brevibus, tertiam partem disci includentibus. Metasternum quadratum, planum. Segmento ventrali 2 (primo apparente) magno, tenuissime longitudinaliter carinato. Pedes mediocres, tibiis ante apicem leviter crassioribus, anticis et intermediis perparum sinuatis, posticis leviter incurvis. -Long. 4-4.40 mill.

Brésil : Blumenau.

La tête est notablement plus longue que large, à côtés parallèles, assez fortement rétuse de chaque côté, au-dessus des antennes; les tempes, en arrière des yeux, sont longues, à angle droit mais arrondi au sommet, et proéminentes en dessous.

**Cryptorhinula xybaridoides** n. sp. — Oblongo-ovata, parum convexa, ferruginea, nitida, tenuissime et brevissime pubescens. Caput quadratum, anterius retusum, fronte transversim elevatum, inter oculos foveis duabus minutis, inter se magis quam a latere distantibus. Antennae crassae, ad apicem gradatim incrassatae, articulis

compactis, duobus primis majoribus, 3-8 vix crescentibus, 3 latitudine sua paulo longiore et 8 leviter transverso, 9 et 10 leviter transversis, majoribus et crescentibus, 11 majore, ovato, basi truncato, apice acuminato. Prothorax longitudine sua paulo latior, antice posticeque subaequaliter valde attenuatus, lateribus valde rotundatus, absque foveis. Elytra subquadrata, basi rotundatim attenuata, stria dorsali brevi, basi lata, dein tenui. Abdomen elytris subaequale, segmento primo dorsali magno, carinulis duabus brevibus, parallelis, paulo minus quam tertiam partem disci includentibus. Metasternum simplex. Pedes mediocres, tibiis ante apicem paulo crassioribus, anticis et intermediis perparum sinuatis, posticis leviter incurvis. — Long. 1,20 mill.

Brésil: Blumenau.

Dans cette espèce, les derniers articles des antennes sont simples, ce qui la distingue de toutes les autres.

**Aybarida punctulum** n. sp. — Subovata, convexa, ferruginea, pedibus antennisque rufis, nitida, glabra, elytris leviter coriaceis. Caput leviter transversum, convexum, lateribus rotundatum, antice posticeque attenuatum, fronte tota transversim sulcata, inter oculos foveis duabus, inter se magis quam a latere distantibus. Antennae breves, compactae, articulis duobus primis multo majoribus, cylindricis, 3-8 moniliformibus, 9 et 10 latitudine leviter crescentibus, transversis, 11 multo majore, brevissime ovato, basi truncato, apice acuminato. Prothorax capite paulo major, cordatus, absque foveis. Elytra latitudine sua longiora, basi rix attenuata, humeris vix notatis, foveis et stria dorsali deficientibus. Abdomen breve, postice rotundatum, segmento primo dorsali paulo majore, valde transverso, absque carinulis. Pedes mediocres, femoribus anticis et intermediis supra leviter incrassatis, tibiis cd apicem paulo crassioribus, posticis incurvis. — Long. 4 mill

Brésil : Blumenau.

Cette espèce diffère : de X. pusilla Schaufuss, par les antennes plus épaisses et les articles 9 et 40 plus transversaux. l'absence de fovéole médiane à la base du prothorax ; de X. clavata Raffr., par la tête plus convexe, plus arrondie sur les côtés, plus atténuée en avant et en arrière, par le dernier article des antennes plus ovale, moins globuleux.

## Strombopsis n. gen.

Brevis, convexa, antrorsum attenuata, postice rotundato-ampliata. Caput antrorsum attenuatum, haud retusum. Palporum articulo 3 intus triangulari, extus rotundato, 4 regulariter ocato, basi haud truncato apice acuminato. Antennae validae, clava biarticulata. Prothorax cum foveis tribus liberis, subaequalibus, magnis. Elytra magna, basi trifoveata, stria dorsali valde conspicua. Abdomen brevissimum, segmento primo dorsali paulo majore. Coxae intermediae parum distantes, inter eas mesosterno lamellato et apice acuminato.

Ce genre diffère : de *Xybarida* Raffray, par ses antennes à massue fortement biarticulée; de *Cryptorhinula* Schaufuss par sa tête non rétuse en avant; de *Xybaris* Reitter, par sa tête simple, la strie dorsale apparente, la massue des antennes très marquée et de tous par son facies particulier, élargi et arrondi en arrière.

strombopsis breviventris n. sp. — Ferruginea, antennis pedibusque rufis, disperse pubescens. Caput latitudine aequilongum, lateribus obliquum, supra antennas minute nodosum, inter oculos foveis duabus magnis et utrinque depressione obliqua, in fronte depressa antrorsum desinente. Antennae validae, articulis duobus primis majoribus, cylindricis, 3-8 quadratis, 9 leviter transverso, 10 fere triplo majore, leviter transverso, 11 magno, brevissime ovato, basi truncato, apice acuminato. Prothorax capite major, latitudine sua longior, cordatus, foreis tribus validis quarum lateralibus paulo majoribus. Elytra magna, latitudine sua longiora, basi attenuata, lateribus obliqua, valde convexa, humeris rotundatis, basi triforeata, stria dorsali valida, recta, medio abbreviata. Abdomen brevissimum, metasternum simplex. Pedes mediocres, femoribus anticis parum crassioribus, tibiis ad apicem incrassatis, anticis et intermediis rectis, posticis parum incurvis. — Long. 4,20 mill.

Brésil: Blumenau.

# Tableau du genre Achillia

		Tablead da Senie 120111111		
A	2.	Antennes simples.		
B	2.	Abdomen simple.		
C	3.	Tête avec un simple sillon frontal transversal plus ou moins profond.		
D	3	Tête atténuée en avant, simple (généralement chez		
		les Q)	Groupe	1.
D	2.	Tête carrée.		
E	3.	Dixième article des antennes gros, transversal	Groupe	]].
E	2.	Onzième article des antennes très gros, massue		
		presque uniarticulée	Groupe	Ш

E 4. Dernier article des antennes ovoïde, de grosseur normale	Groupe	11.			
D 4. Tête plus longue que large, avec une très grande	Ortorapo				
impression triangulaire en avant: dernier ar-					
ticle des antennes très gros	Groupe	٧.			
C 2. Tète ayant, en outre du sillon frontal, une très					
profonde et large dépression transversale, en					
avant des yeux	Groupe	VI.			
C 4. Tête sans sillon frontal transversal, diversement sculptée.					
D <sup>†</sup> 3. Une forte dépression transversale en avant des					
yeux, vertex plus ou moins avancé et proémi-					
nent au-dessus d'elle	Groupe	VII.			
D12. Une dépression sinueuse en avant des yeux, front					
prolongé en avant, tête ponctuée	Groupe	VIII.			
D <sup>1</sup> 1. Une grande fossette frontale et, de chaque côté,					
un sillon longitudinal raccourci	Groupe	IX.			
B 1. Premier segment dorsal ayant, de chaque côté,					
un fort tubercule pointu et une dépression ; tête avec un fin sillon frontal transversal et une					
grande dépression entre les yeux	Groupe	1.			
A 1. Antennes différentes dans les deux sexes.	aroube	.1.			
B <sup>1</sup> 2. Premiers articles des antennes anormaux, anteu-					
nes sinuées : tête armée, épistome grand	Groupe	1.7			
B <sup>1</sup> 4. Derniers articles des antennes anormaux.	aroupe	-/1.			
C <sup>1</sup> 2. Articles des antennes 8, 9 et 10 très anormaux:					
occiput gibbeux, vertex proéminent, très pro-					
fondément creusé de chaque côté ♂; antennes					
simples, mais sinuées, tête large, déprimée					
triangulairement sur le front et le vertex, squa-					
meuse φ	Groupe	XII.			
C14. Articles des antennes 9 et 40 plus gros, anormaux,					
mais non armés; tête profondément creusée de					
chaque côté du vertex	Groupe	XIII.			

Achillia convexiceps n. sp. — Oblonga, subdeplanata, postice subparallela, tota rufo-castanea, sat longe et disperse pubescens. Caput latitudine sua multo longius, antice leviter attenuatum, lateribus obliquum, fronte antrorsum truncatum et totum profunde transversim sulcatum, inter oculos medio foveis duabus magnis, leviter transversis, latere approximatis, inter eas vertice convexo, lateribus ante oculos.

extus oblique et breviter sulcatis. Antennae validae, articulis duobus primis majoribus, 2 ovato, 3-8 quadratis, 9 paululum majore et leviter transverso, 10 fere duplo majore, subquadrato, 11 magno, basi truncato, apice parum acuminato. Prothorax capite et longitudine sua latior, lateribus rotundatus, foveis lateralibus leviter transversis, media rotundata, profunda, basi ipsa grosse punctata. Elytra latitudine sua longiora, basi attenuata, lateribus subobliqua, humeris nullis, basi triforeata, stria dorsali recta, ante medium abbreviata. Abdomen elytris subaequale, segmento primo dorsali magno, carinulis duabus brevissimis, tertiam partem disci includentibus. Metasternum planum, postice triangulatim late, sed parum profunde impressum. Pedes simplices, trochanteribus anticis minutissime dentatis  $\mathfrak{P}$ ?. — Long. 4,60 mill.

Chili.

Voisine de *Ac. approximans* Reitt., mais la tête est bien moins atténuée en avant, plus convexe sur le vertex, le 40° article des antennes est beaucoup plus gros, les élytres ne sont pas carrés.

Achillia picea n. sp. — Elongata, subparallela et deplanata, nigro-picea, elytris paululum rufescentibus, antennis pedibusque rufis. Caput elongato-quadratum, deplanatum, fronte tota transversim sulcatum, inter oculos posterius foreis duabus latere approximatis. Antennae graciles, articulis duobus primis majoribus, 2 ovato, 3-8 moniliformibus, 9 perparum majore et leviter transverso, 10 paulo majore, transverso, 11 magno, ovato, basi truncato, apice obtuse acuminato. Prothorax cordatus, foreis subaequalibus, basi ipsa transversim punctulata. Elytra disperse, sat grosse, sed obsolete punctata, magna, quadrato-elongata, lateribus parallela, basi biforeata, stria dorsali valida, recta, medium attingente. Abdomen elytris paulo brevius, segmento primo dorsali sequentibus haud multo majore, carinulis duabus brevibus, leviter divergentibus et quartam partem disci includentibus. Metasternum profunde sulcatum. Pedes simplices, femoribus anticis paulo crassioribus, 2. — Long. 1.40 mill.

Chili.

Cette espèce avait été considérée par Reitter, dans sa collection, comme une variété ♀ de son Ac. valdiviensis, mais elle en diffère d'une façon plus profonde qu'une variété : la tête est plus allongée, les antennes plus grêles, les élytres beaucoup plus longs à côtés parallèles, la ponctuation des élytres est bien plus forte et la coloration est plus foncée.

Achittia cordicollis n. sp. – Cette espèce est très voisine de

la précédente. La coloration est châtaîn-roux, avec la tête et l'abdomen brun de poix. La tête a la même sculpture, mais est plus carrée et un peu atténuée en avant; les antennes sont plus fortes, avec les articles 3-7 un peu plus longs, 8 carré. 9 légèrement transversal, 10 deux fois plus gros, 11 très largement tronqué à la base, presque conique. Le prothorax est presque hexagonal, fortement rétréci à la base et au sommet. Les élytres sont moins longs, atténués à la base, avec les côtés obliques, la base trifovéolée et la strie dorsale dépassant le milieu. Le métasternum a une impression en arrière. Les pieds sont simples, avec les trochanters faiblement et obtusément angulés chez la  $\mathbb{Q}$ .

Chili.

Achillia clavata n. sp. — Espèce encore très voisine des deux précédentes. Châtain, élytres, antennes et pieds roux. Tête semblable à

celle de Ac. picea, carrée; antennes plus longues et relativement plus grèles, articles, 9 pas plus gros que 8,40 à peine plus gros, mais plus large et transversal, 44 brusquement très gros, ovale, à peine tronqué à la base, aussi long que les cinq précèdents réunis. Prothorax et élytres comme dans Ac. picea, mais les élytres sans ponctuation apparente, plus carrés, à épaules très marquées, strie dorsale dépassant le milieu. Métasternum très concave, avec une bordure latérale en carène obtuse, arrondie en avant et profondément sinuée en arrière. Pieds simples Q.—Long. 4,30 mill. — Fig. 53.



Fig. 53.

Chili

Achillia quadraticeps n. sp. — Appartient au même groupe que les précédentes. Châtain très foncé, presque brun, élytres rougeâtre-clair, antennes et pieds roux. Tête comme chez Ac. picca, mais convexe ; antennes semblables, mais bien plus épaisses, articles, 10 bien plus gros le précédent, presque carré, légèrement transversal, 11 à peine plus gros, ovoîde, tronqué à la base. Prothorax comme chez Ac. picca, fossettes plus fortes. Élytres à peu près carrés, très légèrement atténués vers la base, épaules presque nulles, deux fossettes basales, strie dorsale atteignant à peine le milieu. Métasternum plat. Pieds simples, tibias postérieurs avec un éperon apical très long, sétiforme J.— Long. 1,30-1,60 mill.

Chili.

Achillia latifrons n. sp. — Obscure castanca, elytris rufescentibus, antennis pedibusque rufis. Caput subquadratum, fronte anterius rotundatim retusa, sulco valido, integro, arcuato, inter oculos foveolis duabus a latere distantibus, inter eas vertice convexo et ad sulcum frontalem declivi. Antennae breves, articulis duobus primis majoribus, 2 ovato, 3 obsonico, 4-8 moniliformibus, longitudine perparum decrescentibus, 9 v.v. majore, sed leviter transverso, 10 paulo majore, transverso, 11 fere globoso, leviter acuminato. Prothorax subcordatus, antive posticeque valde angustatus, foveis parvis, basi punctulata. Elytra latitudine sua perparum longiora, basi leviter attenuala, lateribus subrotundata, humeris nullis, basi trifoveata, stria dorsali medio abbreviata. Segmenti primi dorsalis carinulis vix perspicuis, brevissimis, quartam partem disci includentibus, divergentibus. Metasternum planum. Pedes simplices.

3 Caput anterius latius et magis rotundatum, sulco frontali profundiore et vertice magis convexo, anterius magis declivi. — Long. 1,20-1,40 mill.

Chili.

Achillia valdiviensis Reitter nec Blanchard = Blanchardi nom. nov. — Grâce à l'obligeance de M. le Professeur Bouvier, j'ai pu étudier à loisir et comparer avec ma collection les types précieux des Pselaphus cosmopterus et valdiviensis Blanchard, qui appartiennent aux collections du Muséum de Paris et qui étaient restés inconnus des entomologistes. Jusqu'ici on avait admis, par comparaison hypothétique, que ces deux insectes rentraient dans le genre Tyropsis (Aplodea). comme cela est vrai d'ailleurs, pour Pselaphus castaneus Blanchard: Ps. cosmopterus et valdiviensis ont même été l'objet, de la part de Schaufuss, Reitter et de moi-même, de longues dissertations qui se trouvent réduites à néant, car ces deux insectes ne sont nullement des Tyrini, mais des Brachyglutini et rentrent dans le genre Achillia, qui remplace au Chili les Brachygluta (sub Bryaxis).

Achillia (Bryaxis) nasuta Reitt., = nasina Reitt., est identique à Pselaphus valdiviensis Blanchard; Achillia (Bryaxis) chilensis Reitt., est le même insecte que Ps. cosmopterus Blanchard. Le nom de valdiviensis. donné par Reitter à une autre espèce très distincte, doit donc être remplacé, et je propose celui de Blanchardi, en souvenir d'Em. Blanchard qui occupa, pendant de longues années, la chaire d'Entomologie au Museum de Paris. Les mêmes noms de valdiviensis et cosmoptera Blanch., devront être retranchés de la liste des espèces du genre Tyropsis (Aplodea) et être ajoutés, au contraire, à celle du genre Achillia.

Achillia Elfridae n. sp. - Capite piceo, prothorace et abdomine obscure castaneo, antennis pedibusque rufis, vel tota rufa limmatura?). Caput quadratum, fronte minus retusum, planum, antrorsum medio nonnihil triangulare, sulco frontali transverso, integro, profundissimo et lato, foreis duabus maximis, anterius sitis, a latere paululum distantibus, occipite sat convexo. Antennae validae, articulis duobus primis paulo majoribus, 2 orato, 3 obconico, 4-7 quadrato-elongatis. 8 et 9 quadratis, 10 paulo latiore et transverso, 11 magno, basi late truncato, apice acuminato. Prothorar subcordatus, antice plus quam postice attenuatus, foreis validis subaequalibus, basi minute punctulata. Elytra

disperse, irregulariter et obsolete, sat grosse punctata, elongato-quadrata, basi paululum attenuata, humeris notatis, obliquis, basi biforeata, stria dorsali medio abbreviata. Segmenti primi dorsalis carinulis duabus tenuibus, subparallelis, tertiam partem disci includentibus et attingentibus.

of Caput majus et unterius, ante oculos, leviter ampliatum, sulco transverso validiore, foveis majoribus et transversis. Metasternum medio concavum, utrinque mucronatum. Segmentis ventralibus 2 (1 apparente) triangulatim depresso, ultimo apice transversim truncato, elevato et ciliato. Tibiis intermediis crassioribus et intus apice leviter sinuatis. - Fig. 54,



Q Metasternum late nec profunde impressum.

Chili.

Cette espèce se rapproche de Ac. Blanchardi (valdiviensis Reitt.), mais le sillon frontal est plus profond et les fossettes céphaliques ne sont pas réunies par une dépression transversale. Je lui ai conservé le nom inédit qu'elle portait dans la collection Reitter, mais je n'en ai trouvé la description nulle part.

Achillia brevicornis n. sp. - Valida, erassa, capite abdomineque piceo, capite rubro-bimaculato, prothorace obscure ferrugineo, elytris rubro-rufis, antennis pedibusque rubro-ferrugineis, sparsim sed fortius pubescens. Caput latitudine sua longius, anterius valde attenuatum et lateribus obliquum, fronte deplanatum et obsolete transversim sulcatum, postice, ante oculos, late et profunde transversim impressum, ista impressione lateribus extensa et latiore, vertice convexo, supra impressionem, medio anterius, prominulo et acute minute subcornuto. Antennae breves, crassae, articulis duobus primis majoribus, 2 cylindrico, 3-8 quadratis, 9 et 10 majoribus, transversis et crescentibus, 11

breviter ovato, basi minus truncato, apice obtuse acuminato. Prothorax cordatus, foveis mediocribus, basi punctulata. Elytra subquadrata, humeris notatis, basi bifoveata, fovea intermedia obsoleta, stria dorsali medio abbreviata. Carinulis segmenti primi dorsalis inconspicuis. Metasternum late et subtransversim concavum. Pedes simplices, trochanteribus anticis leviter nodosis, intermediis minutissime medio angulatis. Long. 1,90 mill.

Chili.

Cette espèce est voisine de Ac. larrata Reitter; mais l'armature de sa tête et sa taille beaucoup plus forte, l'en distinguent facilement.

### Bryaxina n. gen.

Crassa, plus minusve subdeplanata. Caput magnum plus minusve irregulare. Palpi mediocres, articulis 2 elongato, clavato, 3 minuto,




Fig. 55.
Bryaxina torticornis.
Palpe et tarse autérieur.

globoso, 4 breviter et vregulariter ovato, extus medio subinflato et, ante apicem, leviter sinuato, apice valde acuto. Antennae validae et crassae apice gradatim incrassatae, clava haud abrupta. Prothorax triforeatus fovea media minore. Elytra magna, quadrata, basi tri vel quadri-foveata, stria dorsali brevissima. Abdomen breve, segmento primo dorsali paulo majore, carinulis duabus nunquam tertiam partem disci superantibus et semper plus quam tertiam includentibus. Segmento ventrali primo apparente semper basi longitudinaliter carinato. Coxae intermediae parum distantes et inter eas mesosterno lamellato,

coxae posticae paulo minus distantes. Segmento ultimo ventrali 3 plus minusve transversim impresso, margine sua apicali recte truncata et carinato-elevata, pygidio magno, trapezoidali. Tibiis posticis 3 muticis. 4 calcare apicali setiformi plus minusve elongato et interdum sinuato, armatis. Tarsis validis, infra semper ciliatis, in mare articulo 2 tarsorum anteriorum majore, sequente plus quam duplo latiore, longe subovato, supra convexo, infra deplanato et dense squamoso. — Fig. 55.

Ce nouveau genre est évidemment très voisin du genre Achillia, auquel sa tête grande, généralement irrégulière, le fait ressembler; mais le corps est plus massif, le 4º article des palpes est plus fortement sinué, quoique cette conformation soit déjà apparente chez Achillia. Ce qui l'en distingue surtout, ce sont les tarses toujours très développés et ci-

liés en dessous, dont les antérieurs ont le 2º article, chez les mâles, dilaté on au moins fortement élargi, garni en dessous de brosses analogues à celles que l'on observe chez beaucoup de Carabiques.

Toutes les espèces de ce genre, sauf deux, étant nouvelles, je pense qu'il ne sera pas sans intérêt d'en donner un tableau.

## Tableau des espèces du genre Bryaxina

A 2. Trois fossettes à la base des élytres.
B 2. Carinules abdominales aussi longues que 1/3 du seg-
ment torticornis n. sp.
B 4. Carinules abdominales aussi longues que 4 4 du seg-
ment.
C. 2. Antennes épaisses, articles 8 légèrement, 9 et 10 fortement
transversaux, 11 assez brièvement obconique; tête simple
Qfraudatrix Schauf.
C. 1. Antennes moins épaisses, articles. 8 fortement, 9 beau-
coup moins transversal, 40 presque carré, 44 ovoïde-
allongé; tète excavée et armée ♂ armiceps n. sp.
A 1. Quatre fossettes à la base des élytres.
B <sup>1</sup> 3. Antennes grèles, tous, ou presque tous les articles plus
longs que larges.
C <sup>1</sup> 2. Carinules abdominales aussi longues que le 1 4 du seg-
ment; articles des antennes 4 et 8 carrés lucida n. sp.
C4. Carinules abdominales aussi longues que 4/3 du seg-
ment; articles des antennes 4 et 8 un peu plus longs que
larges clavata n. sp.
B <sup>1</sup> 2. Antennes un peu plus épaisses, articles 5, 6, 7 plus longs
que larges, 4, 8, 9, 10 carrés.
C <sup>2</sup> 2. Carinules abdominales aussi longues que 1 3 du seg-
ment
C <sup>2</sup> 1. Carinules abdominales aussi longues que 1 4 du seg-
ment Schaufussi n. sp.
B <sup>1</sup> 1. Antennes épaisses, articles pas plus longs que larges.
C <sup>3</sup> 2. Articles des antennes 8 carré, 9 et 10 transversaux; cari-
nules abdominales moins longues que 1 4 du segment.
cavifrons Schauf.
C <sup>3</sup> 1. Articles des antennes 8, 9, 10 transversaux; carinules
abdominales aussi longues que 1 3 du segment.

D 2. Articles des antennes 8 et 9 très transversaux, pas plus gros que 7, 10 beaucoup moins transversal; carinules

D 1. Articles des antennes 8, 9, 40 moins transversaux, plus gros que 8, formant une massue assez marquée; carinules abdominales au moins aussi longues que 1/3 du segment, divergentes..... crassicornis n. sp.

Bryaxina torticornis n. sp. — Rubro-castanea. elytris paulo dilutioribus. Caput latitudine aequilongum, antice valde attenuatum, lateribus obliquum, temporibus pone oculos aurantiaco-fasciculatis. Antennae sat crassae, articulis 1 et 2 cylindricis, 3 obconico, 8, 9 transversis, 10 majore et multo minus transverso, 11 ovato, basi truncato. Prothorax cordatus, lateribus fovea laterali magna, paululum emarginatus, fovea media punctiformi.

of Caput paulo brevius, deplanatum, foreis inter se et ab oculis aequaliter distantibus, inter eas vertice depresso et minute unituberculato. Antennae medio leviter sinuatae, articulis 5, 6, 7 crassioribus, fere globosis. Metasternum maxime intricatum, basi media carina et utrinque carina altera longiore et fasciculata, media parte anteriore suboratim depressa, istae depressionis margine postica utrinque producta, medio profunde et quadratim emarginata, medio tuberculo minuto, media parte postica transversim excavata. Segmento ultimo ventrali transversim profunde impresso, fundo granuloso-punctato.

2 Caput paulo longius, magis convexum, foveis inter se magis quam ab oculis distantibus, liberis. Antennae vix sinuatae, articulis 5, 6, 7 ovatis, 5 paulo majore. Metasternum convexum,

simpler. — Long. of, 2,30 mill. Q, 2.40 mill.






Fig. 88.

Bryaxina armiceps n. sp. — Rubrocastanea. Caput latitudine sua longius, antrorsum angustius, lateribus medio incurvum, anterius punctatum, supra antennas angulis anticis obliquis et valde elevatis. fronte medio late deplanata, vertice inter oculos toto transversim et late depresso, fundo medio tuberculo valido, postice carinato et aurantiaco bifasciculato, postice bifoveato, occipite transversim, obtuse sed valde, praesertim medio, elevato, antrorsum trisinuato. Prothorax cordatus, medio sat abrupte rotundatus et postice leviter sinuatus, foreis lateralibus rotundatis, media punctiformi. Metasternum planum, postice triangulatim impressum. Segmento ultimo ventrali parum profunde, subquadratim impresso, utrinque pubescente. — Long. 2,30 mill. — Fig. 88.

Brésil.

Bryaxina lucida n. sp. — Rubro-castanea, elytris, antennis pedibusque rufo-castaneis. Caput latitudine sua longius, lateribus medio sinuatum, incurvum et angustius, angulis anticis supra antennas rotundatis et obtuse elevatis, medio fronte depressa, inter oculos medio foveis duabus, paulo magis inter se quam ab oculis distantibus, sulcis duobus leviter arcuatis, antrorsum acute junctis, vertice et occipite una convexo. Antennarum articulis 9 et 10 paulo crescentibus, 11 oblongo-ocato, basi truncato. Prothorax subcordatus, lateribus minus rotundatis et haud sinuatis, foveis lateralibus minoribus, a latere leviter distantibus, media rotundata, minore. Metasternum valde convexum, postice obsolete et tenuiter sulcatum.

♂ Segmento ultimo ventrali subcordatim impresso. — Long. 2.10 mill.

Brésil.

Les sillons céphaliques forment une ogive très nette.

**Bryaxina clavata** n. sp. — Très voisine de la précédente. La tête est plus grande, plus élargie aux angles antérieurs qui sont droits, avec un tout petit tubercule interne, les fossettes céphaliques sont moins profondes, les deux sillons sont moins nets, moins obliques et forment les deux côtés d'un triangle isoscèle; tous les articles des antennes sont plus longs.

Q Tête un peu moins large, en avant qu'en arrière, angles antérieurs un peu obtus. — Long. 2.20 mill.

Bresil.

**Bryaxina dimidiata** n. sp. — Cette espèce pourrait être prise pourla femelle d'une des précédentes, si l'exemplaire unique qui la représente n'était pas un mâle. La tête est semblable à celle de *Br. lucida*, mais les sillons sont obliques, comme chez *Br. clavata*. Les antennes sont beaucoup plus épaisses, les articles 5, 6, 7 sont plus longs et un peu plus gros que les adjacents, 9 et 10 vont en grossissant. 11 est

gros, ovoïde. Dernier segment ventral avec deux dépressions transversales séparées par une carène, la basale très grande, un peu arquée, l'apicale beaucoup plus petite, ovoïde, en quelque sorte renfermée dans la plus grande, sommet fortement cilié. Pygidium déprimé J. - Long. 2 mill.

Brésil.

Bryaxina Schaufassi n. sp. — Rubro-castanea, elytris multo dilutioribus. Caput subquadratum, perparum longius quam latum, lateribus medio vix incurvum et angustius, angulis anticis oblique truncatis, parum elevatis, fronte medio quadratim impressa, inter oculos foveis duabus validis. Prothorax latitudine sua vix longior, lateribus medio sat abrupte rotundatus et postice leviter sinuatus, foveis lateralibus magnis, media punctiformi. Metasternum convexum.

© Caput paulo majus, supra antennas magis elevatum, foveis inter se magis quam ab oculis distantibus, inter eas vertice magis convexo, sulcis duobus obsoletissimis, obliquis, in fronte acute conjunctis. Articulis antennarum 5 ct 7 perparum majoribus. Segmento ultimo ventrali biimpresso et transversim carinato, impressione basali subquadratotransversa, mediocri, sed profunda, basali minuta, transversim ovata, margine apicali ciliata. Pygidium transversim valde impressum.

© Capitis foveis inter se et ab oculis subaequaliter distantibus, vertice minus convexo, sulvis inconspicuis. Segmento ultimo ventrali plano, medio area elongata, parum elevata. Pygidium medio obtuse tuberculatum. — Long. 2,40 mill.

Brésil: Nouveau-Fribourg.

Bryaxina foveifrons n. sp. — Rubro-castanea, elytris rubris. Caput latitudine sua parum longius, lateribus vix sinuatum et angustius, angulis anticis leviter obliquis, truncatis, elevatis, intus oblique impressis, fronte medio quadratim valde impressa, inter oculos foveis duabus magnis leviter transversis, inter se et ab oculis aequaliter distantibus, in depressione obsoleta usque ad latera productis, vertice subplano. Antennae crassae, articulis 8 et 9 valde transversis, 10 leviter transverso, praecedente fere duplo longiore, paulo latiore, 11 magno, ovato, basi truncato. Prothorax cordatus, foveis lateralibus validis, media minore. Metasternum planum, postice obsolete impressum. Segmento ultimo ventrali profunde quadratim impresso, utrinque setoso. Pygidium transversim impressum 3. — Long. 2,40 mill.

Bresil.

Bryaxina crassicornis sp. n. — Ferruginea, antennis pedibusque rubro-castaneis, elytris rubris. Caput quadratum, lateribus rectum, fronte media leviter deplanatum, anterius declire et hand truncatum, angulis anticis quadratis, parum elevatis, inter oculos foreis duabus magnis, inter se paulo magis quam ab oculis distantibus, sulcis duobus obtiquis in fronte obtuse conjunctis. Antennae validae, articulis quatuor ultimis fere dimidiam partem formantibus, majoribus, 8-10 leviter transversis, crescentibus, 11 magno, oblongo, basi late truncato, apice acuminato. Prothorax subcordatus, sinuatus, pone medium lateribus forea laterali profunda et rotundata, forea media minuta. Metasternum convexum, apice obsolete impressum. Segmento ultimo ventrali parum transversim impresso, pubescente. Pygidium late impressum 3. — Long. 2,20 mill.

Brésil: Theresopolis.

Cette espèce se distingue de toutes les autres par les quatre derniers articles des antennes beaucoup plus gros, formant une massue très distincte.

### Braxyda n. gen.

Ce genre est presque entièrement identique au genre Bryaxina. La forme du corps est plus allongée, toujours assez peu convexe. La tête est grande, mais normale. Les tarses sont semblables avec le 2º article des antérieurs, chez les mâles, élargi et garni de brosses en dessous. Le prothorax n'a pas de fossettes latérales, mais seulement une fossette médiane ponctiforme. Les élytres sont en carré long, avec deux fossettes basales, la strie dorsale est plus marquée et s'étend, très nette. jusqu'au milieu. Le premier segment dorsal est plus grand que les suivants, les deux carinules sont courtes, à peine aussi longues que le 14 du segment et renfermant le 13, très peu divergentes. Chez le mâle, le pygidium est très grand, plus ou moins hexagonal, recourbé en dessous. Les segments ventraux, sauf le premier apparent, sont courts et sans impressions. Les pieds sont très forts et plus ou moins armés. Mais la différence générique la plus importante réside dans les palpes; le 3º article est plus petit, triangulaire, le 4º régulièrement fusiforme, tronqué à la base, comme chez Brachygluta et Reichenbachia, dont il s'éloigne par les hanches intermédiaires non contiguës, avec le mésosternum en forme de lame, entre elles,

Braxyda hamata n. sp. — Ferruginea, elytris rubris, antennis pedibusque obscure rufis. Caput quadratum, lateribus rectum, angulis anticis leviter obliquum, parum elevatum, fronte media depressum et Ann. Soc. Ent. Fr., txxiii 1904. postice transversim impressum, utrinque, inter oculos, impressione obliqua, posterius profundiore, anterius cum sulco transverso juncta, vertice et occipite una convexo. Antennae ralidae, articulis in utroque sexu dissimiles, articulis 3-8 cylindricis. Prothorax fere transversus, lateribus rotundatus, antice et postice valte attenuatus.



Fig. 56.

Antennae longiores, articulis 3, 4, 6 dimidio, 5 fere triplo, 7 duplo latitudine sua longioribus, 8 quadrato, 9 et 10 obconico-truncatis, latitudine paulo crescentibus, 9 paululum, 10 fere duplo latitudine sua longioribus, 11 fusiformi. Metasternum late concavum. Pedum anticorum femoribus leviter incrassatis, tibiis rectis, sat crassis, intermediorum trochanteribus intus, basi, leviter prominulis, femoribus supra tumidis, infra, ante medium, breviter dentatis et dein ad apicem leviter sinuatis, tibiis brevibus, crassis, leviter incurvis, intus apice, calcare valido, intus apice hamato, armatis, tibiis posticis leviter incurvis, apice calcare acuto praeditis. — Fig. 56.

♀ Antennarum articulis intermediis paulo brevioribus, 8, 9, 10 quadratis, 10 praecedente fere dimidio majore, 11 ovato, basi truncato.

Metasternum planum. — Long. 2,60 mill.

Haute-Bolivie: Yuracaris.

Braxyda crassipes n. sp. — Très voisine de la précédente. Tête semblable; cependant le sillon frontal transversal manque et est remplacé par une petite impression, en forme de fossette. Antennes plus longues, articles 3, 4, 6 deux fois, 5, 7 trois fois, 8 moitié plus longs que larges, tous cylindriques, 9 et 10 nettement en cône tronqué, 9 un peu plus long que 8, 10 deux fois plus long que 9, 14 fusiforme, un peu sinué et tronqué à la base. Prothorax plus cordiforme. Pieds comme dans l'espèce précédente, mais, aux intermédiaires, les trochanters sont fortement en demi-lune et longuement proéminents en dedans; les cuisses ne sont pas dentées mais seulement gibbeuses, en dessous, avant le milieu, les tibias sont mutiques, mais un peu échancrés à l'extrémité interne 5. — Long. 2,60 mill.

Haute-Bolivie : Yuracaris.

Je ne pense pas qu'on puisse traiter ces deux formes comme des variétés d'une même espèce : il y a beaucoup d'espèces de Brachy-

glula de la faune paléarctique considérées, à juste titre, comme parfaitement distinctes et qui différent moins entre elles.

Triomicrus cavernosus n. sp. — Sat crassus, totus castaneus, sat longe tenuiter pubescens, elytris paulo dilutioribus. Caput subquadratum, latitudine sua paulo longius, temporibus postice rotundatis, lateribus rectis, foveis tribus validis quarum frontali paulo majore. Antennae validae, articulis 1, 2 paululum majoribus, cylindricis, 3 obconico, sequentibus cylindricis, 4-7 latitudine sua paulo longioribus et longitudine decrescentibus, 8 quadrato, 9 paululum majore et leviter transverso, 10 multo majore, leviter transverso, 11 magno, basi truncato, cylindrico, apice acuminato, juxta basin area rotundata, concava et carinula circumdata. Prothorax capite multo et longitudine sua paulo latior, convexus, antrorsum valde attenuatus, lateribus rotundatus, foreis tribus aequalibus. Elytra latitudine sua paulo longiora, convexa, basi parum attenuata, humeris parum notatis sed breviter carinatis, basi biforeata, stria dorsali leviter obliqua et ante apicem eranescente. Abdomen elytris multo brevius, ad apicem attenuatum, lateribus obliquum, segmento primo dorsali magno, carinulis duabus tenuissimis, divergentibus, sextam partem disci includentibus et vix tertiam attingentibus. Metasternum totum concavum, margine posteriore utringue tuberculo fasciculato armata, Segmentis dorsalibus ultimis infra recurris, ita ut pygidium metasterno proximum sit. Segmentis ventralibus totis excavatis, angustissimis et fere inconspicuis. Pedes validi, simplices J. - Long. 2,20 mill.

Chine: He de Nyew-Tew, près de Shei-Pu.

Les segments dorsaux se recourbent en dessous, au point que le pygidium vient presque toucher le métasternum, de sorte que les segments ventraux, excavés et étroits, disparaissent dans cette profonde excavation.

**Triomicrus humilis** n. sp. — Praecedenti affinis, sed magis convexus et globosus, brevius pubescens. Antennae breviores, articulis 3-7 subquadratis, 8 leviter transverso, 9 paululum majore et leviter transverso, 10 nono fere dimidio longiore, vix transverso, obconicotruncato, 11 magno, ovato-etongato, basi truncato. Prothorax subglobosus, foveis tribus mediocribus aequalibus. Elytra latitudine sua vix longiora, convexa, lateribus et humeris rotundata, basi attenuata, stria dorsali leviter sinuata et pone medium abbreviata. Abdomen breve, posterius vix attenuatum, lateribus subparallelum. Segmento primo dorsali magno, carinulis duabus tenuibus, vix divergentibus,

sextam partem disci includentibus et mediam attingentibus. Metasternum planum, margine postica subrotundatim emarginata et utrinque obtuse producta. Segmento ventrali 2 (primo apparente) leviter depresso. Pedes calidi, simplices, tibiis rectis ad apicem gradatim crassioribus Q.—Long. 2 mill.

Chine: Haining.

Cette espèce a plus d'analogies avec *Tr. protervus* Sharp, qu'avec la précédente, mais la tête et le prothorax sont imponctués, tandis qu'ils présentent une grosse ponctuation chez *Tr. protervus*.

Elle ne me semble pas pouvoir être considérée comme la femelle de cavernosus, à cause des palpes, dont les articles 3 et 4 sont plus courts et plus épais.

### Drasinus n. gen.

Sat crassus et parum deplanatus. Caput antrorsum attenuatum, ante frontem transversim sulcatum, fronte ipsa paulo angustiore, utrinque nodosa et medio depressa, infra carinis tribus validis acutis,



Fig. 57.

genis concavis et palpis in fovea locatis. Palpi sat validi, articulis 2 subrecto, apice clavato, 3 transversim triangulari, 4 secundo majore, irregulariter ovato, basi gracili, haud truncato, apice crassiore et rotundato, angulo apicali interno subacuto, leviter compresso. Antennae decem-articulatae. Oculi magni, postice siti. Prothorax subaequaliter trifoveatus. Elytra quadrata, basi trifoveata, stria dorsali abbreviata. Segmento primo dorsali magno, carinulis duabus valde distantibus. Coxae intermediae leviter

distantes. - Fig. 57.

Ce genre a la plus grande analogie, comme facies, avec le genre Decarthron Brendel, dont il s'éloigne cependant considérablement par l'absence de fossette jugulaire à la face inférieure de la tête et par la forme de ses palpes.

**Drasinus binodulus** n. sp. — Rufo-castaneus, elytris antennis pedibusque paulo dilutioribus, breviter et parce pubescens. Caput latitudine aequilongum, ante oculos foreis duabus latere approximatis, vertice et occipite una convexo. Antennae sat validae, articulis subcylindricis, duobus primis paulo majoribus, 3-7 longitudine decrescentibus, 3 latitudine sua paulo longiore, 7 quadrato, 8 paululum majore, quadrato, 9 adhuc majore, quadrato, 10 (ultimo) ovato, basi truncato,

apice obtuso. Prothorax capite multo major, subtransversus, lateribus rotundatus, foveis tribus subaequalibus et basi ipsa punctulata. Elytra quadrata, humeris notatis, stria dorsali medio evanescente. Segmento primo dorsali magno, carinulis duabus rectis mediam partem disci includentibus et attingentibus. Metasternum juxta coxas intermedias, area oblonga, leviter elevata, opaca, lateribus parallela, et apice acuta, ornatum, et postice tenuiter profunde sulcatum. Pedes simplices, tibiis anticis et intermediis rectis, posticis ad apicem leviter incrassalis et incurvis. — Long. 1,30-1,40 mill.

Mexique.

### Ectopocerus n. gen.

L'espèce unique qui rentre dans ce genre a été décrite et figurée par Reitter qui la rangeait dans le genre *Decarthron*, parce qu'elle n'a que dix articles aux antennes, seul caractère qui soit d'ailleurs commun à ces deux genres. La face inférieure de la tête n'a pas la fossette jugulaire caractéristique des *Decarthron*; il y a, au contraire, la carène longitudinale aplatie qui se retrouve chez la plus grande majorité des *Brachyglutini*. Il faut donc retrancher *verticicornis* Reitt., des *Decarthron* et même l'en éloigner considérablement.

Les antennes et la tête sont très anormales; le 4° article des palpes est régulièrement ovoïde. Il y a trois fossettes égales au prothorax. Les hanches intermédiaires sont contiguës. Ce nouveau genre se rapproche donc beaucoup de *Brachygluta* dont il ne diffère, en réalité, que par la conformation bizarre de la tête et des antennes, et aussi parce que ces dernières n'ont que dix articles.

### Ephymata n. gen.

Je suis obligé de créer ce genre pour Bryaxis mucronata Raffr., de Singapore. La forme générale est beaucoup plus épaisse, presque gibbeuse. La tête est plus longue, assez fortement atténuée en avant; en dessous, il y a trois carènes tranchantes, dont les latérales sinuées se terminent, derrière les yeux, dans un gros tubercule aigu et limitent une fossette palpaire large, mais peu profonde. Le dernier article des palpes est brièvement ovoïde, largement tronqué à la base, peu acuminé au sommet. Le prothorax est presque hexagonal, avec trois très grandes fossettes. Le métasternum est petit, court et étroit, gibbeux. Les hanches intermédiaires sont contiguës et les postérieures moins distantes que d'habitude.

# Tableau du genre Brachygluta

A 2.	Tête avec trois fossettes.		
B 2.	Abdomen semblable dans les deux sexes.		
C 2.	Élytres plus larges que longs	Groupe	I.
	Élytres au moins aussi longs que larges.		
	Carinules du premier segment dorsal renfer-		
1, 0.	mant la moitié de la largeur du segment.		
E 9	Carinules du premier segment dorsal égalant la		
17 74.	moitié de la longueur du segment	Groupe	П
17 3	Carinules du premier segment dorsal égalant le	aroupe	11.
12 1.	tiers de la longueur du segment	Groupe	ш
n a	Carinules du premier segment dorsal renfer-	droupe	111.
D A.	mant plus du tiers de la largeur du segment.		
121 a	Carinules du premier segment dorsal égalant la		
E. Z.		Casino	
121.1	moitié de la longueur du segment	Groupe	1 4 .
E 1.		Comme	**
v	tiers de la longueur du segment	Groupe	١.
D 1.	Carinules du premier segment dorsal renfer-		
	mant seulement un tiers de la largeur du seg-		
	ment.		
E2 2.	Carinules du premier segment dorsal égalant la		
	moitié de la longueur du segment	Groupe	V1.
$E^2 1$ .	Carinules du premier segment dorsal égalant le		
	tiers de la longueur du segment	Groupe	VII.
B 1.	Abdomen différent dans les deux sexes, anormal		
	chez les mâles.		
C1 2.	Tête mucronée, de chaque côté, au-dessous des		
	yeux	Groupe	
	Tête simple dans les deux sexes	Groupe	IX.
A 1.	Tète avec deux fossettes seulement, la frontale		
	manque.		
B12.	Corps plus ovoïde, plus épais, tibias postérieurs		
	sinués	Groupe	X.
B1 1.	Corps plus étroit, plus parallèle, tibias simples.		
	épistome assez allongé	Groupe	X1.

Brachygluta Aubei Tourn. Var. Pici n. var. — Dans la forme typique mâle, le premier segment dorsal est tronqué en rond à l'extrémité au milieu, et le 2º présente un petit tubercule correspondant à cette troncature. Dans la variété *Pici*, le premier segment est un peu

aplati au milieu, à l'extrémité, et tronqué carrément. le 2º est simplement impressionné et un peu irrégulier en face de cette troncature. C'est une simple variété à moindre développement, comme on en constate chez plusieurs espèces de *Brachygluta* à abdomen anormal.

Tunisie.

Brachygluta haematica Reichb. Var. simplicior n. var. — Dans cette nouvelle variété, dont le sexe mâle ne peut être mis en doute, le développement abdominal est réduit à son minimum; le premier segment dorsal est très légèrement aplati au milieu, vers l'extrémité dont la marge présente, au milieu, une entaille presque insensible.

J'en possède un seul exemplaire provenant de la collection Schaufuss; il est étiqueté, Biscaye, sans localité plus précise.

Brachygluta Leprieuri Saulcy, var. elevata n. var. — L'agencement de l'armature abdominale est le même que dans le type, mais le milieu du premier segment dorsal est fortement surélevé, de la base au sommet, les côtés de cette partie surélevée sont obliquement déclives et déprimés, le pli du lobe latéral est plus accentué, plus grand, la fossette dont il est marqué est plus grande, plus oblique et l'échanceure médiane terminale du 2º segment est plus étroite, ce qui fait paraître les lobes latéraux plus grands. C'est une variété très tranchée.

Algérie : Djebel-Taya près de Guelma. Je la tiens de M. A. Grouvelle.

### Bunoderus n. gen.

Ce genre nouveau est très voisin de Brachygluta. Il s'en sépare par un facies un peu différent. Le corps est assez allongé, parallèle et peu convexe. Le prothorax a une carène longitudinale plus ou moins accentuée et trois fossettes médiocres, subégales, dont les latérales sont situées sur le bord extérieur lui-même et le font paraître un peu sinué. Les palpes sont plus petits, bien plus grèles, le 3° article est petit, très brièvement obconique, le 4° est fusiforme, plus allongé, très acuminé au sommet et nullement tronqué à la base, tandis que, chez Brachygluta, le 3° article est triangulaire en dedans, très arrondi en dehors, le 4° largement tronqué à la base, fortement ovoïde et acuminé au sommet. L'abdomen est plus court que les élytres, avec le premier segment dorsal un peu plus grand que les suivants et avec deux carinules peu distinctes. Il y a 7 segments ventraux très marqués chez le mâle, le 7° est grand, enchâssé dans le 6° et forme opercule.

Bunoderus carinicollis n. sp. — Ferrugineus, elytris antennis pedibusque paululum dilutioribus, nitidus, sat longe, sat disperse pilosus. Caput latitudine sua longius, antrorsum haud attenuatum,



Fig. 58.

sed fronte ipsa leviter angustiore, postice utrinque transversim impressa, utrinque supra antennas leviter nodosa, medio antice depressa, inter oculos foveis duabus validis, inter se magis quam ab oculis distantibus, occipite paululum convexo. Antennae validae, articulis subcylindricis, 3-8 decrescentibus, 3 latitudine sua longiore, 8 quadrato, 9 parparum majore. subquadrato, 10 leviter transverso, 11 ovato, basi truncato, apice acuminato. Prothorax capite latior, latitudine sua paululum longior, cordatus, lateribus pone medium leviter sinuatis, carina longitudinali valida, integra. Elytra latitudine sua longiora, basi attenuata, humeris subobliquis, notatis, basi trifoveata, stria dorsali leviter sinuata, mediem multo superante. Segmenti primi dorsalis carinulis paral-

lelis, quartam partem disci includentibus et tertiam attingentibus. In metasterno, juxta coxas intermedias, area elevata, triangulari, opaca, postice sulco prolongata. Segmento primo apparente carinato, ultimo apice medio rotundato, utrinque leciter sinuato, obsolete impresso. Pedes simplices, trochanteribus intermediis leviter gibbosis ♀. — Long. 1-60 mill. — Fig. 58.

Mexique.

Bunoderus longipilis n.sp. — Praecedenti valde affinis, totus rufus et longius pilosus. Caput fere transversum, fronte angusta, supra antennas haud nodosa, et postea transversim sulcata, medio impressa, foveis inter oculos majoribus, leriter transversis, occipite transversim convexo. Antennae similes, sed parum breviores, articulis 9 et 10 transversis, 11 paulo longiore. Prothorax similis sed carina longitudinali obsoleta, disco potius longitudinaliter gibboso quam carinato. Elytra similia, sed basi bifoveata. Trochanteribus anticis nodosis.

of Antennarum articulis 8 majore, quadrato. Metasternum late totum longitudinaliter impressum et utrinque recte carinatum. Segmentis ventralibus (apparentibus) 3, 4, 5 lateribus tantummodo conspicuis, medio secundo occultis, 6 magno, maxime medio transversim excavato, 7 magno, rhomboidali, punctato.

Q Metasternum late, parum profunde sulcatum. Segmento ultimo

ventrali basi sat valide rotundatim impresso, apice obtuse triangulari. — Long. 1,50-1,70 mill.

Brésil: Blumenau.

### Nodulina n. gen.

Ce genre est extrèmement voisin de Reichenbachia, mais il présente des caractères suffisamment tranchés pour que je me décide à l'en séparer.

Il en diffère notamment par la forme de la tête ; celle-ci n'est pourvue que de deux fossettes entre les yeux, de plus le front, dans sa partie antérieure est tronqué brusquement et carrément; enfin dans Nodulina, l'épistome est très grand, transversal, caréné en avant, dilaté sur les côtés et, chez le màle, il est armé au milieu d'une corne saillante.—Fig. 59.

Je n'en connais qu'une seule espèce, *N. convera* Schauf. (*Bryaxis*), qui semble assez répandue dans la région des Amazones.



Fig. 59.

VI.

# Tableau du genre Reichenbachia

Ce genre qui compte plus de 300 espèces est le plus nombreux de la famille et d'une étude difficile : je l'ai divisé en 63 groupes, qui simplifieront les descriptions qui vont suivre.

Div. I. Tête, mandibules, antennes, prothorax, ab-			
domen et pattes simples.			
A 2. Trois fossettes basales aux élytres.			
B 6. Carinules abdominales très rapprochées,			
	Groupe	I.	
B 5. Carinules abdominales distantes de 1 6 de			
la largeur du premier segment dorsal	Groupe	II.	
B 4. Carinules abdominales distantes de 1/5	Groupe	HI.	
B 3. — 1/4	Groupe	IV.	
B 2. — 13	•		
C 2. Fossettes prothoraciques rondes.			
D 2. Prothorax ponctué	Groupe	V.	
D 4. Prothorax lisse.	1		
E 4. Carinules abdominales égalant 1/2 de la lon-			

gueur du premier segment dorsal..... Groupe

E 3. Carinules abdominales égalant 13	Groupe	VII.
E 2. – 14	Groupe	VIII.
E 1. — 1.6	Groupe	IX.
C 4. Fossettes prothoraciques latérales transver-	•	
sales	Groupe	X.
B 1. Carinules abdominales écartées de plus de	1	
13	Groupe	XI.
A 4. Deux fossettes basales aux élytres.	1	
B <sup>1</sup> 5. Carinules abdominales écartées de 1 8	Groupe	XII.
B <sup>1</sup> 4. – 1,5	Groupe	XIII.
B <sup>1</sup> 3. — 1 4	Groupe	XIV.
B <sup>1</sup> 2. – 4/3	Groupe	2511.
C+4. Corps entièrement et fortement ponctué	Groupe	XV.
C <sup>1</sup> 3. Prothorax fortement ponctué	Groupe	XVI.
C <sup>1</sup> 2. Prothorax lisse; élytres ponctués	Groupe	XVII.
C <sup>1</sup> 1. Corps entièrement lisse.	aroupe.	A 111.
D <sup>†</sup> 3. Strie dorsale entière	410	VVIII
	Groupe	XVIII.
D <sup>†</sup> 2. Strie dorsale dépassant le milieu.	(7	37.137
E <sup>†</sup> 2. Antennes très allongées	Groupe	XIX.
E† 1. Antennes beaucoup plus courtes	Groupe	XX.
D <sup>1</sup> 1. Strie dorsale ne dépassant pas le milieu	Groupe	XXI.
B <sup>1</sup> 4. Carinules abdominales séparées de plus de		
1/3		
C <sup>2</sup> 2. Prothorax ponetué	Groupe	XXII.
C <sup>2</sup> 1. Prothorax lisse.		
D <sup>2</sup> 2. Massue antennaire uniarticulée	Groupe	XXIII.
D <sup>2</sup> 1. Massue antennaire pluriarticulée	Groupe	XXIV.
Div. II. Prothorax anormal; le reste simple.		
A 2. Prothorax gibbeux	Groupe	XXV.
A 4. Prothorax tuberculé	Groupe	XXVI.
Div. III. Mandibules armées à la tranche externe;		
le reste simple	Groupe	XXVII.
Div. IV. Abdomen anormal; le reste simple	Groupe	XXVIII.
Div. V. Pieds anormaux; le reste simple.		
A 4. Tibias intermédiaires déformés et armés	Groupe	XXXXX.
A 3. Tibias intermédiaires armés d'un très fort	•	
éperon, postérieurs armés ou comprimés.	Groupe	XXXX.
A 2. Tibias postérieurs coudés, cuisses posté-		
rieures armées	Groupe	XXXI.
A 1. Tous les tibias et les cuisses postérieures		
anormaux	Groupe	XXXII.
	or cobe	

Div.	VI. Antennes anormales.		
A 2.	Pieds simples.		
B 2.	Derniers articles des antennes seuls anor-		
	maux.		
C 6.	Articles 41 seul plus ou moins grossi ou		
	anormal		XXXIII.
C 5.	Article 40 lenticulaire, 11 très gros	Groupe	XXXIV.
	Articles 10 et 11 très gros, 10 plus gros que 11.	Groupe	XXXX.
C 3.	Articles 10 et 11 armés ou comprimés	Groupe	XXXXII.
( 2.	Articles 9 et 41 anormaux	Groupe	XXXVII.
C 1.	Articles 9, 40, 14, armés ou beaucoup plus gros.	Groupe	XXXVIII.
B 4.	Articles intermédiaires et, parfois aussi le		
	dernier, anormaux.		
C18.	Article 4 seul très gros		XXXXX.
C17.	Article 5 seul très gros	Groupe	XL.
C16.	Articles 5 et 6 plus gros, simples ou armés		
	en dessous	Groupe	XLL.
C+5.	Articles 5. 6, 7 anormaux	Groupe	XLII.
C14.	Articles 5, 6, 7, 8 anormaux	Groupe	XLIII.
C13.	Articles 4, 5, 6, 7 anormaux	Groupe	XLIV.
C12.	Articles 2, 5, 6 anormaux	Groupe	XLV.
C14.	Articles 5, 6, 7, 8, 9, 10 anormaux	Groupe	XLVI.
A 1.	Pieds normaux; antennes anormales.		
1312.	Tibias postérieurs dilatés, comprimés.		
C2 2.	Articles des antennes 3 et 6 anormaux	Groupe	XLVII.
	Articles des antennes 5 a 9 anormaux	Groupe	XLVIII.
B1 1.	Tibias postérieurs plus ou moins angulés;		
	articles des antennes 6 à 10 anormaux	Groupe	XLIX.
	VII. Tête plus ou moins anormale.		
A 5.	Tête dilatée en arrière	Groupe	L.
A 4.	Tête avec la fossette frontale entaillant la		
	marge antérieure du front.		
B 2.	Antennes simples	Groupe	Ll.
B 1.	Antennes anormales.		
(1. 2.	Articles 5 et 6 plus grands, plus ou moins		
	armés en dessous	Groupe	LII.
C 4.	Articles 6 à 40 anormaux	Groupe	LIII.
A 3.	Pas de fossette frontale.		
	Articles des antennes simples	Groupe	LIV.
B14.	Article 3 plus ou moins plus gros et sur-		
	treat when have	Carriera	11.

tout plus long ...... Groupe LV.

B <sup>1</sup> 3. Articles 5 et 6 anormaux	Groupe	LVI.
B <sup>1</sup> 2. Articles 4 très gros, 5 à 9 légèrement anor-		
maax	Groupe	LVII.
B <sup>1</sup> 1. Articles 5, 6, 7 très élargis	Groupe	LVIII.
A 2. Tête avec le vertex proéminent	Groupe	LIX.
A 1. Tête avec quatre fossettes, épistome caréné		
et dilaté sur les còtés	Groupe	LX.
Div. VIII. Prothorax sans fossette médiane (nov.		
subg.?)	Groupe	LXI.
Div. IX. Prothorax relevé sur les côtés avec une		
seule fossette médiane (nov. subg.)	Groupe	LXII.
Div. X. Prothorax avec une dépression discoïdale		
trilobée (nov. subg.?)	Groupe	LXIII.

**Reichenbachia addahensis** n. sp. — R. Schlerethi Reitt. valde affinis. Elytra fortius et magis rugoso-punctata. Antennae multo longiores, graciles, articulis 3, 4, 6 fere triplo, 5 paulo plus quam triplo, 7 fere duplo latitudine sua longioribus, 8 quadrato, 9 obconico, latitudine sua paulo longiore, 10 magno, quadrato, 11 oblongo-ovato. Metasternum late concavum et utrinque obsolete carinatum. Segmentis ventralibus totis deplanatis.

Afrique occidentale : Addah.

Chez R. Schlerethi, avec laquelle Reitter l'avait confondue et qui d'ailleurs lui ressemble beaucoup, les articles des antennes sont plus courts, les articles 3, 4, 5, 6 (dans le même sexe mâle) ne sont que deux fois aussi longs que larges, 7 à peine plus long que large, 8 et 9 carrés. Le métasternum a de chaque côté, une carêne qui se dilate, au milieu, en dent triangulaire, saillante et un peu recourbée en dedans. — L'espèce fait partie du Groupe III.

Reichenbachia nava n. sp. — Sat crassa, rufo-testacea, brevissime, sublente sed sat dense pubescens. Caput latitudine sua paulo longius, antice leviter attenuatum, fovea frontali lata, parum profunda, duabus alteris leviter transversis. Antennae mediocres, articulis 3-6 duplo, 7 perparum latitudine sua longioribus, 8-10 quadratis, 9 et 10 crescentibus, 11 mediocri, ovato. Prothorax subcordatus, lateribus leviter rotundatus, foreis lateralibus validis, a latere parum distantibus. Elytra obsoletissime subrugoso-punctata, latitudine sua paulo longiora, ad basin leviter attenuata. Carinulis segmenti primi dorsalis validis, paulo dirergentibus, mediam partem disci attingentibus et quintam includentibus. Metasternum planum. Segmento dorsali primo apparente

basi carinato, ultimo leviter deplanato, punctato. Pedes simplices, tibiis posticis incurvis. — Long. 4.50 mill.

Sumatra: Palembang.

Cette espèce est assez voisine de *R. nilotica* Mots., mais les antennes sont plus longues. les fossettes du prothorax bien plus fortes et les carinules abdominales bien plus fortes, très marquées, avec l'espace compris entre elles un peu déprimé. Le mâle est malheureusement inconnu. — Elle appartient au Groupe III.

Reichenbachia infelix n. sp. — R. Schlerethi Reitt. et addahensi affinis. Antennae cum clava multo magis conspicua, articulis 3-6 duplo, 7 paululum latitudine sua longioribus, 8 leviter transverso, 9 magis transverso, 10 duplo longiore, majore, vix transverso, leviter obliquo, 11 ovato basi oblique truncato. Prothoracis foveis lateratibus mediocribus, media minutissima. Elytra laevia, stria dorsali fere integra et subobliqua. Metasternum juxta coxas intermedias tuberculatum, postice subcordatum, leviter elevatum et deplanatum. Segmento ultimo ventrali late nec profunde impresso. Tibiis anticis, paulo ante apicem, minutissime mucronatis, posticis, ad apicem, leviter incrassatis et incurvis, trochanteribus anticis obtuse sed fortiter medio angulatis 3 — Long. 4.30 mill.

Afrique occidentale : Côte de l'Or.

Cette espèce appartient au Groupe III.

Reichenbachia breviventris n. sp. — Parum convera, tota rufa, minutissime et brevissime pubescens. Caput mediocre, antice leviter attenuatum, supra antennas utrinque leriter nodosum, foreis tribus validis, aequalibus. Antennae mediocres, articulis 3-7 dimidio, 8 perparum latitudine sua longioribus, 9 et 10 quadratis, 9 praecedente vix majore, 10 dimidio majore, 11 basi truncato, subcylindrico, apice acuminato. Prothorar capite multo major, convexus, breviter ovatus, foveis lateralibus minutis, media minutissima et obsoleta. Elytra minute et disperse punctulata, latitudine sua longiora, ad basin attenuata, lateribus subobliqua, humeris parum notatis, stria dorsali integra, subrecta. Abdomen elytris dimidio brevius, postice subtruncatum. Metasternum longitudinaliter depressum. Pedes simplices, tibiis ad apicem leriter incrassatis, posticis paululum incurvis 5. — Long. 1.20-1.30 mill.

Sumatra: Palembang.

Cette espèce se distingue par la brièveté de son abdomen très forte-

ment et brusquement déclive à l'extrémité, ce qui le fait paraître tronqué. — Elle appartient au Groupe IV.

Reichenbachia bengalensis n. sp. - Sat convexa, rufocastanea, pedibus antennisque rufis, istis apice (articulis tribus ultimis) infuscatis, brevissime, sat dense pubescens. Caput deplanatum, forcis tribus rolundatis, aequalibus. Antennae sat graciles, articulis 3-6 duplo, 7 vix dimidio latitudine sua longioribus, 8 minuto, quadrato, 9 fere duplo majore, 10 adhuc majore, ambobus leviter transversis, Il regulariter orato, basi vix truncato. Prothorax capite multo major, latitudine vix aequilongus, antice multo magis quam postice attenuatus, lateribus valde rotundatus, foveis lateralibus magnis, a latere distantibus, media punctiformi, profunda. Elytra vix perspicue punctulata, latitudine sua parum longiora, basi vix attenuata, humeris subquadratis, stria dorsali subintegra, sinuata et ad apicem extus recurva. Metasternum anguste, longitudinaliter depressum. Segmento primo apparente apice, medio, tuberculo subquadrato-transverso praedito, ultimo leviter impresso, punctato. Pygidium infra recurrum, disperse punctatum. Pedes simplices, tibiis ad apicem paulum incrassatis, posticis leviter incurvis of. — Long. 4.60 mill.

Inde: Bengale.

Cette espèce qui se range auprès de *R. fulva* Schauf., de Birmanie, en diffère par la forme plus courte, les antennes plus longues, plus grèles et la strie dorsale recourbée en dehors à son extrémité. — Elle appartient au Groupe VI.

Reichenbachia Grouvellei n. sp. — Sat crassa, rubrocastanea, elytris paulo dilutioribus, antennis pedibusque obscure rufis,
breviter pubescens. Caput latitudine sua longius, antice attenuatum,
lateribus obliquum, supra antennas minute nodosum, foveis inter oculos mediocribus et leviter obliquis, frontali majore. Antennae validae,
articulis cylindricis, 3-6 duplo, 7 dimidio latitudine sua longioribus,
8 minore, quadrato, 9 et 10 quadratis, valde crescentibus, 11 breviter
ovato, basi truncato. Prothorax capite paulo latior, subhexagonus, lateribus minus rotundatus, foveis lateralibus mediocribus, a latere parum
distantibus, media minutissima. Elytra latitudine sua vix longiora,
basi attenuata, lateribus obliqua, humeris notatis, stria dorsali leviter
arcuata, multo ante apicem eranescente. Metasternum altum, obsolete
sulcatum. Pedes simplices, sed validi Q. — Long. 1.80 mill.

Mexique (trouvé dans les tabacs par M. A. Grouvelle).

Voisine de R. pubescens Schauf., du même groupe et du même pays;

mais les antennes sont plus courtes, plus épaisses, dans le même sexe, le seul connu. — Elle appartient au Groupe IX.

Reichenbachia nitella n. sp. — Sat crassa, tota rufa, antennis pedibusque testaceis, sublente pubescens. Caput mediocre, latitudine sua paulo longius, antice leviter attenuatum, lateribus obliquum, supra antennas minute nodosum, fronte late nec profunde foveata, foveis inter oculos mediocribus et parum profundis. Antennae elongatue clava inconspicua, articulis cylindricis, 3-7 duplo, 8 tantummodo, paululum latitudine sua longioribus, 9et 10 leviter obconico-truncatis, latitudine paulo longioribus et leviter crescentibus, 11 mediocri, fusiformi. Prothorax subrotundatus, convexus, capite multo major, foveis lateralibus mediocribus, latera tangentibus, media sat magna, sed parum profunda. Elytra tenuissime punctulata, subquadrata, ad basin leviter attenuata, humeris notatis, stria dorsali leviter sinuata, tenui, subintegra. Metasternum planum. Segmentis ventralibus, primo apparente plano, ultimo deplanato, punctato, apice medio rotundato et utringue sinuato. Pedes validi, anticorum et intermediorum trochanteribus basi dentatis, concavis, femoribus crassioribus, tibiis intermediis apice obtuse et minutissime tuberculatis, posticis leviter incurvis of. - Long. 1.80 mill.

Sumatra: Palembang.

Cette espèce est plus grande et plus courte que *R. invalida* Reitt., de Bornéo: la pubescence est bien plus fine et plus couchée, la tête est moins longue, les antennes plus longues n'ont pas de massue tranchée, les derniers articles grossissent insensiblement et graduellement, les élytres sont moins longs. — Elle appartient au Groupe IX.

Reichenbachia boliviensis n.sp. — Obscure rubro-castanea, pedibus antennisque rufo-castaneis, vix perspicue, sublente pubescens. Caput latitudine sua longius, antice attenuatum, supra antennas subnodosum, foveis tribus aequalibus. Antennae crassae, articulis cytindricis, 3, 4, 6 dimidio, 5 duplo latitudine sua longioribus, 7 quadrato, 8 leviter transverso, 9 duobus praecedentibus aequilongo, leviter obconico-truncato, majore, 10 paulo longiore, cytindrico, subquadrato, 11 haud crassiore et rix longiore, subconico. Prothorax capite major, subcordatus, lateribus minus rotundatus, foveis lateralibus mediocribus, a latere parum distantibus, media punctiformi. Elytra subquadrata, basi attenuata, lateribus obliquis, humeris notatis, stria dorsali leviter arcuata, medium superante. Metasternum planum. Pedes validi, simplices Q. — Long. 2.00 mill.

Haute-Bolivie: Yuracaris.

La proportion des articles des antennes, dont le 5° article est bien plus long que les adjacents, fera facilement reconnaître cette espèce parmi celles du Groupe IX dont elle fait partie.

Reichenbachia pygidialis n. sp. — Brevis sat convexa, castanea, sat fortiter, sublente pubescens. Caput latitudine sua longius, antice, ante oculos, altenuatum, lateribus leviter sinuatum, supra antennas utrinque nodosum, foveis tribus aequalibus, occipite convexo. Antennae breves, articulis cylindricis, 3,4,5 vix dimidio latitudine sua longioribus, 6 fere quadrato, 7 quadrato, 8 minore, transverso, 9 majore, quadrato, 10 fere dimidio latiore, transverso, 11 breviter ovato, basi late truncato. Prothorax antice multo plus quam postice attenuatus, lateribus rotundatus, foveis lateralibus magnis, a latere distantibus, media minutissima, punctiformi. Elytra latitudine sua vix longiora basi attenuata, lateribus rotundatim obliqua, humeris notatis, stria dorsali subintegra, subrecta. Metasternum late deplanatum. Pedes mediocres et simplices.

3 Segmento ultimo ventrali transverso et leviter transversim deplanato, margine postica sinuata et obsolete carinata. Pygidium magnum, fortiter et subquadratim impressum. Antennarum articulo 3 paululum validiore. — Long. 1.40-1.60 mill.

Amérique du Nord : Missouri.

Je ne connais aucune espèce avec laquelle elle puisse être confondue, à cause de l'impression carrée, forte et assez profonde du pygidium.

Elle était dans la collection Reitter, sous le nom de *R. congener* Brend., qui appartient à un autre groupe. — Elle fait partie du Groupe IX.

Reichenbachia cicatricosa n. sp. — Oblonga, parum crassa, obscure castanea, antennis testaceis, pube dispersa, trevissima, subsquamosa, albida. Caput mediocre, ante oculos attenuatum, supra antennas leviter subnodosum, foveis tribus subaequalibus. Antennae breves, graciles, clava uniarticulata, articulis 3-6 latitudine sua paululum longioribus, 5 paulo longior, 7 quadrato. 8-10 subquadrato-transversis, 10 vix majore, 11 breviter fusiformi. Prothorax transversus, lateribus rotundatus, disco convexus, foveis lateratibus magnis, oblique transversis, a latere distantibus, media leriter oblonga. Elytra quadrata, basi paululum attenuata, humeris parum notatis, stria dorsali subrecla, subintegra. Carinulis primi segmenti dorsalis tertiam partem disci includentibus, parallelis et plus quam dimidiam attingentibus. Metasternum concavum, fundo sulcis duobus brevibus, paratletis. Pedes simplices, mediocres. — Long. 1,40 mill.

Sumatra: Palembang.

Cette espèce est très facile à distinguer par ses antennes très petites, son prothorax transversal, dont les fossettes latérales sont obliquement transversales et surtout par sa pubescence clair-semée, presque squameuse. — Elle appartient au Groupe X.

Reichenbachia muscorum n. sp. — Brevis, convexa, rufa vel rufo-castanea, sat dense, breviter griseo-pubescens. Caput elongatum, deplanatum, lateribus valde obliquum, fronte medio late impressa, foveis inter oculos maximis, subtriangularibus. Antennae mediocres, graciles, articulis cylindricis, 3-6 vix dimidio, 7 perparum latitudine sua longioribus, 8 quadrato-transverso, 9 et 10 transversis, paululum crescentibus, 11 magno, breviter ovato, basi vix truncato. Prothorax subcordatus lateribus rotundatus, foveis lateralibus magnis a latere distantibus, media sat valida, profunda. Elytra minute punctulata, basi leviter attenuata, humeris parum notatis, lateribus leviter rotundatis, stria dorsali integra et subrecta. Carinulis segmenti primi dorsalis plus quam tertiam partem disci includentibus et dimidiam superantibus. Metasternum leviter concavum. Pedes mediocres, tibiis sat gracilibus.

Segmentis rentratibus deplanatis, ultimo vir impresso, apice medio obtuse subangulato et ulrinque parum sinuato. Trochanteribus intermediis acute carinatis et obtuse angulatis, tibiis intermediis paulo ante apicem minute et acute calcaratis, posticis leviter incurvis, apice minute et acute calcaratis. — Long. 1.20-1,30 mill.

Penang (dans les mousses).

Cette espèce appartient à un groupe qui n'a de représentants qu'en Nouvelle-Guinée. La tête est plate, à côtés très obliques et la massue antennaire n'est formée que par le dernier article; sa forme est aussi plus courte et plus convexe. — Elle fait partie du Groupe XI.

Reichenbachia curvipes n. sp. — Oblonga, convexa, castanea, sat dense, breviter, griseo-pubescens. Caput validum, deplanatum, latitudine sua longius, antrorsum vix angustius, fronte late triangulatim impressa, foveis inter oculos rotundatis. Antennae graciles, clava biarticulata, articulis 3-6 tatitudine sua paulo longioribus, 7 subquadrato, 8 subquadrato, leviter transverso, 9 quadrato, 10 fere duplo majore, subovato, 11 mediocri, vix crassiore, breviter fusiformi. Prothorax latitudine sua paulo longior, cordatus, foveis lateralibus validis, a latere paulo distantibus, media mediocri. Elytra sat crebre rugosulo-punctata, basi leviter attenuata, humeris notatis, stria dorsali leviter arcuata, medium paulo superante. Carinulis segmenti primi dorsalis tertiam par-

tem disci includentibus et attingentibus. Metasternum obsolete carinatum. Segmento ultimo ventrali obsolete impresso, margine apicali medio obtuse triangulatim producta et utrinque leviter sinuata. Pedes crassi, tibiis intermediis et praesertim posticis incurvis, istis apice calcaratis 3. — Long. 4,60 mill.

Brésil: Matto Grosso.

La ponctuation des élytres la distingue des espèces avoisinantes. — Elle appartient au Groupe XVII.

Reichenbachia arabica n. sp. — Brevis, parum convexa, tota rufa, griseo-pubescens. Caput latitudine sua longius, lateribus perparum obliquum, deplanatum, fronte medio leviter producta, foveis tribus aequalibus, quarum duabus in vertice, in linea anteriore oculorum sitis, et inter se paulo magis quam a latere distantibus. Antennae breves, articulis 1 et 2 subcylindricis, 3,4,5 fere dimidio, 6 tantummodo paulo latitudine sua longioribus, 7 et 8 quadratis, 8 paulo minore, 9 paulo majore, subquadrato-rotundato, 10 latiore, transverso, 11 multo majore, ovato. Prothorax leviter transversus, medio lateribus rotundatus, foveis lateralibus rotundatis, a latere vix distantibus, media minutissima. Elytra subquadrata, basi leviter attenuata, lateribus subobliqua, humeris minute carinato-notatis, stria dorsali integra, leviter arcuata. Segmento primo dorsali subplano, carinulis mediam attingentibus. Metasternum planum, leviter impressum.

Segmento ultimo ventrali deplanato, apice bisinuato. Pedum intermediorum trochanteribus, fere medio, minute et acute angulatis, tibiis intus, paulo ante apicem, brevissime et acute calcaratis, tibiis posticis. ad apicem, incrassatis et incurvis. — Long. 1,30 mill.

Arabie méridionale : La Hadj.

Voisine de R. Chevrieri Aubé, mais bien plus courte, avec les antennes plus courtes à 10° article beaucoup moins gros, transversal et le dernier, au contraire, plus fort. Plus voisine encore de R. Edithae Reitt., antennes un peu moins épaisses, à 40° article moins fort et dernier plus gros. — Elle appartient au Groupe XVIII.

Reichenbachia irrita n. sp. — Valida, obscure rufa, sat longe, tenuiter, griseo-pubescens. Caput deplanatum, tatitudine sua longius, lateribus obliquum, fronte recte truncatum, supra antennas utrinque obsolete et subtransversim nodosum, foreis tribus, anteriore minore, caeteris in linea media oculorum sitis, validis, inter se et a latere subaequaliter distantibus. Antennarum articulis 1 et 2 cylindricis, sat elongatis, 3 obconico, duplo, 4-6 dimidio, 5 duplo, 7 tantummodo paulo, lati-

tudine sua longioribus, 5 paulo crassiore (caeteris deficientibus). Prothora r latitudine fere aequilongus, antice valde attenuatus, lateribus medio et postice rotundatus, foreis tateralibus magnis, a latere distantibus, media minuta. Elytra magna, subquadrata, basi leriter attenuata, lateribus paululum rotundata, humeris parum notatis, stria dorsali recta, medium paulo superante. Segmento primo dorsali valde transrerso, carinulis brevibus, tertiam partem disci vix attingentibus.

3 Pygidium apice productum et rotundatum. Metasternum late impressum. Segmento ultimo ventrali magno, lateribus valde obliquo, medio truncato, impressione maxima, subovata ornato. Pedum intermediorum trochanteribus medio minute et obluse dentatis, tibiis ante apicem, leviter sinuatis, apice intus, calcare valido, obliquo, compresso et summo rotundato armatis, tibiis anticis intus ante apicem sinuatis, posticis incurvis, vix incrassatis, apice minute et acute calcaratis. — Long. 1.80 mill.

## Mexique.

Cette espèce, dont les antennes sont malheureusement mutilées dans le seul exemplaire connu, est très voisine de R. estebanensis Raffray. Elle s'en distingue par le prothorax fortement atténué en avant, avec les côtés obliques, du milieu au cou et, au contraire, arrondis en arrière, et aussi les caractères sexuels, qui sont très tranchés. — Elle appartient au Groupe XX.

Reichenbachia lutcola n. sp. - Oblonga, rufo-castanea, elutris paulo dilutioribus, antennis pedibusque rufis, viv perspicue pubescens. Caput magnum, latitudine sua longius et antrorsum attenuatum, lateribus, ante oculos, leviter sinuatum, supra antennas utrinque nodosum, fronte medio deplanata, foreis duabus, inter oculos, in linea media sitis, magnis, sed parum profundis, forea frontali paulo minore. Antennae validae, elongalae, articulis 1 quadralo, 2 orato, 3 minuto et breviter obconico, 4 praecedente duplo longiore, 5 cylindrico, paulo crassiore et latitudine sua fere triplo longiore, 6 duplo, 7 dimidio latitudine sua longioribus, 8 fere quadrato, 9 majore, obconico-truncato, 10 simili, sed majore, ambobus latitudine sua maxima longioribus, 11 mediocri, orato, basi late truncato, apice acuminato. Prothorax latitudine sua longior, subovatus, foreis lateralibus mediocribus, rotundatis, latere approximatis, media minutissima. Elytra latitudine sua paulo longiora, basi attenuata, lateribus subrotundata, humeris notatis, stria dorsali leviter arcuata, medium multo superante. Segmenti primi dorsalis carinulis quartam partem disci hand superantibus. Metasternum deplanatum. Pedes simplices Q. — Long. 1.60 mill.

Mexique

La femelle seule est connue, mais cependant très distincte par ses grandes et fortes antennes, dont le 3° article est notablement plus court que le 4°, ce qui est généralement le contraire. Il se pourrait qu'en réalité cette espèce appartint à un autre groupe et que le mâle eût les antennes avec les articles intermédiaires anormaux. — Elle fait partie du Groupe XX.

Reichenbachia Chevrolati n. sp. - Subovata, antrorsum attenuata, convexa, rufo-castanea, elytris, antennisque rufis, brevissime et parce pubescens. Caput latitudine sua multo longius, deplanatum et antrorsum attenuatum, lateribus valde obliquum, fronte longe et valde deplanata et leviter declinata, inter oculos foveis duabus validis, inter se magis quam a latere distantibus. Antennae breves, articulis 2 orato, 3 obconico, 3,4,5,6 latitudine sua paulo longioribus, 3 et 5 paulo longioribus, 5 leviter crassiore, 7 quadrato, 8 subtransverso, 9 perparum majore, subquadrato-rotundato, 10 majore, leviter transverso, 11 brevissime ovato, basi truncato, apice obtuso. Prothorax latitudine sua longior. subcordatus, foreis lateralibus mediocribus, a latere parum distantibus. Elytra latitudine sua longiora, ad basin magis attenuata, lateribus obliquis, humeris parum notatis, stria dorsali medium vix attingente. Abdomen breve, segmento primo dorsali valde transverso, carinulis brevibus, quartam partem disci hand superantibus. Pedes crassi, tibiis posticis incurris, ad apicem citiatis. Metasternum obsolete sulcatum.

Segmento ultimo ventrali lateribus sinuato, medio obtuse angulato, toto longitudinaliter et late, sed parum profunde impresso. Tibiis anticis et intermediis rectis, intus, ante apicem, leviter sinuatis, trochanteribus intermediis, minutissime dentatis.

♀ Segmento ultimo ventrali obsolete foveato. — Long. 1,50 mill.

Brésil: Pernambuco.

Cette espèce appartient à un groupe exclusivement représenté dans l'Amérique centrale et surtout méridionale. Elle est beaucoup plus foncée que R. Goryi Aubé, avec les antennes bien plus courtes. Elle est plus convexe que R. rubra Aubé, avec les antennes plus épaisses. Elle ressemble davantage à R. Minassanae Schauf., mais ses antennes sont un peu plus épaisses et plus courtes, la forme est plus convexe, les élytres ont leurs côtés plus obliques. — Elle fait partie du Groupe XXI.

Reichenbachia pilosa n. sp. — L'exemplaire ⊊ que j'avais rapporté (Ann. Soc. ent. Fr. 1890, p. 312) à R. pilosella Schaufuss, me

paraît constituer définitivement une nouvelle espèce. La taille 1,60 millest beaucoup plus petite (pilosella, 2 mill.). La forme surtout est beaucoup plus grèle et allongée, tandis que les femelles sont, au contraire, généralement plus épaisses. Les antennes sont construites sur le même plan, mais considérablement plus grèles et plus allongées; les articles sont tous proportionnellement plus longs. 7 et 8 sont transversaux dans pilosella, 7 à peine plus long que large et 8 carré chez pilosa. Dans pilosella, les carinules du premier segment dersal atteignent à peine 1 4 de la longueur, chez pilosa elles dépassent 4 3. — L'espèce appartient au Groupe XXI.

Reichenbachia illepida n. sp. - Brevis, paulo convexa, tota rufo-castanea, subhirsute pubescens. Caput latitudine sua parum tongius, antrorsum perparum attenuatum, lateribus vix obliquum, sed teviter sinuatum, fronte late deplanata, inter oculos, pone medium, foreis duabus, inter se plus quam ab oculis distantibus, occipite leviter convexo. Antennae validae, sat longe pubescentes, articulis 2 oblongo-ovato, 3 obconico, 3 et 5 fere duplo, 4,6,7 dimidio latitudine sua longioribus, 8 minuto, quadrato, 9 et 10 obconico-truncatis, 9 paulo et 10 duplo majoribus, 11 breviter ovato, basi parum truncato, apice acuminato. Prothorax longitudine sua perparum latior, convexus, lateribus rotundatus, foreis lateralibus mediocribus, latere approximatis, media minuta. Elutra subtransversa, ad basin attenuata, humeris notatis, lateribus oblique subrotundatis, stria dorsali medium vix attingente. Abdomen elytvis paulo brevius, segmenti primi dorsalis carinulis tertiam partem disci attingentibus. Metasternum late, parum profunde sulcatum. Tibiis anticis et intermediis rectis, posticis incurvis et leviter incrassatis.

Brésil: Amazones, Matto Grosso,

Cette espèce diffère des précédentes par sa tête et son prothorax plus courts, la première à peine plus étroite en avant, à côtés légèrement sinueux. — Elle appartient au Groupe XXI.

Reichenbachia fasciculata n. sp. — Oblonga, sat convexa, rufo-castanea, antennis pedibusque rufis, sat dense, breviter pubescens. Caput latitudine sua longius, antrorsum attenuatum, lateribus obliquum, supra antennas utrinque leviter nodosum, fronte depressa, fovea frontali obsoleta. Antennae elongatae, graviles, articulis cylindricis, 2-6 triplo,

7-10 vix duplo latitudine sua longioribus, 9 et 10 leviter obconicis, crescentibus, 11 subcylindrico, apice acuminato. Prothorax breviter ovatus, foveis lateralibus mediocribus, latera tangentibus, media minuta, obsoleta. Elytra tenuissime punctata, latitudine sua longiora, ad basin leviter attenuata, humeris obliquis, notatis, basi bifoveata, stria dorsali leviter arcuata, ante apicem abbreviata. Abdomen elytris brevius, segmenti primi dorsalis carinulis divergentibus, tertiam partem disci includentibus et attingentibus. Metasternum convexum et late nec profunde sulcatum.

7 Pygidium magnum et gibbosum, punctatum, segmentis ventralibus, primo apparente apice transversim obsolete impresso, ultimo transversim carinato et apice rugoso-punctulato. Pedum intermediorum trochanteribus dente magno, compresso, triangulari, acuto munitis, tibiis apice intus acute calcaratis, femoribus omnibus crassis, posticis intus medio dentatis et longe fasciculatis, tibiis posticis sat gracilibus, leviter incurvis et medio intus obsolete angulatis. — Long. 4.90 mill.

Sumatra: Palembang.

La gracilité et la longueur des antennes, ainsi que l'armature des cuisses postérieures la feront facilement reconnaître. — Elle fait partie du Groupe XXXI.

Reichenbachia compressipes n. sp. — Tota castanea, breviter pubescens. Caput deplanatum, latitudine sua paulo longius, antrorsum leviter attenuatum, lateribus obliquum, foveis tribus aequalibus, duabus in linea posteriore oculorum sitis, inter se et ab oculis aequaliter distantibus. Antennae validae, articulis duobus primis cylindricis, 3 fere triplo, 4, 6, 7 dimidio, 5 duplo latitudine sua longioribus, 8 fere quadrato, 9 obconico, latitudine sua longiore, 10 quadrato, ambobus paulo crescentibus, 11 magno, suborato, leviter obliquo. Pro-



Fig. 60.

thorax breviter oratus, convexus, foveis lateralibus validis, leviter ovatis, latera tangentibus, media minuta. Elytra quadrata, basi leviter attenuata, humeris notatis, lateribus leviter rotundatis, basi trifoveata, stria dorsali integra, leviter sinuata. Segmenti primi dorsalis carinulis plus quam tertium partem disci includentibus et fere dimidiam attingentibus. Metasternum vix sulcatum. Segmento ultimo ventrati lateribus sinuato, medio rotundatim producto, maxime impresso. Pedum anticorum femoribus, infra, longitudinaliter sulcatis et cultratis, tibiis, intus, medio angulato-

ampliatis, intermediorum trochanteribus basi et apice obtuse dentatis, medio incurvis, tibiis crassis extus leviter rotundatis, intus, apice oblique emarginatis, dense ciliatis, posticorum media parte basali inferiore late emarginata, tibiis compressis, extus ante medium obtuse angulatis, intus basi bisinuatis et, ante medium, abrupte ampliatis et angulatis, dein ad apicem obliquis, ad apicem ciliatis. — Long. 2 mill. — Fig. 60 (Tibias antérieur et postérieur).

Sumatra nord.

La forme étrange des pieds la fera facilement reconnaître. — Elle appartient au Groupe XXXII.

Reichenbachia orientalis n. sp. Oblonga, parum vonvexa, rufa, subtiliter, brevissime pubescens. Caput latitudine sua paulo longius, antrorsum vix attenuatum, lateribus subparallelum, foreis tribus validis aequalibus. Antennae crassae, articulis 3, 4 vix, 5, 6 fere duplo latitudine sua longioribus, 7 quadrato, caeteris in utroque sexu diversis. Prothorax subovatus, latitudine sua longior, foveis lateralibus validis, latera tangentibus, media minuta. Elytra subquadrata, ad basin leviter attenuata, humeris notatis, lateribus leviter obliquis, basi trifoveata, stria dorsali fere integra, incurva et in angulo suturali desinente. Segmenti primi dorsalis carinulis paululum divergentibus, vix tertiam partem disci includentibus et allingentibus. Metasternum leviter sulcatum. Pedes validi.

Antennae validiores, articulis 8 leviter transverso, 9, 10 valde transversis, 10 paulo majore, istis tribus, intus, leviter acuminatis, 11 maximo, elongato, extus rolundato, intus valde sinuato, infra sinuatim depresso, parte media basali punctata, medio sulco transverso obsoleto definita. Segmentis ventralibus medio deplanatis, femoribus, praesertim intermediis, crassioribus. Pedum intermediorum trochanteribus medio longe, valide et acute dentatis, tibiis intus, multo ante apicem, calcare obliquo valido, longo, acuto praeditis, posticorum tibiis subrectis, supra, ante apicem, leviter sinuatis, tarsorum articulo 2 crassiore, clavato. — Fig. 62.



Fig. 62.

⊋ Antennae breviores, articulis 8, 9 quadratis, 10 paulo majore, leviter transverso, 11 magno, suboblique ovato, evtus magis rotundato, basi truncato, apice acuminato. — Long. 4.60-1.80 mill.

Kurdistan, Mésopotamie, Arabie: Hedjaz.

Cette espèce est évidemment voisine de R. Akinini Reitter, mais

la forme des derniers articles des antennes est très différente. Elle ressemble davantage à R. truncaticornis Raffray, mais le dernier article des antennes est beaucoup plus long et tout autrement échancré; la dilatation du  $2^{\circ}$  article des tarses postérieurs, qui est fortement en massue, est très curieuse. — Elle appartient au Groupe XXXIII.

Reichenbachia maroccana n. sp. — Oblonga, parum convexa, rufo-castanea, antennis pedibusque rufis, breviter, disperse pubescens. Caput latitudine sua vix longius, antrorsum paululum attenuatum, fronte late deplanata et anterius medio leriter producta, foveis tribus magnis aequalibus. Antennae breves, articulis 3-6 vix dimidio latitudine sua longioribus, caeteris in utroque sexu diversis. Prothorax latitudine aequilongus, antice valde et postice paululum attenuatus, lateribus medio rotundatus, foveis lateralibus validis, a latere distantibus, media minutissima. Elytra latitudine sua longiora, basi



parum attenuata, humeris obliquis, parum notatis, basi trifoveata, stria dorsali leviter incurva, subintegra. Segmenti primi dorsalis carinulis divergentibus, tertiam partem disci includentibus et attingentibus. Tibiis posticis leviter incurvis.

Antennae multo crassiores, articulis 7 quadrato, intus leviter producto, 8 transverso et intus leviter producto, 9 tenticulari, 10 tenticulari, praecedente duplo latiore, 11 magno, ovato, basi late truncato et intus oblique emarginato, apice acuminato. Metasternum totum concavum. Segmentis ventralibus deplanatis. Pedum intermediorum trochanteribus basi minutissime dentatis, tibiis intus ad apicem calcare valido, cylindrico, apice obtuso,

oblique sito armatis. — Fig. 61.

Q Antennae multo graciliores, articulis 7, 8 quadratis, 8 paululum minore, 9, 10 paulo crescentibus, leviter transcersis, 11 magno, irregulariter ovato, intus leviter obliquo, basi truncato. Metasternum obsolete sulcatum. — Long. 4.70 mill.

Maroc.

Cette espèce n'est pas sans analogie avec *R. clavala* Peyron, mais les antennes et l'éperon anté-apical des tibias intermédiaires l'en différencient suffisamment. — Elle appartient au Groupe XXXIV.

**Reichenbachia grenadensis** n. sp. — Crassa, valde convexa, castanea, elytris, antennis pedibusque rufescentibus, longe et sat dense fulvo-hirta. Caput latitudine sua paululum longius et antrorsum

leriter attenuatum, lateribus paululum sinuatis, supra antennas leriter utrinque nodosum, foveis tribus profundis, aequalibus. Antennae crussae, articulis 1 cylindrico, 2 ovato-quadrato, 3 et 4 breviter obconicis, 5 et 6 cylindricis, 5 dimidio et 6 tantummodo paulo latitudine sua longioribus, 7-9 transversis, latitudine perparum crescentibus, caeteris

in utroque sexu diversis. Prothorax latitudine aequilongus, breviter ovatus, foveis lateralibus magnis, latera tangentibus, media minuta. Elytra subquadrata, basi bifoveata, stria dorsali brevi, medium haud attingente. Segmenti primi dorsalis carinulis brevissimis, tertiam partem disci fere includentibus. Tibiis posticis leviter incurvis.

Antennarum articulis 7-9 magis transversis, 10 maximo, latiore, latitudine sua longiore, leviler obconico, 11 longiore, sed multo angustiore, oblongo, basi truncato, apice acuminato. Metasternum concavum. Segmento ultimo ventrali leviter impresso. Pedum intermediorum trochanteribus basi spina recta armatis, tibiis rectis, calcare fere apicati, obliquo, valido, acuto praeditis. — Fig. 63.






Fig. 63.

Antilles : Grenada.

Par la forme de ses antennes, cette espèce est voisine de R. Lebasi Aubé, mais le 10° article est bien plus gros et le 44° proportionnellement plus étroit et plus long. — Elle appartient au Groupe XXXV.

Reichenbachia vincentiana n. sp. — Cette espèce est tellement voisine de la précédente qu'elle pourrait être prise pour sa femelle, si je ne possédais les deux sexes de chacune d'elles. La forme est moins courte et plus ovale. Chez le mâle, l'article 7 des antennes est à peine transversal, 8 et 9 sont moins transversaux que chez grenadensis, 10 est gros, mais carré, avec le côté interne arrondi, 11 un peu plus étroit et régulièrement ovale. Chez la femelle, les articles 7-9 sont transversaux, 10 est presque deux fois plus long que 9 et seulement un peu plus large, par suite moins transversal, 11 est assez brièvement ovoïde.

Antilles : St-Vincent.

Elle appartient au Groupe XXXV.

**Reichenbachia cultrata** n. sp. — Castanea, elytris dilutioribus, pedibus et antennis rufis, istarum articulis tribus ultimis infuscatis, rugosis et longius albido-ciliatis, breviter sat dense fulvo-pubescens. Caput mediocre, elongatum, antrorsum vix attenuatum, lateribus leviter



Fig. 64.

sinuatum, foveis tribus profundis, aequalibus. Antennae elongatae, articulis cylindricis, 2 suborato, 3-7 latitudine sua duplo longioribus, 8 quadrato, 9 paulo majore, transverso, 10 maximo, irregulari, latitudine sua longiore, intus leviter rotundato, extus perparum sinuato, supra convexo, infra fere toto excavato et intus dentato, 11 ovato, basi truncato, apice acuminato, media basi excavato. Prothorax obsolete punctulatus, capite fere duplo et longitudine sua paulo latior, lateribus medio rotundatus, antice valde attenuatus, foveis lateralibus validis a latere distantibus, media minuta. Elytra subquadrata, basi parum attenuata, humeris notatis, stria dorsali integra, bisinuata et procul ab angulo

suturali desinente. Primi segmenti dorsalis carinulis leviter divergentibus, vix tertiam partem disci attingentibus et plus quam tertiam includentibus. Metasternum altum, lateribus angulatim, obtuse dentatum, leviter sulcalum. Segmento ultimo ventrali obsolete impresso et basi tuberculato. Pedum anteriorum trochanteribus medio tuberculatis, femoribus parum incrassatis, tibiis rectis, intermediorum trochanteribus acute et minute tuberculatis, femoribus crassioribus, tibiis rectis, calcare anteapicali longo, compresso, sinuato armatis, posteriorum femoribus incrassatis, tibiis gracilibus, leviter incurvis S. — Long. 4,60 mill. — Fig. 64.

Sumatra: Palembang.


La forme des antennes suffit pour la faire facilement reconnaître. Dans la figure 64, l'antenne entière est figurée en dessus et les derniers articles seulement vus en dessous. — Cette espèce appartient au Groupe XXXVI.

Reichenbachia falsa n. sp. — Oblonga, tota rufa, tenuissime punctulata, brevissime pubescens. Caput latitudine sua vix longius, antrorsum haud attenuatum, supra antennas elevatum et fronte media late, haud profunde impressum, impressione frontali absque fovea, foreis inter oculos latis, sed obsoletis. Antennarum clava inconspicua, articulis 1 cylindrico, 2 ovato, 3 obconico, 4 quadrato, 5 maximo, ovato, supra convexo et punctato, infra irregulariter triimpresso, 6 et 8 transversis, 7 quadrato, 9 et 10 latitudine sua longioribus, leviter crescentibus et obconicis, 11 oblongo, basi truncato, Prothorax cordatus,

foveis lateralibus magnis, latere approximatis, media minuta. Elytra quadrato-elongata, basi vix attenuata, humeris notatis, basi trifoveata, stria dorsali perparum arcuata, medium superante. Segmenti primi dorsalis carinulis divergentibus, tenuissimis, quartam partem disci includentibus et attingentibus. Metasterno et segmento ultimo ventrali deplanatis. Pedes simplices, femoribus intermediis crassioribus 3.—Long. 4.90 mill.— Fig. 67.

Yucatan.

Favais déjà indiqué (Ann. Soc. ent. Fr. 1890, p. 312) que cette espèce, qui fait partie du Groupe XL, devait être séparée de R. sarcinaria Schaufuss. Il y a trois espèces très voisines les unes des autres, dont je figure l'antenne, ce qui permettra de les reconnaître plus facilement. L'antenne entière est vue en dessus et les articles intermédiaires seulement vus en dessous.



Antennes de Reichenbachia sarcinaria Schauf, (fig. 65), R. callosa Raffr. (fig. 66), R. falsa (fig. 67).

Reichendachia glodulosa n. sp. — Obscure rufa, antennis pedibusque rufis, brevissime pubescens. Caput elongatum, antrorsum attenuatum, lateribus sinuatum, foveis tribus aequalibus, parum profundis. Antennae validae, clava inconspicua, articulis 1 cylindrico, 2 ovato, 3 breviter conico, 4 leviter transverso, 5 magno, extus recto, intus obtuse dilatato, supra convexo, infra gibboso, 6 et 7 cylindricis, 7 paulo longiore, 8 quadrato, istis tribus intus leviter serratis, 9 et 10 subquadratis, leviter crescentibus, 11 oblongo, basi truncato, apice acuminato. Prothorax tenuiter punctulatus, cordatus, latitudine sua longior, foveis lateralibus minutis, latera fere tangentibus, media paulo minore. Elytra latitudine sua longiora, ad basin attenuata, lateribus



obliquis, humeris notatis, basi bifoveata, stria dorsali leviter arcuata, medium multo superante. Segmenti primi dorsalis carinulis brevissimis, tertiam partem disci includentibus. Metasternum totum concavum, lateribus rotundatim et obtuse subcarinatum. Segmentis ventralibus vix depressis. Pedes simplices, femoribus intermediis paulo crassioribus, tibiis posticis leviter incurvis  $\circlearrowleft$ .—Long. 4,90 mill.— Fig. 68.

Brésil.

Fig. 68.

Voisine de la précédente, en diffère par la forme du 5° article des antennes. — Elle appartient au groupe XL.

Reichenbachia chiricahuensis n. sp. — Totarufo-castanea, brevissime et sublente pubescens. Caput antrorsum leviter attenuatum, aequaliter et mediocriter trifoveatum. Antennarum articulis 1 culindrico, 2 subquadrato-elongato, 3 obconico, 4 subtransverso, 5 magno, breviter ovato, supra convero, infra late, rotundatim impresso, 6 multo minore, quadrato, infra verrucoso, 7 et 8 minoribus, leviter transversis, intus minute serratis, 9 paulo majore, subquadrato, 10 simili sed majore, 11 orato, extus magis rotundato, basi late truncato, apice acuminato. Prothorax latitudine aequilongus, antice plus quam postice attenuatus, lateribus medio parum rotundatus, foveis lateralibus media hand multo majoribus. Elytra latitudine aequilonga, basi leviter attenuata, humeris notatis, stria dorsali arcuata, ante apicem abbreviata, margine postica hand sinuata. Segmenti primi dorsalis carinulis tertiam partem disci vix includentibus et allingentibus. Metasternum late impressum. Segmento ultimo ventrali vix impresso. Tibiis intermediis apice obtuse et minute calcaratis. - Long. 1,90 mill.

Amérique septentrionale : Arizona M¹s Chiricahua.

Je ne connais qu'un mâle de cette espèce, qui m'avait été envoyé par le Rév. J. Schmitt sous le nom de R. tumida Lec., ce qui est évidemment une erreur. R. tumida n'a pas de fossette frontale, les articles 5 et 6 des antennes sont à peu près égaux entre eux, plus longs que larges; c'est le 6 et non le 5 qui est impressionné, en dessous, le 5 est simple. Cette nouvelle espèce est très voisine de R. Wickhami Brend., avec laquelle il serait très facile de la confondre: le 5 article est plus régulièrement ovale et moins élargi, moins triangulaire, il est fortement impressionné circulairement en dessous, tandis que chez Wickhami ce mème article en dessous est plat, un peu verruqueux,

avec un tubercule court, tronqué circulairement. — Elle appartient au groupe XLI.

Reichenbachia mexicana n. sp. — Oblonya, castanca, elytris paulo dilutioribus, antennis pedibusque rufis, brevissime pubes-

cens. Caput latitudine sua longius, antrorsum attenuatum, lateribus medio leviter rotundatum et ante oculos
paululum sinuatim deplanatum, foreis tribus mediocribus
sed profundis, occipite medio leviter gibboso. Antennarum
articulis 1 cylindrico. 2 subquadrato, 3 et 4 minoribus,
transversis, 5 et 6 magnis, irregularibus, nodum magnum
irregulariter ovatum una formantibus, 5 oblique subpyriformi, angulo interno producto, 6 transverso, intus
producto, ambobus infra excavatis, 7 subquadrato, intus
leviter producto, 8-10 paululum obconicis et latitudine
sua perparum longioribus, valde crescentibus, 11 ovato,
basi late truncato. Prothorax ovatus, foreis lateralibus
maximis, latera tangentibus, media minutissima. Elytra
subquadrata, basi parum attenuata, humeris subquadra-



Fig. 69.

tis, notatis. Segmenti primi dorsalis carinulis brevissimis, tertiam partem disci includentibus. Metasternum obsolete impressum. Segmento ultimo ventrali vix impresso. Pedes simplices 3. -- Long. 1.80 mill. -- Fig. 69.

Mexique.

Cette espèce appartient au groupe XLI.

Reichenbachia Oberthüri n. sp. — Oblonga, rufa, vix perspicue pubescens. Caput subquadratum, subplanum, vertice attamen medio leviter convexo, anterius, ante oculos, leviter sinuato-angustatum, fovea frontali minuta, in margine frontali sita, inter oculos foveis duabus mediocribus, inter se multo magis quam ab oculis distantibus. Antennae in utroque sexu diversae. Prothorax breviter oratus, foveis lateralibus minutis, latere approximatis, media vix conspicua. Elytra quadrata, basi attenuata, lateribus obliquis, humeris quadratis, parum notatis, basi trifoveata, stria dorsali fere recta, medium superante. Segmenti primi dorsalis carinulis brevissimis, paulo minus quam tertiam partem disci includentibus. Metasternum impressum. Pedes simplices, tibiis posticis gracilibus, vix incurvis.

Antennae validae, crassae, articulis 1 et 2 cylindricis, 3 obconico, latitudine sua longiore, 4 subquadrato-rotundato, 5 duplo majore, circulari, supra leviter convexo, infra gibboso, 6 magno, oblongo-ovato,

supra convexo, infra depresso et granuloso, 7 et 8 quadratis, 9 et 10 latitudine sua paulo longioribus, 9 cylindrico, 10 parum majore et subobconico, 11 oblongo-ovalo, leviter sinuato, basi truncato, apice subobtuso. Segmentis ventralibus vix deplanatis. Pedum intermediorum coxis, intus, retrorsum, longe triangulatim et acute productis, tibiis calcare apicali obliquo, acuto munitis.

♀ Antennae multo graciliores, articulis cylindricis, 4-7 paululum, 5 duplo, 6 triplo latitudine sua longioribus, 8 quadrato, 9 et 10 paululum crescentibus et latitudine sua perparum longioribus, 11 ovato, vir sinuato. — Long. 1,60 mill.

Nouvelle-Grenade: Honda.

Cetté espèce est voisine de R. Reichei Schauf. Elle en diffère beaucoup par la forme de ses antennes qui rappellent davantage celles des R. falsa et sarcinaria. Je la dédie à M. R. Oberthür, de qui je la tiens. — Elle appartient au groupe LII.

Reichenbachia appendiculata n. sp. — Oblonga, obscure ferruginea, elytris rubris, antennis pedibusque rußs, brevissime et parce pubescens. Caput quadratum, leviter convexum, fronte anterius abrupte truncatum, valde declive, fovca frontali transversa, in declivi




Fig. 70.

parte sita, inter oculos foveis duabus rotundatis. Antennarum supra visarum articulis 1 cylindrico, 2 quadrato, 3 breviter obconico, 4 transverso, 5 oblongo, reniformi, gibboso, 6 oblongo, deplanato, 7 et 8 quadratis, 9 subquadrato, leviter majore, 10 adhuc majore, subquadrato-elongato, 11 ovato, basi truncato: lateraliter visarum articulis 4 infra acuto et ciliato, 5 et 6 angulatim connexis, infra ciliatis et latere interno impressis, 5 obliquo, infra medio valde emarginato et longe et acute appendiculato, 6 infra, basi oblique emarginato, medio quadratim ampliato, biappendiculato, appendiculo inferiore longissimo, leviter angulato, apice abrupte clavato, superiore acuto, breviore, 7-10 infra pro-

ductis et ciliatis, 11 infra leviter sinuato. Prothorax valde cordatus, foveis lateralibus mugnis, leviter transversis et latere approximatis, media minutissima. Elytra latitudine sua longiora, ad basin attenuata, lateribus obliquis, humeris valde notatis, basi biforeata, stria dorsali incurra et medium multo superante. Segmenti primi dorsalis carinulis divergentibus, tertiam partem disci includentibus et attingentibus. Metasterno et segmento ultimo ventrali leviter impresso. Pedes simpli-

ces, trochanteribus intermediis basi leriter spinosis 5. — Long. 1,80 mill. — Fig. 70.

Mexique.

Par son front tronqué abruptement et portant la fossette antérieure sur la partie déclive, cette espèce fait le passage aux groupes suivants, où la fossette frontale disparaît complètement. — Elle appartient au groupe LII.

Reichenbachia obnubita n. sp. — Oblonga, sat convera, rufo-castanea, antennis pedibusque rufis, sat dense pubescens. Caput anterius obsolete punctulatum, latitudine sua paulo longius, luteribus leviter sinuatum, fronte anterius rotundatim truncatum, totum deplanatum, utrinque oblonge et obsolete impressum, lateribus leviter elevatum, forea frontali deficiente, inter oculos foreis duabus rotundatis, occipite transversim leviter convexo. Antennae crassae, articulis 1 et 2 quadratis, 3 obconico, caeteris cylindricis, 3, 4, 6 paululum, 5 duplo latitudine sua longioribus, isto paulo crassiore, 7 et 8 quadratis, 9 quarto simili, sed paululum crassiore, 10 subsimili, sed paulo majore et perparum obconico, 11 orato. Prothorax longitudine sua paulo latior, lateribus medio rotundatus, foveis lateralibus magnis, latere approximatis, media minutissima. Elytra latitudine sua longiora, basi attenuata, lateribus obliquis, humeris notatis, basi triforeata, stria dorsali leriter arcuata, medium superante. Segmenti primi dorsalis carinulis tenuibus, divergentibus, quintam partem disci includentibus et tertiam attingentibus. Metasternum deplanatum. Pedes validi, simplices, tibiis intermediis extus, medio, leviter crassioribus, posticis ad apicem crassioribus et incurris 2. - Long. 1,60-4,80 mill.

Yucatan.

Deux exemplaires de cette espèce figuraient dans la collection Reiche, seus le nom de *R. pubescens* Schaufuss, et portaient même une étiquette de ce nom, de la main de Schaufuss; mais ils n'ont rien de commun avec le vrai *pubescens* dont je possède un type authentique provenant de la collection Schaufuss et qui correspond d'ailleurs à la description de cet auteur. — Elle appartient au groupe LIV.

Reichenbachia immodica n. sp. — Très voisine de la précédente. Tête semblable, mais plus courte, carrée, non atténuée en avant. Antennes bien plus grêles, articles 3, 4, 6 de moitié et 5 trois fois plus longs que larges, chez le mâle. Chez la femelle les articles 5 et 6 sont chacun deux fois plus longs que larges. Le prothorax est moins large, moins arrondi sur les côtés, au milieu, et les fossettes latérales sont beaucoup plus petites. Les carinules du premier segment dorsal sont parallèles, écartées de 1 4 de la largeur et à peine plus longues que cette dimension.

Colombie.

Cette espèce avait été considérée par Reitter, dans sa collection, comme R. rubra Aubé, dont elle est très différente. Elle est voisine de R. Stussineri Reitter, mais, chez celle-ci, les articles 7, 8, 9, 10 des antennes sont un peu proéminents et denticulés en dedans, les carinules du premier segment dorsal sont distantes de plus de 1 3 de la largeur. — Elle appartient au groupe LIV.

### Phoberus n. gen.

Crassus et brevis, antrorsum angustior. Caput quadratum, infra tricarinatum, supra irregulare. Antennae in mare irregulares. Palpi mediocres, articulis 2 recto, apice clavato, 3 brevissime obconico, 4 regulariter fusiformi, basi haud truncato. Prothorax subhexagonus, antice plus attenuatus, postice lateribus leviter sinuatus et medio rotundatus, foveis lateralibus deficientibus, media minuta. Elytra magna, quadrata, basi trifoveata, stria dorsali deficiente. Abdomen breve. Coxae intermediae subcontiguae, posticae valde distantes.

Ce genre diffère de *Brachygluta* et de *Reichenbachia*, par les palpes plus petits, à 3° article conique et 4° régulièrement fusiforme.

**Phoberus armatus** n. sp. — Obscure castaneus, elytris rubris, in femina magis castaneis, antennis pedibusque rufo-castaneis, sat longe,



Fig. 71.

tenuiter et disperse pubescens. Caput antice, fronte, quadratim excavatum, utrinque lateribus leviter porrectum, vertice excaratum, medio dentatum, inter oculos foveis duabus, totum longitudinaliter sulcatum, infra fovea palpali praedita. Antennae validae, articulis 1 et 2 cylindricis, 3 obconico, 4-8 cylindricis, 3-7 latitudine sua longioribus et longitudine paulo decrescentibus, 8 quadrato, 9 et 10 transversis, 11 ovato, basi truncato. Prothorax capite latior, latitudine sua paulo latior, lateribus ante medium obliquis et postice leviter sinuatis, pone medium rotundatus. Elytra basi attenuata, lateribus rotundata. Seg-

menti primi dorsalis carinulis divergentibus, tertiam partem disci attingentibus et minus quam tertiam includentibus. Pedes simplices.

- O Capitis cava frontali maxima, lateribus antrorsum magis productis, in medio cavae carinula longitudinali setosa, epistomate producto et cornu truncato armato, vertice anterius et lateraliter punctato, anterius, medio, multo magis acute dentato, infra carinis lateralibus prominentibus et cultratis, sinuatis, fovea palpali maxima et profunda. Antennarum articulis 2 majore, apice intus dentato, 9 multo majore, obliquo, angulo apicali interno producto. Elytra latitudine sua longiora, humeris valde notatis. Metasternum leviter concarum. Segmento ultimo ventrali basi transversim impresso et toto transversim et arcuatim carinato. Fig. 71.
- Q Capitis cava frontali multo minore, simplici, epistomate leviter producto, simplici, vertice medio obtuse dentato, lateribus leviter prominulis sed deplanatis, infra carinis lateralibus obtusis, forea palpali mediocri. Elytra latitudine sua hand longiora, basi magis attenuata, humeris fere nullis. Metasternum convexum. Long. 2 mill.

Haute Bolivie: Yuracaris.

### Eremomus n. gen.

Crassus, brevis, antice valde attenuatus. Caput latitudine sua longius, trifoveatum. Palpi breves, crassi, articulis 2 apice sat abrupte incrassato, 3 intus triangulari, extus valde globoso, 4 breviter ovato, crasso, basi truncato. Oculi pone medium siti. Antennae crassae. Prothorax cordatus, foreis tribus, quarum lateralibus majoribus, media mediocri. Elytra brevia, subtriangularia, basi bifoveata, stria dorsali nulla. Abdomen plus minusve breve, segmento primo dorsali plus minusve majore. Coxae intermediae approximatae, posticae minus distantes. Metasternum minus magnum et quadratum. Pedes simplices.

Ce genre qui se rapprocherait davantage de *Brachygluta* et de *Reichenbachia* par ses palpes qui sont cependant plus courts, avec le dernier article plus épais, s'en éloigne surtout par son facies. Les élytres sont courts, triangulaires, tout à fait sans épaules, les hanches postérieures moins distantes, et le métasternum par suite, moins grand et carré.

Leemomus obesus n. sp. — Brevis, totus cinnamomeus, sat longe et dense fulvo-pubescens. Caput deplanatum, latitudine sua mullo longius, lateribus obtiquis, antice subrotundatum, foveis tribus aequalibus, validis. Antennae validae, articulis 1 et 2 cylindricis, 3 obconico, 4-7 cylindricis, 3-6 fere triplo, 7 dimidio latitudine sua longio-Ann. Soc. Ent. Fr., IXXIII [1904].




Fig. 72.

ribus, 8 quadrato, 9 et 10 subquadratis, 9 praecedente dimidio, 10 triplo majoribus, 11 magno, ovato, basi late truncato. Prothorax cordatus, convexus, foveis lateralibus mediocribus, media paulo minore. Elytra longitudine sua breviora, basi maxime attenuata, lateribus valde obliquis, humeris nullis. Abdomen elytris vix longius, segmento primo dorsali sequente paulo majore, valde transverso, carinulis duabus obsoletis, mediam partem disci multo superantibus et plus quam tertiam includentibus. Pedes sat elongati, simplices \( \varphi \). — Long. 2,30 mill. — Fig. 72.

Haute-Bolivie: Yuracaris.

Eremonus crassicornis n. sp. — Magis ovatus, ferrugineus, sat longe pubescens. Caput deplanatum, latitudine sua paulo longius, antrorsum attenuatum. lateribus sinuatum, foceis tribus aequalibus. Antennae crassae, articulis 1 et 2 breviter cytindricis, 3 obconico, 4 et 3 ovatis, latitudine sua vix longioribus, 6-8 longitudine decrescentibus, magis ac magis transversis, 9 paulo majore, transverso. 10 multo majore, transverso, 11 breviter ovato, basi truncato. Prothorax cordatus, convexus, foveis lateralibus paulo majoribus. Elytra latitudine sua vix breviora, basi paulo minus attenuata, lateribus valde obliquis, humeris nullis. Segmento primo dorsali sequente multo majore, minus transverso, cavinulis duabus obsoletis, brevibus, plus quam tertiam partem disci includentibus. Pedes validi, minus elongati, simplices \( \varphi \). — Long. 2 mill.

Para: Bragance.

Anasis impunctata n. sp. — Brevis, parum crassa, tota rufocastanea, polita, nitida, glabra. Caput mediocre, antrovsum attenuatum, lateribus obliquis, foveis tribus latis, parum profundis, quarum frontali paulo minore. Oculi magni. Palporum articulo ultimo valido, basi extus ampliato, leviter sinuato, apice acuto. Antennarum articulis 1 et 2 paulo crassioribus, 3 leviter obconico et praecedente longiore, 4 et 6 dimidio, 5 duplo, 7 tantummodo paululum latitudine sua longioribus, 8, 9 et 10 quadratis, 9 et 10 paululum majoribus, 11 magno, oblongo-ovato, acuminato. Prothorax capite major, subcordatus, absque foveis. Elytra quadrata, basi bifoveata, stria dorsali integra, arcuata, fere in angulum suturalem desinente. Abdomen elytris brevius, segmento primo dorsali magno, varinulis duabus tennissimis, plus quam tertiam partem disci includentibus et tertiam attingentibus. Metasternum deplanatum et obsolete sulcatum. Segmento ultimo ventrali transversim, valde profundeque, ad apicem impresso, Trochanteribus intermediis medio angulatis et breviter spinosis S.— Long. 1,40 mill.

Sumatra: Palembang.

Cette espèce diffère de A. laccicollis Raffray, de Manille, par les antennes plus longues, avec l'article 40 beaucoup moins gros et le prothorax plus fort et plus cordiforme; de A. singhalensis Raffr., par la tête moins longue, le dernier article des antennes plus gros, le prothorax plus cordiforme, l'absence de toute pubescence, les carinules abdominales très fines à peine distinctes et non divergentes.

### Anasopsis n. gen.

Ce nouveau genre est très voisin d'Anasis. Il en diffère par la forme du corps beaucoup plus allongée, plus parallèle, par la présence de trois grandes fossettes libres au prothorax et la forme des palpes : dans

Anasis, le dernier article est simplement un peu renflé extérieurement à la base, très légèrement sinueux en dehors, mais régulièrement coniforme vers le sommet; dans Anasopsis le 3º article des palpes est gros, fortement convexe en dehors, le 4º est allongé, avec un nœud très distinct extérieurement à la base; ce nœud est régulièrement convexe en dessus et légèrement sillonné en dessous; de là à l'extrémité, l'article est convexe en dedans et concave en dehors, ce qui le fait paraître très sinueux. — Fig. 73.



Fig. 73.

Il comprend deux espèces, An. Savesi Raffr., de Nouvelle-Calédonie et adumbrata Raffr., des lles Loyalty, toutes les deux décrites comme Anasis.

Mon ami M. A. Fauvel (Rev. d'Ent. 1903, pp. 281 et 282), vient de décrire deux autres espèces d'Anasis de Nouvelle-Calédonie qui devront très probablement rentrer dans le genre Anasopsis.

### Tableau du genre Rybaxis

A 2. Sillon transversal du prothorax toujours très marqué et assez profond.

B 2. Deux fossettes seulement à la base des élytres.		
C. 3. Fossette médiane du prothorax aussi grande que	Channa	T
les latérales, spongieuse	Groupe	I.
coup plus petite que les latérales, jamais		
spongieuse, mais cependant très marquée	Groupe	11.
C. 1. Fossette médiane du prothorax extrêmement	Groupe	11.
petite, très souvent invisible au fond du		
sillon, parfois même manquant entièrement.		
D 3. Premier segment dorsal avec une simple dépres-		
sion, entre les carinules basales.		
E 4. Carinules basales du premier segment dorsal		
renfermant 1/6 de la largeur du disque.		
F 3. Carinules basales du premier segment dorsal at-		
teignant seulement 4-5 de la longueur du disque.	Groupe	Ш.
F 2. Carinules atteignant 1/3 de la longueur	Groupe	IV.
F 4. Carinules atteignant 1/2 de la longueur	Groupe	V.
E 3. Carinules renfermant 4/5 de la largeur du dis-		
que et égalant 4/5 de sa longueur	Groupe	VI.
E 2. Carinules renfermant 4/4 de la largeur du disque		
du premier segment dorsal.	~	****
F <sup>1</sup> 3. Carinules atteignant 1,5 de la longueur	Groupe	VII.
F <sup>1</sup> 2. Carinules atteignant 1/4 de la longueur	Groupe	VIII.
F <sup>1</sup> 4. Carinules atteignant 1/3 de la longueur	Groupe	1X.
E 4. Carinules de la base du premier segment dorsal		
renfermant 4 3 de la largeur du disque. F <sup>2</sup> 3. Carinules atteignant 4 4 de la longueur	Groupe	X.
F <sup>2</sup> 2. Carinules atteignant 1/3 de la longueur	Groupe	XI.
F <sup>2</sup> 1. Carinules atteignant 1/2 de la longueur	Groupe	XII.
D 2. Premier segment dorsal sans carinules à sa	aroupe	
base, ayant seulement, au milieu, une fossette		
ronde, pubescente	Groupe	XIII
D 1. Premier segment dorsal avec deux carinules peu	Cit Miles	
visibles et, entre elles, deux fossettes rondes,		
pubescentes	Groupe	XIV.
B 1. Élytres avec quatre fossettes à la base; forme		
plus allongée, aplatie et parallèle	Groupe	XV.
A 1. Sillon transversal du prothorax très obsolète, à		
peine visible, fossette médiane assez forte.		
B <sup>1</sup> 2. Quatre fossettes à la base des élytres	Groupe	
B <sup>1</sup> 1. Deux fossettes à la base des élytres	Groupe	XVII.

Rybaxis villosa n. sp. - Oblonga, valida, rubro-castanea, elytris paulo dilutioribus, antennis pedibusque rufis, tenuiter sat longe rillosula. Caput latitudine sua longius, lateribus obliquum et leviter sinuatum, vertice convexum, inter oculos, pone medium sitos, foreis duabus rotundatis, fundo glandulosis, forea frontali paulo minore. Antennae validae, articulis 1 cylindrico, 2 cylindrico, breviore et angustiore, 3 lexiter obconico, sequentibus cylindricis, 3 et 5 duplo, 4, 6, 7 dimidio latitudine sua longioribus, 8 fere quadrato, 9 et 10 duplo majoribus, latitudine sua paululum longioribus, cylindricis, 11 oblongoorato, basi truncato, apice acuminato. Prothorax fere transversus, convexus, capite latior, sed fere brevior, foreis lateralibus magnis, glandulosis, media multo minore, sed conspicua, sulco transverso angulato. Elytra latitudine sua longiora, ad basin attenuata, humeris obtusis. notatis, lateribus sinuata et postice ampliata, basi biforeata, stria dorsali ante apicem abbreviata, subrecta et apice curvata, Abdomen elytris multo brevius, segmento primo dorsali brevi, carinulis valde dirergentibus, basi vix quintam partem disci includentibus et mediam attingentibus. Metasternum deplanatum, Tibiis anticis subrectis, sed intus, ante apicem, leviter sinuatis, intermediis subrectis, posticis viv arcuatis et intus ad apicem ciliatis Q. - Long. 2,50 mill.

#### Tonkin

Cette espèce, dont la femelle seule est connue, est assez voisine de R. princeps Sharp, du Japon, mais les antennes sont bien plus longues, avec les articles 9 et 10 surtout, plus allongés.

Rybaxis convexa n. sp. - Oblonga, convexa, obscure rubrocastanea, elytris obscure rubris, antennis pedibusque castaneis, brevissime pubescens. Caput deplanatum, latitudine sua longius, lateribus obliquum, inter oculos, posterius, foreis duabus mediocribus, rotundatis, forea frontali lata sed obsoleta. Antennae sat elongatae et graciles, articulis 1 cylindrico, 2 multo minore, suborato, 3 vix obconico, sequentibus cylindricis, 3 et 7 duplo, 4, 5, 6 triplo, 8 dimidio latitudine sua longioribus, 9 majore, valde obconico, 10 magno, quadrato, 11 irregulariter fusiformi, extus rotundato, intus media basi deplanato, late truncato, apice acuminato. Prothorar capite multo major, converus, subcordatus, foreis lateralibus magnis, glandulosis, forea media deficiente, sulco transverso arcuato et medio ampliato. Elytra magna, latitudine sua paululum longiora, basi vix attenuata, humeris obtuse quadrata, stria dorsali multo ante apicem abbreviata, subrecta. Abdomen elytris brevius, segmenti primi dorsalis carinulis leviter divergentibus, tertiam partem disci includentibus et attingentibus. Metasternum sulcatum. Segmento ultimo ventrali basi vix impresso. Pedes validi, femoribus, praesertim anticis, incrassatis, tibiis anticis intus, fere medio, minute dentatis et dein ad apicem incurvis et subemarginatis, intermediis subrectis, ante apicem intus panlulum sinuatis, apice late et obtuse calcaratis, posticis vix incurvis, ante apicem leviter crassioribus, intus ciliatis, apice minute et acute calcaratis o. -- Long. 2,40 mill.

Sumatra : Palembang.

Par la forme des tibias antérieurs, cette espèce se rapprocherait de R. mibila Reitter, de Bornéo, tandis qu'elle s'en éloigne beaucoup, au contraire, par l'absence de fossette médiane au prothorax : elle est d'ailleurs bien plus grande. Elle est, en réalité, voisine de R. gladiator Raffray, de Manille, mais elle s'en distingue par les antennes.

Rybaxis bicarinata n. sp. — Elongata, subparallela, sat convexa, rubro-castanea, elytris rubris, pedibus antennisque rufis, istarum articulis duolus penultimis piceis, vix perspicue pubescens. Caput elongatum, lateribus parallelum, supra antennas utrinque uodosum, fronte medio declinata, foveis tribus magnis, aequalibus. Antennarum articulis I cylindrico, 2 ovato, 3 obconico, ultimo breviter ovato, basi late truncato, apice valde acuminato, caeteris in utroque sexu diversis. Prothorax capite major, elongato-cordatus, foveis lateralibus magnis, media deficiente, sulco transverso arcuato, medio vix ampliato. Elytra latitudine sua longiora, lateribus subparallela, humeris notatis, stria dorsali subrecta, ante apicem abbreviata et abrupte extus recurva, margine postica bisinuata. Abdomen elytris brevius, carinulis vix perspicuis, brevissimis, quartam partem disci includentibus, inter eas impressio-

nibus duabus, et juxta marginem lateralem impressione altera, omnibus glaudulosis. Pedes validi, tibiis subrectis, posticis ad apicem gradatim incrassatis.

Antennarum articulis 4 obconico, praecedente paulo majore, 5 subcylindrico, leviter arcuato, 6 irregulariter quadrato transverso, intus oblique truncato et subserrato, 7 leviter transverso, intus paulo angustiore, truncato et subserrato, 8 minore, transverso, intus serrato, 9 magno, irregulariter quadrato, intus obliquo, angulo apicali interno acuto, 10 adhuc majore, irregulariter quadrato, intus leviter rotundato et unidentato, 11 minore. Metasternum totum concavum et utrinque carinatum. Segmento ultimo ventrali deplanato. Tibiis anticis intus medio dentatis, dein ad apicem leviter emarginatis. — Fig. 74.



Fig. 74.

Q Antennarum articulis 4-7 cylindricis, 4, 6, 7 dimidio, 3 duplo latitudine sua longioribus, 8 quadrato, 9 paulo majore, quadrato, 10 duplo majore, quadrato, 11 viv angustiore. Metasternum medio depressum. — Long. 2,60 mill.

Australie : Queensland.

Cette espèce qui vient auprès de R. antilope Raffr., s'en distingue par ses antennes.

### Enteleia n. gen.

Ce nouveau genre est extrèmement voisin de *Decarthron* Brend., comme lui, il a à la face inférieure de la tête une grande fossette à rebords trauchants, remplaçant la carène médiane qui est une des caractéristiques de la tribu, et les antennes de 10 articles; mais le corps est très trapu, plus convexe. Enfin le caractère le plus important



réside dans les palpes. Dans Decarthron les palpes, bien que légèrement variables, sont courts et épais, le 3° article est toujours plus ou moins triangulaire transversalement, anguleux en dedans, arrondi en dehors et, en réalité, plus large que long, le 4° est plus ou moins brièvement ovoïde,



Fig. 76.
Palpe de Decarthron.

tronqué à la base et fortement acuminé au sommet, tandis que, dans *Euteleia*, les palpes sont plus longs, plus grèles, le 2° article est beaucoup plus long que le 4°, assez fortement en massue, le 3° obconique ou ovoïde, variable de longueur, mais toujours plus long que large, le 4° est presque fusiforme ou ovale-allongé, acuminé à la base et plus ou moins obtus au sommet. Le 2° segment ventral, qui est le premier visible, est déprimé à la base, le long des hanches postérieures, de chaque côté et cilié; au milieu il forme une courte carène assez large et plate.

Le palpe figuré fig. 75, est celui d'*Euteleia recens* Schaufuss (sub. *Bryaxis*).

J'ajoute (fig. 76), un palpe de Decarthron, pour comparaison.

Euteleia Lewisi n. sp. — Brevis, tota rufa, antennis pedibusque rufotestaceis, parce, sat longe pubescens. Caput quadratum, angulis an-

ticis oblique truncatis, fronte recte truncatum, transversim sulcatum in linea anteriore oculorum, juxta latera utrinque, forea parum profunda et anterius, utrinque, obtuse tuberculatum, isto tuberculo medio diviso, occipite verticeque una convexo. Palporum articulis 3 breviter orato, vix quartam partem articuli sequentis longitudine aequante, 4 magno, fusiformi. Oculi magni. Antennae sat crassae, articulis 3 breviter obconico, 4-9 quadratis, 8 et 9 crescentibus, 10 (ultimo) ovato, basi truncato, extus apice leviter sinuato, acuminato. Prothorar capite (cum oculis) latitudine aequalis, fere transversus, lateribus rotundatus, foreis tribus aequalibus, mediocribus, basi punctulata. Elytra subquadrata, lateribus leviter rotundata, humeris obtuse quadratis, notatis, basi biforeata, stria dorsali medium attingente. Abdomen elytris brevius, segmento primo dorsali transverso, carinulis parallelis, dimidiam partem disci includentibus et attingentibus. Metasternum, juxta coxas intermedias, glanduloso-pubescens. Pedes graciles et parum elongati, tibiis ad apicem leviter incrassatis, vix arcuatis, trochanteribus intermediis et anticis medio leviter nodosis Q. — Long. 1,20 mill.

Brésil.

Cette espèce diffère de *E. recens* Schauf., des Amazones, par les antennes beaucoup plus épaisses et plus courtes, la strie dorsale plus courte, le 3° article des palpes pas plus long que le quart du dernier, tandis que, dans *recens*, il est aussi long que la moitié du quatrième.

Euteleia trifoveata n. sp. — Très voisine de la précédente. Tête et palpes semblables; en diffère seulement par les points suivants. Antennes également courtes, mais moins épaisses, articles 3-7 moniliformes, 8 un peu plus gros, presque carré, 9 beaucoup plus gros. carré, 40 cylindrique, tronqué à la base et obtus au sommet. Prothorax un peu plus long et plus atténué en avant. Strie dorsale plus large, moins nette et ne dépassant pas le premier tiers.

Brésil: Matto Grosso.

Euteleia nodosa n. sp. — Major et magis elongata, minus convexa, rubro-castanea, elytris paulo dilutioribus, antennis pedibusque rufis, sat dense et longe pubescens. Caput quadratum, angulis anticis oblique truncatis, tuberculum obliquum, foveatum formantibus, fronte truncata et medio foveata, ante oculos et juxta latera foveis duabus validis, occipite verticeque una convexo. Oculi magni. Palpi sicut in speciebus praecedentibus. Antennae validae, articulis 1-7 cylindricis et latitudine sua paulo longioribus, 8 et 9 crescentibus, nonnihil obconicis et latitudine sua perparum longioribus, 10 oblongo-ovato. Prothorar

breviter ovatus, antice plus et postice minus attenuatus, lateribus minus rotundatus, foreis tribus mediocribus, aequalibus, basi punctulata. Elytra latitudine sua vix longiora, lateribus minus rotundata, humeris quadratis, stria dorsali lata, brevi, trientem vix superante. Abdomen sicut in praecedentibus, Metasternum sulcatum, jurta coras intermedias bi-glanduloso-fasciculatum. Trochanteribus simplicibus, tibiis ad apicem incurvis et incrassatis. - Long. 1,60 mill.

## Mexique.

Cette espèce est beaucoup plus grande et moins convexe que les précédentes, les angles antérieurs de la tête sont plus noueux, les antennes sont robustes, avec les articles plus longs que larges.

## Tableau des espèces du genre Decarthron

Le genre Decarthron, répandu du Nord au Sud du Nouveau Monde, n'a jamais été étudié dans son ensemble : il y a beaucoup de nouvelles formes à faire connaître et un tableau des espèces en facilitera l'étude.

- A 2. Front plus ou moins tronqué ou déclive, jamais prolongé en corne au-dessus de l'épistome. B 2. Trois fossettes prothoraciques. C. 2. Fossettes prothoraciques latérales, situées en dessus du bord latéral et visibles en dessus. D 2. Front plus ou moins tronqué, épistome armé chez les 👩 ..... Groupe 1. corpulentum Schf., bicolor n. sp., Hetschkoi n. sp., ? macrocephalum Schf. D 1. Front plus ou moins déclive, épistome simple. E 2. Tibias antérieurs simples..... Groupe H. cochlearifer Schf., dimissionis Schf., soror Schf. E 1. Tibias antérieurs assez fortement dilatés, vers l'extrémité et sillonnés en dessous...... Groupe III. sulcipes n. sp. C. 1. Fossettes latérales prothoraciques situées en dessous du bord latéral, invisibles en dessus.... Groupe IV. formiceti Lec. B 1. Une seule fossette prothoracique. C'2. Prothorax avec une ligne de points à la base.... Groupe V.
- stigmosum Brend., tritomum n. sp., abnorme Lec., scarificatum Brend., laurentiacum Cas.
- C<sup>1</sup> I. Prothorax sans ligne de points à la base.

		( .
D12. Antennes anormales O	Groupe	VI.
nanum Schf., Brendeli Cas., curticor		
arthriticum n. sp., insulare n. sp.,		
Lec., quadraticeps n. sp.	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
D 1. Antennes normales et simples dans	les deux	
sexes.		
E <sup>1</sup> 4. Antennes à articles intermédiaires mon	iliformes,	
plus ou moins globuleux ou ovoïde		
plus ou moins transversaux.	<i>'</i>	
F 2. Tibias postérieurs fortement renflés, cu	isses an-	
térieures et intermédiaires simples J.		VII
laevicolle Aubé.	1	
F 4. Tibias postérieurs simples, cuisses inter-	médiaires	
et parfois aussi les antérieures ar.		
articles intermédiaires des antennes		
moins globuleux		VIII
G 4. Tête plate, carrée, fossettes très supe		
externedens Reitt.		
G 3. Tête carrée avec deux fossettes très m	arquées.	
planiceps n. sp.		
G 2. Tête presque carrée, deux fossettes pr	rolongées	
en avant en sillons parallèles. Schmitt	i n. sp.	
G 1. Tète fortement atténuée en avant, deu	ix sillons	
obliques se rejoignant sur le front. spine	osus n. sp.	
E <sup>†</sup> 3. Antennes à articles intermédiaires ove	oïdes, un	
peu plus longs que larges; cuisses int	ermédiai-	
res armées 🗸	Groupe	IX.
vulneratum n. sp., exsectum Brend.,	brasilia-	
num n. sp., Cearae Schf., uniforeatu	ım Schf.,	
minutum n. sp.		
E <sup>1</sup> 2. Antennes à articles intermédiaires plus	ou moins	
cylindriques ou obconiques.		
F <sup>1</sup> 3. Antennes à articles 3-5 plus longs que	larges Groupe	X.
G12. Antennes à articles 6 carré, 7 et 8 tr	ès trans-	
versaux, 9 légèrement transversal. ton	nentosum	
n. sp., similare Sharp.		
G <sup>4</sup> 1. Antennes à articles 7, 8, 9 à peine trans	versaux.	
restitutum Sharp.		
F <sup>1</sup> 2. Antennes à articles 3-6 plus longs que		X1.
G <sup>2</sup> 4. Antennes à articles 7 et 8 carrés, 9 lé	gèrement	
town consult of the D		

transversal. strenuum Brend.

- G<sup>2</sup> 3. Articles 7 carré, 8 et 9 très légèrement transversaux. fallaciosum Sharp.
- G<sup>2</sup> 2. Articles 7, 8, 9 carrés. planifrons n. sp., Schaufussi n. sp.
- 631. Articles 7 et 8 carrés, 9 plus long que large. suturale Schf.
- Fi 1. Articles des antennes 3-7 plus longs que larges. Groupe XII. discolor Brend.
- A 1. Front prolongé en avant.

**Decarthron bicolor** n. sp. — Breve, nigro-piceum, elytvis dilute rubris, basi rufescente, untennis pedibusque rufo-piceis, pube subtili, dispersa, albida. Caput magnum, quadratum, lateribus fere paratlelum, fronte recte truncata, late parum impressa, epistomate cornu horizontali truncato, brevi armato ♂, in linea media oculorum foveis tribus quarum media minus profunda. Antennae graciles et breves, articulis 3-8 moniliformibus, 8 pautulum majore, 9 fere duplo majore, trapezoidati, 10 breviter ovato. Prothorax latitudine aequilongus, antice calde et postice multo minus attenuatus, lateribus parum rotundatus, foreis tribus aequalibus mediocribus, basi punctulata. Elytra disperse, sat grosse punctata, subquadrata, basi leviter attenuata, stria dorsali recta, medium haud attingente. Abdomen disperse et minus punctatum, carinulis perparum divergentibus, mediam partem disci superantibus, sed vix mediam includentibus. Metasternum sulcatum. Pedes breves, graciles et simplices. — Long. 4,50 mill.

Chili.

Remarquable par sa coloration très tranchée.

**Decarthron Hetschkoi** n. sp. — Subovatum, castaneum, elytris paulo dilutioribus, antennis pedibusque rufis, subtiliter parce pubescens. Caput minus antrorsum attenuatum, lateribus obtiquum, anterius punctatum, utrinque supra antennas minute nodosum, fronte recte

truncata, inter oculos foveis duabus validis et medio foveola plus minusve conspicua. Antennae crassae, articulis 2 cylindrico, 3 breviter obconico, 4-7 moniliformibus, 8 paulo, 9 multo majore, ambobus leviter transversis, 10 breviter ovato, basi late truncato, apice intus leriter emarginato. Prothorax vix punctulatus, latitudine sua paulo longior, subcordatus, foveis tribus aequalibus, basi impunctata. Elytra latitudine sua longiora, basi apiceque leviter attenuata, lateribus rotundata, stria dorsali recta, medium attingente. Abdomen elytris paulo brevius, segmento primo dorsali magno, carinulis tertiam partem disci attingentibus et fere mediam includentibus. Metasternum postice triangulatim impressum. Pedes simplices, sat graciles.

- 3 Epistomate cornu minuto, compresso, acuto praedito. Antennarum articulis 1 superne basi profunde impresso, 2 leviter oblique sito.

Brésil : Blumenau.

Cette espèce est plus allongée, plus ovale que les autres ; je lui ai conservé le nom inédit qu'elle portait dans la collection Reitter.

Decarthron sulcipes n. sp. — Breve, crassum, nigropiceum, elytris obscure rubris, antennis pedibusque castaneis, pube brevi, suvhirsuta. Caput magnum, fronte anterius medio declinata, inter oculos foveis duabus. Antennae sat crassae, articulis 1 et 2 subcylindricis. 3 breviore, subovato, 4 majore, orato et latitudine sua longiore, 5 et 6 quadratis, 7 et 8 leviter transversis, 8 paululum majore, 9 magno, quadrato, 10 breviter ovato, intus apice emarginato. Prothorax latitudine sua longior, antice valde et postice multo minus attenuatus, lateribus medio parum rotundatis, foveis tribus aequalibus, basi laevi. Elytra quadrata, stria dorsali trientem haud superante. Abdomen breve carinulis tertiam partem disci attingentibus et mediam includentibus. Metasternum sulcatum, isto sulvo posterius triangulatim ampliato. Pedes breves, sat crassi.

© Tibiis anticis ad apicem ampliatis, infra late sulcatis. — Long. 1.60-1.70 mill.

Haute-Bolivie: Yuracaris.

**Decarthron tritomum** n. sp. — Oblongum, subparallelum, totum rufum, brevissime subhirsute pubescens. Caput tatitudine sua longius, lateribus parallelum, supra antennas utrinque minute nodosum et postea obsolete impressum, inter oculos maximos foveis duabus. Antennae validae, elongatae, articulis 1,2 cylindricis, 3, 4, 5 avatis, 6 cylindrico, paulo longiore, 7 quadrato, 8, 9 duplo majoribus, inter se subaequalibus, quadratis, nonnihil obconicis, 10 ovato. Prothorax breviter ovatus, latitudine sua longior, unifovegtus, basi minute punctulatus. Elytra subquadrato-elongata, basi vix attenuata. Segmento primo dorsali magno, carinulis leviter divergentibus, plus quam dimidiam partem disci includentibus et superantibus, inter eas basi biforeata. Pedes graciles, breves et simplices. Metasternum sulcatum. — Long. 1.30 mill.

Brésil: Blumenau.

Cette espèce est voisine de *D. stigmosum* Brend., mais elle est beaucoup plus petite et plus allongée.

Decarthron arthriticum n. sp. — Breve, crassum, totum dilute rufum, antennis pedibusque rufotestaceis, breviter, subhirsute pubescens. Caput magnum, quadratum, deplanatum, inter oculos anterius late nee profunde foveatum. Antennae validae, articulis 1, 2 cylindricis, 3, 4, 5 teriter obconicis, latitudine sua paulo longioribus, 6 multo magis obconico, intus teriter ampliato, 7 quadrato, 8 paulo minore, leviter transverso, 9 dimidio majore, quadrato, 10 breviter ovato, basi late truncato, intus ante apicem emarginato. Prothorax breviter ovatus, subtransversus, unifoveatus, basi laecis. Elytra magna, quadrata, stria dorsali medium attingente. Segmenti primi dorsalis carinulis dimidiam partem disci includentibus et quartam attingentibus.

Metasternum ovatim concavum et glanduloso-setosum. Segmento ultimo ventrali transversim impresso. Femoribus anticis crassis, supra oblonge impressis, intermediis supra angulatim dilatatis, extus compressis et fasciculatis, apice constrictis, tibiis intermediis medio leviter ampliatis, intus apice



Fig. 77

ciliatis, posticis ad apicem incrassatis, incurvis et intus ciliatis. — Fig. 77.

⊋ Antennae breviores, articulis 6, 7 angustioribus. Pedes simplices.

Metasternum convexum. Segmento ultimo ventrali foreato. — Long.

1.50 mill.

1.50 mill.

1.50 mill.

1.50 mill.

1.50 mill.

2.50 mill.

3.50 mill.

Mexique : Sierra de Durango.

Cette espèce est voisine de *D. curticorne* Schauf., mais, dans cette dernière, ce sont les articles 3, 4, 5 des antennes qui sont plus gros et l'armature des cuisses intermédiaires est très différente.

**Decarthron insulare** n. sp. — Crassum subparallelum, ferrugineum, elytris rubescentibus, antennis pedibusque rufis, longe sat

dense pubescens. Caput quadratum, deplanatum, fronte medio leviter depressa, inter oculos depressionibus duabus obliquis, occipite longitudinaliter depresso. Antennae crassae, breves. articulis 2 quadrato, 3 obconico, 4-7 moniliformibus, 7, 8, 9 transversis, 8 paulo, 9 dimidio majoribus, 10 breviter orato, basi late truncato. Prothorax magnus, subcordatus, minute unifoveatus, basi laevis. Elytra quadrata, stria dorsali medium vix attingente. Abdomen elytris vix brevius, segmento



Fig. 78

primo dorsali magno, carinulis divergentibus, dimidiam partem disci includentibus, sed quartam haud superantibus. Metasternum vix sulcatum. Tibiis posticis leviter, ad apicem, incrassatis et incurvis.

♂ Antennae crassiores, articulis 4, 5, 6 majoribus, subglobosis. Femoribus intermediis supra dilatatis et bispinosis, pone apicem pro-

fundissime emarginatis. - Long. 4.60 mill. - Fig. 78.

Antilles : Grenada.

Ressemble à D. longulum Lec., mais beaucoup plus court et plus épais.

Decarthron quadraticeps n. sp. — Robustum, subparallelum, totum rufum, subhirsute brunneo-pubescens. Caput magnum, quadratum, subdeplanatum, inter oculos trifoveatum. Antennae ad apicem incrassatae, articulis 2 ovato, 3 obconico, 4 et 5 minus obconicis, latioribus, 6 et 7 quadratis, majoribus, intus nonnihil servatis, 8 valde transverso, 9 subquadrato, 10 breviter ovato, basi late truncato, apice acuminato. Prothorax latitudine sua paulo longior, antice valde et postice multo minus attenuatus, unifoveatus. Elytra quadrata, stria

dorsali medium attingente. Abdomen elytvis vix brevius, segmento primo dorsali magno, carinulis paululum divergentibus, tertiam partem disci attingentibus et paulo plus quam mediam includentibus. Metasternum lale concavum et glanduloso-squamosum. Femoribus intermediis crassis, supra leviter emarginatis et bidenticu-



Fig. 86.

latis, sulco lato extus recurvo, tibiis intermediis intus apice, valde et acute calcaratis 3. — Long. 4,60 mill. — Fig. 86.

Mexique : Cuantla.

**Decarthron planiceps** n. sp. — Suboblongum, totum rufum, nitidum. Caput magnum, quadratum, subdeplanatum, in linea ante-

riore oculorum, juxta latera, foveis dualus rotundatis et profundis. Antennarum articulis 3 intus leviter rotundatim ampliato, 8 vix majore, subquadrato, 9 paulo majore, subtransverso. Prothorax breviter oratus, minutissime unifoveatus. Elytra latitudine sua paululum longiora, basi leviter attenuata, humeris notatis, stria dorsali trientem haud superante. Abdomen elytris longitudine aequale, segmento primo dorsali

magno, carinulis paululum divergentibus, plus quam tertiam partem disci includentibus, tertiam paulo superantibus. Metasternum obsolete sulcatum. Trochanteribus leviter gibbosis, femoribus intermediis supra angulatim dilatatis, spinosis, extus valde compressis et carinatis, ante apicem leviter constrictis, femoribus anticis supra leviter compressis et carinatis.— Long. 4.60 mill.— Fig. 79.



Fig. 79.

Colombie.

Très voisin de *D. externedens* Reitt., antennes un peu moins épaisses; l'échancrure supérieure de la cuisse intermédiaire est remplie par une carène oblique.

**Decarthron Schmitti** n. sp. — Breve, crassum, totum rufum, brevissime pubescens. Caput quadratum, fronte anterius, medio, decliri et postice sulco transverso tenui et integro praedita, inter oculos, fere medio, foveis duabus et sulcis obsoletis parallelis. Antennae validae, ud apicem crassiores, articulis 3 obconico, 6 paulo majore, 7 quadrato, 8 et 9 leviter transversis, 8 paululum et 9 dimidio majoribus. Prothorax transversus, lateribus valde rotundatus, minute unifoveatus. Elytra



Fig. 80

quadrata, stria dorsali vix medium allingente. Abdomen paulo brevius, carinutis paululum divergentibus, mediam partem disci includentibus et attingentibus. Metasternum sulcatum

3 Antennae paulo validiores, femoribus intermediis supra angulatim ampliatis et den-

tatis, dein paulum emarginatis et carinatis, intus et extus oblique constricto-sulcatis, trochanteribus anticis nodosis. — Long. 1,70 mill. — Fig. 80.

Mexique : Cuernavaca.

Très voisin du précédent, mais armature de cuisses un peu différente. Je dois cette espèce au Rév. J. Schmitt, auquel je me fais un plaisir de la dédier.

**Decarthron spinosum** n. sp. — Breve. crassum, ferrugineum, vel rufo-ferrugineum, elytris rufo-rubris, antennis pedibusque rufis, sat longe pubescens. Caput antrorsum angustatum, lateribus obliquum, foveis duabus et sulcis duobus obliquis, in fronte connexis. Antennae crassae, articulis 2 ovato, 3 obconico, 4-7 moniliformibus, 8 vix majore, transverso, 9 duplo majore, quadrato-subtransverso, 10 breviter ovato, valde acuminato. Prothorar latitudine aequilongus, lateribus regulariter rotundatus, minute unifoveatus. Elytra quadrata, stria dorsali vix medium attingente. Abdomen brevius, carinulis paululum divergentibus, vix tertiam partem disci attingentibus et dimidiam includentibus.



Fig. 81.

Antennae validiores, articulis, 9 paulo majore. Femoribus anticis supra, ante apicem, impressis et oblique carinatis, intermediis supra, valde et obtuse angulatis, dein ad apicem leriter sinuatis, intus, juxta angulum medium, rotundatim impressis et unispinosis, ista impressione sulco sinuato infra producto. Metasternum sulcatum. — Fig. 81.

⊋ Antennae breviores et graviliores. Metasternum vix sulvatum. −
Long. 4,30-4,40 mill.

Antilles : Grenada.

Espèce voisine des précédentes, dont elle diffère surtout par l'armature des cuisses intermédiaires.

**Decarthron vulneratum** n. sp. — Breve, obscure ferrugineum, elytris paulo dilutioribus, antennis pedibusque rufo-castaneis, tenuiter rufo-pubescens. Caput quadratum, fronte antrorsum medio subquadratim impressa, in linea anteriore oculorum, juxta latera, foveis duabus validis, vertice et occipite una convexo. Antennae mediocres, articulis 3 obconico, 4-6 moniliformibus, ovatis, 7, 8 quadratis, 8 vix majore, 9 majore, leviter transverso, 10 breviter ovato, basi late truncato, apice parum acuminato. Prothorax cordatus, sat valide unifoveatus. Elytra quadrata, stria dorsali valida, medium attingente. Segmento primo

dorsali magno, carinulis subparallelis, tertiam partem disci attingentibus et mediam includentibus. Metasternum sulcatum, juxta coxas intermedias flavo-fasciculatum. Femoribus anticis supra. medio, leviter angulatis, longitudinaliter impressis, intermediis dilatatis, supra profunde rotundatim emargi-



Fig. 82.

natis et intus impressis, medio acute spinosis, ante apicem irregulariter tuberculosis 3. — Long. 1,30 mill. — Fig. 82.

Mexique.

**Decarthron brasilianum** n. sp. — Cette espèce est extrêmement voisine de la précédente : elle en diffère, dans les deux sexes, par la strie dorsale qui est large, très courte et ne dépassant pas le premier quart des élytres. L'armature des cuisses, chez les màles, est

la même pour les antérieures, mais très différente pour les intermédiaires; la cuisse est simplement renflée, avec une forte épine oblique, au milieu, en dessus, surplombant un large et profond sillon oblique à la face interne, partant de la base de l'épine et s'étendant jusqu'à la face inférieure : cette con-



Fig. 83.

formation rappelle un peu celle de *D. Schmitti*; mais, chez ce dernier. l'épine est suivie d'une échancrure peu profonde, le sillon est moins profond et n'atteint pas la face inférieure. — Long. 1,50-1,60 mill. — Fig. 83.

Brésil: Matto Grosso.

**Decarthron minutum** n. sp. — Praecedentibus affinis, sed multo minus, totum rufo-testaceum, breviter pubescens. Caput antrorsum attenuatum, lateribus obliquum, supra antennas utrinque tuberculo obtuso posterius impresso, fronte medio vix impressa, in linea anteriore oculorum et latera tangentibus, foreis duabus sulcis obliquis antrorsum productis, occipite verticeque una convexo. Antennae validae, ad apicem magis clavatae, articulis 3-6 latitudine sua paulo longioribus, 7, 8 quadratis, 8 paulo majore, 9 duplo majore, quadrato, leriter transverso, 10 breviter ovato, ante apicem intus leriter emarginato. Prothorax breviter ovatus. Elytra subquadrata, ad basin leviter attenuata, stria dorsali obsoleta, tertiam partem disci vix attingente. Segmento primo dorsali magno, carinutis leviter divergentibus, plus quam dimidiam partem disci includentibus et attingentibus. Metasternum quadratim impressum, basi glanduloso-fasciculatum. Pedes simplices. — Long. 1,45 mill.

Brésil : Matto Grosso.

Cette espèce pourrait, à première vue, être prise pour une petite femelle de l'espèce précédente, mais elle en diffère par la tête atténuée, à côtés obliques, au lieu d'être tout à fait carrée et la massue des antennes bien plus marquée.

Ann. Soc. Ent. Fr., LXXIII [1904].

Decarthron tomentosum n. sp. — Breve, totum ferrugineum, etytris rubris, antennis pedibusque castaneis, longe, tenuiter pubescens. Caput quadratum, utrinque sulco lato, parum profundo, longitudinali, lateribus parallelo, fronte recte truucata. Antennae crassae, articulis 3-5 obconicis, 3 intus perparum gibboso, 7, 8 valde transversis, 9 praecedente fere duplo majore, transverso. Prothorax latitudine sua paulo longior, antice multo plus quam postice attenuatus, lateribus parum rotundatus, sat valide unifoceatus. Elytra subquadrata, basi leviter attenuata, stria dorsali medium attingente. Segmento primo dorsali magno, carinulis parallelis, minus quam dimidiam partem disci includentibus et tertiam attingentibus. Metasternum sulcatum. Pedes simplices. — Long. 4,70 mill.

Colombie.

Cette espèce qui vient auprès de *D. similare* Schauf., en diffère par la forme beaucoup plus courte, les articles des antennes 7-10 beaucoup plus transversaux, les carinules du premier segment dorsal beaucoup plus courtes; elles atteignent presque les deux tiers dans similare.

Decarthron Schaufussi n. sp. — Breve, totum rufum, breviter pubescens, Caput subquadratum, lateribus attamen leviter obliquum, deplanatum, fronte medio declivi, inter oculos anterius, foveis duabus latis, parum profundis et leviter triangularibus. Antennae leviter sinuatae, sat elongatae et graciles, articulis 3-6 obconicis, 7, 8, 9 quadratis, 8 paululum et 9 fere duplo majoribus, 10 regulariter ovato. Prothorax breviter ovatus, latitudine sua aequilongus, lateribus rotundatus, minute unipunctatus. Elytra quadrata, stria dorsali medium attingente. Segmento primo dorsali magno, carinulis subparallelis, multo plus quam dimidiam partem disci includentibus et dimidiam haud superantibus. Metasternum tenuiter sulcatum. Pedes simplices. — Long. 1,45 mill.

Amazones.

**Decarthron planifrons** n. sp. — Cette espèce est très voisine de la précédente, mais bien plus grande, plus robuste et de coloration plus foncée. Elle diffère, en outre, par les antennes qui, bien que construites sur un plan identique, sont beaucoup plus épaisses, avec les articles 8 et 9 un peu obconiques. La tête aussi est un peu différente; l'angle externe est un peu noueux de chaque côté, avec une petite impression, ce qui fait paraître le front plus déprimé au milieu. — Long. 4.60 mill.

Mexique: Yucatan.

Decarthron longicorne n. sp. — Crassum, sat convexum, ferrugineum, etytris rubris, antennis pedibusque rufo-castaneis, sat dense pubescens. Caput quadratum, utrinque, supra antennas, tuberculo plano, postice transversim breviter sulcato, in fronte impressione magna, parum profunda, subhexagona, inter oculos foveis duabus cum impressione frontali junctis. Antennae elongatae, graciles, articutis 3-6 cylindricis, latitudine sua fere duplo, 7, 8 tantummodo pauto longioribus, 8 perparum crassiore, 9 subconico, majore, latitudine sua pauluum tongiore, 10 oblongo-ovato. Prothorax breviter oratus, sut valde unipunctatus. Elytra quadrata, stria dorsali brevissima. Segmento primo dorsali magno, carinulis trientes duos includentibus et dimidiam partem disci attingentibus, inter eas basi flavo-ciliata. Metasternum late haud profunde sulcatum, basi glanduloso-setosum. Pedes simplices. — Long. 1,60 mill.

Amazones.

Cette espèce se distingue de toutes les autres par la longueur de ses antennes et leur gracilité, disposition un peu anormale dans ce genre.

**Decarthron frontale** n. sp. — Sat oblongum, parallelum, totum rufum, breviter pubescens. Caput deplanatum, subquadratum, lateribus leviter obliquum, fronte antrorsum valde pro-

ducta, isto processu recte truncato, in linea anteriore oculorum foveis duabus, inter se valde distantibus, fronte medio obsolete deplanata. Antennae crassae, sinualae, articulis 1 quadrato, 2 ovato, 3






Fig. 84.



Fig. 85.

verso, intus producto, 8 majore, transverso et intus producto, 9 subquadrato, praecedente paulo augustiore. 10 breviter ovato, basi late truncato. Prothorax subovatus, sat valde unifoveatus. Elytra quadrata, stria dorsali vix medium attingente. Segmento primo dorsali magno, carinulis fere duos trientes includentibus et mediam partem disci attingentibus. Metasternum late ner

profunde sulcatum. Femoribus anticis medio, supra, leviter incrassatis, intermediis valde incrassatis, supra profunde excavatis, cum carina contorta, summo minute spinosis et extus angulatim dilatatis, tibiis posticis haud incrassatis, sed leviter incurvis 5. — Long. 4,30 mill. — Fig. 84 et 85.

Colombie.

La forme de la tête et des antennes fera facilement reconnaître cette espèce. L'armature des cuisses est si compliquée que je l'ai représentée vue en dessus, et de profil, en dedans.

#### Itamus n. gen.

Crassus. Caput transversum, fronte recte truncatum, inter frontem et epistoma sulco profundo, utrinque posterius, usque infra ocutos prolongato et postice, in foveam magnam, pilosam, desinente, genis lateraliter pone oculos angulatis, epistomate erecto, armato. Palpi maxillares mediocres, articulis 2 apice clavato, 3 subgloboso, intus triangulari, 4 fusiformi, basi truncato, jugulum oblonge et profunde foveatum. Antennae decem-articulatae articulis 1 magno, 2 elongato-cylindrico, sequentibus ovatis, penultimis transversis. Prothorax subtransversus, foreis tribus liberis et aequalibus. Elytra quadrata, basi triforeata, stria dorsali brevi. Segmento primo dorsali magno, carinulis duabus.

Itamus laticeps n. sp. — Obscure castaneus, elytris rubescen-





Fig. 87

tibus, antennis pedibusque rufo-castaneis, sat longe pubescens. Caput minute punctulatum, magnum, deplanatum, transversum, antice posticeque retusum, lateribus leviter sinuatum, inter oculos medio, foreis duabus rotundatis, fronte, medio late, hand profunde impressa. Antennae validae, articulis 1 crasso, supra transversim impresso, 2 cylindrico, latitudine sua fere triplo longiore, 3 subobconico, 4, 5, 6 ovatis, longitudine decrescentibus, 7, 8 transversis, intus leviter productis et paululum crescentibus, 9 subquadrato, transverso, 10 orato, basi late truncato. Prothorax subcordatus, leviter transversus, lateribus valde rotundatus, aequaliter trifoveatus, basi punctatus. Elytra quadrata, convexa, stria dorsali lata, brevi. Segmenti primi dorsalis carinulis purallelis, fere duos trientes includentibus et tertiam partem disci haud superantibus. Metasternum sulcatum. Pedes simplices. — Long. 2,10. — Fig. 87.

Brésil.

La tête est représentée vue en dessus et de côté.

Le genre Itamus est très voisin de Decarthron Brendel.

Bien qu'il en diffère seulement par la conformation de la tète, celleci est tellement anormale, qu'elle m'a paru motiver la création d'un genre nouveau.

Chez Hamus, le front est très abruptement tronqué en avant, et séparé de l'épistome par un sillon très profond qui se continue de chaque côté jusqu'au-dessous des yeux, où il se termine par une grande fossette remplie de pubescence glanduleuse : les joues, au-dessous des yeux, sont un peu dilatées, et l'épistome est relevé et armé.

Dans la figure 87, la tête de l'unique espèce du genre, 1. laticeps est représentée vue en dessus et de côté.

Eupsenius gracilis n. sp. — Oblongus, subparallelus, totus pallide rufus, glaber, nitidus. Caput latitudine sua longius, antrorsum leviter attenuatum, lateribus obliquum, fronte subrecte truncata, ante oculos foveis duabus magnis. Antennae breves, articulis duobus primis magnis, 1 quadrato, 2 ovato, 3-8 minutis, moniliformibus et compactis, 9 lenticulari, 10 duplo majore, transverso, 11 maximo, conico, minus quam dimidiam partem antennae aequante. Prothorax elongato-cordatus. Elytra latitudine sua multo longiora, lateribus parallela, humeris rotundata, basi foveis duabus maximis. Segmento dorsali primo magno, carinulis duabus brevissimis, vix perspicuis, plus quam tertiam partem disci includentibus. Metasternum convexum, simplex. Pedes simplices, femoribus, praesertim anticis, crassis. — Long. 1-4.10 mill.

Antilles : Grenada.

Voisin de *E. politus* Reitt., de S<sup>t</sup>-Thomas; mais les articles des antennes 9 et 40 sont plus transversaux, 41 est plus épais et le prothorax est bien plus cordiforme.

### CATALOGUE.

### BRACHYGLUTINI

Bryaxini Raffray, Rev. d'Ent. 1890, pp. 83, 147-125. — GANGLBAUER, Käf. Mitteleur. II. 1895, p. 805.

#### ARACHIS

RAFFRAY, Rev. d'Ent. 4890, pp. 447, 424.

#### **OBRICALA**

RAFFRAY, Rev. d'Ent. 4890, pp. 447, 421.

 foveicollis
 Raffray
 (Batrisomorpha)
 Rev. d'Ent.

 4882
 p. 47; 4890
 pl. II, f. 23
 Java : M' Gedeh

 4
 4
 4
 4

### BATRAXIS

Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, p. 464. — Raffray, Rev. d'Ent. 1895, p. 21. Batrisomorpha Raffray, Rev. d'Ent. 1882, p. 38.

## Groupe I.

## Groupe II.

## Groupe III.

# Groupe IV. -

Doriae Schaufuss, Ann. Mus. Civ. Gen. XVIII, p. 366.

— Raffray, Rev. d'Ent. 4895, p. 26...... Sumatra: Singalan.

quadrata Raffray, Rev. d'Ent. 4895, p. 26. Singapore : Penang.
truncaticornis Raffray, loc. cit. p. 27, pl. II. f. 1. Singapore.
nauta Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 4896. p. 254 Sumatra.
tumorosa n. sp
Groupe V.
megacephala Raffray, Ann. Mus. Nat. Hung. Bu-
dapest, 1903, p. 57, pl. 1, f. 42 N <sup>the</sup> -Guinée : Golfe Huon.
Groupe VI.
instabilis Raffray, Rev. d'Ent. 4895, p. 30. Singapore : Penang.
lucida Raffray (Bryacis), Rev. d'Ent. 1882. p. 37;
4895, p. 34
indica n. sp
Groupe VII.
calcarata Raffray, Rev. d'Ent. 4895, p. 33 Sumatra.
Groupe VIII.
brevicollis Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 4893, p. 492;
Rev. d'Ent. 1895, p. 29. Sumatra.
nitidissima Raffray (Bryaxis), Rev. d'Ent. 4882.
p. 36; 4895. p. 34 Java : M' Gedeh.
Groupe IX.
parvispina n. sp Sumatra : Palembang.
curvispina Raffray. Ann. Soc. ent. Fr. 4893.
p. 491; Rev. d'Ent. 1895, p. 31 Singapore, Sumatra.
sinensis Raffr. Ann. S. ent. Fr. 4896, p. 253. Chine: Tien-Tsin.
variabilis Raffray, Rev. d'Ent. 4890, pl. II, f. 22;
1895. p. 34
laevigata Raffray, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales.
1901. p. 148 Australie : New South Wales.
convergens Raffray, loc. cit. p. 448
Groupe X.
carinulata Schaufess, Ann. Mus. Civ. Gen. XVIII.
1882, p. 365. — Raffray, Rev. d'Ent. 1893, p. 29. Sumatra.

The feature (Out)
militaris Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 1896, p. 254 Sumatra.
clegans Raffray, Rev. d'Ent. 4895, p. 36 Sinyapore.
Groupe XI.
obliqua Raffray, Rev. d'Ent. 1895, p. 32, pl. II, f. 3. Penang.
Groupe XII.
<b>pilosella</b> Raffray, Rev. d'Ent. <b>1882</b> , p. 40; <b>1895</b> , p. 37
<b>clavata</b> Raffray, loc. cit. 4882, p. 40; 4895, p. 38 N <sup>ne</sup> -Guinée : Port Dorey.
<b>Hampei</b> Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 4881, p. 464.  — Raffray, Rev. d'Ent. 4895, p. 38 Grèce : M¹ Olympe.
Groupe XIII.
Armitagei King ( <i>Bryaxis</i> ), Trans. Ent. Soc. N. S. Wales 4864, p. 404, pl. 7, f. 45. — Raffray, Rev. d'Ent. 4895, p. 38; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 4900, p. 447
Groupe XIV.
foveata Raffray, Rev. d'Ent. 4895, p. 37 Singapore.
Groupe XV.
latipes Raffray, Ann. Mus. Nat. Hung. 4903, p. 59  N <sup>he</sup> -Guinée: Golfe Huon, Sattelberg.
Groupe XVI.
brevis Raffray, Rev. d'Ent. 1895, p. 36 Singapore.
pl. II, f. 2
35 DIROPTRUS
Motschulsky, Et. ent. 4858, p. 28. — Raffray. Ann. Soc. ent. Fr. 4893, p. 454.
ceylonicus Motsch, Étud. ent. 1858, p. 28. — Raf- fray, loc. cit. p. 455
monoceros Raffray, loc. cit. p. 456 Ceylan : Cottawa.

## COMATOPSELAPHUS

SCHAUFUSS.	Ann. Mus.	Civ. Gen.	XVIII,	1882. p	. 368.
	RAFFRAY, I	Rev. d'Ent.	4895. p.	. 39.	

opacicolnis Schaufuss, 10c. cu. p. 309 Borneo.
puncticollis Raffray, Rev. d'Ent. 4895, p. 39
Singapore : Penang.
Huonis Raffray, Ann. Mus. Nat. Hung. Budapest.
1903. p. 60
brevicornis Raffray, loc. cit. p. 60
N <sup>ne</sup> -Guinée : Baie de l'Astrolabe.
Schaufussi Raffray, loc. cit. p. 61 Nºle-Guinée : Wilhemhafen.
<b>parcepunctatus</b> n. sp
ATENISODUS

longicornis Raffray (Comatopselaphus), Rev. d'Ent.	
4895, p. 40, pl. II, f. 9	Singapore.
macrophthalmus n. sp	Sumatra.
longicornis (var.) Raffray (Comatopselaphus). Ann.	
Soc. ent. Fr. 4896, p. 255.	

2

## BYTHINOGASTER

SCHAUFUSS, Tijds. Ent. XXX, 4887, p. 444.

simplex Schaufuss, loc. cit. p. 412..... Antilles : S'-Domingue.

## GLOBA

Raffray, Rev. d'Ent. 4887, p. 37 : Ann. Soc. ent. Fr. 4896, p. 257, 258.

ft. 2, 3	e : Bogota.
<b>Drevicornis</b> Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 1890, p. 314	Venezuela.
Taevis         n. sp	Yuracaris.

#### BERLARA

Reitter, Verh. naturf. Ver. Brünn. XX, 4881, p. 489.

crassipalpus Reitter. Verh. z. b. Ges. Wien, 4882.

p. 287; Deuts. Ent. Zeits. 4885, pl. III, ff. 21, 22,

23 . . . . . Java : Batavia.

1

### BERDURA

REITTER, Verh. naturf. Ver. Brünn, XX. 1881, p. 187.

excisula Reitter, Deuts. Ent. Zeits. 1883. p. 36;

4885, pl. III, f. 24. . . . . . . . Antilles : St-Thomas.

4

#### EUPINES

King, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales, 4866, p. 310. — Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 4896, pp. 257, 258; Proc. Linn. Soc.

N. S. Wales, 1901, p. 171. —

Broun, Man. N. Zeal. Col. Prt. 3, 1881, p. 759. — Blackburn, Trans. R. S. South Austr. 4891, p. 81.

Brabaxis Raffray, Rev. d'Ent. 1890, pp. 419, 425.
 Patranus Raffray, loc. cit. pp. 418, 423.

Byraxis (subg.) REITTER, Verh. naturf. Ver. Brünn, XVIII, 4879 (sep.), p. 2.

Subg. Eupines s. str.

## Groupe 1.

Sphaerica Motsch. Bull. Nat. Mosc. 1851, p. 492. —
Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 1882, p. 291. —
Schaufuss, Berl. Ent. Zeits. 1887, p. 293. — Raffray
(*Brabaris*), Rev. d'Ent. 1890, p. 148; Ann. Soc.
ent. Fr. 1893, p. 457.

siamensis Schaufuss, Psel. Siams 4877, p. 9; Tijds. Ent. XXV, p. 68; Notes Leyd. Mus. IV, p. 448; Berl. Ent. Zeits. 4887, p. 293; Bull. Soc. ent. Fr. 4882, p. cxvii. — Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 4882, p. 294 (Siam. Célèbes).

foneusis Schaufuss, Psel. Siams 4877, p. 10; Tijds.

Ent. XXV, p. 69; Berl. Ent. Zeits, 4887, p. 293. — REITTER, Verh. z. b. Ges. Wien, 1882, p. 291 Siam'.
Aurora Schaufuss, Nunq. ot. III. p. 496. — Raffray,
Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 4900, p. 475
Australie : New South Wales. Tasmanie.
affinis Schaufuss, loc. cit. p. 504.
melanocephala Schaufuss, loc. cit. p. 494. —
Raffray, loc. cit. p. 180
pumilio Schaufuss, loc. cit. p. 504. — Raffray, loc. cit. p. 184
spreta Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 501. — Raffray, loc. cit. p. 184. Australie: New South Wales, Victoria.
villosula Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 4896, p. 302.
N <sup>the</sup> -Calédonie : Noumea.
Groupe II.
soror Raffray, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 1900,
p. 480 Australie : New South Wales.
pleta Schaufuss, Nunq. ot. III, p. 497. — Raffray.
Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 4900, p. 473. Australie. Tasmanie.
laeviceps Schaufuss, loc. eit. p. 503 (Australie : East Creeck).
Var. verticalis Schaufuss, loc. cit. p. 498 (Tasmanie).
Var. ebenifer Schaufuss loc. cit. p. 498 (Tasmanie).
Var. aethiops Schaufuss, loc. cit. p. 498 (Tasmanie).
Var. frontalis Schaufuss, loc. cit. p. 497 (Tasmanie).
minima n. sp
militaris Blackburn, Trans. R. Soc. South Austr. 4891, p. 85
sororcula Blackburn, loc. cit. p. 82. Australie: Alpes de Victoria.
punctata Broun, Man. N. Zeal. Col. Prt. 4, 4886,
p. 831
longipennis Raffray, Rev. d'Ent. 1882, p. 29
Groupe III.
pectoralis Raffray, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales,
1900, p. 185 Australie : New South Wales.

capitata King, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales, 4866,
p. 311. — Raffray, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 4900, p. 482 Australie : New South Wales. Tasmanie.
liliputana Raffray, loc. cit. p. 486. Australie: New South Wales.
transversa King, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales,
4866, p. 314. — Raffray, loc. cit. p. 478
exigua King, loc. cit. 4863, p. 50
dubia Raffray, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 1900,
p. 485. Australie.
grata Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 500 Nuc-Zélande.
sternalis Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. XII, 4893, p. 471
caledonica Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 4896, p. 302.  Nue-Calédonie : Nouméa.
Groupe IV.
tuberosa Raffray, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales,
4900, p. 476 Australie : New South Wales.
polita King, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales, 4863, p. 49.
- RAFFRAY, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 4900,
p. 476 Australie: New South Wales.
bicolor Raffray, loc. cit. p. 477 Australie: New South Wales.
fuscicornis Raffray, loc. cit. p. 174
Groupe V.
megacephala Raffray, loc. cit. p. 484
Groupe VI.
longicornis Raffray, loc. cit. p. 482 Australie: Swan River.
nauta Blackburn, Trans. R. Soc. South Austr. 1891,
p. 83 Australie : South Australia.
spiniventris Blackburn, loc. cit. p. 84
Australie : South Australia.
nautoides Blackburn, loc. cit. p. 84. Australie: South Australia.

# Groupe VII.

Carriedo A A A A
clavatula King, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales, 1864.
p. 104, pl. VII, f. 12
concolor Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 502.
- Raffray, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 4900,
p. 487, pl. X, f. 20
triangulata Raffray, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales,
4900. p. 487. pl. X, f. 47 Australie : New South Wales.
nodosa Raffray, loc. cit. p. 488, pl. X. f. 48
compressinoda Raffray, loc. cit. p. 488, pl. X,
f. 49
Blackburni nom. nov. Australie : New South Wales, Moreton Bay.
sternalis   Raffray, loc. cit. p. 188, pl. X, f. 24.
aequata King, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales, 4866,
p. 310
Groupe VIII.
1aevifrons Raffray, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 4900, p. 489, pl. X, f. 22 Australie: New South Wales.
paludis Blackburn (Bryaxis), Trans. R. Soc. South
Austr. 1891, p. 81
Groupe 1X.
? talpa Schaufess, Nunq. ot. III, p. 496
? sobrina Schaufuss, loc. cit. p. 495 Tasmanie.
vitrea Schaufuss, loc. cit. p. 495
piciceps Broun, Man. N. Zeal. Col. 1880, p. 127 N <sup>to</sup> -Zélande.
nigriceps Raffray, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales,
4900, p. 479, pl. X, f. 41 Australie : New South Wales.
diversicolor Schaufuss, Nunq. ot. III, p. 498. —
RAFFRAY, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 1900,
p. 183, pl. X, f. 9 Australie: King George's Sound.
Giversicornis Raffray (Eupinoda), Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 1900, p. 470, pl. X, f. 10
Australie : New South Wales.
sulcata Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 503.
West Australia.

# Groupe X.

(327)

nodicornis Raffray, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales,
1900, p. 477 Australie : New South Wales.
globulifer Schaufuss (Bryaxis), Nunq. ot. 4880.
p. 304. — Raffray, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales,
4900, p. 490, pl. X, f. 44 (Patranus); Rev. d'Ent.
1890, p. 419. pl. II, f. 33 3 (Melbourne, Australie.
of polita Schaufuss (Tychus). Tijds. Ent. XXIX,
1886, p. 206 (Champion Bay).
amplicentris Schaufuss, Nunq. ot. p. 505 (Sydney).
plecta Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 502
Australie : Victoria.
relicta Blackburn, Trans. R. S. South Austr. 1891.
p. 292 Australie : Victoria.
Groupe XI.
nigricollis King (Tychus), Trans. Ent. Soc. N. S.
Wales, 1864. p. 102. — RAFFRAY, Proc. Linn. Soc.
N. S. Wales 1900, p. 181 Australie: Melbourne.
biclavata Raffray, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales,
4900, p. 479, pl. X, f. 46 Australie: New South Wales.
Groupe XII.
micans Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 4874, p. 497.
— Broun, Man. N. Zeal. Col. 1880, p. 426 Nue-Zelande.
Groupe XIII.
pattipes Raffray, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales.
4900, p. 178 Australie : New South Wales.
Espèces d'affinités douteuses.
atra King, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales. 4866, p. 309. Australie.
geminata King, loc. cit. p. 311
Victoriae King, loc. cit. p. 310
? inconspicua Schaufuss (Bryavis), Berl. Ent. Zeits.
1887, p. 294
? atomus Schaufuss (Bryaxis), loc. cit. p. 294 Bornéo.
spinifera Fauvel, Rev. d'Ent. 1903, p. 283
Nu-Calèdonie : Nouméa.

suturalis Fauvel, loc. cit. p. 284. . . . . Nuc-Calédonie : Tonghoné. trapezus Fauvel, loc. cit. p. 284. . . . . . Nuc-Calédonie : Noumea.

## Subg. Byraxis Reitt.

## Groupe XIV.

thoupe Mr.	
monstrosa Reitter, Verh, naturf, Ver, Brünn, XVIII,	
1879 (sep.), p. 3	Nº - Zelande.
clavata Broun (Bryawis), Man. N. Zeal. Col. 1880.	
р. 426	Nº10-Zélande.
platyarthra Brown, loc. cit. 4893, p. 1417.	
rudicornis Broux, loc. cit. Prt. 3, 4886, p. 759	Nº Zelande.
conspicua Brotn, loc. cit. Prt. 7, 1893. p. 4415	N <sup>tte</sup> -Zétande.
costata Broun, loc. cit. 4893, p. 1416	Nue-Zélande.
Groupe XV.	
crassicornis Brown, loc. cit. 1880, p. 429	N"e-Zélande.
impar Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 500	Nile-Zélande.
sanguinea Broux 'Bryaxis), Man. N. Zeal. Col. 1880,	
р. 132	Nile-Zelande.
fulvitarsis Brown, loc. cit. 1893, p. 1418.	
dispar Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874. p. 498.	
— Brown, loc. cit. 1880, р. 430 d	Nº Zelande.
Q ovalipennis Schaufuss, Nunq. ot. III, р. 501.	
glabrata Broun, Man. N. Zeal. Col. Prt. 3, 4886, p. 830.	N <sup>ne</sup> -Zélande.
nemoratis Brown, loc. cit. 1886. p. 831	Nº10-Zelande.
foveatissima Brotn, loc. cit. 1893, p. 1047	Nº - Zélande.
setifera Brown, Ann. Mag. Nat. Hist. 1893. p. 473	Nue-Zélande.
Groupe XVI.	
munda Broux (Bryaxis), Man. N. Zeal. Col. 1880,	
p. 129	Nie-Zélande.
mundula Brown, loc. cit. 4893, p. 1417.	
decens Broun, loc. cit. 1893, p. 4046	Nº Zélande.
forficulida Broun, loc. cit. p. 4047	Nº-Zélande.
diversa Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. 4893, p. 474	Nº Zélande

LECONTE, Trans. Amer. Ent. Soc. 4880, p. 435. -Brendel, Bull. Un. Iowa, 4890, I. p. 255.

Cylindrembolus Schaufuss, Tijds. Ent. XXX, 4887, p. 103. -Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 4896, pp. 257, 260.

Abryxis Raffray, Rev. d'Ent. 4890, pp. 419, 424.

## Groupe I.

marginalis Schaufuss, Tijds. Ent. XXX, p. 103. — Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. pp. 257, 260	Amazones.
subcarinatus (Schauf. in litt.) (Bryaxis), n. sp	Yucatan.
Groupe H.	

Bresil.

Schaufussi n. sp.....

Horni Leconte, Trans. Amer. Ent. Soc. 4880, p. 135.
Brendel. Bull. Un. Iowa, 4890, I. p. 255, pl. VII,
f. 36
simplex n. sp
Groupe III.
obliquus n. sp Mexique.
Groupe IV.
denticornis Schaufuss (Bryaxis), Nunq. ot. III.
p. 491. — Raffray (Abrywis) Yucatan.
clavicornis Raffray (Eupines). Ann. Soc. ent. Fr.
1896, p. 258, pl. XI, f. 40
clavatus n. sp Antilles : Grenada.
separabilis Schaufuss (Bryaxis), Tijds. Ent. XXX.
p. 429. — Raffray (Abryxis)
pectinicornis n. sp
adparatus Schaufuss (Bryavis). Tijds. Ent. XXX, p. 129
12
PSELAPITS
PSELAPTUS  Leconte Trans Ent Soc 4880 p 484 — Baffray
PSELAPTUS  Leconte, Trans. Ent. Soc. 4880, p. 484. — Raffray.  Ann. Soc. ent. Fr. 4896, pp. 257, 259, — Brendel.
Leconte, Trans. Ent. Soc. 4880, p. 484. — Raffray.
LECONTE, Trans. Ent. Soc. 4880, p. 484. — RAFFRAY.  Ann. Soc. ent. Fr. 4896, pp. 257, 259, — Brendel,  Bull. Un. Iowa, 4890, II, p. 2.  Belleagei Leconte, Trans. Am. Ent. Soc. 4880.
Leconte, Trans. Ent. Soc. 4880, p. 484. — Raffray. Ann. Soc. ent. Fr. 4896, pp. 257, 259, — Brendel., Bull. Un. 10wa, 4890, II, p. 2.
LECONTE, Trans. Ent. Soc. 4880, p. 484. — RAFFRAY.  Ann. Soc. ent. Fr. 4896, pp. 257, 259, — Brendel,  Bull. Un. Iowa, 4890, II, p. 2.  Belleagei Leconte, Trans. Am. Ent. Soc. 4880.
Leconte, Trans. Ent. Soc. 4880, p. 484. — Raffray. Ann. Soc. ent. Fr. 4896, pp. 257, 259, — Brendel., Bull. Un. Iowa, 4890, II, p. 2.  Beltragei Leconte, Trans. Am. Ent. Soc. 4880. p. 485. — Brendel. Bull. Un. Iowa, 4890, II, p. 2. Texas.  sternalis n. sp
Leconte, Trans. Ent. Soc. 4880, p. 484. — Raffray. Ann. Soc. ent. Fr. 4896, pp. 257, 259, — Brendel., Bull. Un. Iowa, 4890, II, p. 2.  Belfragei Leconte, Trans. Am. Ent. Soc. 1880. p. 485. — Brendel. Bull. Un. Iowa, 4890, II, p. 2.  sternalis n. sp
Leconte, Trans. Ent. Soc. 4880, p. 484. — Raffray. Ann. Soc. ent. Fr. 4896, pp. 257, 259, — Brendel, Bull. Un. Iowa, 4890, II, p. 2.  Beltragei Leconte, Trans. Am. Ent. Soc. 1880, p. 485. — Brendel. Bull. Un. Iowa, 4890, II, p. 2.  sternalis n. sp
Leconte. Trans. Ent. Soc. 4880, p. 484. — Raffray.  Ann. Soc. ent. Fr. 4896, pp. 257, 259, — Brendel.,  Bull. Un. Iowa, 4890, II, p. 2.  Belfragei Leconte, Trans. Am. Ent. Soc. 1880.  p. 485. — Brendel. Bull. Un. Iowa, 4890, II, p. 2.  sternalis n. sp
Leconte. Trans. Ent. Soc. 4880, p. 484. — Raffray. Ann. Soc. ent. Fr. 4896, pp. 257, 259, — Brendel., Bull. Un. Iowa, 4890, II, p. 2.  Belfragei Leconte, Trans. Am. Ent. Soc. 1880. p. 485. — Brendel. Bull. Un. Iowa, 4890, II, p. 2. Texas.  sternalis n. sp
Leconte, Trans. Ent. Soc. 4880, p. 484. — Raffray. Ann. Soc. ent. Fr. 4896, pp. 257, 259. — Brendel., Bull. Un. Iowa, 4890, II, p. 2.  Belfragei Leconte, Trans. Am. Ent. Soc. 4880. p. 485. — Brendel. Bull. Un. Iowa, 4890, II, p. 2. Texas.  sternalis n. sp
Leconte. Trans. Ent. Soc. 4880, p. 484. — Raffray. Ann. Soc. ent. Fr. 4896, pp. 257, 259, — Brendel., Bull. Un. Iowa, 4890, II, p. 2.  Belfragei Leconte, Trans. Am. Ent. Soc. 1880. p. 485. — Brendel. Bull. Un. Iowa, 4890, II, p. 2. Texas.  sternalis n. sp
Leconte. Trans. Ent. Soc. 4880, p. 484. — Raffray.  Ann. Soc. ent. Fr. 4896, pp. 257, 259, — Brendel.,  Bull. Un. Iowa, 4890, II, p. 2.  Belfragei Leconte, Trans. Am. Ent. Soc. 1880.  p. 485. — Brendel. Bull. Un. Iowa, 4890, II, p. 2. Texas.  sternalis n. sp. Antilles: Grenada.  cristatus Schaufuss (Bryaxis), Nunq. ot. III, p. 490.  — Raffr. (Entrichites). (error) Mexique.  batrisoides Sharp. Biol. Centr. Amer. Col. II (1),  p. 33, pl. 1, f. 17 Yucatan.  Grouvellei Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 1896, p. 259.  Brésil: Bahia.  longiciava Schaufuss (Bryaxis), Tijds. Ent. XXX,  p. 426, pl. IX, ff. 1, 4a. Cuba.  politissimus n. sp. Brésil: Blumenau.
Leconte. Trans. Ent. Soc. 4880, p. 484. — Raffray.  Ann. Soc. ent. Fr. 4896, pp. 257, 259, — Brendel.,  Bull. Un. Iowa, 4890, II, p. 2.  Belfragei Leconte, Trans. Am. Ent. Soc. 1880.  p. 485. — Brendel. Bull. Un. Iowa, 4890, II, p. 2. Texas.  sternalis n. sp. Antilles: Grenada.  cristatus Schauffuss (Bryaxis), Nunq. ot. III, p. 490.  — Raffr. (Entrichites). (error) Mexique.  batrisoides Sharp. Biol. Centr. Amer. Col. II (1),  p. 33, pl. l. f. 47. Yucatan.  Grouvellei Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 1896, p. 259.  Brésil: Bahia.  longiciava Schaufuss (Bryaxis), Tijds. Ent. XXX,  p. 426, pl. IX, ff. 1, 4a. Cuba.

A10 (001
calcaratus Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 1891, p. 315. Venezuela.
formicarius Raffray, Bull. Soc. ent. Fr. 4900.
p. 305
**Simulatrix Sharp (Bryaxis), Biol. Centr. Amer. Col. II (4), p. 31
40
EUTRICHITES
Leconte, Trans. Amer. Ent. Soc. 4880, p. 484. — Brendel, Bull. Un. Iowa, 4890, I, p. 256.
Zimmermanni Leconte, loc. cit. 1880, p. 184. — Brendel, loc. cit. p. 256, pl. VII, f. 37. — Casey. Bull. Cal. Ac. Sc. 4887, pl. XVI, f. 3  Amér. septentrionale: Virginie, Géorgie, Texas.
zonatus Brendel (Bythinus), Proc. Ent. Soc. Phil. 1865, p. 28; 1866, p. 33.
I EUPINOPSIS
Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 4896, pp. 257, 261; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 4900, p. 491.
<ul> <li>Perforata Schaufuss (Rytus), Nunq. ot. III. p. 540.</li> <li>Raffray, Proc. Lin. Soc. N. S. Wales, 4900.</li> <li>p. 491</li></ul>
punctata Raffray, loc. cit. p. 192, Australie: New South Wales.
2 ANCHYLARTHRON
Brendel, Trans. St-Louis Ac. 4883, V. p. 300. Verticinotus Brendel, Bull. Un. Iowa, 4890, II. p. 2.
cornutum Brendel. Proc. Ent. Soc. Phil. 4865. p. 31; Bull. Un. Iowa, II, p. 3, pl. IX, ff. 74, 75 o. Amér. septentrionale: Illinois, Iowa, Caroline. p. inornatum Brendel. Proc. Ent. Soc. Phil. 4865.
p. 258.  curtipenne Casey, Col. Not. VII, p. 644
eaviceps Casey, loc. cit. p. 612. Amér, septentrionale : Floride.

#### MITONA

quadraticeps n. sp	Haute-Bolivie : Yuracaris.
bisulciceps n. sp	Haute-Bolivie : Yuracaris.
Mniszechi n. sp	Colombie : Bogota.
nigra n. sp	Venezuela.

#### XYBARIS

Reitter, Deuts. Ent. Zeits. 1882, p. 143. — RAFFRAY, Ann. Soc. ent. Fr. 1896, p. 257.

spiniceps Reitter, Deuts, Ent. Zeits, 4882, p. 143, pl. V. f. 41..... Brésil : So-Paolo. triangulifera Schaufuss (Brya.cis), Tijds, Ent. XXX. p. 128..... Brésil : Minas Geraes. Sahlbergi Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 4882, p. 384..... Brésil: Petropolis. quadraticeps n. sp..... atomaria n. sp...... Brésil : Blumenau. troglocera Reitter, Deuts. Ent. Zeits. 1882, p. 144. 6

## CRYPTORHINELA

Schaufuss, Tijds. Ent. XXX, p. 149. - Raffray, Rev. d'Ent. 1890. pp. 119, 124; Ann. Soc. ent. Fr. 1896, p. 257.

nodifera Schaufuss, Tijds. Ent. XXX, p. 449	Brésil.
longiclava Raffray, Rev. d'Ent. 4890, p. 203, pl. II,	
f. 32	Brésil.

longiceps Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 1890, p. 313. ..... Venezuela : Caracas.

Schaufussi Raffray, loc. cit. 1896, p. 261. Brésil : Theresopolis. xibaroides n. sp..... Brésil : Blumenau.

trimioides Sharp (Bryaxis), Biol. Centr. Amer. p. 32. pl. I. f. 16..... Guatemala.

\* Oedipus Sharp (Bryaxis), loc, cit, p. 33..... Guatemala.

# RABYXIS

Raffray, Rev. d'Ent. 4890, p. 124.
striolata Raffray, Rev. d'Ent. 4890, p. 433
Madagascar : Fantoumizi.
simplex Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 1903, p. 317
Madagascar <sub>*</sub> sud : Forèt Tanala.
madecassa Raffray, Rev. d'Ent. 1896, p. 243
Madagascar : Tamatave.
clavata Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 4903, p. 347
heterocera Raffray, loc. cit. p. 318. Madagascar: Fort-Dauphin.
5 BRYAXELLA
Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 4903, p. 319.
spectralis Raffray, loc. cit. p. 349 Madagascar : côte est.
1 DUNNAR A
EUPINODA
Raffray, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 4900, p. 468.
Leana Raffray, loc. cit. p. 468, pl. X. f. 15
Australie ; New South Wales.
amplipes Raffray, loc. cit. p. 169, pl. X. ff. 12, 13.
Australie : New South Wales, South Australia.
4 diversicolor # Schaufuss (pro parte), Nunq. ot. III,
p. 499.
2 XYBARIDA
Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 4896, pp. 257, 260.
punctulum n. sp
clavata Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 4896, p. 260  Brésil: Matto Grosso.
pusilla Schaufuss (Bryaris), Nunq. ot. III, p. 491 Yuvalan.
3 STROMBOPSIS
breviventris n. sp
The state of the s
1

Chili.

#### NISAXIS

Casey, Bull. Cal. Ac. Sc. 4886, pp. 26, 27, Brendel, Bull. Un. Iowa, 4890, I. p. 257.

tomentosa Aubé (Bryaxis), Psel. Mon. 1833, p. 93, pl. XII, f. 4; Ann. Soc. ent. Fr. 1844, p. 443. — Brendel, Bull. Un. Iowa, I, p. 257, pl. XII, f. 128.

..... Amér. septentrionale.

Var. cincinnata Casey, Bull. Cal. Ac. Sc. 1887, p. 466, pl. XVI, f. 1. — Brendel, Bull. Un. Iowa, 1890,

I. p. 258... Amér. septentrionale : Texas, Illinois, Nebraska.

maritima Casey, Bull. Cal. Ac. Sc. 4887, p. 468...

...... Amér. septentrionale : Texas.

parviceps Casey, Col. Not. VII, 4897, p. 640......

..... Amér, septentrionale : Nebraska.

3

#### BRIARAXIS

Brendel, Ent. News 1894, p. 159.

depressa Brendel, loc. cit. p. 459, pl. V. f. 6.....

...... Amér. septentrionale : Dry Tortugas.

1

#### ACHILLIA

REITTER. Wien. Ent. Zeit. IX, 4890. p. 212. Byraxis Raffray. Rev. d'Ent. 4890. pp. 448, 423.

## Groupe I.

approximans Reitter. Deuts. Ent. Zeits. 1885.

p. 326, pl. II. f. 4..... Chili: Valdivia.

Groupe II.

Groupe III.

Kindermanni Reitter, Deuts. Ent. Zeits. 4883.

# Groupe IV.

tripunctata Reitter, Deuts. Ent. Zeits. 4885, p. 330.
Chili : Valdivia.
picea n. sp Chili : Valdivia.
quadraticeps n. sp
Elfridae (Reitter in. litt.), n. sp Chili: Valdivia.
Blanchardi nom. nov.
valdiviensis Reitter, Deuts. Ent. Zeits. 4883, p. 50,
pl. I, f. 89; 4885, p. 330, pl. II, f. 44 Chili: Valdivia.
Latifrons n. sp
Groupe V.
simulans Reitter, loc. cit. 1885, p. 328, pl. H. ff. 10,
40a
Groupe VI.
humidula Reitter. loc. cit. 4885, p. 329, pl. II, f. 43.  Chili: Valdivia.
bifossifrons Reitter, loc. cit. 4883, p. 50, pl. 1,
f. 9; 4885. p. 329
brevicornis n. sp
Groupe VII.
larvata Reitter, loc. cit. 4885, p. 330, pl. II, f. 15.
Chili : Valdivia.
cosmoptera Blanchard (Pselaphus) ap. Gay. Hist.
Chili, V. p. 563. — Reft. (Aplodea). — Raffray
(Tyropsis)
ff. 41, 42, 43.
Groupe VIII.
longiceps Reitter. loc. cit. p. 327. pl. H. f. 8 Chili: Valdiria.
Groupe IX.
<b>ргаесіага</b> Вентев. loc. cit. 4885, р. 329, рl. II, f. 42.
Chili : Valdiria.
Groupe X.
bituberculata Reitter, loc. cit. p. 330 Chiti: Valdivia.

Brésil.

## Groupe XI.

valdiviensis Blanchard (Pselaphus) ap. Gay. Hist.
Chili, V. p. 563. — Reitter (Aplodea). — Raffray
(Tyropsis, Chili: Valdivia,
anas Reitter. Wien, Ent. Zeit. 1885. p. 317.
nasuta Reitter, Deuts. Ent. Zeits. 1885, p. 327, pl. II.
f. 7.
nasina Reitter, Wien. Ent. Zeit. 1893, p. 261.
monstrata Reitter, Deuts. Ent. Zeits. 1885, p. 327.
pl. II, f. 6
Groupe XII.
puncticeps Rerrt. loc. cit. 4883, p. 50, pl. 1, f. 40;
1885, p. 326, pl. II, f. 5
and to make a first of the second of the sec
Groupe XIII.
validicornis Reitter, loc. cit. 1885, p. 328, pl. II.
f. 9 Chili : Valdivia.
excisa Schaufuss, Nunq. ot. III, p. 494
25
BRYAXINA
n ' ' T T T
torticornis u. sp Brésil : Theresopolis,
fraudatrix Schaufuss (Bryaxis), Nunq. ot. III,
p. 489 Brésil : Nouveau-Fribourg.
armiceps n. sp Brésil.
Lucida n. sp
clavata n. sp Brésil.
dimidiata n. sp
Schaufussi n. sp Bresil: Nouveau-Fribourg.
cavifrons Schaufuss (Bryaxis), Nunq. ot. III, p. 489.

..... Brésil : Nouveau-Friboury.

foveifrons n. sp.....

crassicornis n. sp.

#### BRAXYDA

## ANARMOXYS

RAFFRAY, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 1900, p. 166.

#### BRIARA

Reitter, Verh. naturf. Ver. Brünn, XX, 1881, p. 90. — Raffray, Rev. d'Ent. 1890, p. 423; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales. 4900, p. 462.

Gonatocerus | Schaufuss, Nunq. ot. III, p. 506.

capitata Raffray, loc. cit. p. 465, pl. X, f. 35......

Australie: New South Wales.

basalis ‡ Schaufuss (nec King), Tijds. Ent. XXIX. p. 281.

tertia Schaufuss, Tijds. Ent. XXIX, 4886, p. 279. — Raffray, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 4900, p. 464.

Wales, 4865, p. 473. — RAFFRAY, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 4865, p. 473. — RAFFRAY, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 4900, p. 466.

Australie.

breviuscula Schaufuss (Bryanis), Nunq. ot. III. p. 503.

ö

4

#### TRIBATUS

Motschulsky, Bull. Nat. Mosc. 4851, IV, p. 484.

Abatrisops Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 4881, p. 518.

91.	

thoracicus Morson, Mem. Soc. Nat. Mosc. V, p. 415.
pl. XVI, f. C. — Асве́, Ann. Soc. ent. Fr. 4844, р. 87.
- Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, p. 518 Caucase.
creticus Reitter, Wien. Ent. Zeit. 4884, p. 8; Verh.
z. b. Ges. Wien, 4884, p. 66
2
PHYSOPLECTUS
Reitter, Verh. naturf. Ver. Brünn, XX, 4881, p. 197.
armipes Raffray (Euplectus), Rev. d'Ent. 4882.
p. 81. — Reitter, Deuts. Ent. Zeits. 4885, pl. III,
f. 30
Thiamichia
TRIOMICRUS
Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 4883, p. 325.
cavernosus n. sp Chine: Shei Pon.
protervus Sharp, loc. cit. 1874, p. 421 Japon.
humilis n. sp Chine: Haining.
simplex Sharp, loc.cit. 1883, p. 326. — Waterhouse, Aid Identif. Ins. II, pl. 446
4
PEDINOPSIS
Raffray, Rev. d'Ent. 1890, p. 96.
major Raffray (Euplectus), Rev. d'Ent. 1882, p. 56:  1890, pl. II. f. 6
1
BRYAXONOMA
Raffray, Trans. S. Afr. Phil. Soc. 1898, p. 401.
filiceum Raffray, loc. cit. p. 402, pl. XVIII, f. 45
Le Cap : Muizenberg.
1
DRASINUS
binodutus n. sp
1

### **ECTOPOCERUS**

#### **EPHYMATA**

 mucronata
 Raffrav (Bryaxis), Rev. d'Ent. 4895,

 p. 41.....
 Singapore.

 4
 Singapore.

#### BRACHYGLUTA

THOMSON, Skand. Col. I, 4859. p. 54; AH, 4861, p. 236. — GANGLBAUER, Käf. Mitteleur. H, 4895, p. 807.

Bryaxis Aubé, Psel. Mon. 4883, p. 23; Ann. Soc. ent. Fr. 4844, p. 403. — Denny, Mon. Psel. 4825, p. 32. — Erichson, Köf. Mk. Brandbg. I, p. 268. — Jacq. Duyal, Gen. Col. Eur. II, p. 431. — Sauley, Spec. II, p. 436. — Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien. 4881, pp. 451, 454. — Raffray, Rev. d'Ent. 4890, pp. 418, 123.

Nisa Caser, Bull. Cal. Ac. Sc. 4886, p. 182.

## Groupe 1.

hemiptera Saulcy, Spec. II, p. 454. — Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 4881, p. 468........ Maroc: Tanger.

Гозѕи Тата Веіснемвасн, Моп. Psel. 4846, р. 54, рl. II, f. 43. — А∪ве́, Psel. Моп. 4833, р. 25, рl. 84, f. 3; Ann. Soc. ent. Fr. 4844, р. 406. — Denny, Mon. Psel. 4825, р. 37, рl. VIII, f. 4. — Евісняом, Ка́f. Мк. Brandbg. 4, р. 270. — Тномвом, Skand. Col. III. р. 236. — Sacley, Spec. II, р. 453. — Веіттев, Verh. z. b. Ges. Wien, 4884, р. 468. — Ganglbauer, Káf. Mittel. II, р. 809. . . . . Europe moyenne.? Brésil : So-Paolo. Var. aterrima Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 4884.

Var. rufescens Reitter, loc. cit. p. 462..... Hongrie: Marmaros.

haemoptera Aubé, Ann. Soc. ent. Fr. 4844, p. 408.

— Sauley, Spec. II, p. 450. — Reitter, Verh. z. b.

Ges. Wien, 1881, p. 468. — GANGLBAUER, Käf. Mitteleur. II, p. 809. France. Italie. Espagne.

(540) Genera et catalogue des Psetapatues. 21
xanthoptera Aubé, Psel. Mon. 4833, р. 49, рl. 83, f. 3.
? spinicowis Motsen. Nouv. Mém. Mosc. IV, 1835, pl. XI, f. D.
Langei Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 1884, p. 68. Syrie: Caïfa
Groupe II.
Hummleri Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien. 1900. p. 290
Revelierei Sauley, Spec. II, p. 147. —Reitter, Verh.
z. b. Ges. Wien, 1881, p. 466
syriaca Baudi. Berl. Ent. Zeits. 1849, p. 410. —
Sauley, Spec. II, p. 141. — Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, p. 467 Syrie. Asie Mineure. Chypre. Grece
Fuchsi Krauss, Verh. z. b. Ges. Wien, 4900, p. 291.
Dalmatie: Castelnuovo
dentiventris Sauley, Spec. II, p. 139. — Reitter,
Verh. z. b. Ges. Wien, 4881, p. 465
France mér <sup>te</sup> . Europe mér <sup>te</sup> . Algérie
tristis Hampe, Wien. Ent. Monatschr. VII, 4863,
р. 286. — Sauley, Spec. II, р. 457. — Reitter. Verh. z. b. Ges. Wien, 4881. р. 468. — Ganglbauer, Käf.
Mittel, II., p. 809 Croatie, Ligurie, France: Pyrénées, Jura.
nigricans Grebler, Käf. Tirol, 1863, p. 430 Tyrol
nigrescens Marseul, L'Abeille, 1872, p. 46
Sartorii Redtenb. Fn. Austr. III. p. 292
cotus Sauley, Spec. II, p. 148. — Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 4881. p. 466
Groupe III.
<b>apennina</b> Sauley, Sp. II, p. 146. — Reitter. Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, p. 466
Groupe IV.
minor Farmaire (Centrophthalmus), Bull. Soc. ent.
Fr. 4898, p. 637. — Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 4899, p. 516. — Madagascar : Suberbieville.

tibialis Aubé, Ann. Soc. ent. Fr. 1844, p. 106.

Sauley, Spec. II, p. 437. — Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 4884, p. 466. — Ganglbauer, Köf. Mittel. II, 4895, p. 808
hipponensis Sauley, Spec. II, p. 439. — Reitter, Ver. z. b. Ges. Wien, 4881, p. 468
p. 491. — Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 4881, p. 467
Waterhousei Rye ap. Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 4884, p. 467. — Ganglbauer, Käf. Mitteleur. II, 4895, p. 809
simples Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 4862, p. 135. Sauley, Spec. II, p. 456.  maxima Reitter, Deuts. Ent. Zeits. 1884, p. 48 Grèce.
Groupe V.
Groupe V.  Perrier1 Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 1899, p. 516.  Madagascar : Suberbieville.
Perrierl Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 1899, p. 516.
Perrierl Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 1899, p. 516.  Madagascar: Suberbieville.  trochalis Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 1903, p. 320.
Perrierl Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 1899, p. 516.  Madagascar : Suberbieville.  trochalis Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 1903, p. 320.  Madagascar sud : Forêt Tanala.  trifoveata Raffray, Rev. d'Ent. 1896, p. 247.  Madagascar : Fantoumizi.  dichroa Saulcy. Spec. II, p. 444. — Reitter, Verh.  z. b. Ges. Wien, 1881, p. 465 Algérie : Bône, Oran, Alger.
Perrierl Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 1899, p. 516.  Madagascar: Suberbieville.  trochalis Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 1903, p. 320.  Madagascar sud: Foret Tanala.  trifoveata Raffray, Rev. d'Ent. 1896, p. 247.  Madagascar: Fantoumizi.  dichroa Sauley. Spec. II, p. 144. — Reitter, Verh.
Perrierl Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 1899, p. 516.  Madagascar: Suberbieville.  trochalis Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 1903, p. 320.  Madagascar sud: Forêt Tanala.  trifoveata Raffray, Rev. d'Ent. 1896, p. 247.  Madagascar: Fantoumizi.  dichroa Saulcy. Spec. II, p. 444. — Reitter, Verh.  z. b. Ges. Wien, 1881, p. 465.  Algérie: Bône, Oran, Alger.  celtiberica Saulcy, Spec. II, p. 1449. — Reitter,

Lefebvrei Aubé, Psel. Mon. 1833, p. 28, pl. 83, f. 1;
Ann. Soc. ent. Fr., 1844, p. 108. — Sauley, Spec. II.
p. 152. — Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881.
p. 465. — Ganglbauer, Käf. Mitteleur. II, p. 808.
Europe, Algérie,
Guillemardi Sauley, Spec. II, p. 151. — Reitter.
Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, p. 467. — GANGLBAUER.
Käf. Mittel. II, p. 808. France. Alsace. Italie. Dalmatie. Algérie.
carmelitana Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 1884.
p. 67 Syrie : Caïfa.
Groupe VI.
corsica Sauley, Spec. II, p. 155. — Reitter, Verh.
z. b. Ges. Wien, 1881, p. 465
Groupe VII.
Pandellei Sauley, Spec. II, p. 148. — Reitter, Verh.
z. b. Ges. Wien, 1881, p. 466. France: Pyrenées.
numidica Sauley, Spec. II, p. 142. — Refter,
Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, p. 467
Lederi Sauley, Spec. II, p. 145. — Reitter, Verh. z.
b. Ges. Wien, 1881, p. 46
tetuanica Beitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 1884,
p. 68
Groupe VIII.
Ragusae Sauley, Spec. II, p. 463. — Reitter. loc.
cit. p. 472
Galathea Sauley, loc. cit. p. 186. — Reitter, loc.
cit. p. 472 Sicile.
Groupe IX.
Espèces paléarctiques.
kabyliana Raffray, Rev. Mag. Zool, 1873, p. 364.
pl. XV, f. 3. — Sauley, Spec. II, p. 177. — Reit-
TER, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, p. 469 Algérie : Kabylie.
colchica Sauley, Spec. H. p. 476. Reitter, Verh.
z. b. Ges. Wien, 1881, p. 474

nodiventris Reitter, Wien. Ent. Zeit. 1899, p. 274. Turkestan.
Araxidis Reitter, Douts, Ent. Zeits, 1889, p. 19
Arménie : Araxe.
paludosa Peyron, Soc. Ent. Fr. 4858, p. 416
Syrie, Chypre, Grece,
gibbera Baudi, Berl. Ent. Zeits. 4869, p. 411. — Sauley, Spec. II, p. 459. — Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, p. 469.
Helferi Schmidt, De Psel. Fn. Prag. 1836, p. 33.
pl. II., f. 14. — Aubé, Ann. Soc. ent. Fr. 4844, p. 409. — Sauley, Spec. II. p. 460. — Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, p. 469. — Ganglbauer, Käf, Mitteleur. II. p. 810. Bassin de la Méditerranée, 
longispina Reitter. Deuts. Ent. Zeits. 1884, p. 106;
Verh. z. b. Ges. Wien, 1884, p. 68. — GANGLBAUER. Käf. Mittel. II. p. 810
transversalis Schaum, Berl, Ent. Zeits. 1859, p. 48.
— Sauley, Spec. II. p. 161. — Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, p. 469. — Ganglbauer, Käf. Mit- tel. II. p. 810
Retowskyi H. Simon, Wien, Ent. Zeit, II, 1883, p. 8. Crimie.
mauritanica Sauley, Spec. II, p. 166. — Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, p. 472
sardoa Sauley, loc. cit. p. 166. — Reitter, loc. cit. p. 474
Wilbergi Reitter. Wien. Eut. Zeit, 1891, p. 141 Taschkent.
Thagoni Sauley, loc. cit. p. 189. — Reitter, loc. cit. p. 474
Schüppeli Aubé, Ann. Soc. ent. Fr. 1844, p. 110.— Sauley, Spec. II. p. 162.— Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, p. 471.— Ganglbauer, Käf. Mittel. II. p. 810
Klimschl Holdhaus, Verh. z. b. Ges. Wien, 1902.
p. 200 Carinthie et Styrie septentrionales.
Aubel Tournier, Ann. Soc. ent. Fr. 1867, p. 363. —

Sauley, Spec. H. p. 470. — Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 4881. p. 473 Sicile. Sardaigu	e Maérie
Var. Pici n. var	Tunis.
globulicollis Mulsant et Rey, Op. XII, p. 71. Saulcy, Spec. II. p. 471. — Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 1884, p. 473. — Ganglbauer, Käf. Mittel, II, p. 814.	
France mér <sup>te</sup> , Corse, Sardaigne, Italie, Sicile	. Algérie.
carthagenica Sauley, Spec. II, p. 168. — Reitter. loc. cit. p. 472.	Espagne.
Balcanica Saulov, Deuts. Ent. Zeits. 1878, p. 41. — Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 4881, p. 474	Balkans.
cavernosa Sauley, loc. cit. p. 164. — Reitter, loc. cit. p. 472	: Athènes.
Diecki Sauley, loc. cit. p. 487. — Reitter, loc. cit. p. 471	ntrionale.
<b>Croissandeaui</b> (1) Reitter, Deuts, Ent. Zeits, 1887, p. 267 France: S'-Martin-L	Lantosque.
haematica Leach, Zool. Misc. III, p. 86. — Reichenbach, Mon. Psel. 4846, p. 52, pl. 2, f. 42. — Denny, Mon. Psel. 4825, p. 26, pl. VIII, f. 5. — Aube. Psel. Mon. 4833, p. 26, pl. 82, f. 4; Ann. Soc. ent. Fr. 1844, p. 410. — Erichs. Käf, Mk. Brandbg. p. 269. — Thomson, Skand. Col. III, p. 237. — Saulcy, Spec. II, p. 473. — Jacq. Duval, Gen. Col. Eur. I. pl. 41, f. 204. — Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 4881, p. 473. — Ganglbauer, Käf. Mittel. II, p. 814. ♂ emarginata Foerster, Verh. Preuss. Rheinld. VIII, p. 39.	
Var. ♂ perforata Aubé, Psel. Mon. p. 27, pl. 82, f. 4°.  palustris Rett. Verh. z. b. Ges. Wien, 4884, p. 472.  obscura Dejean, Cat. Ed. 3, p. 465 Amér. septie??  Var. ♂ bidenticulata Aubé, Psel. Mon. p. 27, pl. 82,  f. 4°	Europe.  Dalmatic.
(1) By Caning alogari act part the identities is By Directi Care	

<sup>(1)</sup> Br. Croissandeaui est peut-être identique à Br. Diecki Saulcy, mais je ne connais pas cette dernière espèce.

Var. of tuberiventris Raffray, Rev. Mag. Zool. 1873,
p. 365, pl. XV, f. 2
Var. & sinuata Aubé. Psel. Mon. 1833, p. 27, pl. 82.
f. 1° Europe méridionale.
Var. 👩 nodosa Moтsen. Mém. Soc. Nat. Mosc. IV,
р. 345, pl. 9, f. В. — Sauley, Spec. II, р. 475. — Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 4881, р. 474. Russie : Caucase.
Var. o trigonoprocta Ganglbauer, Käf. Mittel. II, p. 811
tuberculata Baudi, Berl. Ent. Zeits. 4869, p. 412. —
SAULCY, Spec. II, p. 463. — REITTER, Verh. z. b. Ges.
Wien, 4881, p. 473 Chypre. Syrie: Caïfa.
Pirazzolii Sauley, Spec. II, p. 484. — Reitter,
Verh. z. b. Ges. Wien, 4881, p. 471 Italie: Toscane.
Leprieuri Sauley, Spec. II, p. 478. — Reitter, loc.
cit. p. 470 Algérie : Bône. Tunis.
Var, elevata n. var
Breiti Holdhaus, Verh. z. b. Ges. Wien, 1902, p. 499.  Autriche: Wien.
foveiventris Raffray, Rev. d'Ent. 4882, p. 33 Abyssinie.
Picciolii Sauley, Spec. II, p. 183. — Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, p. 470
Reichei Morsch Bull Soc ent Fr 4859 p cevi
Reichei Motsch. Bull. Soc. ent. Fr. 4859. p. ccvi. — Saulcy, Spec. II, p. 479. — Reitter, Verh. z. b.
The state of the s
— Saulcy, Spec. II, p. 479. — Reitter, Verh. z. b.
— Sauley, Spec. II, p. 479. — Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 4881, p. 470
— Sauley, Spec. II, p. 479. — Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 4881, p. 470
— Sauley, Spec. II, p. 479. — Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 4881, p. 470
— Saulcy, Spec. II, p. 479. — Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 4884, p. 470
— Sauley, Spec. II, p. 479. — Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 4881, p. 470
— Sauley, Spec. II, p. 479. — Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 4884, p. 470
— Sauley, Spec. II, p. 479. — Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 4881, p. 470

no

in

la

ill

de

in te:

fo

Be

in lo te

A

f. 2. — Brendel, Bull. Un. Iowa, I, p. 278, pl. VIII,
f. 51 Amér. septentrionale : États de l'Atlantique.
dentata Aubé (nec Say). Ann. Soc. ent. Fr. 1844.
р. 112.
oridana Brendel, Proc. Ent. Soc. Phil. 1865, p. 257;
4866, p. 194; Bull. Un. Iowa, I. p. 278, pl. VIII.
1. 53 Floride.
termedia Brender, Bull. Un. Iowa, p. 279, pl. VIII.
f. 52 États de l'Atlantique.
byrinthea Casey, Col. Not. V. 1893, p. 477 New York.
Ikei Brendel, Proc. Soc. Phil. 1866, p. 193; Bull.
Un. Iowa, I, p. 280, pl. VIII, f. 54 Maryland. Virginie.
linoiensis Brendel, loc. cit. 4865, p. 257; 4866,
p. 194; Bull. Un. Iowa, I. p. 281, pl. VIII, f. 55.
Amér. septentrionale.
entata Say, Journ. Ac. Phil. IV, p. 99 Le-
CONTE, Bost. Journ. Nat. Hist. VI, p. 85 Bren-
DEL. Proc. Ent. Soc. Phil. 1866, p. 194; Bull. Un.
lowa, p. 282, pl. VIII, f. 36 États de l'Atlantique.
tricata Casey, Col. Not. V. 4893, p. 479 New York.
rebrata Casey, Col. Not. V. 1893, p. 481
perforata   Brendel. Proc. Ent. Soc. Phil. 1866.
p. 492; Bull. Un. Iowa, I. p. 282, pl. 1X, f. 58.
veata Leconte, Ann. Lyc. Nat. Hist. V, p. 215. —
Brendel, Bull. Un. Iowa, I. p. 283
eguta Casey, Col. Not. VII, 4897, p. 585 Michigan. Pensylvanie.
elfragei Leconte, Trans. Am. Ent. Soc. 4880.
p. 181. — Brendel, Bull. Un. Iowa, I. p. 284.
pl. IX, f. 57 Louisiane, Texas.
finita Casey, Bull. Cal. Ac. Sc. 1886, p. 184 Texus.
ripes Casey, Col. Not. V. 1893, p. 480 Californie sud.
xana Casey, Bull. Cal. Ac. Sc. 4886, p. 183; Col.
Not. V. 4893, p. 480 Texas. Nouveau-Mexique.
rizonae Casey, Bull. Cal. Ac. Sc. 1887, p. 465;
Series of the se
Ann. Soc. Ent. Fr., LXXIII [1904].

## Groupe X.

<b>caligata</b> Sauley, Spec. I. p. 137. — Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, p. 469
Groupe XI.
labiata Raffray, Rev. d'Ent. 4896, p. 248
Hudiger Leconte (Nisa Casey). Bost. Journ. VI, p. 87.  — Brendel. Bull. Un. Iowa, p. 275, pl. VIII, f. 50.  Maryland. Virginie.  cavicornis Brendel., Proc. Ent. Soc. Phil. 4865, p. 30; 4866, p. 34; Bull. Un. Iowa, I, p. 275.
pl. VIII, f. 49
perpunctata Brendel. Bull. Un. Iowa, I. p. 275
elegans Brendel, loc. cit. p. 276, pl. VIII, f. 48
Amér. septentrionale : Arizona.
89 BUNODERUS
carinicollis n. sp Mexique.
longipilis n. sp
NODULINA NODULINA
convexa Schaufuss (Bryaxis), Nunq. ot. III. p. 487; Tijds. Ent. XXX, 1887, p. 431 Brésil: Minas Geraes, Amazones. Surinam.
1 ACAMALDES
Reitter, Deuts, Ent. Zeits, XXVI, 1882, p. 491.
bythinoides Reitter, loc. cit. p. 491, pl. 1X, f. 8  Afr. occidentale: Ouida.

## REICHENBACHIA

..... Afr. occidentale : Gabon.

vagepunctatus Raffray, Rev. d'Ent. 1896, p. 249.

2

LEACH, Zool. Journ. II, 1826, p. 451. — SAULEY, Spec. II, p. 136. — RAFFRAY, Rev. d'Ent. 1890, p. 118; Trans. S. Afr. Phil. Soc. 4897, p. 90. - REITTER. Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, p. 474. — GANGLBAUER, Käf. Mitteleur. II, 4895, p. 807. Bryaxis auctorum (pro parte).

Dicrobia Thomson, Skand. Col. I, 1859, p. 54; III, p. 237.

Groupe I.
bifossa Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 1903, p. 321
Madayascar : Fort-Dauphin.
hova Raffray, Rev. d'Ent. 1896, p. 244. Madagascar : Namaloum.
decursa Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 1899, p. 518
Madagascar : Suberbieville.
rupestris Raffray, Rev. d'Ent. 1896, p. 238. Abyssinie: Geralla.
Groupe II.
Quedenfeldti Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881,
p. 477
gemmifer Leconte, Trans. Amer. Ent. Soc. 1880.
p. 182. — Brendel, Bull. Un. Iowa, I, p. 287
Amér. septentrionale : Iowa, Michigan.
canadensis Brendel. Bull. Un. Iowa, I. p. 286
, Amér. septentrionale : Canada.
cylindrarthrus Brendel. Trans. Am. Eut. Soc.
1893, p. 279 Amér, septentrionale : Illinois.
O'Neili Raffray, Trans. S. Afr. Phil. Soc. 1897.
p. 413 Le Cap : Uitenhage.
radians Leconte, Trans. Am. Ent. Soc. 1880, p. 182.
subsimilis Casey, Col. Not. VII. 1897, p. 594
atlantica Brendel, Proc. Ent. Soc. Phil. 1866, p. 413; Bull. Un. Iowa, I, 4890, p. 288. Amér. septentrionale: Louisiane.
p. 182. — Brendel, Bull. Un. Iowa, I. p. 288
Amér. septentrionale : Iowa, Massachusetts,
* trigona Leconte, Trans. Am. Ent. Soc. 1880, p. 182.
— Brendel, Bull. Un. Iowa, I. p. 288
Amér. septentrionale : Iowa, Massachusetts.

* bicolor Brendel, Bull. Un. Iowa, I. p. 294
Amér, septentrionale : Iowa.
congener Brendel, Proc. Ent. Soc. Phil. 4865, p. 257;
Bull. Un. Iowa. I. 1890, p. 292. pl. IX, f. 61
Amér. septentrionale : Iowa, Massachusetts.
facilis Casey, Contr. Descr. Col. N. Amer. II, p. 87.
Amér. septentrionale.
morio Reitter. Deuts. Ent. Zeits. 1884, p. 107 Corfon.
Groupe III.
Schlerethi Reitter, Deuts. Ent. Zeits. 1882, p. 189.
Afr. occidentale : Côte de l'Or.
addahensis n. sp
nilotica Motsch. Bull. Nat. Mosc. 4851, p. 492. —
SAULCY, Spec. II, p. 88. — REITTER, Verh. z. b.
Ges. Wien, 4881, p. 475 Égypte.
aegyptiaca. Мотscн. loc. cit. p. 492.
subpubescens Raffray, Trans. S. Afr. Phil. Soc.
4897, p. 93
rivularis Raffray, loc. cit. 1897, p. 429; 1898,
pp. 401, 413 Le Cap : Stellenbosch, Uitenhage.
nava n. sp
infelix n. sp Afr. occidentale : Côte de l'Or.
spinipes Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 1884.
p. 69 Caspienne. Lenkoran.
p. one Denovien
Groupe IV.
scabra Brendel, Proc. Ent. Soc. Phil. 4865. p. 29;
Bull. Un. Iowa, I, p. 291, pl. IX, f. 62 Amér. septentrionale.
cribricottis Brendel, Bull. Un. Iowa, I. p. 291
Amér. septentrionale : Régions de l'Atlantique nord.
Marshalli Raffray, Ann. S. Afr. Mus. 1901, p. 424.
rubicunda Aubé, Ann. Soc. ent. Fr. 4844, p. 446.
- Leconte, Bost. Jour. Nat. Hist. VI. p. 88
Brendel, Bull. Un. Iowa, I, 4890, p. 293
Amér. septentrionale : Pensylvanie.

fusciventris Casey, Col. Not. VII, 1897, p. 599
Amér, septentrionale : New York.
insolita Casey, loc. cit. 1897, p. 597
abyssinica Raffray, Rev. Mag. Zool. 1877, p. 44, pl. 3, f. 47; Rev. d'Ent. 4896, p. 237
Opuntiae Schmidt, Psel. Fn. Prag. 1836, p. 31.— Aubé, Ann. Soc. ent. Fr. 4844, p. 415.— Saulet, Spec. II, p. 91.— Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 4881, p. 477
impressa Panzer, Fn. Ins. Germ. p. 89, 40. — Denny,
Mon. Psel. 4825, p. 36, pl. VII. f. 4. — Aubé, Psel. Mon. 4833, p. 31, pl. 84, f. 1; Ann. Soc. ent. Fr. 4844, p. 147. — Erichson, Käf. Mk. Brandbg. I, p. 270. — Thomson, Skand. Col. III, p. 237. — Saulcy, Spec. II, p. 92. — Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 4881, p. 476. — Ganglbauer, Käf. Mitteleur, II, p. 813
punctipennis Raffray, Rev. d'Ent. 1896, p. 241 Zanzibar.
semirugosa Brendel, Ent. News, Phil. 1895, p. 183.
Amér, septentrionale.
decipiens Raffray, Rev. d'Ent. 1896, p. 241 Zanzibar.
dimidiata Raffray, Ann. S. Afr. Mus. 4901, p. 123.
Rhodesia : Salisbury.
Peringueyi Raffray, Trans. S. Afr. Phil. Soc. 4897, p. 95
<b>Zambeziana</b> Raffray, Trans. S. Afr. Phil. Soc.  1898, p. 400
parva C. Schaufuss, Cat. Psel. p. 29
pulla   Raffr. Rev. d'Ent. 1882, p. 27; 1896, p. 238.
kansana Casey, Col. Not. VII, 1897, p. 595
Amér. septentrionale : Kansas.

gracilis Casey, Contr. Descr. Col. 1884, p. 32
Brendel, Bull. Un. Iowa, I. p. 290, pl. IX, f. 60
Amér. septentrionale : Michigan, Illinois, Iowa, Louisiane.
ursina Casey, Col. Not. VII. 1897, p. 596
Amér. septentrionale : Ouest du Missouri.
graciticornis Casey, Bull. Cal. Ac. Sc. 4886, p. 490.
Amér. septentrionale : Texas.
inepta Casey, Col. Not. V. 4893, p. 484
Amér, septentrionale : New Jersey
sodalis Casey, Col. Not. VII, 4897. p. 598
peregrinator Casey, Col. Not. VII, 4897, p. 599
Amér. septentrionale : Iowa, Nebraska, Dakota.
furtiva Casey, loc. cit. V, 1893, p. 483
Amér. septentrionale : Pensylvanie.
Achillis C. Schaufuss, Cat. Psel. p. 20. — Raffray.
Trans. S. Afr. Phil. Soc. 4897, p. 399
Le Cap : Stellenbosch, Cape Town.
crassipes    Raffray, Rev. d'Ent. 1887, p. 36.
Var. Q bimucronata Raffray, Trans. S. Afr. Phil.
Soc. 1897. p. 400
Var. ♂ ⊊ inferior Raffray, loc. cit. p. 400 Port Elizabeth.
negligens Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 1883.
p. 403 Bornéo.
subvalida Reitter, loc. cit. p. 404 Bornéo: Telang.
breviventris n. sp Sumatra : Palembang.
sternalis Raffray, Rev. d'Ent. 1896, p. 240 Zanzibar.
Groupe V.
puncticollis Leconte, Bost. Journ. VI, p. 87
Brendel, Bull. Un. Iowa, I. 4890, p. 295
Amér, septentrionale : Est du Mississipi.
laticollis Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 4891, p. 491,
pl. XIV, ff. 45, 45 <sup>a</sup>
manillensis Raffray, loc. cit. p. 490, pl. XIV, ff. 44.
14° Manille.

borealis Casey, Col. Not. VII, 1897, p. 601	1
	tenusetts.
Amér. septentrionale : Michigan,	Canada.
litoralis Brendel, Bull. Un. Iowa, I, 1890, p. 296  Amér. septentrionale: Texas,	Virginie.
inopia Casey, Contr. Descr. Col. N. Amer. p. 33; Bull. Cal. Ac. Sc. 1886, p. 183.	
distans Casey, Col. Not. VII, 1897, p. 602	Canada.
demissa Casey, Col. Not. V, 1893, p. 485	Columbia.
ingrata Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 1883, p. 403.	Java.
punctithorax Reitter, loc. cit. 1882, p. 290	Bornéo.
procera Casey, Col. Not. VII, p. 603. Amér. septentrionale	: Iowa?.
Groupe VI.	
Grabowskyi Reitter, Verh z. b. Ges. Wien, 1882,	
p. 289	Bornéo.
munda Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 122.	Japon.
fulva Schaufess, Berl. Ent. Zeits. 1887, р. 292. — Мотs. (in litt.), Bull. Nat. Mosc. 1851, IV, р. 493. —	
Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 1891, p. 490, pl. XIV, ff. 49, 49a	Birmanie.
bengalensis n. sp	
notha Raffray, Ann. Mus. Nat. Hung. Budapest, 1903, p. 65	
Groupe VII.	Zin ( ) () (ii) ,
The state of the s	
p. 97. — Sauley, Spec. II, p. 89. — Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 4881, p. 475. — Ganglbauer, Käf.	
Mitteleur. II, 4895, p. 843	Suisse.
Schaufussi Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 1882,	
p. 289 Sumatra. S extuscurrata Schaufuss, Tijds. Ent. XXX, p. 114.	Singapore.
mamilla Schaufuss, Psel. Siams, 1877, p. 9. — Raf-	

FRAY, Ann. Soc. ent. Fr. 1891, p. 489, pl. XIV,
ff. 10, 10° Siam.
curta Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 124 Japon.
obtusa Raffray, Rev. Mag. Zool. 4877, p. 41; Rev.
Abyssinie : Samarh, Keren, Enderta, Haut Mareb, Djibouti.
zanzibarica Raffray, Rev. d'Ent. 4896, p. 242 Zanzibar.
infossa n. sp Sumatra : Palembang.
intuscurvata Schaufuss,, Tijds. Ent. XXX, p. 445. Sumatra.
? Var. aurita Schaufuss, loc. cit. p. 415 Sumatra.
montana Sauley, Spec. II, p. 494. — Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, p. 476
Groupe VIII.
Castelnaui Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 4891, p. 489,
pl. XIV, ff. 13, 13a Siam.
mavortia Raffray, Ann. Mus. Nat. Hung. Budapest, 1903, p. 67
Groupe IX.
pubescens Schaufuss, Nunq. ot. III, p. 492 Mexique.
Grouvellei n. sp Mexique.
invalida Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 1882, p. 288. Bornéo.
nitella n. sp Sumatra : Palembang.
boliviensis n. sp
pygidialis n. sp
Groupe X.
villosula Raffray, Rev. d'Ent. 1882, p. 34
cicatricosa n. sp. Sumatra : Palembang.
Aubeana Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 1890, p. 312  Venezuela: Caracas, S <sup>n</sup> -Esteban.
Groupe XI.
semipunctata Raffray, Ann. Mus. Nat. Hung. Bu-
dapest, 1903, p. 64 N <sup>tle</sup> -Guinée : Golfe Huon.

acinosa Raffray, loc. cit. p. 66 Nue-Guinée : Golfe Huon.
Indecora Raffray, loc. cit. p. 67. Noc-Guinée : Baie de l'Astrolabe.
defossa Raffray, loc. cit. p. 65 N <sup>the</sup> -Guinée: Baie de l'Astrolabe.
obstipa Raffray, loc. cit. p. 66 Nº Guinée : Baie de l'Astrolabe.
egena Raffray, loc. cit. p. 67 Nue-Guinée : Golfe Huon.
muscorum n. sp Penang.
sinuatipes Raffray, Ann. Mus. Nat. Hung. Buda- pest, 4903. p. 68
Groupe XII.
ecarinata Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 1903, p. 322.
Madagascar sud : Forèt Tanala.
parallela Raffray, Rev. d'Ent. 4896, p. 240 Zanzibar.
pulla Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 432 Japon.
Groupe XIII.
rufa Schmidt-Goebel, Beitr. Mon. Psel. p. 6, pl. I,
f. 44. — Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 1882,
p. 287. — Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 4894, p. 486,
pl. XIV, ff. 8-8°. — Schaufuss, Berl. Ent. Zeits. 4887, p. 289
Singapore, Célèbes, Siam, Manille, Annam, Syrie?
affinissima Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 1883,
p. 402 Bornio.
amitta Reitter, loc. cit. 1883, p. 403 Bornéo, Sumatra.
Groupe XIV.
punctulata Raffray, Rev. d'Ent. 1896, p. 242 Zanzibar.
discreta Raffray, Trans. Phil. Soc. S. Afr. 1897,
p. 93; Ann. S. Afr. Mus. 1901, p. 424 Rhodesia: Salisbury.
budha Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 1891, p. 487 Siam.
Groupe XV.
multifora Raffray, Ann. Mus. Nat. Hung. Budapest, 1903, p. 71
Groupe XVI.
juncorum Leach, Zool. Misc. III, 1817, p. 86; Zool.
Journ. II. 1826, p. 452. — Aubé, Psel. Mon. 1833,
*

p. 32, pl. 84, f. 3; Ann. Soc. ent. Fr. 4844, p. 413.  — Erichson, Käf. Mk. Brandbg. I, p. 271. — Thomson, Skand. Col. III, p. 288. — Sauley, Spec. II, p. 82. — Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881. p. 475. — Ganglbauer, Käf. Mitteleur. II, 4895, p. 812
nigriventris Schaum, Berl. Ent. Zeits. 4859, p. 49.
— Sauley, Spec. II. p. 83. — Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, p. 475. — Ganglbauer, Käf. Mittel. II, 1895, p. 812 Europe méridionale. Algérie.
Groupe XVII.
curvipes n. sp
Groupe XVIII.
Edithae Reitter, Deuts. Ent. Zeits. 4887, p. 268
Caucase méridional, oriental.
arabica n. sp Arabie : La Hadj.
Chevrieri Aubė, Ann. Soc. ent. Fr. 4844, p. 414. — Saulcy, Spec. II, p. 84. — Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, p. 475. — Ganglbauer, Käf. Mittel. II, 4895, p. 813
telangensis Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 4883.
p. 402 Bornéo.
arcolata Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 4893, p. 493. Sumutra nord.
viduana Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 4897, p. 266 Madayascar : Diégo-Suarez.
Groupe XIX.
usitata Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. p. 267
Madayascar centre, sud : Diégo Suarez.
tanalensis Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 1903, p. 323.  Madagascar Sud : Forêt Tanala.
Alluaudi Raffray, loc. cit. p. 324. Madayascar Sud : Forêt Tanala.
analis Raffray, Rev. d'Ent. 1896, p. 244 Madagascar.

# Groupe XX.

estebanensis Raffray. Ann. Soc. ent. Fr. 4890, p. 312 Venezuela: S <sup>n</sup> -Esteban. Brésil: Amazones.
irrita n. sp
luteola n. sp
loti Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 1891. p. 488, pl. XIV,
1. 12, 12 <sup>a</sup>
dentipes Baudi, Berl. Ent. Zeits. 4869, p. 413. —
Saulcy, Spec. II, p. 86. — Reitter, Verh. z. b. Ges.
Wien, 4881, p. 476
Groupe XXI.
Goryi Acbé, Psel. Mon. 4833, p. 30, pl. 83, f. 4. — Schaufuss, Tijds. Ent. XXX, 4887, p. 437
? parviceps Sharp, Biol. Centr. Amer. Col. II (1,
1887, p. 25
rubra Aubé, Ann. Soc. ent. Fr. 4844, р. 115. — Schau-
russ, Tijds. Ent. XXX, 1887, p. 434 Bresil.
subnitida Schaufuss, Tijds. Ent. XXX. p. 434 Amazones.
semisanguinea Schaufuss, Tijds. Ent. XXX,
p. 133 5 Brésil.
2 Minassanae Schaufuss, loc. cit. p. 133.
Chevrolati n. sp
tenuicornis Schaufuss, Tijds. Ent. XXX, p. 437 Amazones.
pilosa n. sp
pilosella Raffray (nec Schaufuss), Ann. Soc. ent. Fr. 1890, p. 312.
pilosella Schaufuss, Nunq. ot. II, p. 262. Venezuela: Cumana.
subfoveolata Schaufuss, Nunq. et. II, p. 262
Nouvelle-Grenade
illepida n. sp
Groupe XXII.
moluccana Raffray, Rev. d'Ent. 4882, p. 35. Moluques : Gilolo.
mallicolensis Raffray, Bull. Soc. ent. Fr. 4896,
p. 299

misella Raffray, Ann. Mus. Nat. Hung. Budapest, 1903, p. 73
marcida Raffray, loc. cit. p. 72. N <sup>th</sup> -Guinée : Baie de l'Astrolabe.
compacta Baffray, loc. cit. p. 72. N <sup>th</sup> -Guinée: Baie de l'Astrolabe.
Groupe XXIII.
impedita Raffray, loc. cit. p. 73. Nº-Guinée: Baie de l'Astrolabe.
abluta Raffray, loc. cit. p. 74 Nue-Guinée : Golfe Huon.
? regularis Schaufuss, Ann. Mus. Civ. Gen. XVIII,
4883, p. 364 Amboine.
Groupe XXIV.
expanda Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 1882. p. 288
cordata Schaufuss, Psel. Siams, 1877, p. 9. — Raf-
Fray, Ann. Soc. ent. Fr. 4891, p. 487, pl. XIV,
ff. 11, 11°
singapuriensis Raffray, Rev. d'Ent. 1895, p. 42 Singapore.
Groupe XXV.
gibblecollis Raffray, Rev. d'Ent. 4896, p. 245
Coquereli Raffray, loc. cit. p. 246 Madagascar : StMarie.
Goudoti Raffray, loc. cit. p. 245 Madagascar.
Imerinae Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 4899, p. 547
mateola Raffray, loc. cit. p. 547 Madagascar: Suberbieville.
Groupe XXVI.
lacernata Raffray, Ann. Mus. Nat. Hung. Buda-
pest, 4903, p. 68
infanda Raffray, loc. cit. p. 69 Nue-Guinée : Golfe Huon.
apicata Raffray, loc. cit. p. 70 Nue-Guinée : Golfe Huon.
illimis Raffray, loc. cit. p. 70 Nie-Guinée : Golfe Huon.
tubericollis Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 4891,
p. 485 Singapore.

## Groupe XXVII.

rosmarus Reitter, Deuts. Ent. Zeits. 4882, p. 487, pl. IX, f. 5..... Afr. occidentale : Côte de l'Or.

## Groupe XXVIII.

iranica Sauley, Spec. II, p. 85. — Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, p. 476.....

Perse.

caudata Raffray, Ann. Mus. Nat. Hung. Budapest, 1903, p. 62, pl. I, f. 6. . . . . . . . . . . . N<sup>n</sup>e-Guinée : Golfe Huon.

spiniventris Raffray, loc. cit, p. 63......

## Groupe XXIX.

arcifer Casey, Col. Not. VII, p. 604. Amér. septentrionale : Kansas.

# Groupe XXX.

Integrostriata Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien. 4883, p. 403, pl. XX, f. 2.....

Borneo.

crassipes Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 4874, p. 123.

Japon.

## Groupe XXXI.

fasciculata n. sp...... Sumatra : Palembang.

## Groupe XXXII.

# Groupe XXXIII.

clavata Peyron, Ann. Soc. ent. Fr. 1858, p. 415. -BAUDI, Berl. Ent. Zeits. 1869, p. 413. - SAULCY, Spec. II, p. 90. - Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 4881, p. 476..... Chypre, Syrie, Caramanie,

sulcicornis Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 4895, p. 389; Trans. S. Afr. Phil. Soc. 4897, p. 90; 4898, p. 400. . . . Le Cap : Vitenhage, Bechuanaland, Rhodesia, Natal.

clavicornis Raffray, Rev. Mag. Zool. 4877, p. 40; Rev. d'Ent. 1896, p. 229..... Zanzibar.

diversa Raffray, Rev. d'Ent. 1887, p. 36; Trans. S. Afr. Phil. Soc. 1897, p. 94... Le Cap: Cape Town, Stellenbosch.

Birónis Raffray, Ann. Mus. Nat. Hung. Budapest, 

papuana Raffray, Rev. d'Ent. 1882, p. 34 Nouvelle-Guine
laciniosa Raffray, Ann. Mus. Nat. Hung. Budapest,
4903, p. 75, pl. I, f. 5 Nouvelle-Guine
truncaticornis Raffray, Rev. d'Ent. 1896, p. 239.
Abyssinie : Agami
orientalis n. sp Arabie : Hedjaz. Kurdistan. Mésopotami
Groupe XXXIV.
maroccana n. sp
Groupe XXXV.
<b>Lebasi</b> Aubé, Ann. Soc. ent. Fr. 4844, p. 448. — Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 4890, p. 340 <i>Venezuele</i>
grenadensis n. sp Antilles : Grenade
vincentania n. sp
diffinis Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1883, p. 324. Japon
Groupe XXXVI.
Akinini Reitter, Deuts. Ent. Zeits. 4894, p. 49 Taschken
cultrata n. sp Sumatra : Palembang
dama Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 4891, p. 492,
pl. XIV, f. 47
lamellicornis Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 1882,
p. 290. — Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 4894, pl. XIV,
f. 48
Baumelsteri Schaufuss, Psel. Siams, 4877, p. 7. — Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 4894, pl. XIV. f. 46. Siam
Groupe XXXVII.
afra Raffray, Trans. S. Afr. Phil. Soc. 4897, p. 94
Rhodésia : Salisbury
pulvinata Reitter, Deuts, Ent. Zeits, 4882, p. 190,
pl. IX. f. 7
picticornis Rettter, loc. cit. p. 488, pl. IX. f. 6.
Raffray, Trans. S. Afr. Phil. Soc. 1897, p. 91
Afr. occidentale : Côte de l'Or. Afr. australe : Salisbury, Natal.

## Groupe XXXIX.

Oroupe AAAIA.
Sagax Leconte, Trans. Amer. Ent. Soc. 1880, p. 183.
Groupe XL.
falsa n. sp
callosa Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 1890, p. 311 Venezuela.
sarcinaria Schaufuss, Tijds, Ent. XXX, p. 127
Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 1890, p. 312 Mexique.
pentachiroides Schaufuss, Tijds. Ent. XXX, 4887,
p. 125
globulosa n sp
intacta Sharp. Biol. Centr. Am. Col. II (1), 4887, p. 28
Groupe XLI.
Wickhami Brendel, Trans. Amer. Ent. Soc. 4893, p. 280, pl. IV, f. 49. — Casey, Col. Not. V, p. 486. Californic.
chiricahuensis n. sp Amér. septentrionale : M <sup>ts</sup> Chiricahua.
diversicornis Sharp, loc. cit. p. 28
Sallei Sharp, Biol. Centr. Amer. Col. II 1, 4887.
p. 27, pl. I, fig. 3 Mexique. Guatemala. Panama.
biclavata Reitter, Deuts. Ent. Zeits. 1882, p. 143,
pl. V, f. 10
mexicana n. sp
eucera Aubé, Ann. Soc. ent. Fr. 1844, p. 420 Porto Rico.
melina Solsky, Bull. Nat. Mosc. 4869, p. 4. — Saulcy.
Spec. II. p. 87. — Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 4881, p. 475
ç rubra Мотsen. Bull. Nat. Mosc. 1851, 1V, р. 492.
of tychoides Reitter, Deuts. Ent. Zeits. 1877, p. 291.
⊋ talyschensis Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 1884. p. 68.
subtilis Leconte, Ann. Lyc. Nat. Hist. V. p. 215. —
Casey, Col. Not. V. p. 486
?nevadensis Casey, loc. cit. p. 491 Caifornie: Nevada.

## Groupe XLII. informis Casey, Bull. Cal. Ac. Sc. 1886. p. 189, pl. VII. f. 1 b. — Brendel, Bull. Un. Iowa, I, p. 299. pl. IX, f. 69..... Californie. arthritica Brendel, Ent. News, 1894. p. 459.... Californie. Groupe XLIII. tumidicornis Casey, Bull. Cal. Ac. Sc. 1886, p. 487. pl. VII, f. 4 a..... Californie. Groupe XLIV. tumorosa Casey, loc. cit. 486, pl. VII, f. 4..... Californie. Groupe XLV. deformata Leconte, Trans. Amer. Ent. Soc. 1880, p. 183..... Californie. taphrocera Casey, Col. Not. VII. p. 592..... Californie. deformata Casey (nec Leconte), Bull. Cal. Ac. Sc. 4886, p. 495, pl. VII, f. 2. — Brendel, Bull, Un. Iowa, I. 4890, p. 300, pl. IX, f. 70. Groupe XLVI. antennata Aubé, Psel. Mon. 1833, p. 31, pl. 84, f. 2; Ann. Soc. ent. Fr. 1844, p. 118. — Jaco. Duval. Gen. Col. Eur. I, pl. 41, f. 202. — SAULCY, Spec. II, p. 93. — Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien. 1881, p. 476. — Ganglbauer, Käf. Mittel. II, p. 813. Europe: Caucase. serricornis Schmidt, Beitr. Mon. Psel. Prag. 4833. p. 5, f. 3..... Trébizonde. serrata Gredler, Käf. Tir. 1863, p. 131..... Tyrol. caucasica Sauley, Spec. II, p. 94 (Caucase). heterocera Aubé, Ann. Soc. ent. Fr. 1844, p. 119. Lucas, Explor. Alg. p. 430, pl. 43, f. 40. — Sauley, Spec. II, p. 95. - Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, Algerie. 1881, p. 476..... Groupe XLVII.

Caseyi nom. nov.....

articularis | Casey, Col. Not. VII, 1897, p. 608.

Colorado sud.

americana nom. nov
albionica Casey (nec Motsch.), Col. Not. VII. p. 592.
binodifera Casey, Col. Not. VII, 1897, p. 608, f. 2
Amér, septentrionale : Vancouver.
polita Brendel, Bull. Un. Iowa, I. p. 297
Groupe XLVIII.
fusticornis Casey, loc. cit. 1897, p. 608 Californie.
spatulifer Casex, loc. cit. 1897. p. 608
propinqua Leconte, Bost, Journ. Nat. Hist. VI.
p. 88. — Brendel, Bull. Un. Iowa, 1, p. 298, pl. 1X.
ff. 63-66
Groupe XLIX.
cubitus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874. p. 122. Japon.
aliena Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 420. Japon.
GROUPE L.
tippa Raffray, Ann. Mus. Nat. Hung. Budapest.
1903. p. 74 Nouvelle-Guinée : Golfe Huon.
Groupe LI.
nasalis Reitter, Wien. Ent. Zeit. 1900, p. 41.
nasula   Reitter, Deuts. Ent. Zeits. 1882, p. 142 Brésil.
Groupe LII.
appendiculata n. sp
Oberthüri n. sp
Groupe LIII.
Reichel Schaufuss, Nung. ot. II, p. 264 Colombie.
Reicheimu Schaufuss, Tijds, Ent. XXX, p. 161.
Groupe LIV.
celaf Sharp, Biol. Centr. Amer. Col. II (1), 1887, p. 25
subfoveolata Schaufuss, Nunq. ot. II. p. 262. Nouvelle-Grenade.
· ·
Obnubila n. sp. Yucutan.  Ann. Soc. Ent. Fr., Exxiii 1905. 16

Stussineri Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 1882, p. 381	1 · Sta_Rita
immodica n. sp.	Colombie
Dinodula Schaufuss, Nunq. ot. II, p. 264.	Colombie
	· ·
Groupe LV.	
coxalis Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 1903, p. 325  Madayascar: Fo	rt-Dauphin
<b>articularis</b> Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 4893, p. 494	natra nord
nominata Sharp, Biol. Centr. Amer. Col. II (1), p. 26.	Guatemala
Groupe LVI.	
diversula nom. nov	Panama
tumida Leconte, Trans. Amer. Ent. Soc. 4880, p. 483.  — Brendel, Bull. Un. Iowa, I, p. 303, pl. IX, f. 73.  — Casey. Col. Not. V. p. 486, ♂	$t^{le}: Texas. \ Texas.$
Groupe LVII.	
albionica Motsch. Bull. Nat. Mosc. 1845. I, p. 43. pl. III, f. 2	Californie.
franciscana Casey, Bull. Cal. Ac. Sc. 1886, p. 193, pl. VII, f. 2 b. — Brendel. Bull. Un. Iowa, I. p. 302, pl. IX, f. 17.	Californie.
Groupe LVIII.	
Falli Casey, Col. Not. VII. 4897, p. 606	Californie.
turgidicornis Casey, loc. cit. 1897, p. 607	Californie.
Groupe LIX.	
	Californie. Inatemala.

## Groupe LX.

Groupe LX.
auriculata Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 1897, p. 266.
Madayascar : Diego-Suarez.
Groupe LXI.
militarls Sauley, Spec. II, p. 189
Groupe LXII.
suffarcinata Schaufuss, Ann. Mus. Civ. Gen. 1882.
p. 362
Groupe LXIII.
? vulnerata Sharp. Biol. Centr. Amer. Col. H. 1.
p. 31. pl. 1, f. 15 Panama.
Espèces inconnues décrites comme Bryaris, devant rentrer
dans le genre Reichenbuchin, mais d'affinités douteuses.
blocellata Schaufuss, Tijds. Ent. XXX. p. 127 Mexique.
dorsopunctata Schaufuss, loc. cit. p. 433. Brésil: Minus Gerues.
penita Schaufuss, loc. cit. p. 135
hippopotamus Schaufuss, loc. cit. p. 435 Brésil.
ornatissima Schaufuss, loc. cit. p. 415 Sumatra.
Espèces inconnues décrites comme Bryavis, mais devant rentrer très probablement dans d'autres genres.
latifrons Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1883, p. 325. Japon.
bisinuata Schaufuss, Tijds, Ent. XXX, 1887, p. 130. Cuba.
Muviatilis Schaufuss, loc. cit. 1887, p. 134 Amazones.
impunctata Schaufuss, loc. cit. p. 132 Mexique: Yucatan.
spuria Schaufuss, loc. cit. p. 132 Brésil : Nouveau-Fribourg.
truncata Schaufuss. loc. cit. p. 128
pygmaea Schaufuss, Nunq. ot. p. 491 Amazones.
triangulifera Schaufuss (? <i>Xybaris</i> ). Tijds. Ent. XXX, 1887. p. 128
clara Schaufuss, loc. cit. p. 113 Sumatra.
Inusitata Blackburn, Trans. Royal. Soc. S. Austr. 4891, p. 79

Sharpi Broux (? Gastrobothrus), Man. N. Zeal. Col. 1880, p. 124	ande.
platynota Broun (? Gastrobothrus), loc. cit. 1893,	
p. 4338	ande.
nasuta Broty, loc. cit. 4880, p. 432	ande.
Naso C. Schaufuss, Cat. Psel. p. 29.	
calcarata Brown, loc. cit. 4886, p. 834	ande.
ignota Broun, loc. cit. 1881, p. 664	ande.
crassipalpis Sharp, Biol. Centr. Amer. Col. II (1).	
p. 26	mala.
rubecula Sharp, loc. cit. p. 28 Pan	ama.
bythinoides Sharp, loc. eit. p. 30 Pan	ama.
impressicollis Sharp, loc. cit. p. 30 Gunter	mala.
impubis Sharp, loc. cit. p. 32 Guater	mala.
euplectodes Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874.	
p. 504. West Aust	valia.
277	
PHOBERUS	
armatus n. sp Haute-Bolivie : Yura	curis.
T EREMOMUS	
obesus n. sp Haute-Bolivie : Yuraa	uris.
crassicornis n. sp	Para.
2	
GASTROBOTHRUS	
Broun, Man. New. Zeal. Col. Prt. 3, 4886, p. 758. — Raffray, Rev. d'Ent. 4890, p. 122.	
abdominalis Brown, loc. cit 4880, p. 425 No Zelo	ande.
Ī	
ANASIS	
Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 1891, p. 492.	
impunctata n. sp Sumatra : Palemi	ning.
laevicollis Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 4891, p. 493.	
pl. XIV, f. 21	nille.

singhalensis Raffray, loc. cit. 1894, p. 459...... Ceylan.

3

#### ANASOPSIS

1864, p. 92 (indescript.).

adumbrata Raffray, loc. cit. 4896, p. 300... Iles Loyalty: Maré.
armipes Fauvel (Anasis). Rev. d'Ent. 1903, p. 281...
Nouvelle-Calédonie: M'-Koqui.

distans Fauvel (Anasis), loc. cit. p. 282......

4

#### BARAXINA

RAFFRAY, Bull. Soc. ent. Fr. 1896, p. 301.

Françoisi Raffray, loc. cit. p. 301..... Nue-Calédonie : Nouméa.

#### STARTES

Broun, Man. N. Zeal, Col. Prt. 3, 1886, p. 829.

foveata Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. 1893, p. 170... N<sup>th</sup>-Zélande.
sculpturata Broun, Man. N. Zeal. Col. 1886, p. 830. N<sup>th</sup>-Zélande.
2

#### PHYSA

RAFFRAY, Rev. d'Ent. 1890, pp. 118, 422.

inflata Sharp (Bryaxis), Trans. Ent. Soc. Lond. 1874.
 p. 497. — Raffray, Rev. d'Ent. 1890, pl. II. f. 29. N<sup>ne</sup>-Zélande.

#### RYBAXIS

Sauley, Spec. II. p. 136, in Bull. Metz. 1876, p. 96.— Reitter, Verh. naturf. Ver. Brünn, p. 190; Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, p. 464.— Raffray, Rev. d'Ent. 1890, pp. 118, 123; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 1901, p. 449; Trans. S. Afr. Phil. Soc. 1897, p. 88. Bryaxis Leach, Zool, Misc. III, 4847, p. 85; Zool, Journ, Lond, H. 1826, p. 450. — Aubé (pro parte), Psel, Mon. 1833, p. 23; Ann. Soc. ent. Fr. 4844, p. 403. — Thomson, Skand, Col. I, 4859, p. 53; III, 1861, p. 233. — Ganglbauer, Käf, Mitteleur, II, 4895, p. 806.

## Groupe 1.

valida Brendel, Bull. Un. Iowa, I, 4890, p. 273..... Amer. septte.

## Groupe II.

Denny, Mon. Psel. 4825, p. 32, pl. VII, F. 2. —
Aubé, Psel. Mon. 4833, p. 24, pl. 84, f. 4.....

..... Europe. Barbarie. Asie Mineure.

⊋ sanguinea Leach, Zool. Misc. III. 4817, p. 85. —
⊋ Aubé, Psel. Mon. 1833, p. 25, pl. 81. f. 2;
Ann. Soc. ent. Fr. 4844, p. 404. — ⊋ Denny, Mon. Psel. 1825, p. 32, pl. VII. f. 3. — Erichson, Kåf. Mk. Brandbg. I, p. 268. — Thomson, Skand. Col. III. p. 234. — Sauley, Spec. II, p. 204. — Reitter. Verh. z. b. Ges. Wien, 4881, p. 477. — Ganglbauer, Käf. Mitteleur, II, 1895, p. 806.

limnophila Peyron, Ann. Soc. ent. Fr. 4858, p. 414. formicariensis Gredler, Käf. Tirol, 4863, p. 735.

Var. nigropygialis Fairmaire, Ann. Soc. ent. Fr. 1857, p. 129.

Var. laminata Motsch, Mag. Zool. 4836, p. 471, f. 3: Et. ent. 4857, p. 56.

Marquardti Reitter, Deuts. Ent. Zeits. 4900, p. 50. Bokhara.

circumflexa Raffray, Rev. d'Ent. 1882, p. 24:

Trans. S. Afr. Phil. Soc. 1897, p. 88. Abyssinie: Keren, Kobbo, ...... Enderta, Adona. Afr. australe: Natal, Salisbury.

africana Raffray, Ann. S. Afr. Mus. 1901, p. 122.

## Groupe III.

p. 47. RAFFRAY, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 1863, p. 47. RAFFRAY, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales,

1900, p. 153
Australie : New South Wales, Swan River, Cape York.
atriceps Mac Leav, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales,
1873, p. 152. — Raffray, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 1900, p. 157 Australie: New South Wales, Gayadah.
Isidorae Schaufuss, Nung. of. III, p. 30, Q. — Raf-
FRAY, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 1900, p. 451.
O Harti Blackburn, Trans. Royal, Soc. S. Austr.
1891, p. 78.
recta Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 496. Q.
- Raffray, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 1900,
p. 145. pl. X, f. 42. J Australie: King George's Sound, Champion Bay, Swan River, Brisbane,
o bisan Schaufuss, Nunq. ot. III. p. 499.
antitope Raffray, Proc. Lin. Soc. N. S. Wales, 1900,
p. 155, pl. X, f. 43
Groupe IV.
flavipes Schaufuss, Nunq. ot. III, p. 502. — Raffray.
Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 1900, p. 152
villosa n. sp
Groupe V.
conjuncta Leconte, Bost, Journ. VI, p. 85. — Bren-
DEL, Bull. Un. Iowa, I, p. 273, pl. VIII, f. 46 Var. ♂ truncaticornis Brendel, loc. cit. p. 274.
Groupe VI.
princeps Share, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 118. Japon.
nubila Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 4882, p. 292. Bornéo.
Groupe VII.
gigantea Motsch. Bull. Nat. Mosc. 1863, II, p. 422
sladiator Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 1891, p. 481. Manille.
Groupe VIII.
diabolica Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 1884,
p. 66

## Groupe IX.

gigas Batdi, Berl. Ent. Zeits. 4869, p. 408. — Sauley, Spec. II, p. 206. — Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 4881, p. 477. Chypre. Turquie. Syrie. Lenkoran. Perse. Celavata Brendel (Bryaxis), Proc. Ent. Soc. Phil. 4866. p. 496	
4865, p. 256.	
mystica Casey, Col. Not. V, p. 476 : Amér. septe	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Manille.
Groupe X.	
convexa n. sp	Sumatra.
Groupe XI.	
hyalina Schaufuss, Nunq. ot. III, p. 502. — Raffray, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 4900, p. 450  Australie: New South Wales, Queensland, West hyalinipennis Schaufuss, Nunq. ot. p. 501 (Tasmanie).	Australia.
Groupe XII.	
varifcornis Brendel. Bull. Un. Iowa. I, p. 274	
	entrionale.
Groupe XIII.	
1	Australie.
p. 172. — Raffray, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 1863, p. 172. — Raffray, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 1900, p. 156	eth Wales.
Groupe XIV.	
adumbrata Raffray, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales,	
4901, p. 159	th Wales.
bicarinata n. sp	ueensland.
amica Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 4883, p. 405.	Bornéo.
cymbularia Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 4883, p. 292	Batavia.

précédents, mais sans affinités précises.

ovenensis Blackburn, Trans. Royal. Soc. S. Austr.
1891, p. 80
strigtcollis Westwood, Trans. Ent. Soc. Lond. 1856,
p. 269. pl. XVI, f. 1
optata Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 496
Australie : Victoria.
lindensis Blackburn, Trans. Royal Soc. S. Austr.
1891, p. 77 Australia : South Australia.
quadriceps Westwoon, Trans. Ent. Soc. Lond. 1856,
p. 270, pl. XVI, f. 2
Groupe XV.
electrica King, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales, 1863,
p. 48, pl. V, ff. 9a, 9b. — Raffray, Proc. Linn. Soc.
N. S. Wales, 1901, p. 461 Australie: Swan River, Tasmanie.
Groupe XVI.
quinquefoveata Raffray, Proc. Linn. Soc. N. S.
Wales, 1900, p. 139 Australie: New South Wales.
euplectoides Broun, Man. N. Z. Col. 1893, p. 1045. Nue-Zelande.
planipennis Broux.
Groupe XVII.
Iunatica King, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales. 1863,
p. 48, pl. V, f. 8b Australie : New South Wales.
Espèces inconnues décrites comme Bryavis, appartenant
probablement au genre Rybaxis.
sumatrensis Schaufuss, Tijds. Ent. XXX, p. 113 Sumatra.
imperatrix Schaufuss, Ann. Mus. Civ. Gen. XVIII,
1882. p. 363
sarawakensis Schauferss, Ann. Mus. Civ. Gen.
XVIII., 1882., p. 364
43
EUTELEIA
recens Schaufuss (Bryanis), Nunq. ot. III, p. 487 Amazones.

trifoveata n. sp
nodosa n. sp
4
DECARTHRON .
Brendel, Proc. Soc. Phil. 1865, p. 30; Bull. Un. Iowa, I, 4890, p. 260. — Raffray, Rev. d'Ent. 4890, pp. 417, 122.
Groupe I.
corpulentum Schaufuss (Bryaxis), Tijds. Ent.
XXX, 4887, p. 123 Brésil : Minas Geraes.
bicolor n. sp
Hetschkoi n. sp
? macrocephatum Schaufuss (Bryaxis), loc. cit. p. 424
Groupe II.
cochlearifer Schaufuss (Bryaxis), Nunq. ot. III, p. 485
dimissionis Schaufuss (Bryaxis), Tijds. Ent. XXX, 1887, p. 123
*oror Schaufuss ( Bryaxis , Tijds. Ent. XXX, p. 122. Mexique.
Groupe III.
sulcipes n. sp
formiceti Leconte, Bost. Journ. VI, p. 90. — Bren- DEL, Bull. Un. Iowa, 1890, I, p. 266, pl. VIII, f. 44. 
Groupe V.
stigmosum Brendel, Proc. Ent. Soc. Phil. 4865, p. 21; Bull. Un. Iowa, I. p. 262, pl. VII, f. 39 Amér. septentrionale : États de l'Est, Canada.
scarificatum Brendel. Trans. Am. Ent. Soc. 1893,
p. 278
abnorme Leconte; Bost. Journ. VI, p. 89. — Bren-

DEL, Bull. Un. Iowa, I, p. 261, pl. VIII, f. Amér. septentrionale :		
laurentiacum Casey, Col. Not. VII, 4897		
Amér. septentrionale : Canada		
tritomum n. sp		
tritomant n. sp	Dieste: Matty arosso.	
Groupe VI.		
nanum Schaufuss (Bryaxis), Tijds. Ent. XX	X, p. 121. Amazones.	
Brendell Casey, Bull. Cal. Ac. Sc. 1887, 1	o. 464. —	
Brendel, Bull. Un. Iowa, 1890, I, p. 263		
f. 43; Trans. Amer. Ent. Soc. 1893, pl. V		
Amér, septentrion	uale : Texas , Californie.	
curticorne Schaufuss (Bryanis), Nunq. ot.	II, p. 263. Yucatan.	
arthriticum n. sp Mexiq	ue : Sierra de Durango.	
insulare n. sp.		
<ul> <li>Longulum Leconte, Bost. Journ. Nat. Hist.</li> <li>Brendel. Bull. Un. Iowa, 4890, 1.</li> </ul>		
pl. VIII, f. 42		
quadraticeps n. sp		
	mayne, comment.	
Groupe VII.		
laevicolle Aubé (Bryaxis), Ann. Soc. ent.		
р. 121, д		
Q hipunctatum, Reitter, Deuts. Ent. Zei	its. 1882,	
p. 142.		
Groupe VIII.		
externedens Reitter, Verh. z. b. Ges. Wi		
р. 380	Brésil : Petropolis.	
planiceps n. sp	Mexique.	
Schmitti n. sp	Mexique : Cuernavaca.	
spinosum n. sp	Antilles : Grenada.	
Groupe IX.		
vuineratum n. sp	,	
brasilianum n. sp		
Cearae Schaufuss (Bryaxis), Nunq. ot. III, p. 489		
	Brésil : Matta Grosso.	

exsectum Brendel, Proc. Ent. Soc. Phil. 4865, p. 32;		
Bull. Un. Iowa, I. 1890, p. 261, pl. VIII, f. 41		
unifoveolatum Schaufuss (Bryaxis), Tijds. Ent.		
XXX, 1887, p. 425, pl. VIII, ff. 3a, 3b		
minutum n. sp		
minutum n. sp		
Groupe X.		
tomentosum n. sp		
similare Sharp, Biol. Centr. Amer. Col. 4887, II (4),		
p. 24		
restitutum Sharp, loc. cit., p. 23 Mexique. Guatemala.		
Groupe XI.		
strenuum Brendel, Proc. Ent. Soc. Phil. 4865,		
p. 32; Bull. Un. Iowa, p. 264, pl. VII, f. 38		
Amér, septentrionale : Pensylvanie, New Jersey.		
fallaciosum Sharp, Biol. Centr. Amer. Col. II (4),		
p. 23, pl. I, f. 42 Mexique, Guatemala.		
planifrons n. sp Yucatan.		
Schaufussi n. sp		
suturale Schaufuss (Bryanis), Nunq. ot. III, p. 493. Menique.		
Groupe XII.		
discolor Brendel, Bull. Un. Iowa, I, p. 265 Nouveau-Mexique.		
Groupe XIII.		
longicorne n. sp		
Groupe XIV.		
frontale n. sp		
Groupe XV.		
monoceros Schaufuss (Bryaxis), Bull. Soc. ent. Fr.		
4882, p. xciv		
Espèces d'affinités douteuses.		
Aurivilli Schaufuss (Bryaxis), Ann. Soc. ent. Fr.		
1882, p. 44		
· ·		

marinum Brendel, Trans. Amer. Ent. Soc. 1893.		
p. 278		
seriepunctatum Brendel. loc. cit. p. 278		
47		
ITAMUS		
laticeps n. sp		
T		
EUPSENIUS		
Leconte, Bost. Journ. Nat. Hist. VI, 1850, p. 90. — Brendel, Bull. Un. Iowa, I, 4890, p. 1. — Raffray, Rev. d'Ent. 1890, p. 420; Ann. Soc. ent. Fr. 1896, p. 262.		
glaber Leconte, Bost, Journ. VI, p. 90. — Lacor- daire, Gen. Col. (Atlas), pl. 46, f. 4. — Brendel, Bull. Un. Iowa, I, 4890, p. 1; Trans. Amer. Ent. Soc. 4893, pl. IV, ff. I, Ia.		
Amér, septentrionale : Louisiane, Caroline.		
rufus Leconte, New. Spec. Col. 1, 1863, p. 28		
Amér, septentrionale : Alabama.		
gracilis n. sp		
politus Reitter. Deuts. Ent. Zeits. 4883, p. 36		
mexicanus Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 1896, p. 264. Mexique.		
Grouvellei Raffray, loc. cit. p. 264 Mexique.		
? dominicanus Schaufuss, Tijds. Ent. XXX, 4887, p. 408. Antilles : S'-Domingue.		
gibbicollis Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 4896,		
p. 263 Mexique.		
longicollis Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 4896, p. 263. Colombie.		
DARADA		
BARADA		
Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 1891, p. 314.		
mucronata Raffray, loc. cit. p. 315, pl. VI, f. 8  Venezuela: Colonie Tovar.		
1		

# Genre d'affinités douteuses, bien qu'appartenant probablement à la tribu des Brachyghetini.

#### ACETALIUS

SHARP, Trans. Ent. Soc. Lond. 4883, p. 322.

dubius Sharp, loc. cit. p. 322. Japon.

## 9° Tribu Tychini nom. nov.

(sub. Bythinini).

Le nom de *Bythinus* devant disparaître pour être remplacé par celui de *Bryaxis* Kugelann plus ancien, la tribu des *Bythinini* prendra désormais le nom de *Tychini*.

#### TABLEAU DES GENRES

- 4. (52). Premier segment ventral très grand, dépassant les hanches postérieures qui sont très distantes: chez les mâles le 7° segment ventral, quand il existe, est très petit, en forme de bouton. Palpes grands ou tout au moins moyens, le 4° article toujours un peu sécuriforme.
- (33) Tête avec un tubercule antennaire; antennes plus ou moins rapprochées à leur base. Abdomen bien marginé. Dernier article des palpes très grand, plus ou moins sécuriforme.
- 3. (30). Un seul ongle aux tarses, parfois une forte soie simulant un ongle.
- (27). Troisième article des palpes petit, subglobuleux. Segments ventraux subégaux; en tous cas le 2º n'égale jamais trois trois fois le premier. (Ancien genre Bythinus).
- 5. (6). Antennes de 40 articles..... Gen. Decatocerus Saulcy.
- 6. (5). Antennes de 41 articles.
- 8. (7). Deuxième article des tarses antérieurs simple 3.
- (44). Palpes très longs, 2º article peu recourbé et peu renflé au sommet, 4º falciforme ou ensiforme.
- (43). Tête très étroite allongée, à côtés obliques, rectilignes, atténuée en avant, plus ou moins plate, parfois ca-

	renee; yeux mus ou tres peuts \(\phi\), generalement plus
	gros .
11.	(12). Prothorax sans sillon transversal
	Gen. Machaerites Miller.
12.	[11]. Prothorax avec un sillon transversal
	Gen. Bythoxenus Motschulsky.
13.	10). Tête encore plus longue que large, mais non étroite,
	plus convexe, surtout en arrière, côtés sinués, s'élargissant
	à l'insertion des antennes. Dernier article des palpes en-
	siforme Gen. Linderia Saulcy.
14.	(9). Palpes plus courts, 2º article plus courbé et plus renflé
	au sommet, dernier article sécuriforme, d'ailleurs variable.
(.)	(46). Dernier article des palpes avec une fossette à la face
	inférieure of. Prothorax sinué sur les côtés
	Gen. Eccoptobythus Deville.
16.	[15 et 19]. Dernier article des palpes avec une fossette à la
	face supérieure J. Prothorax plus ou moins régulière-
	ment cordiforme.
17.	(18). Quatrième article des antennes très gros ♂, très long ♀.
	Gen. Xenobythus Peyerhimhoff.
18.	17 . Quatrième article des antennes semblable au suivant
	♂ et ♀ Gen. Glyphobythus n. gen.
9.	[16] et 20]. Quatrième article des palpes gros court, plus ou
	moins sécuriforme, avec un tubercule à la face supérieure
	J. Gen. Bolbobythus n. gen.
2().	[19]. Quatrième article des palpes simple, plus ou moins
	sécuriforme.
21.	
	forme, très convexe. Tête longue, arrondie en arrière, très
	fortement rétrécie en avant et étroite, avant le tubercule
	antennaire Gen. Pselaptrichus Brendel.
2.	
	curiforme ou ovoïde.
3.	(26). Tête normale, plus ou moins triangulaire et atté-
	nuce en avant ♂ et Q, avec trois impressions plus ou
	moins réliées par des sillons obliques, variables.
1.	(25). Quatrième article des antennes plus gros que les ad-
	jacents Gen. Tychobythus Ganglbauer.
,).	(24). Quatrième article des antennes semblable aux adja-
	cents, les premiers articles très variables
	Gen. Bryaxis Kugelann.

- 27. (4). Troisième article des palpes plus long, triangulaire, 4º plus brièvement et plus fortement sécuriforme. Deuxième segment ventral plus grand, égalant presque trois fois le premier.
- 29. (28). Troisième article des palpes presque aussi long que le 4°, celui-ci presque ovalaire, peu sécuriforme. Hanches postérieures moins distantes. Forme allongée, cylindrique. Gen. Cylindraretus Schaufuss.
- 30. (3). Deux ongles vrais, très inégaux aux tarses.
- 32. (31). Palpes longs, deuxième article long, aplati et sinué, sillonné, garni de soies, 3° petit, triangulaire, 4° grand, brièvement ovoïde, très arrondi au sommet, garni de soies rigides, portant un bouton à l'extrémité, sans appendice terminal. Tête avec un tubercule antennaire séparé de la tête par un sillon transversal................. Gen. Valda Casey.
- 33. (2). Tête sans tubercule antennaire; antennes bien distantes à la base; palpes bien plus petits, 4° article fusiforme ou plus ou moins sécuriforme.
- 34. (51). Abdomen faiblement marginé.
- (40). Écartement des hanches postérieures égalant au moins la longueur du métasternum.
- 36. (37). Premier segment dorsal très grand. 2° ventral au moins égal au premier. Prothorax sans sillons longitudinaux....... Gen. Bythinophanax Reitter.
- 37. (36). Segments dorsaux subégaux.

39.	(38). Les trois premiers segments ventraux subégaux. Pro- thorax sans sillons avec trois grandes fossettes libres. Marge latérale des élytres dilatée, tranchante
40.	Gen. Harmomima n. gen.  (35 et 46). Écartement des hanches postérieures grand, mais n'égalant pas la longueur du métasternum; premier segment ventral un peu plus grand que les suivants qui vont en décroissant graduellement.
41.	(42). Prothorax un peu cordiforme, au moins aussi long que large, deux sillons longitudinaux et un transversal.  Marge latérale des élytres dilatée, tranchante
12.	(41). Prothorax transversal, très brièvement cordiforme; pas de sillons longitudinaux au prothorax, mais un transversal. Marge latérale des élytres non dilatée.
43.	(44). Forme assez courte, épaisse et convexe, ovalaire
44.	(43 et 45). Forme allongée, parallèle, aplatie, euplectoïde . Gen. Acrocomus Raffray.
45.	(44). Forme allongée, cylindrique et convexe
46.	Gen. <b>Dalmodes</b> Reitter. (40). Hanches postérieures très peu écartées.
	(48). Yeux invisibles en dessus, la tête étant très large et
	dilatée sur les côtés. Premier et deuxième segments ven- traux subégaux. 3° et 4° bien plus étroits
	Gen. Harmophorus Schaufuss.
48.	(47). Yeux bien visibles en dessus, la tête n'étant pas dila-
	tée sur les côtés. Deuxième segment ventral plus grand que le 1 <sup>cr</sup> , premier dorsal plus grand que les suivants.
49.	(50). Deuxième segment ventral seulement un peu plus
	plus grand que le premier, les suivants encore grands et très visibles. Deux fossettes latérales et un sillon transver-
	sal au prothorax Gen. Batrybraxis Reitter.
50.	(49). Deuxième segment ventral plus de deux fois plus
	grand que le premier, 3°, 4°, 5° peu visibles au milieu. Trois grandes fossettes et un sillon transversal au protho-
	rax
51.	(34). Abdomen absolument immarginé, Corps allongé, cylin-
	drique. Hanches postérieures assez fortement écartées.
	Segments dorsaux subégaux entre eux
	Ann. Soc. Ent. Fr., LXXIII [1904].

- 52. (1). Premier segment ventral encore très visible, mais dépassant à peine les hanches postérieures, 7° segment ventral grand chez les 5, longitudinalement fendu. Palpes très petits, deuxième article légèrement renflé au sommet. 3° petit, globuleux. 4° ovoïde ou fusiforme, acuminé. Antennes relativement courtes, massue formée seulement par le dernier article qui est très gros.
- 53. (54). Corps très épais globuleux. Tête pas plus longue que large. Prothorax sans sillons ni fossettes, globuleux ou très légèrement cordiforme. Segments ventraux très courts. égaux; abdomen très court..... Gen. Tanypleurus Raffray.

## TABLEAUX, NOTES ET DESCRIPTIONS.

## Tableau du genre Bryaxis (sub Bythinus)

- A 5. Premier et deuxième articles des antennes toujours simples.
- B 2. Premier article des antennes généralement très long, simple ou parfois très légèrement rentlé 5.
- C 2. Tête et prothorax imponctués.
- D 2. Pieds plus ou moins armés.
- E 3. Tibias antérieurs armés..... Groupe I.
- E 2. Cuisses antérieures armées..... Groupe II.
- E 1. Tibias postérieurs armés..... Groupe III.
- D 1. Pieds simples.
- E<sup>1</sup>2. Premier article des antennes légèrement tuberculeux; vertex gibbeux et tronqué....
- berculeux; vertex gibbeux et tronqué.... Groupe IV. E<sup>1</sup> 1. Premier article des antennes absolument

B 1. Premier article des antennes simple, cylindrique, seulement un peu plus long que large.  C12. Tête avec les tempes très fortement mucronées, en dessous, derrière les yeux	Groupe Groupe	VII. VIII.
C22. Tête et prothorax densément ponctués	Groupe	IX.
C <sup>2</sup> 1. Tête et prothorax imponetués	Groupe	Χ.
B <sup>1</sup> 1. Premier article des antennes plus ou moins renflé en dedans, avec une impression ou une fossette en dessus ou en dedans.		
C32. Prothorax imponetué	Groupe	X1.
C <sup>3</sup> 1. Prothorax ponctué	Groupe	XII.
B <sup>2</sup> 10. Premier article des antennes avec un sillon	24	25.115
intérieur et un petit tubercule	Groupe	XIII.
rieur externe pointu (ex Croissandeau). B <sup>2</sup> 8. Premier article plus ou moins renflé vers le	Groupe	XIV.
sommet, avec un petit tubercule peu sail- lant, plus ou moins légèrement impres-		
sionné à la base	Groupe	7.1.
B <sup>2</sup> 7. Premier article court, un tubercule oblong, verruqueux à la face interne	Groupe	XVI.
B <sup>2</sup> 6. Premier article grand, plus ou moins renflé en dedans, vers le milieu, émarginé avant le sommet et, dans cette échancrure, un		
tubercule tronqué	Groupe	XVII.
B <sup>2</sup> 5. Premier article allongé, sillonné, avec une		
épine mousse située au-dessus de l'angle supérieur et dirigée en haut B <sup>2</sup> 4. Premier article grand, plus ou moins renflé en	Groupe	XVIII.
dedans, avec l'angle supérieur marqué et armé d'un tubercule ou d'une épine mousse dirigée obliquement en haut B <sup>2</sup> 3. Premier article des antennes plus ou moins	Groupe	XIX.

renflé, parfois globuleux, avec l'angle in-		
terne supérieur arrondi, pas marqué; cet		
angle présente, en dessous, un tubercule		
dirigé latéralement, et perpendiculairement		
au grand axe de l'article.		
C <sup>1</sup> 2. Prothorax imponctué	Groupe	XX.
C41. Prothorax ponetué	Groupe	XXI.
B <sup>2</sup> 2. Premier article gros, dilaté ou angulé et plus	,	
ou' moins fortement tuberculé au sommet		
de la dilatation, ou de l'angle, vers le milieu.		
C <sup>3</sup> 2. Front non armé d'une corne	Groupe	XXII.
C <sup>3</sup> 1. Front armé d'une corne droite, horizontale.	Groupe	XXIII.
B <sup>2</sup> 4. Premier article long, longitudinalement im-	caroupe	
pressionné en dedans, avec un tubercule		
au milieu, front aplati, un peu prolongé		
triangulairement	Groupe	VVIV
A 3. Premier article des antennes allongé, rentlé,	Groupe	.1.211.
deuxième très gros, globuleux, tous les		
deux inermes	Groupe	1.1.1.
A 2. Premier et deuxième articles des antennes	Groupe	.1.11.
anormaux, plus ou moins armés, le		
deuxième généralement caréné et tran-		
chant en dedans.		
B <sup>3</sup> 2. Tempes dilatées sous les yeux	Groupe	77/1
B <sup>3</sup> 1. Tempes simples non dilatées.		
C <sup>6</sup> 2. Premier article simplement sillonné et caréné		
en dedans, deuxième un peu oblique, avec		
l'angle postérieur interne plus marqué, un		
peu proéminent	Groupe	XXXIII.
C <sup>6</sup> 1. Premier article des antennes toujours plus ou		
moins tuberculé.		
D <sup>+</sup> 6. Deuxième article des antennes arrondi en de-		
dans, sans aucun angle proéminent.		
E <sup>2</sup> 2. Premier article médiocre, un peu renflé, avec		
une fine épine médiane, 2º très gros, pres-		
que deux fois plus large que le premier.	Groupe	XXVIII.
E <sup>2</sup> 1. Premier article variable, 2 <sup>e</sup> plus ou moins		
arrondi en dedans, à peine aussi gros que		
la plus grande largeur du premier.		
F 2. Premier et deuxième articles des antennes		

presque de même longueur, premier article

avec un tubercule épineux, bien au-dessous de l'angle supérieurde	Groupe XXIX.
F 1. Denxième article beaucoup plus petit que le premier.	
G 3. Premier article très large, avec un tubercule	
en dessous de l'angle supérieur	Groupe XXX.
G 2. Premier article plus long que large, renflé, avec un tubercule large, tronqué à l'angle	
supérieur interne, sans échancrure	Groupe XXXI.
G 1. Premier article beaucoup plus long que	
large, moins renflé, avec un tubercule	
large, tronqué à l'angle supérieur interne.	
un peu échancré en dedans	Groupe XXXII.
beaucoup plus large que long, obliquement	
arrondi, cordiforme, premier peu à peu	
élargi, sa plus grande largeur en arrière du	
sommet et denté à cet endroit, le bord in-	
terne à arête vive en arrière de la dent.	O. V.V.
(ex Gang I bauer	Groupe XXXIII.
supérieur interne un peu marqué, bien	
qu'émoussé, premier plus long que large,	
renflé vers le milieu, puis plus ou moins	
sinué ou émarginé, et l'angle supérieur in-	
terne pointu	Groupe XXXIV.
carré long, les angles étant aigus, mais	
non proéminents.	
E <sup>3</sup> 2. Prothorax fortement ponctué	Groupe XXXV.
E <sup>3</sup> 1. Prothorax imponctué (très rarement très	
faiblement ponctué).	
F <sup>1</sup> 3. Premier article court, presque triangulaire, anguleusement dilaté et tuberculé en de-	
dans.	
G12. Deuxième article carré	Groupe XXXVI.
G <sup>1</sup> 1. Deuxième article plus long que large. l'an-	
gle inférieur interne un peu proéminent	Groupe XXXVII.
F¹2. Premier article un peu plus long que large, arrondi, tubercule situé presque tout à fait	
à l'angle interne, tronqué, sa troncature	

prolongée en pointe en dessus, deuxième	
carréF14. Premier article bien plus long que large.	Groupe XXXVIII.
622. Premier article avec le tubercule ou l'épine	
situé tout à fait à l'angle supérieur.	
H 2. Deuxième article presque du double plus	
long que large, droit, caréné en dedans.	
premier avec une fine épine à l'angle su-	
périeur	Groupe XXXIX.
H 1. Deuxième article carré.	though AAAIA.
1 2. Premier article cylindrique, un peu sillonné	
longitudinalement, tubercule très court,	
oblique, 2º article carré	Groupe XL.
1 4. Premier article assez plat, tubercule fort et	or oupe 2013.
latéral, deuxième article carré	Groupe XLI.
G24. Premier article avec le tubercule situé bien	See Superior Control
en dessous de l'angle supérieur interne.	
H12. Premier article avec un tubercule spini-	
forme, mince, assez long, mais tronqué, pas	
de sinuosité au côté interne: deuxième	
article un peu plus long que large	Groupe XLII.
H <sup>1</sup> 4. Premier article avec un tubercule large, très	
court, largement tronqué, placé dans une	
sinuosité du côté interne, 2º article carré.	Groupe XLIII.
D <sup>1</sup> 2. Deuxième article un peu oblique, plus large	
à la base qu'au sommet. l'angle inférieur	
interne étant un peu proéminent bien qu'é-	
moussé; premier article gros court, avec	
un tubercule spiniforme, situé vers le mi-	
lieu.	
E'2. Premier article convexe, deuxième à angle	
supérieur émoussé	Groupe XLIV.
E 4. Premier article entaillé en dedans, à la base.	
deuxième à angle supérieur interne très	Groupe XLV.
aigu	Groupe XLV.
peu triangulaire, rétréci à la base, épaissi	
au sommet	Groupe XLVI.
A 1. Premier article simple, deuxième seul anor-	
mal ou armé.	
B <sup>†</sup> 6. Deuxième article globuleux.	
0	

C72. Prothorax fortement ponctué; 2° article des		
antennes à peine tuberculé en dedans	Groupe	XLVII.
C74. Prothorax imponetué.		
D <sup>2</sup> 2. Deuxième article avec un fort tubercule	Groupe	XLVIII.
D24. Deuxième article faiblement caréné en de-		
dans	Groupe	XLIX.
B <sup>†</sup> 5. Deuxième article transversal, rétréci et acu-		
miné en dedans	Groupe	1
B <sup>†</sup> 4. Deuxième article carré, caréné en dedans	Groupe	LI.
B <sup>‡</sup> 3. Deuxième article élargi, en dedans, en forme		
de denticule presque triangulaire, son bord		
interne supérieur concave jusqu'à la dent.		
l'inférieur convexe	Groupe	1.11.
B12. Deuxième article à peu près carré, sécuri-		
forme au côté interne : prothorax ponctué.	Groupe	LIII.
B <sup>1</sup> 1. Deuxième article plus long que large, un		
peu pyriforme, plus étroit à la base, très		
lingment empire	Granno	111

Bryaxis sculptifrons Reitt. — Var. Roumaniae. n. var. — Cette variété, dont je ne connais que deux exemplaires mâles, est en tous point semblable au type et n'en diffère que par les deux premiers articles des antennes : le premier est moins sinué intérieurement et le tubercule aplati est moins visible, le 2º est bien plus long que large, tandis que dans le type il est carré avec tendance à devenir transversal. Je ne crois pas que ce soit là une modification suffisante pour créer une espèce, mais en tout cas, c'est une variété bien marquée qu'il importe de signaler.

Boumanie.

Bryaxis nodicornis Aubé. — Var. Montandoni, n. var. — Cette variété est très tranchée, mais les différences ne portant que sur le plus ou moins de dilatation du 2º article des antennes, je ne puis la considérer que comme variété. Dans le type, le 2º article des antennes est nettement transversal, un peu conique au côté interne; dans la variété cet article est presque aussi long que large, régulièrement et fortement arrondi au côté interne, ce qui le fait paraître un peu plus gros.

Carpathes : Sinaïa.

Je la dois à M. Montandon à qui je me fais un plaisir de la dédier.

## Tableau du genre Tychus

A 2. Tête au moins aussi large que longue, généralement rétrécie en avant; en tout cas jamais les tubercules antennaires ne sont divariqués ni dilatés latéralement.

Espèces paléarctiques.		
B 4. Trochanters intermédiaires armés.		
C. 2. Épine des trochanters intermédiaires simple.		
D 6. Cinquième article des antennes beaucoup plus		
gros que les autres.		
E 2. Métasternum simple	Groupe	1.
E 1. Métasternum avec une dent	Groupe	11.
D 5. Sixième article des antennes beaucoup plus gros		
que les autres	Groupe	Ш.
D 4. Articles des antennes 5 et 6 beaucoup plus grands		
que les autres	Groupe	iV.
D 3. Articles des antennes 6 et 7 plus gros que les		
autres	Groupe	V.
D 2. Articles des antennes 3-5 plus gros que 6-8	Groupe	VI.
D 4. Articles des antennes tous simples dans les deux		
sexes, 5 parfois plus long mais jamais plus		
gros que 6-8.		
E <sup>1</sup> 2. Des yeux normaux dans les deux sexes; tête	~	
simple et sans armature, chez les mâles	Groupe	VII.
E <sup>1</sup> 4. Pas d'yeux, tout au moins chez les femelles	Groupe	VIII.
C. 4. Épine des trochanters intermédiaires double	Groupe	IX.
B 3. Trochanters intermédiaires simples, antérieurs	G.	**
armés; tête armée	Groupe	Χ.
B 2. Trochanters intermédiaires et antérieurs simples,		
postérieurs armés; tête simple; métasternum	(300000	V.1
tuberculé	Groupe	X1.
B 4. Trochanters de tous les pieds simples.	Almann.	V: 11
G <sup>1</sup> 2. Tête armée	Groupe	XII.
D <sup>†</sup> 2. Métasternum plus ou moins impressionné en ar-		
rière, jamais entièrement sillonné.		
E <sup>2</sup> 2. Métasternum ayec un tubercule près des hanches		
intermédiaires	Groupe	7.111
E <sup>2</sup> 4. Métasternum sans tubercule	Groupe	
12 15 Metasternam sans tancretae	or eart	A117.

D14.	Métasternum	profondément et largement sillonné		
	dans toute	sa longueur	Groupe	XV.

## Espèces de l'Amérique du Nord.

- a 2. Yeux normalement développés.
- b 3. Trochanters simples.
- b 2. Trochanters antérieurs épineux..... Groupe XVIII.
- b 1. Trochanters antérieurs épineux, postérieurs épineux et tuberculés....
- neux et tuberculés . . . . . . . . . Groupe XIX. a 1. Yeux composés seulement de quelques facettes  $\circlearrowleft$  . Groupe XX.
- A 1. Tête pas aussi longue que large, les tubercules antennaires étant un peu dilatés en dehors, et disconius (capitages palégratiques)

divariqués (espèces paléarctiques)..... Groupe XXI.

L'étude des *Tychus*, du moins de certaines espèces européennes et algériennes, offre de grandes difficultés. Comme les *Bryaxis* (*Bythinus*) dont ils sont d'ailleurs voisins, ils présentent, ainsi que me l'a fait judicieusement observer M. P. de Peyerimhoff, qui a bien voulu comparer un certain nombre de mes matériaux et me communiquer une partie des siens, des cas de poecilandrie avec des grands, moyens et petits développements chez les mâles; mais ces modifications, au lieu de porter sur les pattes, comme dans *Bryaxis* (*Bythinus*), affectent les antennes, chez les uns, et la tête, chez les autres.

Dans *T. ibericus* Motsch., c'est l'antenne qui se modifie; son minimum de développement s'observe chez ce qu'on peut considérer comme la forme typique de Motschulsky redécrite par Reitter (*type* Reitter); le 3º article est obconique, plus long que large, les 4º et 5º sont moniliformes, aussi longs que larges et pas plus larges que le 3º; les 6º, 7º et 8º sont un peu plus petits, mais à peine transversaux.

T. striola Guillebeau (type Guillebeau), est absolument identique, mais déjà les articles 3 à 3 montrent une tendance à s'épaissir.

T. ibericus Guillebeau (type Guillebeau): le 3° article est un peu plus épais et proportionnellement plus court, les 4° et 5° sont un peu plus larges et légèrement transversaux, les 6°, 7° et 8° légèrement transversaux.

T. moniticornis Guillebeau (type Guillebeau), est une variété mélanique dont les antennes sont semblables à celles de son ibericus.

T. mutinensis Reitter (type Reitter), est également une variété mélanique : le 3° article est obconique et encore plus long que large, les 4º et 5º sont à peu près aussi longs que larges, mais tous les trois sont plus gros que dans *ibericus* Mots. Reitt., avec tendance, pour le 4º, à être plus fort et surtout plus long que le cinquième.

T. corsicus Reitter (type Reitter): variété claire, articles 3 très légèrement plus long que large, 4 et 5 sensiblement transversaux, 6, 7 et 8 transversaux.

T. creticus Reitter (type Reitter): variété claire, articles 3, 4, 5 un peu plus épais que dans corsicus, 3 plus court, 4 et 5 moins transversaux, 6, 7, 8 relativement plus petits et plus transversaux.

T. monilicornis Reitter (type Reitter): variété foncée, mais non mélanique; élytres d'un brun rouge, articles 3 à 5 atteignant leur maximum d'épaisseur, 3 obconique, plus long que large, 4 et 5 nettement transversaux. 6, 7, 8 bien plus petits et transversaux.

Si on ne considère que les types extrêmes et même si on les étudie successivement, au lieu de les examiner comparativement et simultanément, on sera amené à considérer ces différentes formes comme des espèces différentes, que relient cependant entre elles les développements intermédiaires.

Ainsi compris, *T. ibericus* est répandu dans la France centrale orientale et méridionale, en Espagne, en Italie, en Corse, Sardaigne, Sicile. Crète. Dalmatie. Herzégovine. Si *T. erythropterus* Schmidt, lui est identique, il se rencontrerait jusque sur les rives orientales de la Mer Noire; mais je ne l'ai pas vu de cette région, pas plus que du Caucase, ni des parties orientales de l'Europe.

Le même phénomène se produit pour *T. niger* Payk., qui a une variété à coloration claire, *dichrous* Schmidt, et une autre variété à antennes moins fortes, *colchicus* Saulcy : ces deux variétés sont de l'Europe orientale et du Caucase.

T. bryaxioides Guillebeau, est encore une forme protéique au plus haut point. Dans le type normal qui correspond le mieux à la description de Guillebeau, dont je ne connais pas les types et d'après les observations de M. P. de Peyerimhoff et des exemplaires que j'ai recus de M. Théry comme des co-types de Guillebeau, la tête est très peu rétrécie en avant, le front porte un sillon transversal entier, profond, avec un petit tubercule tronqué, le bourrelet frontal est droit en avant, un peu creusé au centre et arrondi sur les côtés et le vertex est tronqué carrément au-dessus du sillon. Ce développement, qui peut être considéré comme moyen, est lui-même variable, j'en possède des exemplaires dans lesquels le vertex est un peu angulé, au milieu, au-dessus du sillon frontal. T. Koziorowiczi Croiss., qui a été identitié par M. de Peyerimhoff et aussi très certainement Aŭverti Croiss., que je ne

connais pas, sont identiques à cette forme, avec de très légères variations.

T. Pici Croissand. (aurientatus Saulcy in. litt.), est un grand développement : la tête n'est nullement rétrécie en avant, le vertex est proéminent, en avant et anguleusement entaillé, au milieu, au-dessus du sillon frontal; ce dernier est très large, profond avec un gros tubercule; le bourrelet frontal est assez mince et un peu tranchant, légèrement arrondi, plus épais et un peu auriculé sur les côtés.

Les plus petits développements viennent d'être décrits par M. de Peyerimhoff l'Abeille, XXX, 1904, p. 177, sous le nom de var. Raffrayi: ils ont la tête bien plus atténuée, en avant, avec les côtés obliques.

Dans les femelles du Frais-Vallon, près d'Alger, que m'a communiquées M. de Peyerimhoff, il y a, de chaque côté du vertex, un sillon oblique, tous les deux se rejoignant sur le front.

Dans toutes ces formes les antennes sont identiques, avec les articles carrés, mais je possède un développement maximum qui avait reçu autrefois, de M. de Saulcy, le nom inédit de *Poupillieri*. Cette variété, qui u'a pas été décrite à ma connaissance, est si tranchée que je l'ai longtemps considérée comme une espèce distincte, surtout à cause de ses antennes dont les articles sont notablement plus longs que larges. Je crois indispensable de la décrire et je lui conserve le nom de collection que lui avait assigné de Saulcy, en mémoire d'un entomologiste qui a été un des premiers collecteurs en Algérie.

Tychus bryaxioides Guillebeau, var. Poupillieri n. var. — Plus grand et plus robuste que le type, entièrement roux ferrugineux. Antennes allongées, articles 1 et 2 altongés, cylindriques, 3-7 cylindriques, plus larges que longs, décroissant de longueur, 8 carré. Tête nullement atténuée en avant, vertex tronqué circulairement, au-dessus d'un sillon frontal très large et profond, au milieu duquel il y a un tubércule fasciculé; le bourrelet frontal est en forme de carène un peu arrondie, mais assez tranchante, un peu irrégulière, arrondie et épaissie, légèrement auriculée sur les côtés. Chez la femelle la tête est un peu rétrécie en avant, mais les tubercules frontaux sont forts, très obtus, séparés par un sillon longitudinal, au fond duquel il y a un vestige de tubercule. — Long. 4,60 mill.

Fai pris cet insecte autrefois auprès d'Alger, sur les hauteurs de Dely-Ibrahim.

**Tychus Dispina** (Saulcy in. litt.) n. sp. — Elongalus, piceus, antennis pedibusque rufis. Caput magnum, postice convexum, anterius parum attenuatum, fronte capite vix angustiore, valde bituberculata,

istis tubercutis rufescentibus. Antennae magnae, clava magna, dimidiam partem corporis aequantes, articulis 1 et 2 cylindricis, 3 obconico, 4 et 5 cylindricis, latitudine sua paulo longioribus, 6, 7, 8 quadratis, 9 et 10 quadratis, 8 praecedente fere triplo majore et 9 adhuc paulo majore, 11 ovato, acuminato. Prothorax latitudine sua longior, subhexagonus, basi media forea punctiformi, et utrinque, linea punctorum. Elytra latitudine sua longiora, ad basin attenuata, lateribus subobliquis, stria dorsali ralida, medium attingente. Metasternum late concavum. Trochanteribus intermediis apice dente valido bifido munitis. — Long. 1,30 mill.

Tanger.

Petite espèce, étroite et allongée, à grandes antennes : l'épine fortement bifide des trochanters intermédiaires, l'isole de toutes les autres.

L'exemplaire unique que je possède provient de la collection Chevrolat où il était étiqueté, de la main de M. de Saulcy, sous le nom que je lui ai conservé, mais je ne sache pas qu'il ait jamais été décrit.

Tychus sternalis n. sp. — Oblongus, sat angustus, supra piceus, infra castaneus, antennis pedibusque rufis, sat longe tenuiter pubescens. Caput elongatum, antice valde attenuatum, tuberculo antennario parum profunde sulcato. Antennae crassae, breves, articulis 1 et 2 cylindricis, 2 latitudine sua paululum longiore, 4-8 quadratis, 7 et 8 nonnihil transversis, 9 et 10 fere duplo majoribus, leriter transversis, 11 breviter ovato, basi late truncato. Prothorax latitudine sua paulo longior, subhexagonus, basi media fovea mediocri, subovata, et foveolis aliquot minoribus. Elytra latitudine sua paulo longiora, basi attenuata, stria dorsali valida, medium attingente. Metasternum totum concarum, utrinque, carina obtusa, leviter arcuata, definitum, basi juxta coxas intermedias, tuberculo crasso, transverso, valido. Segmentis ventralibus primis medio deplanatis. Pedes sat validi, simplices. — Long. 1.30 mill.

Amérique septentrionale : Pensylvanie.

Cette espèce est très voisine de *T. spiculifer* Cas., mais les antennes sont un peu moins épaisses, le tubercule antennaire est plus plat et moins profondément sillonné et la forme générale du corps est plus étroite. Dans *T. spiculifer*, le métasternum n'est pas entièrement concave, les côtés ne sont pas relevés en carène obtuse et le tubercule épais de la base manque, mais il y a, au milieu, un tubercule lamelli-

forme redressé étroit, en arrière duquel le métasternum est déprimé. Je dois cette nouvelle espèce au Rév. J. Schmitt, de St-Vincent College.

## Harmomima n. gen.

Suborata. Caput subquadratum, plus minusve forealum. Antennae breves, articulis duobus primis majoribus, caeteris moniliformibus, vel transversis, clava uniarticulata. Oculi pone medium siti, mediocres. Palpi mediocres, articulis 2 gracili, apice abrupte clavato, 3 minuto. globoso, 4 magno, leviter securiformi, apice acuminato. Prothorar brevis, subcordatus vel subrotundatus, foreis tribus liberis, aequalibus, quarum lateratibus latera tangentibus, basi transversim impressa. Elytra plus minusre quadrata, basi biforeata, sulco dorsali brevissimo, accentiformi, humeris obtuse dentatis, sulco susepipleurali mediocri, lateribus cultratis. Abdomen anguste marginatum, segmentis dorsalibus subaequalibus. Coxae intermediae leviter distantes, mesosterno inter eas deplanato, posticae minus distantes quam triens latitudinis corporis. Segmentis ventralibus 1-3 decrescentibus, 6 majore. Pedes breves.

Ce genre diffère de *Batrybraxis* Reitt.. par les antennes à massue uniarticulée, le prothorax sans sillon transversal et à fossettes libres. le premier segment dorsal pas sensiblement plus grand que les autres.

Il ressemble davantage à *Harmophola* Raffr., qui a également la massue uniarticulée, mais le dernier article des palpes est bien plus grand, plus sécuriforme et. dans *Harmophola*, le prothorax présente un sillon longitudinal de chaque côté et un transversal ayant la base.

Harmomima grandiceps n. sp. — Tota ferruginea, antennis pedibusque rufis, nitida, laevis et glabra. Caput antrorsum leviter attenuatum, lateribus obliquum, supra antennas utrinque nodosum, fronte truncatum et leviter arcuatum. in linea anteriore oculorum, utrinque, fovea profunda et sulco parabolico anterius rotundato et obsoleto, vertice medio impressione lata, profunda, postice sulco profundo usque ad collum producto. Antennae breves, articulis 2 brevissime ovato, 3-8 moniliformibus, 7 paululum majore et 8 leviter transverso, 9 et 10 ralde transversis et latitudine leviter crescentibus, 11 magno, ovato, valde acuminato. Prothorax breviter subcordatus, lateribus rotundatus, paulum sinuatus, foveis lateralibus, basi oblique impressa. Elytra quadrata, sulco dorsali brevissimo. Metasternum planum, sulcatum. Femoribus parum crassis, tibiis, praesertim intermediis, medio extus paululum crassioribus, posticis leviter incurvis ♀. — Long. 1.20 mill.

Haute-Bolivie : Yuracaris.

Harmomima impressicollis n. sp. — Magis elongata, tota rufa, glabra, nitida, antennis pedibusque testaceis. Caput sicut in



Fig. 89

praecedente, sed paulo minus, vertice haud impresso et occipite vix perspicue sulcato. Antennae graciliores, articulis 2 globoso. 3-10 moniliformibus, 3-8 globosis, 9 et 10 leviter transversis, 11 oblongovato, vaide acuminato. Prothorax subrotundatus, forea media magna, lata, parum profunda, basi minus oblique impressa. Elytra latitudine sua paulo longiora, basi haud attenuata, humeris obliquis, sulco dorsali trientem attingente. Metasternum sulcatum, isto sulco basi latiore, apice tenui. Segmento centrali ultimo magno, late, sed parum profunde impresso. Femoribus parum crassis, tibiis, praesertim intermediis, medio extus, leviter incrassatis, posticis leviter incurvis \( \sigma \). — Long. 4 mill. — Fig. 89.

Hante-Bolivie : Yuracaris.

**Dalmodes gracilipes** n. sp. — Elongatus, rubro-castaneus, antennis pedibusque rufis, parce pubescens. Caput subtransversum, inter oculos foreis duabus et sulco parabolico in fronte quadrato, occipite convexo, postice sulcato et sinuato. Antennae mediocres, articulis 1 subelongato et obconico, 2 ovato, 3-8 moniliformibus et globosis, 9 transverso, vix latiore, 10 majore, transverso, 11 brevissime ovato, basi late truncato, apice fere turbinato. Prothorax cordatus, latitudine sua longior, utrinque forea laterali mediocri, sulco transverso leviter arcuato, profundo et medio ampliato. Elytra subquadrata, lateribus leviter rotundata, humeris notatis et quadratis, obtuse carinatis, basi transversim et obtuse elevata, triforeata, stria dorsali nulla. Abdomen elytris longius, segmentis dorsalibus subuequalibus, in primo cavinulis duabus validis, teviter divergentibus, mediam partem disci attingentibus et quartam includentibus. Pedes validi, femoribus clavatis, tibiis basi gracilibus, apice, praesertim intermediis et postivis, incrassatis et incurvis.

3 Metasternum deplanatum, segmento ultimo rentrali impresso. Trochanteribus intermediis dentatis. — Long. 1,30-1,60 mill.

Brésil : Blumenau.

Cette espèce est voisine de *D. labialis* Schauf., mais elle est plus allongée et plus étroite ; le prothorax est plus long que large, tandis qu'il est presque transversal chez *labialis*.

Tanypleurus megacephalus n. sp. — Breviler ovalus, convexus, obscure vastaneus, nitidus, laevis, glaber, antennis pedibusque rufis. Caput magnum, transverso-quadratum, lateribus medio leviter incurvis, angulis anticis rotundatis et elevatis, valde notatis, postice profunde et oblique impressis, fronte capite angustiore, postice sulco transverso definita, vertice convexo et medio sinuato, impresso. Caput infra grosse punctatum. Antennae validae, articulis 1 quadralo, 2 vylindrico, latitudine sua paulo longiore, 3 breviter obconico, 4-8 monitiformibus, 9 paulo minore, valde transverso, 10 majore, transverso, 11 maximo, brevissime et late ovato. Prothorax cordatus, latitudine sua longior. Elytra magna, subovata. Abdomen breve, acuminatum. Metasternum minute, oblonge foveatum. Pedes sat clongati, femoribus medio clavatis, tibiis ad apicem leviter incrassatis, anticis et intermediis leviter sinuatis, posticis subrectis. — Long. 1.30 mill.

Sumatra.

1

Cette espèce, qui ne pourrait être confondue qu'avec *T. malaianus* Raffr., en diffère par sa tête beaucoup plus grande et plus transversale.

#### CATALOGUE.

#### TYCHINI

Bythinini Raffray, Rev. d'Ent. 1890, pp. 83, 126, 131. — Ganglbauer, Käf. Mitteleur, H. 1895, p. 814.

#### TRICHOBYTHUS

Dodero, Ann. Mus. Civ. Gen. 1900, p. 408. — Peyerimhoff, Bull. Soc. ent. Fr. 1901, p. 205.

anophthalmus Dodero, loc. cit. p. 408, et fig. . . . Italie: Génes.

#### ECCOPTORYTHES

DEVILLE, Bull. Soc. ent. Fr. 1901, p. 271.

paradoxus Deville, loc. cit. p. 271, et fig........... France méridionale : Nice.

#### DECATOCERUS

Sauley, Berl. Ent. Zeits, 1870 (Beih.), p. 89. — Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 4881, p. 478.

- Alhambrae Sauley, loc. cit. p. 89, pl. II, f. 7.
- REITTER, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, p. 478. Espagne: Grenade. **Dicornis** REITTER, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881,

#### MACHAERITES

Miller, Verh. z. b. Ges. Wien, 1855, р. 509. — Schaufuss, Verh. z. b. Ges. Wien, 1863. р. 1242. — Sauley, Ann. Soc. ent. Fr. 1863. р. 80. — Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881. рр. 456, 478. — Raffray, Rev. d'Ent. 1890. рр. 126, 128. — Ganglbauer, Käf. Mittel. II. 1895, р. 818. — Реуегинногг, Bull. Soc. ent. Fr. 1901, р. 204.

- Spelaeus Miller, Verh. z. b. Ges. Wien, 4853, p. 309.
   Schaufuss, Verh. z. b. Ges. Wien, 4863, p. 1244. —
   Sauley, Ann. Soc. ent. Fr. 4863, p. 80. pl. III. f. 3.
   Kraatz, Berl. Ent. Zeits. 4863, p. 422. Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 4881, p. 479. —
   Ganglbauer, Käf. Mittel. II. 4895, p. 836. . . . . .
  - ..... Carniole : grotte de Strug.
- ? Lucantei Sauley, Pet. nouv. ent. 1878, p. 40. REITTER, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, p. 481......
  - France méridionale : Basses-Pyrénées.

2

#### BYTHOXENUS

Motschulsky, Ét. ent. 1859, p. 432. — Ganglbauer, Käf. Mittel, II, 1895, p. 848. — Реуегиногг, Bull. Soc. ent. Fr. 4901, p. 205.

Facetus Schaufuss, Nunq. ot. II. p. 454.

subterraneus Motsch, Ét. ent. VIII, 1859, p. 432,
pl. I, f. 2. — Schaufuss, Verh. z. b. Ges. Wien.
1863, p. 4244, pl. 25, ff. 9, 10. — Reitter, Verh. z-b. Ges. Wien, 4881, p. 480, pl. XIX, ff. 44, 15. —
Ganglbauer, Käf. Mittel, II, 1895, p. 836 —

Peyerimhoff, Bull. Soc. ent. Fr. 1901, p. 298....

Carniole: grotte de Pasica.

\$\infty\$ plicatulus Schaufuss, Rev. Mag. Zool. 4863, p. 293;
Verh. z. b. Ges. Wien. 4863, p. 1245, pl. 25. ff. 5-8.
41; Nunq. ot. II, p. 454.

Argus Kraatz, Berl. Ent. Zeits. 4863, p. 122, pl. IV,
f. 1. — Речекиноff, Bull. Soc. ent. Fr. 4901,
p. 298. Carniole: grotte de Pasica.

Revelièrei Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien. 1881,
p. 482, pl. XIX, f. 1. Corse.

? cristatus Saulcy Machaerites , l'Abeille, 1872, p. 16;

? cristatus Sauley Machaerites . l'Abeille. 1872, p. 16;
Bull. Soc. ent. Fr. 1872, p. xix. — Reitter, Verh.

z. b. Ges. Wien, 481. p. 481. . . . France méridionale : Ariège.

#### LINDERIA

SAULCY, Ann. Soc. ent. Fr. 1863, p. 81.

Mariae Jacq. Duval (Machaerites), Glan. ent. I. 4859, p. 35. — Sauloy, Ann. Soc. ent. Fr. 1863, p. 82, pl. 3, ff. 1, 2. — Schaufuss, Verh. z. b. Ges. Wien, 4863, p. 1247, pl. 25, ff. 17-22. — Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 4881, p. 481, pl. XIX, ff. 18, 49. France méridionale: Pyr.-Orientales.

? Bonvoutofri Sauley, Ann. Soc. ent. Fr. 4865.
p. 46. — Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 4884.
p. 482. . . . . France méridionale : Pyr. Orientales.

? Clarae Schauffuss, Verh. z. b. Ges. Wien, 1863.
p. 1248, pl. 25, ff. 12-46...... Espagne: Province de Burgos.

#### XENOBYTHUS

Bull. Soc. ent. Fr. 4901, p. 203,

Serullazi Peyerim. loc. cit. p. 203. ff. 1, 2.......... France méridionale : Alpes-Maritimes, grotte de Daluis.

Ann. Soc. Ent. Fr., LXXIII [1904].

#### GLYPHOBYTHUS

Doriae Schaufuss (Machaerites). Nunq. ot. II, p. 290.
— Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 4881. р. 480.
Italie : La Spezzia.
maritimus Reitter (Machaerites), Verh. z. b. Ges.
Wien, 1884. p. 70. France: Alpes-Maritimes.
gracilipes Deville (Machaerites), Bull. Soc. ent. Fr.
4899, p. 63
Vaccae Dodero (Bythoxenus), Ann. Mus. Civ. Gen.
4900, p. 410 Italie : Ligurie, grottes Vazi et Pollera.
Var. Bensae Dodero, loc. cit. 1900, p. 410
Italie : Finalmarina , grotte Arene candide.
4
TYCHOBYTHINUS
Ganglbauer, Verh. z. b. Ges. Wien, 4896, p. 470.
eavifrons Reitter (Bythinus), Verh. z. b. Ges. Wien,

Hongrie.

Dalmatie.

p. 70.....

## PSELAPTRICUS

Brendel, Ent. Amer. V, 1889, p. 194; Bull. Un. Iowa. I, 1890, p. 242.

tuberculipalpus Brendel, Ent. Am. 4889, p. 194;
Bull. Un. lowa. I, 1890, p. 242, pl. VII, f. 24.....

Amérique septentrionale : Californie, Alameda.

#### BRYAXIS

Kugelańn, Neu, Schneid, Mag. 1794, p. 580.

Bythinus Leach, Zool. Miscell. III, 4817, p. 82; Zool. Journ. Lond. 1826, p. 446. — Denny, Mon. Psel. 4825, p. 20. — Aubé, Psel. Mon. 1833, p. 33; Ann. Soc. ent. Fr. 1844, p. 126. —

Erichson, Käf. Mk. Brandbg, I. p. 271. — Jacq. Duval. Gen. Col. Eur. 1, p. 131. — Thomson, Skand. Col. III, p. 230. — Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, pp. 451, 455, 478. — Raffray, Rev. d'Ent. 1890, pp. 126, 128. — Ganglbauer, Käf. Mittel. II, 4895, p. 814.

Arcopagus Leach, Zool, Miscell, III, 1817, p. 83; Zool, Journ, Lond, 1826, p. 447. — Denny, Mon. Psel, 1825, p. 24.

Kunzea Leach. Zool. Journ. Lond. II. 1826, p. 448.

## Groupe 1.

 myrmido
 Reitter
 (Machaerites)
 Verh. z. b. Ges.

 Wien, 1881, p. 482. pl. XIX. f. 20. — Croissandeau
 Corse.

 Le Coléopt. 1891, p. 138, pl. III, f. 49.
 Corse.

## Groupe II.

## Groupe III.

gladiator Reff. Verh. z. b. Ges. Wien. 1884, p. 70. Halie. Corse?.

## Groupe IV.

Q Eppelshemi Reitter (Machaerites), Verh. z. b. Ges. Wien, 1884, p. 70. (Italie: Gènes).

? 2 curvicornis Croissand, Le Coléopt. 1891, p. 136. (Vallombrosa).

## Groupe V.

**algirica** Raffray, Pet. nouv. ent. 1871, p. 160; Rev. Mag. Zool. 1873, p. 366, pl. XV, f. 6, — Reitter

Machaerites), Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, p. 483.
Algérie : gorges de la Chiffa. Tunisie. Maroc.
Theryi Guller. [Machaerites]. Bull. Soc. ent. Fr.
4893. р. сехен
Xambeui Guilleb. Rev. d'Ent. 1888, p. 203 France méridionale : Montélimar.
Abeillei Gulleb. loc. cit. p. 204 France : Le Plantay.
Apfelbecki Ganglbauer, Käf. Mittel. II. 1895, p. 834. Bosnie.
2 Czernohorshyi Reitter, Wien. Ent. Zeit. 1902, p. 4, pl. 1, f. 4. (Herzégovine).
tychoides Brendel (Tychus), Proc. Ent. Soc. Phil.
4865, p. 259; 4863, p. 33.
bythinoides Brendel (Machaerodes), Bull. Un. Iowa,
I, 4890. p. 253, pl. VI, f. 35
Amérique septentrionale : Pensylvanie.
Carolinae Casey, Col. Not. VII, 4897, p. 614
Amérique septentrionale : Caroline du Nord.
tunisea Pic, Bull. Soc. ent. Fr. 4900, p. 404 Tunisie.
pauper Kiesenw, Berl. Ent. Zeits, 1858, p. 48. —
REITTER. Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, p. 448
Grèce : Morée, Nauplie, Zante.
paupercula Reitter, Deuts. Ent. Zeits. 1885, p. 201.
Bosnie: Nemila.
caviceps Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, p. 484.
pl. XIX, f. 22
A
Halbherri Reitter, Deuts. Ent. Zeits. 4883, p. 368.
— Dodero, Mus. Civ. Gen. 4900, p. 43 et fig
Fauconneti Fauvel, Rev. d'Ent. 1886, p. 125.
Croissandeau, Le Coléopt. 1891, p. 139
France: Lyon, Auvergne, Me-Dore, Le Lioran, Morbihan.
Var. Grilati Reitter, Wien. Ent. Zeit. 4886, p. 236.
? Damryi Croissandeau Machaerites). Le Coléopt.
4891. p. 137 Sardaigne. ? Corse.
Groupe VI.
reversa Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 4883, p. 327.
Japon : Nagasaki.

#### Groupe VII.

Caucase.

## Groupe VIII.

Baudueri Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, p. 71.

— Fauvel, Rev. d'Ent. 1891, p. 20. — Croissand, Le Coléopt, 1891, p. 138. — Ganglbauer, Käf. Mittel.

II, 1895, p. 833. . . . . France méridionale : Pyrénées

difficilis Reitter. Ann. Mus. Civ. Gen. 4884, p. 369. Sardaigne.

### Groupe IX.

affinis Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1883, p. 326...

..... Japon : Nagasaki.

## Groupe X.

**corputenta** Мотscн. Bull. Nat. Mosc. 1845, 1, р. 45; 1851, р. 498.....

Cancase,

Jaso Sauley, Verh. naturf. Ver. Brünn. XVI, 1878, p. 435. — Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, p. 484, pl. XIX, f. 25.

Cocles Sauley, Cat. Gren. 1863 (Mat., p. 12. — Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, p. 487... France méridionale. hypogaea Sauley, Ann. Soc. ent. Fr. 1863, p. 657.

montivaga Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 1884, p. 73. France: Pyr.-Orientales.

## Groupe XI.

oedymera Ganglb. Käf. Mitteleur, H. 1895, p. 832. Herzégovine.
### ### ### ### ######################
subsolida Reitter, Wien. Ent. Zeit. 1902. p. 2 Herzégovine.
sculpticornis Gulleb. Rev. d'Ent. 4891, p. 47 Valais: Loèche-les-Bains.
Groupe XII.
migripennis Aubé, Ann. Soc. ent. Fr. 4844, p. 431.  — Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, p. 501, pl. XIX, f. 77. — Ganglbauer, Käf. Mittel. II, 1895, p. 820
p. 43; 1881, p. 501, pl. XIX, f. 78. — GANGLBAUER, Käf. Mittel. p. 820
valida Aubé, Ann. Soc. ent. Fr. 4844, p. 430. — Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 4881, p. 502, pl. XIX, f. 79. — Glanglbauer, Käf. Mittel. II, 4895, p. 820 Silésie, Moravie, Hongrie, Belgique, France centrale.
Groupe XIII.
<b>Heydeni</b> Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 1879, p. 42; 1881, p. 485, pl. XIX, f. 27. — Glanglbauer, Käf. Mittel, 1895, p. 823
Nakeralae Beitt. Verh. z. b. Ges. Wien, 4884, p. 72. Caucase.
Groupe XIV.
? Antonii Croissand. Le Coléopt. 4891, p. 439, pl. IV, ff. 45, 46. France méridionale : Pyrénées.
Groupe XV.
Picteti Tournier, Bull. Soc. ent. Fr. 4859, p. xchi. — Ganglbauer Käf. Mittel. II, p. 830 * France: Nice, Pyrénées. 

Marthae Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 4881, p. 488, pl. XIX, f. 35.
peninsularis Sauley, Berl. Ent. Zeits. 1870 (Beih.).
p. 89. — Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881.
p. 490. pl. XIX. f. 41. Espagne : Algésiras. Portugal : Coïmbre.
pyrenaea Sauley, Cat. Gren. 1863 (Mat.), p. 43. —
Reitter. Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, p. 491
France méridionale : Pyrénées.
Var. normanna Croiss. (Sauley in. litt.). Le Coléopt.
1891, p. 143
·
trogtocera Sauley, Berl. Ent. Zeits. 4870 (Beih.),
p. 89. — Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881.
p. 491, p. XIX, f. 46 Espagne centrale et méridionale.
cateniger Krauss, Wien. Ent. Zeit. 4899, p. 204 Autriche.
anabates Holdhaus, Verh. z. b. Ges. Wien, 1902,
p. 201 (Tyrol méridional).
incerta Dodero (in. litt.). (Tyrol).
Dajulus Hampe, Ent. Mon. Wien, 4863, p. 287. —
REITTER, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, p. 491, pl.
XIX. f. 45. — GANGLBAUER, Käf. Mittel, II, 1895,
p. 832 Hongrie méridionale, Slavonie, Croatie, Dalmatie,
diversicornis Raffray, Rev. Mag. Zool. 4873, p. 366,
pl. XV. f. S
S'-Charles, Philippeville, Kabylie, Djebel-Mahadid, Collo.
Mauricii Reitter, Wien. Ent. Zeit. 1894, p. 149.
Raffray, Bull. Soc. ent. Fr. 4896, p. 219.
? foreicornis Gulleb, Bull. Soc. ent. Fr. 1897, p. 223.
Pic. loc. cit. 4897. p. 344.
Var. pallidior Pu., Bull. Soc. ent. Fr. 1900, p. 403
Tunisie : Kroumirie.
Croissandeaui Pic. Bull. Soc. ent. Fr. 4892.
p. cclxxII
verrucula Reitter. Verh. z. b. Ges. Wien. 4881,
p. 438, pl. XIX, f. 37
Groupe XVI.
·
etrusca Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, p. 491.

401)

Var. pedator Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, p. 489, pl. XIX, f. 38	ie : Tascane
Groupe XVII.	
p. 72. — Croiss. Le Coléopt. 1891. p. 441. pl. IV, f. 53. — Ganglbauer. Käf. Mittel. II. 1895. p. 829. France méridionale: Digne, Drôme, Nice, Antibes,	San-Remo
blanda Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 4884, p. 74.  Var. 3 Ravouri Grilat. l'Échange, 4889, p. 78. —  Fauvel, Rev. d'Ent. 4894, p. 20. — Peyerimhoff, Bull. Soc. ent. Fr. 4899, p. 229 et fig	
p. 386. — Ganglbauer, Käf. Mittel, II, 4895, p. 829.  serripes Fauvel, Rev. d'Ent. 4891, p. 48. — Croiss. Le Coléopt. 4891, p. 441 France méridiona.	le : <b>H</b> érault
Koltzei Reitter, Wien. Ent. Zeit. 4887, p. 269 Sibérie:	Vladivostok
Groupe XVIII.	
<b>Simoni</b> Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 4879, p. 535; 4881, p. 489, pl. XIX, f. 39. — Ganglbauer, Käf. Mittel. II, p. 830.	Bulgarie
Var. bulgarica Reitter, loc. cit. 1879, р. 535; 1881, р. 489. — Речениновъ, Вий. Soc. Ent. Fr. 4899, р. 228.	Bulgarie
Groupe XIX.	
rostrata Motsch. Bull. Nat. Mosc. 1845, I. p. 45; 1851, IV, p. 498	Caucase
Wien, 1881, p. 492, pl. XIX, f. 48.  nemilensis Reitter, Deuts. Ent. Zeits. 1885, p. 201.	
Bosn	ie : Nemila.
appendiculata Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 4884, p. 73.	Caucase.

dichroa Reitter, loc. cit. 1881, p. 491 Espagne.
Groupe XX.
elephas         Reitter, loc. cit. 1879, p. 467; 1881, p. 498,           pl. XIX, f. 67
peloponnesia Reitter, Deuts. Ent. Zeits. 4884,
p. 48, pl. II, ff. 12, 12a
argiola Reitter, Wien. Zeits. Ents. 4888, p. 286. Caucase. Circassie.
<b>iberica</b> Sauley, Berl. Ent. Zeit. 1870, p. 88. — Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien. 1881, p. 487, pl. XIX,         f. 34
Groupe XXI.
puncticollis Denny, Mon. Psel. 1825, p. 26, pl. V, f. 3 — Aubé, Psel. Mon. 1833, p. 41, pl. 87, f. 4 ♀;
Ann. Soc. ent. Fr. 1844, р. 129. — Erichson, Käf. Mk. Brandbg. I, р. 276. — Thomson, Skand. Col. III. р. 232. — Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 4881, p. 502. pl. XIX, f. 80. — Ganglbauer, Käf. Mittel.
П, 1895, р. 848
J regularis Schmitt, De Psel. Fn. Prag. p. 28. 2 rugicollis Leach, Zool. Journ. II, p. 448.
? carinula Rev, L'Échange, 1888, p. 4 France : Lyon.
Groupe XXII.
crassicornis Motsch. Nouv. Mém. Mosc. 1V, 4835, p. 317, pl. XI, f. E. — Алве́, Ann. Soc. ent. Fr.
1844, p. 132. — Reitter. Verh. z. b. Ges. Wien,
1881, p. 486. — GANGLBAUER, Käf. Mittel, II, 4895,
p. 831 Europe centrale, Caucase, Russie mévidionale.  2 longipalpis Morsen, Nouv. Mem. Mose, IV, 4835, p. 318, pl. XI, f. F.
Chandoiri Chaudoir, Bull. Nat. Mosc. 1815, р. 173. — Schaum. Stett. Ent. Zeit. 1846, р. 354.
Var. quisquiliarum Baudi Italie : M-Viso, M-Pisani.
Rosti Reitter, Wien. Ent. Zeit. 1894, p. 149 Circassie.
clavipes Morsen, Bull. Nat. Mosc. IV, 1851, p. 498.
Caucase, Daghestan, Géorgie russe,

schamyliana Sauley, Verh. naturf. Ver. Brünn,
XVI, 1878. p. 134, pl. II, f. 14. — Reitter, Verh.
z. b. Ges. Wien, 1881, p. 487, pl. XIX, f. 32.
Var. martkopia Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 1880, p. 510; 1881, p. 486, pl. XIX, f. 31
dimorpha Reitter, Wien. Ent. Zeit. 1888, p. 288 Daghestan.
tcherkessica Reitter. Wien. Ent. Zeit. 1888, p. 284.
Var. inermis Reitter, loc. cit. p. 285 Caucase. Circassie.
giraffa Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 4879, p. 49;
1881, p. 486, pl. XIX, f. 30
Lederi Reitter, Wien. Ent. Zeit. 1888, p. 285 Circussie.
Var. fluctuosa Reitter, loc. cit. p. 286
Groupe XXIII.
abastumana Reitter Verh. z. b. Ges. Wien, 4880,
p. 510; 1881, p. 489, pl. XIX, f. 40 Caucase oriental.
Groupe XXIV.
Argodi Croiss, Rev. d'Ent. 1885, p. 473; Le Coléopt.
4891. p. 140. — Ganglbauer, Käf. Mittel. H. 1895,
p. 831 France : Drôme, grotte du Sadou.
Groupe XXV.
convexa Kiesenw. Berl. Ent. Zeits. 4858, p. 47
Grèce : Morée, Olympe, Corfon, Zante.
Brenskei Reitter, Deuts. Ent. Zeits. 1884, p. 48, pl. II. 1. 44.
? levantina Schaufuss, Ann. Mus. Civ. Gen. 1882.
р. 398.
Groupe XXVI.
anguliceps Reitter, Deuts, Ent. Zeits, 4885, p. 369.
Portugal : Sierra Monchique.
Steindachneri Retter, Verh. z. b. Ges. Wien, 4880.           p. 511: 4881, p. 495, pl. XIX, f. 55
Groupe XXVII.
gallica Reitter. Deuts. Ent. Zeits. 1887, p. 268

swanetica Reitter. Verh. z. b. Ges. Wien, 1884. p. 73..... Cancase. Groupe XXVIII. collaris Baudi, Berl. Ent. Zeits. 4859, p. 341. -Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, p. 498. pl. XIX, f. 65. — GANGLBAUER, Käf. Mittel, II, 1895. p. 825 . . . Allemagne, France : Alpes-Maritimes, Italie : Étrurie. Manueli Sharp. Ent. Monthl. Mag. X1, 1874, p. 82. germana Reitter, Naturf. Insect. Deuts. III (2), p. 84; Verh. z. b. Ges. Wien, 1884, p. 74. Groupe XXIX. Mulsanti Kiesenw. Stett. Ent. Zeit. 1850, p. 222; Ann. Soc. ent. Fr. 1851, p. 402. - REITTER, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, p. 493. . . France méridionale : Pyrénées. Massanae Sauley, Ann. Soc. ent. Fr. 4864, p. 260. Desbrochersi Croiss, Le Coléopt. 1891, p. 408.... ..... France centrale : Mt-Dore , Le Lioran. Groupe XXX. Grouvellei Reitter. Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, p. 487. — Dodero, Ann. Mus. Civ. Gen. 1900. p. 414..... France méridionale : Nice. Var. alticola Dodero, Ann. Mus. Civ. Gen. 1900, p. 414 et fig ..... Piemont. Var. sculpticollis Refter. Wien, Ent. Zeit. 4885. p. 369. — Dodero, loc. cit. p. 414..... Liqurie. Var. obscurans Pic., Feuille j. Nat. 4893, p. 46. . . Alpes-Maritimes. pastoralis Peyerem. L'Abeille, XXX, 1901, p. 56. Alpes-Maritimes. dalmatina Reitter. Deuts, Ent. Zeits. 1881, p. 193, pl. VI, f. 46; Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, p. 490. - GANGLBAUER, Käf. Mittel. II, 1895, p. 831..... ..... Dalmatie méridionale : Herzégovine. melinensis Reitter, Deuts, Ent. Zeits, 4881, p. 495, pl. VI, ff. 6, 7; 45; Verh. z. b. Ges. Wien, 1881. p. 490. — Ganglbauer, Käf. Mittel, II, 1895, p. 831. ...... Dalmatie, Herzégovine.

<b>corcyrea</b> Reitter, Deuts, Ent. Zeits, 484, p. 108, pl. II, ff. 43, 43a
Formanecki Fleischer, Wien. Ent. Zeit. 1901, p. 444. — Reitter, loc. cit. 1902, pl. I. f. 5 Italie: Raguse.
Groupe XXXI.
Viertti Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 4884, p. 542:           4884, p. 71
Theana Reitter, Wien. Ent. Zeit. 1894, p. 413  Constantinople. Asie Mineure: Goek-Day.
Amasiae Reitter, Deuts. Ent. Zeits. 4890, p. 373  Turquie d'Europe : Amasia.
Groupe XXXII.
scapularis Reitter (Machaerites), Deuts. Ent. Zeits. 4881, p. 497, pl. VI, ff. 40, 41; Verh. z. b. Ges. Wien, 4881, p. 494. — Ganglbauer, Käf. Mittel. II, 4895, p. 835 Dalmatic. Herzégovine.
Groupe XXXIII.
transsilvanica Ganglbauer, Verh. z. b. Ges. Wien, 4897, p. 568
Groupe XXXIV.
Duldifer Reichenbach, Mon. Psel. p. 37, pl. 1, f. 6.  — Denny, Mon. Psel. 1825, p. 25, pl. V, f. 1. —  Aubé, Psel. Mon. 4833, p. 37, pl. 86, f. 2 \( \pi \); Ann.  Soc. ent. Fr. 4844, p. 133 — Erichson, Käf. Mk.  Brandbg. 1, p. 273. — Thomson, Skand. Col. III,  p. 231. — Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 4881,  p. 497, pl. XIX, f. 59. — Ganglbauer, Käf. Mittel.  II, 4895, p. 826. Europe. Caucase.  ? Schneideri Kugel. Nucu. Mag. Schneid. 4794, p. 580. Prusse.  anomala Schrank, Donaum. Brief. VIII, p. 436 Allemagne.  cephalotes Motsch. Bull. Nat. Mosc. 4845, I, p. 45. (Géorgie russe).  taurica Motsch. loc. cit. 4851, IV, p. 499. (Crimée.  flavipalpis Motsch. (in. litt.). (Russie méridionale).  Q glabricollis Gyllh. Ins. Svec. IV, p. 229. — Aubé.  Psel. Mon. 1833, p. 38, pl. 86, f. 3.

Var. extremitalis Reitter, Verh. naturf, Ver. Brünn,
XVI, 4878, p. 135
Actistac Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, p. 497, pl. XIX, f. 63
italica Baudi. Berl. Ent. Zeits. 4869. p. 414. — Reitter, loc. cit. 1881, p. 497. pl. XIX, f. 62. — Gangl- Bauer, Käf. Mittel. II, 1895. p. 826
Groupe XXXV.
armipes Reitter. Deuts. Ent. Zeits., 1881, p. 498,
pl. V1, ff. 12, 13, 14
<b>Dosnica</b> Ganglbauer, Käf. Mittel. II., 1895, p. 829 Bosnie.
Groupe XXXVI.
oranensis Pic. Bull. Soc. ent. Fr. 4896, p. 72  Algérie : Ain-Temouchen.
longula Kiesenw, Küst, Käf, Eur, XVI, p. 98. — Reit-
ter, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, p. 495, pl. XIX, f. 56. — Ganglbauer, Käf. Mittel. II, 1895, p. 827 ———————————————————————————————————
Var. carniolica Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881,
p. 495 Carniole.
alpestris Dodero, Ann. Mus. Civ. Gen. 1900, p. 413 et fig
Groupe XXXVII.
muscorum Kiesenw. Küst. Käf. Eur. XVI, p. 400.
— Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, p. 495, pl. XIX, f. 54. — Ganglbauer, Käf. Mittel. II, 1895, p. 827
Groupe XXXVIII.
femorata Aubé, Ann. Soc. ent. Fr. 4844, p. 132. — REITTER, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, p. 496, pl. XIX. f. 57. — Ganglbwer, Káf. Mittel. II. 4895, p. 827. Europe moyenne: Serbie, Antriche, Roumanie, Hongrie.
Weisei Saulcy, Deuts. Ent. Zeits. 4875, p. 358. —
Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, p. 496, pl. XIX . f. 61. — Ganglbauer, Käf. Mittel. II, 1895, p. 827

### Groupe XXXIX.

Leonhardi Reitter, Wien. Ent. Zeit. 1902, p. 3, pl. I, f. 6. . . . . . Herzégovine : Jablanica. Groupe XL. clavicornis Panzer, Faun. germ. in. p. 99, (3). — Denny, Mon. Psel. 4825, p. 25, pl. 5, f. 29. — Aubé, Psel. Mon. 1833, p. 40, pl. 87, f. 2; Ann. Soc. ent. Fr. 4844, p. 127. — Erichson, Kaf. Mk. Brandbg. I. p. 275. — Thomson, Skand. Col. III, p. 234. — REITTER, Verh. z. b. Ges. Wien, 4881, p. 97, pl. XIX, f. 64. — GANGLBACER, Kaf. Mitt. p. 825... ..... Europe septentrionale et moyenne. Ç qlabricollis Reichb. Mon. Psel. p. 43, pl. I, f. 8. — DENNY, Mon. Psel. p. 28, pl. V. f. 4 3. nigrina McLSANT et REY, Opusc. ent. XII, 1861, p. 74. luevicollis Fairmaire, Ann. Soc. ent. Fr. 4857, p. 275. - FAUVEL, Rev. d'Ent. III, p. 79. Var. inflatipes Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 1884. p. 74; Wien. Ent. Zeit. 1884, p. 144. Porsenna Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, p. 496, pl. XIX, f. 58...... Italie: Toscane. islamita Reitter, Deuts. Ent. Zeits. 1885, p. 201.... Bosnie. Groupe XLI. armata Schaufuss (Machaerites), Rev. Mag. Zool. 1863, p. 293; Verh. z. b. Ges. Wien, 1863, p. 1247, pl. 25, ff. 4-4. — Reitter. Verh. z. b. Ges. Wien, 1881. p. 481..... Espagne septentrionale : Biscaye. Groupe XLII. Erichsoni Kiesenw, Küst, Käf, Eur, XVI, p. 99. — REITTER, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, p. 493, pl. XIX, f. 50. — GANGLBAUER, Käf. Mittel, H. 4895, p. 829. ..... Carniole. Croatie. Var. ursus Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881. p. 493..... Carniole. ? splendida Croiss. Le Coléopt. 1891, p. 134.

pl. III. f. 3......

#### Groupe XLIII.

sculptifrons Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 4879, p. 535; 4881, p. 493, p. XIX, f. 52. . . . Bulgarie, Serbie, Banat. Var. Roumaniae, n. var.............. Roumanie.

Reitteri Saulcy, Deuts. Ent. Zeits. 4875, p. 358. — REITTER, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, p. 493, pl. XIX, f. 51. - GANGLBAUER, Käf. Mittel. II, 1895, p. 828.....

Carpathes.

### Groupe XLIV.

anatolica Sauley, Deuts. Ent. Zeits. p. 44. — Reit-TER, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, p. 490. . . . . . Syrie: Caifa. ? judaca Pic. Bull. Soc. zool. Fr. 4900, p. 482. Syrie : Jéricho.

### Groupe XLV

Lagari Halbherr. Elenco sistem. Col. Valle Lagarina, Fasc. IV, p. 3, f. 1. (Pubbl. Civ. Mus. Rovereto, XVII. 4900). — GANGLBAUER, Käf. Mittel. II, 4895, p. 825..... Tyrol méridional. Lombardie. lictor Flach, Wien, Ent. Zeit. 1891, p. 230.

### Groupe XLVI.

nasicornis Saulcy, Berl. Ent. Zeits. 4870 (Beih.), p. 89. — Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 4881, p. 496, pl. XIX, f. 60..... Portugal.

Sharpi Saulcy, ap. Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881. p. 493. pl. XIX. f. 49.. Espague septentrionale: Asturies. asturiensis Reitter Verh. z. b. Ges. Wien, 1879. p. 534.

Mulsanti SAULCY.

### Groupe XLVII.

japonica Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874. p. 425; 4883, p. 327..... Japon : Nagasaki.

subscriata Weise. Deuts. Ent. Zeits. 1877, p. 98... ..... Japon : Hoshiroyama.

## Groupe XLVIII.

Curtisi Leach, Zool. Misc. III, 1817. p. 83. - Denny, Mon. Psel. 1825, p. 20, pl. III, f. 1. — Acbé, Psel.

- C)(')	A. ICATICAL.	(*00)
1844. p. 274 f. 203 p. 498 H. p. Curtisi p. 446	1833. p. 34, pl. 85, f. 1; Ann. Soc. ent. Fr. p. 434. — Ericuson, Käf. Mk. Brandbg. I — Jacq. Duval. Gen. Col. Eur. I. pl. 41, . — Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881. S. pl. XIX, f. 66. — Ganglbauer, Käf. Mittel. 824	Europe.
1. 2.		
4884,	garica         Reitter         Verh.         z.         b.         Ges.         Wien.           p. 498.         . <t< td=""><td></td></t<>	
	Groupe XLIX.	
— Re pl. XI	ica Sauley, Deuts. Ent. Zeits. 4875, p. 358.  rtter, Verh. z. b. Ges. Wien, 4881, p. 494, X, f. 53. — Ganglbauer, Käf. Mittel. II. 4895,	es occidentaux.
	Groupe L.	
f. 4; 2 Verh. — G.s Sternbe	nis Aubé, Psel. Mon. 4833, р. 37, pl. 86, Ann. Soc. ent. Fr. 4844, р. 435. — Венттек, z. b. Ges. Wien, 4881, р. 499, pl. XIX, f. 68. NGLBAUER, loc. cit. р. 823	
V ((1M))))	tanaone n. vat Carpe	unes : semun.
	Groupe LI.	
р. 88. р. 492 Oedipus	CA SAULCY, Berl. Ent. Zeits. 4870 (Beih.), — REITTER, Verh. z. b. Ges. Wien, 4881, d. pl. XIX, f. 47	ne : Asturies.

p. 534. ? Var. Ehlersi Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, p. 498. pl. XIX, f. 67.

monstripes Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 4879.

ruthena Sauley, Verh. naturf. Ver. Brünn, XV, 4876. p. 12. pl. 1, f. 3. — Refter, Verh. z. b. Ges. Wien.

0e

129

gr

te:

ba

kı

1881, p. 499, pl. XIX, f. 69. — GANGLBAUER, Käf. Mittel, p. 823	rmaros.
Groupe L.H.	
tila Sauley, Deuts. Ent. Zeits. 1878, p. 43 Hongrie n	néridate.
Groupe LHL	
ivaldskyi Reitter, Deuts, Ent. Zeits, 1887, p. 304.	
Hongrie ; Ma	rmaros.
Groupe LIV.	
rtzeni Reitter. Verh. z. b. Ges. Wien. 1881.	
p. 499, pl. XIX, f. 70. — GANGLBAUER, Käf. Mittel. II, p. 823	
II. p. 823 Tyrot mer	ultonul.
BOLBOBYTHUS	
Bythinus auct. (pro parte).	
Recilis Morson, Bull. Nat. Mosc. 4851, 4V, p. 499.  — RETTER, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, p. 484,	
	Cancase.
Karamani Reitter, Deuts. Ent. Zeits. 4899, p. 273.  Dalmatie:	Spalato
tieus Reitter, Deuts. Ent. Zeits. 1885, p. 370,	Grèce.
	Corfou.
opfigarteni Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881,	our jour.
p. 500, pl. XIX, f. 74	Mehadia.
anaticus Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 1884.	
p. 74 Hongrie; 3	Ichadia.
ninensis Reitter, loc. cit. 1880, p. 215; 4881.	D 11
p. 501, pl. XIX, f. 76	Balkans.
	Sarajevo.
Decialis Sauley, Deuts. Ent. Zeits. 1878, p. 43. —	
REITTER, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, p. 500, pl.	
	Hongrie.
f. 9. — Erichenbach, Mon. Psel. 1817, p. 45, pl. 1, f. 9. — Erichson, Käf. Mk. Brandbg. I, p. 272. —	
REITTER, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, p. 500,	
Ann. Soc. Ent. Fr., LXXIII 1904].	19

pl. XIX, f. 72. — Ganglbauer, Käf. Mittel. II, 4895.
p. 822 Europe septentrionale et moyenne
д Burrelli Aubé. Psel. Mon. 1833. р. 35. pl. 85. f. 3.
o uncicornis Aubé. Ann. Soc. ent. Fr. 1844, p. 137.
distinctus Chaupoir, Bull. Nat. Mosc. 4845. III.
p. 477. — Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 4881.
p. 500. — Ganglbauer, Käf. Mittel. p. 822
Europe septentrionale et moyenne
of securiger Denny, Mon. Psel. 4825, p. 24, pl. III.
f. 2. — Aubé, Psel. Mon. 4833. p. 36. pl. 85. f. 4.
⊊ macropalpus Aubé, Psel. Mon. 4833, р. 39. pl. 86.
1. 4.
⊊ globulipalpus Aubé. loc. cit. p. 39. pl. 87, f. 4.
<b>balkanicus</b> Reitter, Deuts, Ent. Zeits, 4885, p. 371. Balkans,
acutangulus Reitter, loc. cit. 4878. p. 42: Verh.
z. b. Ges. Wien, 4881, p. 499, pl. XIX, f. 71. —
Ganglbauer, Käf. Mittel. 1895, p. 823 Hongrie. Carniole.
Croatie. Dalmatie. Herzégovine. Montenegro. Corfou.
Burrelli Denny, Mon. Psel. 4825, p. 22, pl. IV, f. 4.
— Асвé, Ann. Soc. ent. Fr. 1844. p. 136. — Евісп-
son, Käf, Mk, Brandbg, I, p. 271. — Jacq. Duyan.
Gen. Col. Eur. I. pl. 41, f. 204. — REITTER, Verh.
z. b. Ges. Wien. 4881, p. 501, pl. XIX, f. 75, — Ganglbauer, Käf. Mittel, 4895, p. 821
Europe septentrionale et moyenne.
luniger Aubé. Psel. Mon. 1833, p. 35, pl. 85, f. 2.
<b>lunicornis</b> Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 4884, p. 75. — Ganglbauer, Käf. Mittel, 11, 4895, p. 821.
Hongrie: Banat.
14
MACHAERODES
Brendel, Bull. Un. Iowa, I. 4890, p. 252; Trans. Ent.
Soc. Phil. XX, 4893, p. 277 Raffray.
Ann. Soc. ent. Fr. 4896, p. 431.
carinatus Brendel. Proc. Ent. Soc. Phil. 4865.

p. 29; Bull. Un. Iowa, I. p. 254, pl. VII. ff. 33, 34.

.... Amérique septentrionale : M's Alleghany, Canada, Virginie.

#### TYCHUS

LEACH, Zool. Miscell. III, 1817, p. 84. — DENNY, Mon. Psel, 1825, р. 30. — Агве. Psel. Mon. 1833, р. 42; Ann. Soc. ent Fr. 1844. p. 421. — Erichson, Käf. Mk. Brandbg. I. p. 276. — Jacq. Duval, Gen. Col. Eur. I, p. 132. — Thomson, Skand. Col. III. p. 235. — REITTER, Verh. z. b. Ges. Wien, 4881, pp. 451, 454. - Raffray, Rev. d'Ent. 4890, pp. 126, 129. — Ganglbauer, Käf. Mittel. H. 1895, p. 837.

### Groupe L.

angulifer Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien. 4884,
p. 509 Lenkoran.
niger Paykull, Fn. Svec. III, 1789, p. 365. — Rei-
снехваси. Mon. Psel. 1817, р. 35, рl. I, f. 5. —
Denny, Mon. Psel. 1825, p. 30, pl. VI, f. 1. — Aubé.
Psel. Mon. 1833, p. 43, pl. 88, f. 1; Ann. Soc. ent.
Fr. 4844, p. 422. — Ericuson, Käl. Mk. Brandbg. I.
p. 277. — Thomson, Skand, Col. III, p. 235. — Reit
TER, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, p. 309. — Gul-
LEB. Rev. d'Ent. 4888, p. 373. — GANGLBAUER, Käf.
Mittel. II. 4895, p. 839
nodicornis Веск, Beitr. pl. II, f. 10 Angleterre.
Var. dichrous Schmidt, De Psel. Fn. Prag. 1836, p. 48,
pl. 1. f. 16. — Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 4881.
р. 509. — GULLEB. Rev. d'Ent. 1888. p. 374
Bohème, Carniole, Caucase,
tauricus Мотвен. Bull. Nat. Mosc. 1851, p. 495.   Russie méridionale)
Var. colchicus Sauley, Verh. naturf. Ver. Brünn,
XVI. 4878, p. 436. — Reitter, Verh. z. b. Ges.
Wien, 4881. p. 509
<b>dalmatinus</b> Reitter, loc. cit. 1880. p. 216; 1881. p. 510. — Ganglbauer, Káf. Mittel. p. 840
p. 510. — GANGEBACER, Kai. Shitet. p. 640 Dalmativ. Corfon.
Damaer. Corpus
Groupe II.

nodicornis Reitter, Deuts. Ent. Zeits. 1884, p. 109. Corfou.

# Groupe III.

oroupe in.	
Ganglbaueri Apfelbeck, Wissens. Mitth. Bosn. Herc. 4897, p. 506	Herzėgovine.
Groupe IV.	
<b>Dosnicus</b> Ganglbauer, Wissens. Mitth. Bosn. Herc. 1897, p. 495.	Bosnie.
Lederi Saulcy, Verh. naturf. Ver. Brünn, XVI, 1878, p. 436. — Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, p. 510.	Cancase.
Groupe V.	
nodifer Reitter, Deuts. Ent. Zeits. 4884, p. 49, pl. II. f. 46	Grèce : Morée.
caudatus Reitter, Deuts, Ent. Zeits, 4884, pp. 49, 140.	Corfou.
Groupe VI.	
ibericus Motsch. Nouv. Mém. Mosc. 4835, IV, p. 319, pl. II, f. G. — Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 4881, p. 540. — Ganglbauer, Käf. Mittel. 4895, p. 840. — Jacq. Duval. Gen. Col. Eur. I, pl. 41, f. 205. — Peyerimhoff, l'Abeille, XXX, 4904, p. 477	'alie. Caucase,
p. 12, pl. 2, f. 5. ( <i>Trébizonde</i> ). striola Guilleb. Rev. d'Ent. 1888, p. 374. — Gangl- Bauer, Käf. Mittel. 1895, p. 840. ( <i>France</i> ).	
Var. ibericus Guilleb. Rev. d'Ent. 4888, p. 375 France centrale, méridionals	e et orientale.
Var. corsicus Reitter. Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, p. 548. — Guilleb. Rev. d'Ent. 1888, p. 375	le. Sardaigne.
Var. monilicornis Reitt. Verh. z. b. Ges. Wien, 4880,	er, Pyrénées.

p. 217. — Ganglbauer, Käf. Mittel. 1895, p. 840  Dalmatic. Herzégorine.
Var. mutinensis Reitter, loc. cit. 1884, p. 76 Italie: Modène. Var. creticus Reitter, Deuts. Ent. Zeits. 4885, p. 371 Crète.
Groupe VII.
serbicus Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 1884, p. 76
florentinus Reitt. loc. cit. 1884, p. 77. Italie : Étrurie, Corfou.
gibbiventris Reitter, loc. cit. 4884, p. 76 Syrie: Caöfa.  atgericus Gulleb. Bull. Soc. Ent. Fr. 1893.
р. ссхсні. — Речевімногг, l'Abeille, XXX, 4904, р. 176 Algérie : Alger, Edough, Téniet.
tuniseus Pic. L'Échange, 1901. p. 2. — Peyerimhoff, l'Abeille, XXX, 1904, p. 476
castaneus Saulcy (in. litt.) et auctores
XVI, 1878, p. 136, pl. II, f. 47. — REITTER, Verh. z. b. Ges. Wien, 4881, p. 510
Pullus         Kiesenw.         Berl.         Ent.         Zeits.         1858, p. 47.         —           Reitter, Verh.         z. b. Ges.         Wien.         1881, p. 514;         Deuts.           Ent.         Zeits.         1884, p. 50.         Grèce ; Corfou.
mendax Kiesenw, Berl. Ent. Zeits. 1858, p. 47. — REITTER, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, p. 514; Deuts. Ent. Zeits. 1884, p. 50
Drunneus Motsch. Bull. Nat. Mosc. 1851, IV, p. 110. REITT. Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, p. 512. Caucase. Dayhestan.
caucasicus Sauley, Verh. naturf. Ver. Brünn, 1878, p. 437, pl. II. f. 18.
? tenuicornis Baubi, Berl. Eat. Zeits. 1869. p. 407 Chappre.
Groupe VIII.
anophthalmus Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 4881, p. 512
Groupe IX.
<b>Dispina</b> (Sauley in litt.), n. sp

# Groupe X.

tuberculatus Aubé, Ann. Soc. ent. Fr. 4844, p. 125.
— Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 4881. р. 510. —
Guilleb. Rev. d'Ent. 1888, p. 370. — Ganglbauer,
Käf. Mittel. 1895, p. 838 France centrale et méridionale.
dentifrons Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881,
p. 543
bryaxioides Guilleb. Bull. Soc. ent. Fr. 4893,
р. сехен. — Речевиновъ, l'Abeille, XXX, 1904,
p. 473 Algérie : Kabylie, St-Charles,
Bone, Constantine. Tunisie: Ain-Draham.
Koziorowiczi Croiss, Miscell, ent. 4893, p. 453, pl. II,
ff. I-III. (Algérie : Bône).
Auverti Croiss, loc. cit. p. 454, ff. VII-IX. (? Algérie).
Var. Pici Croissandeau, loc. cit. p. 453, pl. II, ff. I-III.
Algérie : Constantine, St-Charles. Tunisie : Souk-el-Arba, Feriana.
Var. Poupillieri n. var
Var. Raffrayi Peyerimhoff, l'Abeille, XXX, 4904,
p. 470 Algérie : Alger, Mouzaïa, St-Charles.
Groupe XI.
hirtulus Reitter, loc. cit. 4880, p. 217; 1881, p. 511.
GANGLBAUER, Käf. Mittel. II, 1895, p. 839
Dalmatic, Herzégovine, Italie.
Groupe XII.
Jacquelini Boieldieu, Ann. Soc. ent. Fr. 1859,
p. 463. — Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881,
p. 544. — Guillebeau, Rev. d'Ent. 1888, p. 374
France méridionale. Sicile. Algérie. Maroc.
cornutus Croiss, Miscell, ent. 1893, p. 454, pl. III,
fig. X-XII
Groupe XIII.
rufus Morsen. Bull. Nat. Mosc. 1851, IV, p. 495. —
Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 4895, p. 839. Carniole Istrie.
Dalmatie, Hongrie, Roumanie, Valachie, Grèce, Herzégovine,
myops Kiesenw. Berl. Ent. Zeits. 4858, p. 46. (Crète).
myops wissess. Bett. Ett. Zetts. 1000, p. 10. (Circle).

Var. morio Reitter, Deuts. Ent. Zeits. 1881, p. 483. . . Dalmatic.

		м	
v)			

Var. puncticollis Reitter, Ioc. cit. 1887, p. 505 Hongrie.
lenkoranus Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, p. 512. Lenkoran.
Groupe XIV.
integer Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien. 1881, p. 512. Sicile.
rufopictus Reitter. Verh. z. b. Ges. Wien, 1881,
p. 511
Groupe XV.
Guillebeaui nom. nov
volchicus Guilleb. Rev. d'Ent. 1888, p. 372.
Espèces de l'Amérique du Nord (Gr. XVI à XX).
Groupe XVI.
minor Leconte, Bost. Journal. VI. p. 82. — Brendel.  Bull. Un. Iowa, I. 1890, p. 247, pl. VII, f. 27. —  Casey, Col. Not. V. p. 491, pl. I, f. 19
testaceus Casey, Contr. Descr. Col. N. Amer. 4884, p. 31. — Brendel, Bull. Un. Iowa; 1, 1890, p. 248, pl. VII, f. 28.
Pocahontas Casey, Col. Not. VII, p. 615. Amér, septle: Virginie.
cognatus Leconte, Trans. Amér. Ent. Soc. 4874,
р. 50. — Brendel, Bull. Un. Iowa, I, р. 249.
pl. VII. f. 29 Caser, Col. Not. V. p. 491. Vancouver Island.
bipuncticeps Casey, Buff. Cal. Ac. Sc. 1887. p 470. Californie.
Sonomae Casey, Bull. Cal. Ac. Sc. 1887, p. 469, pl. XVI, f. 6; Col. Not. V, p. 491
Groupe XVII.
verticalis Casey, Col. Not. V, 1893. p. 492
Amérique septentrionale : Distr. de Columbia.
spiculifer Casey, loc. cit. 1893, p. 491 Pensylvanie.
sternalis n. sp Pensylvanie.
Groupe XVIII.
puberulus Leconte, Ann. Lyc. Nat. Hist. V. p. 214.
Brendel, Bull. Un. Iowa, I, 1890, p. 250, pl. VII,
f. 31. — Casey, Col. Not. V, 1893, p. 491 Californic.

hexagonus Casey, Col. Not. VII. 4897. p. 646 Californie.
Groupe XIX.
tenellus Leconte, Ann. Lyc. Nat. Hist. V, p. 244. —
Brend. Bull. Un. Iowa, I. p. 249, pl. VII. f. 30. —
Casey, Col. Not. V, 4893, p. 494 Californie.
Groupe XX.
microphthalmus Brendel, Trans. Amer. Ent. Soc.
XX, 4893, p. 277 Amérique septentrionale : Cañon City.
Groupe XXI.
castaneus Aubé, Ann. Soc. ent. Fr. 4844, p. 424.
Espagne. Sicile.
armatus Sauler, Berl. Ent. Zeits. 4870 (Beih.),
p. 88. — Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 4881. p. 514 Espagne méridionale. Algérie. Tanger.
miles Saulcy, Berl. Ent. Zeits. 1870 (Beih.), p. 88.
— Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 4881, p. 514.
Espagne : Malaga, Algésiras. Maroc : Tanger.
grandiceps Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 4881.
p. 515 Marow: Tanger.
Fournieri Saulcy, Ann. Soc. ent. Fr. 4864, p. 259.
— Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, р. 515. — Gulleb. Rev. d'Ent. 1888, р. 369; 1890, р. 33
France méridionale : Draguignan, Hyères.
Var. olbiensis Guilleb. loc. cit. 4888, p. 369; 4890, p. 33.
48
CYLINDRARCTUS
Schaufuss, Tijds. Ent. XXX, 4887, p. 91. — Raffray. Rev. d'Ent.
1890, pp. 126, 129. — Casey, Col. Not. V, p. 487.
longipalpus Leconte (Tychus), Bost. Journ. Nat.
Hist. VI, p. 82. — Brendel. Bull. Un. Iowa, I,
p. 246, pl. VII, ff. 25, 26. — Casey, Col. Not. V, p. 488, pl. I, f. 20
1 1

americanus Scharfess, Tijds. Ent. XXX, p. 92. -

Casey, Col. Not. V, p. 488.... Amérique septentrionale : Illinois.

ludovicianus Brendel (Tychus), Trans. Amer. Ent.

Soc. XX, 1893, p. 277..... Louisiane. Mississipi.

comes Casey Col. Not. V. 1893, p. 489, pl. 1, f. 20b. Floride.

erinifer Casey, loc. cit. p. 489, pl. 1, f. 20a..... Indiana. Iowa 5

### ATYCHODEA

Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 4883, p. 412. — Raffray, Rev. d'Ent. 4890, pp. 126, 129.

lenticornis Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 4883.

p. 414, pl. XX, ff. 19, 20..... Bornéo : Telang.

singularis Reitter, loc. cit. p. 414, pl. XX, f. 24

..... Bornéo : Tameanglaiang.

Simoniana Reitter, loc. cit. p. 413, pl. XX, ff. 21,

22. Bornéo : Telang.

Rafrayi Reitter, loc. cit. p. 414, pl. XX, f. 23. Bornéo : Telang.

### VALDA

CASEY, Col. Not. V, 1893, p. 493.

frontalis Casey, loc. cit. 1893, p. 493..... Californie.

### BYTHINOPHANAX

Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 1883, p. 405. — Raffray, Rev. d'Ent. 1890, pp. 427, 429.

Dicornis Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 1883, p. 407,

pl. XX, f. 43..... Bornéo : Telang.

punctatus Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 1896, p. 266,

exilis Reitter, loc. cit. 1883, p. 406. . . . Bornéo: Tameanglaiang.

latebrosus Reitter, loc. cit. p. 406 . . Bornéo : Tameanglaiang.

### BYTHINODERES

Reitter Verh. z. b. Ges. Wien, 1883. p. 407. — Raffray, Rev. d'Eut. 4890. pp. 127, 429.

Grabowskyi Reitt, loc. cit. p. 408, pl. XX, f. 14. Bornéo: Telang.

marginata Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 4896, p. 265. Sumatra.

### HARMOMIMA

### HARMOPHOLA

RAFFRAY, Ann. Soc. ent. Fr. 4896, p. 430.

clavata Raffr. loc. cit. p. 430. Brésil méridional : Colonia Alpina.

#### SUNORFA

Raffray, Rev. d'Ent. 1882, p. 28; 1890, pp. 127, 129; Ann. Mus. Nat. Hung. Budapest, 1903, p. 76.

Bythinomorpha Schaufuss, Tijds. Ent. XXX, p. 409

- John Edition Plant Edition Plant Plant In 1981	
capitata Raffray, Rev. d'Ent. 1882, p. 28. Nouvelle-Guinée : De	ney.
monstrosa Raffray, Ann. Mus. Nat. Hung. Buda-	
pest, 1903, p. 77, pl. I. f. 13	
Nouvelle-Guinée : Berlinhafen, Baie de l'Astro.	luhe.
acutangula Raffray, loc. cit. p. 78	

Nouvelle-Guinée : Baie de l'Astrolabe.

**nodifera** Raffray, loc. cit. p. 79. Nouvelle-Guinée: Withemhafen. **nodifera** Raffray, loc. cit. p. 80. N<sup>th</sup>-Guinée: Baie de l'Astrolabe.

excavata Baffray, loc. cit. p. 80, pl. I, f. 16....... Nouvelle-Guinée : Baie de l'Astrolube, Wilhemhafen.

nasuta Raffray, loc. cit. p. 81, pl. 1, f. 47.....

Nouvelle-Guinée : Baie de l'Astrolabe. tridentata Raffray, loc. cit. p. 82. Nouvelle-Guinée : Wilhemhafen.

occipitatis Raffray, loc. cit. p. 82. pl. II, f. 13.....

...... Nouvelle-Guinée : Wihemhafen.

Iobata Raffray, loc. cit. p. 83, pl. 1, f. 45......

..... Nouvelle-Guinée : Withemhafen.

auriculata Raffray, loc. cit. p. 83. pl. H. f. 42
Nouvelle-Guinée : Withemhafen.
fuscipennis Raffray, loc. cit. p. 84
galeata Raffray, loc. cit. p. 84
Nouvelle-Guinée : Baie de l'Astrolabe.
pinguis Raffray, loc. cit. p. 85
Nouvelle-Guinée : Baie de l'Astrolabe.
papuana Raffray, loc. cit. p. 85., Nouvelle-Guinée : Wilhemhafen.
exsculpta Schaufuss (Bythenomorpha), Tijds. Ent. XXX, 1887, p. 410
clavata Raffray Bythinomorpha, Rev. d'Ent. 1895,
p. 44 Singapore.
caviceps Raffray (Bythinomorpha), Ann. Soc. ent. Fr.
1896, p. 302
ACROCOMUS
Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 1893, p. 460.
cribratus Raffray, loc. cit. p. 460
DALMODES
Reitter, Verh. naturf. Ver. Brünn, XX, p. 49. — Raffray,
Rev. d'Ent. 4890, pp. 427, 430.
Batrisobryaxis Schaufuss. Tidjs. Ent. XXX, 4887, p. 148.
plicatulus Schaufuss (Trichony.e., Rev. d'Ent. 1882, p. 485
venustulus Schaufuss (Trichonyx), Nunq. ot. p. 288.
Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 1896. p. 266 Mexique: Teapa.
Schaufussi Raffr. Ann. Soc. ent. Fr. 4896, p. 267.
rybaxoides Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 1882, p. 382
Drevicollis Sharp, Biol. Centr. Amer. Col. H [1],
1887. p. 39, pl. I, f. 21
gracilipes n. sp

p. 148. pl. IX. ff. 5. 5abc. Brésil : Rio de Janeiro, Matto Grosso.

ensipes Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 4890, p. 316...

Venezuela S<sup>n</sup>-Esteban.

#### HARMOPHORUS

Schaufuss Tijds, Ent. XXIX, 1886, p. 264. — Raffray, Rev. d'Ent. 4890, pp. 427, 429.

manticoroides Schaufuss loc. cit. p. 265..... Brésil.

#### BATRYBRAXIS

Reitter, Deuts. Ent. Zeits. 4882, p. 444. — Raffray, Rev. d'Ent. 4890, pp. 427, 429.

fortis Reitter, Deuts. Ent. Zeits. 4882, p. 445, pl. V.

f. 5..... Brésil : S°-Paolo.

caviceps Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 4896, p. 429.

..... Brésil méridional : Colonia Alpina.

longipennis Raffray (Arthmius), Ann. Soc. ent. Fr.

4890, p. 309...... Venezuela.

inflexa Schaufuss, Tijds. Ent. XXX, 4887, p. 447.... Mexique.

#### GNESION

RAFFRAY, Linn. Soc. N. S. Wales, 4900, p. 492.

rufulum Raffray, loc. cit. p. 492, pl. X. ff. 3, 4... Australie.

### DALMOPHYSIS

Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 4896, p. 267.

eylindrica Raffray, loc. cit. p. 268, pl. XI, f. 7.... Mexique.

#### TANYPLEURUS

RAFFRAY	, Rev. d'Ent.	1890, pp.	128, 130.
---------	---------------	-----------	-----------

malaianus	RAFFRAY.	Rev. d'Ent.	1890, p. 206,	pl. 11,	
1. 45				Singapore.	Penang.

Bouchardi Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 4896, p. 269.

..... Sumatra : Palembang.

megacephalus n. sp.....

Sumatra.

variolosus Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 1896, p. 268,

pl. XI, f. 6..... Sumatra: Palembang.

gibbicottis Raffray, Rev. d'Ent. 1895, p. 46..... Singapore.

#### NEDARASSUS

RAFFRAY, Rev. d'Ent. p. 4895, p. 44.

punctatus Raffray, loc. cit. p. 45, pl. II, f. 8......

Penang.

4

#### APOPLECTUS

RAFFRAY, Rev. d'Ent. 1890, pp. 96, 102 : 1898, p. 227.

Glapharsenus RAFFRAY, Ann. Mus. Nat. Hung.

Budapest, 1903, p. 36.

crassus Raffray (Euplectus), Rev. d'Ent. 1882, p. 60,

pl. II. f. 26...... Nouvelle-Guinée : Amberbaki.

asperatus Raffray, Ann. Mus. Nat. Hung. Budapest,

1903, p. 87, pl. I, f. 2...... Nouvelle-Guinée : Golfe Huon.

punctatus Raffray, loc. cit. p. 87.....

...... Nouvelle-Guinée : Golfe Huon, Baie de l'Astrolabe.

microphthalmus Raffray, loc. cit. p. 88......

Var. sublaevis Raffray, loc. cit. p. 89.....

...... Nouvelle-Guinée : Baie de l'Astrolabe.

latus Raffray, loc. cit. p. 89..... Nouvelle-Guinée: Berlinhafen.

6

### 40° Tribu Coniacerini.

#### TABLEAU DES GENRES

- (2). Tarses à deux ongles robustes, égaux. Antennes de 41 articles, géniculées. Palpes grands, tordus, à trois articles forts, sécuriformes................................... Gen. Anagonus Fauvel.
- 3. (2). Tarses à un seul ongle.
- 4. (5). Antennes géniculées, de 8 articles, 2-7 moniliformes, 8 très gros, globuleux. Abdomen aussi grand que les élytres, nullement déclive, fortement rebordé; premier segment dorsal beaucoup plus grand que les autres. Gen. Simus Raffray.
- 5. (4). Antennes géniculées, de cinq à six articles. Abdomen bien plus court, plus ou moins triangulaire et déclive, avec la marge latérale en forme de carène, segments subégaux. Corps assez globuleux.
- 6. (9). Antennes de six articles.
- 7. (8). Premier article des antennes avec une lame tranchante denticulée au côté interne, très largement sillonné en dessous. 2º transversal, 3º lenticulaire. 4º plus grand que les deux précédents réunis, obconique, 5º carré, 6º ovoïde, presque aussi long que le 4º, sommet du 4º et du 5º tout entier et base du 6º fortement excavés ensemble en dessous. Corps brillant. Une seule carène suturale aux élytres......
  Gen. Listriophorus Schaufuss
- 9. (6). Antennes de cinq articles.
- (41). Premier article des antennes simplement et légèrement aplati en dessous, 2º transversal triangulaire, petit. 3º

#### CATALOGUE.

#### GONIACERINI

RAFFRAY, Rev. d'Ent. 4890, p. 431.

#### ANAGONUS

FAUVEL, Rev. d'Ent. 1903, p. 284.

fracticornis Fauvel, loc. cit. p. 285 Nouvelle-Caledonie: Yahoue.

#### OGMOCERUS

Raffray, Rev. d'Ent. 1882, p. 7; 1887, p. 40; 1890, p. 431, pl. I, ff. 7, 8.

agymsibanus Raffray, loc. cit. 1887, p. 41, pl. I.

ff. 12-13; Ann. Soc. ent. Fr. 1896, p. 269.... Zanzibar

Mocquerysi Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 1896, p. 269. Gabon.

#### SIMUS

Raffray, Rev. d'Ent. 1882, p. 6; 4890, p. 431.

fracticornis Raffray, loc. cit. 1882. p. 6, pl. II, f. 6.

Abyssinie: Bogos.

1

4

#### LISTRIOPHORUS

Schaufuss, Nunq. ot. II, p. 289. — Raffray, Rev. d'Ent. 1890, p. 131.

#### GONIACERUS

Motschulsky, Étud. Ent. 4855, p. 47. — Raffray, Rev. d'Ent. 4890, pp. 431, 132; Ann. Soc. ent. Fr. 1890, p. 317. **Metopioides** Schaufuss, Nunq. ot. II, p. 450.

gibbus Motsch. Bull. Nat. Mosc. 1851, IV, p. 17..... Panama.

#### GONIASTES

Westwood, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 125. — Raffray, Rev. d'Ent. 1890, pp. 132, 133.

Raffray, Rev. d'Ent. 1890, pp. 132, 133.

Sulcifrons Westwood, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870.

p. 125; Thes. Ent. Oxon. p. 99, pl. IV, f. 8..... Westwoodi Raffray, Rev. d'Ent. 1890, p. 437, pl. II.

Brésil.

Amazones.

425

2

#### ADROCERUS

Raffray, Rev. d'Ent. 4890, pp. 432, 133.

**ca vicornis** Raffray, loc. cit. 1890, p. 208, pl. II. f. 50. *Brésil*.

# Il Tribu Cyathigerini.

Groupe I.

Groupe II.

Groupe III.

Groupe IV.

Groupe V.

#### TABLEAU ET DESCRIPTIONS.

### Tableau du genre Cyathiger

- A 2. Antennes de 7 articles.
- B 2. Dernier article des antennes o, toujours plus grand et plus ou moins excavé.
- C 2. Excavation inférieure du dernier article des antennes 5, peu profonde et mal délimitée; prothorax gibbeux.....
- C. 1. Excavation inférieure du dernier article des antennes o, toujours profonde et bien limitée, au moins à sa partie antérieure et externe.
- D 3. Ponctuation presque nulle sur les élytres, très fine sur le reste du corps.....
- D 2. Ponctuation très grosse, mais plus ou moins espacée, laissant les téguments brillants.....
- D 1. Ponctuation variable, mais teujours plus ou moins confluente; téguments opaques.
- E 2. Dernier article des palpes court, assez épais, ovoïde.
- E 1. Dernier article des palpes oblong, plus ou moins fusiforme, beaucoup plus grêle.....
- B 1. Dernier article des antennes semblable dans les deux sexes, en marteau, sans excavation.....
- deux sexes, en marteau, sans excavation..... Groupe VI.
  A 1. Antennes de 40 articles................... Groupe VII.

**Cyathiger gracilis** n. sp. — Oblongus, sat gracilis, rufo-castaneus, confertim, sat grosse punctatus, pube grisea sat elongata, subsericea. Caput elongatum, anterius attenuatum, lateribus obliquis, fronte truncata, medio vir impressa. Palporum articulo

truncata, medio vix impressa. Palporum articulo ultimo breviter fusiformi. Antennarum articulis 1 paulo majore, 2-6 leviter transversis, aequalibus et simplicibus, 7 maximo, sat regulariter transversim ovato, supva convexo, infra fere toto excavato, margine vultrata, latere externo ampliato et deplanato. Prothorax subcordatus, absque foveis. Elytra latitudine sua paulo longiora, basi bifoveata, humeris subquadratis, notatis 3.—Long. 4,30 mill.—Fig. 93.



Fig. 93.

### Sumatra: Palembang.

Le dernier article des antennes, de dimension relativement moyenne, est transversal, en ovale assez régulier, en dessous; il est presque en-Ann. Soc. Ent. Fr., LXXIII [1904]. tièrement creux et, tout autour, le bord est mince et tranchant, excepté à l'angle externe où il est élargi, aplati, cette partie plate formant un triangle très allongé; l'angle de son sommet est arrondi.

**Cyathiger patruelis** n. sp. — Oratus, crassus, convexus, castaneus, totus crebre, confertim et sat fortiter punctatus, sat longe et dense pube subsericea vestitus. Caput antrorsum minus attenuatum, lateribus



Fig. 90

leviter sinuatum, fronte truncata, haud sulcata. Palporum articulo ultimo ovato, brevi, acuminato. Antennae rectae, ad apicem attenuatae, articulis transversis. latitudine decrescentibus. ultimo maximo, valde conve.ro, transversim ovato, margine superna obtuse et leviter angulato, intus plus quam extus rotundato, infra, cava magna extus subrecta, intus rotundata, articulo ipso minore. Prothorar rotundatus, absque foveis. Elytra subquadrata, basi

leviter attenuata et bifoveata, humeris quadratis, valde notatis 5. — Long. 1,70 mill. — Fig. 90.

Sumatra: Palembang.

Le dernier article des antennes est très convexe, un peu irrégulièrement ovale; la cavité, en dessous, n'occupe pas toute la surface en dehors et en haut elle se rapproche davantage du bord, en dessous elle se confond avec lui. Cette espèce est très voisine de *C. inexpectus* Raffr., mais elle est un peu plus grande, le dernier article des antennes est plus ovale, les six premiers sont plus fortement atténués du deuxième au sixième.

**Cyathiger nodicornis** n. sp. — Ovatus, convexus, crassus, castaneus, totus confertim, minus grosse punctatus, sat longe, dense, tenuiter pube grisea, subsericea, vestitus. Caput antrorsum valde atte-

nuatum, lateribus obliquis. Palporum articulo ultimo breviter fusiformi. Antennae medio angulatae, articulis, 1 magno, obconico, 2 transverso, 3 transverso, intus producto et leriter crassiore, 4, 5, 6 transversis, intus angustioribus et oblique sitis, 7 maximo, irregulariter et leviter transverso, intus magis rotundato, summo medio obtuse angulato et leriter fasciculato, infra concavo, margine lata, rotundata. Prothorax breviter ovatus, absque foveis. Elytra subquadrata, basi bifoveata, humeris valde notatis, subquadratis 3.— Long. 4.50-4,60 mill.— Fig. 91.



Fig. 91.

Sumatra : Palembang.

L'antenne forme antérieurement un angle assez prononcé à la hauteur du 3° article qui est en forme de coin et plus gros au côté interne; les suivants sont également en coin, mais en sens inverse, le dernier est grand, plus large et plus arrondi en dehors qu'en dedans, l'excavation a la même forme que l'article, mais est moins grande que lui.

**Cyathiger truncatus** n. sp. — Ovalus, converus, minus crassus, totus confertim, minus grosse punctatus, sat dense, longe, tenuiter

pube subsericea vestitus. Caput paulo brevius et minus attenuatum. Palporum articulo altimo elongato, fusiformi. Antennae leviter sinuatae, sed non angulatae, articulis 2-6 latitudine decrescentibus, 2 caeteris magis transverso, 6 fere quadrato, 7 permagno, transversim fere pyriformi, angulo externo superno late truncato, fasciculato, infra valde excavato, ista cava transversim elongato-quadrata et articulo ipso minore. Prothorax breviter ovatus,



Fig. 92.

minute et aequaliter triforeolatus. Elytra subquadrata, basi triforeata, humeris subquadratis, minus notatis 3. — Long. 1.70 mill. — Fig. 92.

Sumatra: Palembang.

L'antenne est sinuée, mais non angulée au milieu, le dernier article est très grand, bien plus large en dehors qu'en dedans; à l'endroit où se trouverait l'angle externe supérieur il y a un brusque aplatissement qui forme troncature; l'excavation inférieure est en quadrilatère assez régulier et moins grande que l'article lui-même.

#### CATALOGUE.

#### CYATHIGERINI

RAFFRAY, Rev. d'Ent. 4890, p. 433.

### CYATHIGER

King, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales, I. 1865, p. 174.RAFFRAY, Rev. d'Ent. 1890, p. 434; 1895, p. 46.

### Groupe I.

sylvestris Raffray, Rev. d'Ent. 4882, p. 4; 4895, p. 48, pl. II, f. 22. . . . . . . . . . Nouvelle-Guinée : Doren.

# Groupe H.

(429)

Schaufussi Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 1883,
p. 385. — Raffray, Rev. d'Ent. 4895, p. 52, pl. II, f. 46
Groupe III.
variolosus Raffray, Rev. d'Ent. 4895, p. 53, pl. II.
f. 47 Penang
heterocerus Raffray, loc. cit. p. 53, pl. II, f. 24
Singapore, Penany.
Groupe IV.
rufus Raffray, loc. cit. p. 54, pl. II, f. 19 Singapore.
Simoni Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 4883, p. 387.
— Raffray, Rev. d'Ent. 1895, p. 55, pl. H. f. 21 Bornéo.
borneensis Raffray, loc. cit. p. 55, pl. II, f. 23 Bornéo.
juvencus Reitter, Notes Leyd. Mus. X1, 4889, p. 5.
gracilis n. sp
inexspectus Raffray, Rev. d'Ent. 1895, p. 56, pl. II,
f. 18 Singapore.
infossus Raffray, Ann. Mus. Nat. Hung. Budapest,
1903, p. 90, pl. II, f. 14 Nouvelle-Guinée : Baie de l'Astrolabe.
patruelis n. sp
nodicornis n. sp
p. 388. — Raffray, Rev. d'Ent. 4895, p. 56, pl. II,
f. 25 Bornéo.
Groupe V.
viduus Raffray, loc. cit. p. 57, pl. II, f. 43 Singapore.
gibbicollis Raefray, Ann. Mus. Nat. Hung. Buda-
pest. 1903, p. 89, ff. 45, 16 Nouvelle-Guinée : Golfe Huon.
truncatus n. sp
<b>cribratus</b> Raffray, Rev. d'Ent. 4895, p. 58, pl. II, f. 44
impar Raffray, Rev. d'Ent. 1890, p. 209, pl. II.
f. 46; 1895, p. 51 Singapore. Penang.

pallidus Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 1892, p. 496. pl. X, ff. 15, 15; Rev. d'Ent. 1895, p. 51 . . . Sumatra septral.

punctatus King, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales, I. 1865, p. 474. — RAFFRAY, Rev. d'Ent. 4895, p. 59, pl. II, f. 45..... Australie: Sydney, Blue Mountains

Q Reitteri Schaufuss, Tijds. Ent. XXIX, 1886, p. 242.

### Groupe VI.

similis Raffray, Rev. d'Ent. 1895, p. 60. Sumatra méridional. sericeus Raffray, loc. cit. p. 57, pl. II, f. 20. . . . . Penang.

### Groupe VII.

Birónis Raffray, Ann. Mus. Nat. Hung. Budapest, 4903, p. 91, f. 47..... ......... Nouvelle-Guinée : Baie de l'Astrolabe, Wilhemhafen.

### 94

### 12º Tribu Hybocephalini.

### TABLEAU DES GENRES

- 1. (14). Deux ongles très inégaux aux tarses.
- 2. (3). Abdomen immargine...... Gen. Mestogaster Schmidt.
- 3. 2). Abdomen plus ou moins marginé,
- 4. (13). Tous les segments dorsaux marginés.
- 5. (44). Massue des antennes de 3 articles.
- 6. (7). Premier et 2º segments dorsaux plus grands; abdomen finement caréné sur les côtés... Gen. Metaxoides Schanfuss.
- 7. (6 et 8). Quatrième segment seul plus grand; abdomen réellement marginé...... Gen. Filiger Schaufuss
- 8. (7). Tous les segments dorsaux subégaux; abdomen réellement marginé.
- 9. (40). Élytres sans strie dorsale. Corps plus court, opaque... ..... Gen. Hybocephalus Reitter.
- 40. (9). Élytres avec une strie dorsale. Corps plus allongé, brillant..... Gen. Pseudapharina Raffray.
- 11. (5 et 12). Massue des antennes de 2 articles. Abdomen réellement marginé...... Gen. Apharina Reitter.

- 42. (14). Antennes extrêmement compactes, à articles lenticulaires, graduellement épaissies vers le sommet, massue formée par le dernier article qui est presque aussi long que le tiers de l'antenne. Élytres courts. Abdomen plus grand très légèrement marginé. Tout entier, sauf les élytres, couvert d'écailles polygonales... Gen. Apharinodes Raffray.
- 4%. (4). Deux ongles égaux aux tarses. Abdomen largement marginé. Corps un peu moins convexe. Antennes épaisses, massue grande, de 3 articles...... Gen. **Ephimia** Reitter.

#### DESCRIPTIONS.

**Filiger validus** n. sp. — Crassus, antrorsum attenuatus, rufus, disperse et minute albido-squamosus, capitis angulis posticis, prothoracis basi, elytrorum margine postica et segmentorum abdominis



Fig. 94.

suturis, dense glanduloso-squamosis. Caput latitudine sua longius, subtriangulare, angulis posticis rotundatis, tuberculo antennario vix sulcato, basi minute impresso, inter oculos foreis duabus inter se et a latere aequaliter distantibus. Antennae validae, articulis 1 et 2 cylindricis, elongatis, 3 quadrato, 4-8 magis ac magis transversis, 9 et 10 multo majoribus, quadrato-transversis, 11 brevissime ovato, basi latissime truncato, apice parum acuminato, Prothorax latitudine sua paulo longior, leviter conicus, lateribus vix rotundatus, disco tenuiter et toto longitudinaliter carinatus, basi media fovea oblonga. Elytra latitudine sua longiora, ad basin attenuata, humeris fere nullis, basi bifoveata, stria dorsali integra, subrecta. Abdomen hand carinatum, elytris subaequale, convexum, postice subrotundatum, Metasternum magnum, planum, transversum, sulcatum, lateribus pone medium obtuse hamatum et dein emar-

ginatum. Pedes sat elongati, femoribus parum crassis, tibiis subrectis.

Segmento ventrali 2 tuberculis duobus acutis armato et inter eos concavo.

Long. 4,20-4,40 mill. — Fig. 94.

Sumatra : Palembang.

Cette espèce diffère des F. carinirentris Schauf., et batarianus Raffr., surtout par l'absence de carène longitudinale à l'abdomen.

Filiger opacus n. sp. — Magis elongatus, rufus, sat crebre punctatus et opacus, disperse squamosus. Caput elongatum, antrorsum

valde angustatum, tuberculo antennario minuto, vix sulcato, inter oculos foveis duabus obsoletis. Antennae elongatae, validae, articulis tribus primis cylindricis, leviter decrescentibus, 4-8 transversis, 9 et 10 haud multo latioribus, sed quadrato-elongatis, 10 paulo majore, 11 elongato, cylindrico, apice obtuso. Prothorax latitudine sua paulo longior, antice et basi subaequaliter paulo attenuatus, medio rotundatus, ecarinatus, basi media fovea minutissima. Elytra latitudine sua paulo longiora, ad basin minus attenuata, lateribus rotundatis, humeris rotundato-elevatis, basi bifoveata, stria dorsali integra. Abdomen ecarinatum, convexum, postice rotundatum. Metasternum longitudinaliter sat profunde sulcatum,

Fig. 95.

tateribus valde et acute humatum. Pedes elongati, femoribus parum crassis, tibiis rectis, leviter intus, pone medium sinuatis 2. — Long. 1,30 mill. — Fig. 95.

Sumatra: Palembang.

La ponctuation, la forme plus allongée et les antennes plus longues séparent nettement cette espèce de la précédente.

Apharina nodula n. sp. - Oblongo-orata, tota rufa, tenuiter et sparse squamosa, capitis, prothoracis et elytrorum margine postica, abdominis suturis, dense albido-squamosis, Caput latum, deplanatum, breviter oratum, anterius constrictum, tuberculo antennario prominente, triangulari, foveis tribus minutis, aequalibus, carinula tenui a vertice usque ad collum extensa. Antennae parum elongatae, articulis tribus primis cylindricis, latitudine sua longioribus, decrescentibus, 4 quadrato, 5-7 moniliformibus, 8 paulo minore, transverso, 9 septimo vix majore, transverso, 10 majore, multo minus transverso, 11 breviter ovato, parum acuminato. Prothorax latitudine sua longior, subconicus, converus, lateribus leviter rotundatus, basi media vix foveatus. Elytra sat elongata, ad basin attenuata, lateribus leviter rotundata, humeris fere nullis, stria dorsali integra, arvuata. Abdomen elytris subaequale, segmento tertio dorsali apice obtuse bituberculato. Metasternum transversum, sulcatum, lateribus pone medium emarginatum, dense squamis glandulosis circumdatum. Pedes elongati, femoribus viv incrassatis, tibiis rectis, anticis ad apicem gradatim incrassatis, intermediis et posticis gracilibus, intus leviter sinuatis 5. — Long. 4.50 mill.

Sumatra: Palembang.

C'est de *Aph. conicicollis* Schauf., que cette espèce se rapproche le plus, mais elle en diffère, ainsi que de *Aph. Simoni* Reitt., par les trois premiers articles des antennes notablement plus longs que larges.

**Apharina armata** n. sp. — Oblonga, convexa, rufa, disperse albido-squamosa, capitis angulis posticis, prothoracis basi, elytrorum margine postica et abdominis suturis dense glanduloso-squamosis. Caput



Fig. 96.

pyriforme, antrorsum valde attenuatum, tuberculo antennario valido, cordato, basi fovea magna, ovata, parum profunda, carinula circumdata, in vertice declivi foveis duabus minutis approximatis. Antennae elongatae, graciles, articulis tribus primis cylindricis, latitudine sua multo longioribus, vix decrescentibus, 4 quadrato, 6 et 7 paululum minoribus, subquadratis, 8 minore, transverso, 9 paulo majore, transverso, 10 multo majore et minus transverso, 11 ovato, basi truncato. Prothorar latitudine sua longior, conicus, lateribus minus rotundatus, basi media fovea rotundata. Elytra latitudine sua longiora, ad basin leviter attenuata, humeris fere nullis, stria dorsali profunda, valida, leviter arcuata, integra. Abdomen elytris subaequale, postice attenua-

tum, pygidio magno, subgibboso et apice infra recurvo. Metasternum cordatum, totum concavum, fundo tenuiter sulcatum, apice ju via coxas posticas utrinque tenuiter et acute productum et apice hamatum. Segmento ventrali 2 deplanato. Pedes elongati, femoribus parum crassis, tibiis gracilibus, subrectis, intus leviter sinuatis 3. — Long. 1.30 mill. — Fig. 96.

Sumatra: Palembang.

Cette espèce se distigue de toutes les autres par la longueur et la gracilité de ses antennes.

**Ephimia subnitida** n. sp. — Oblonga, autrorsum valde attenuata, castanea, elytris antennis pedibusque pallidioribus, breviter et parum dense pube adpressa vestita. Caput elongatum, antrorsum valde attenuatum, anterius recte truncatum, inter oculos foveis duabus obsoletis. Antennae valde crassae, densius ciliatae, clava parum conspicua, articulis 1 et 2 quadratis, 3-8 valde transversis, 9 et 10 multo longio-

ribus, vix latioribus, subquadratis et leviter transversis, 11 elongato, cylindrico, apice obtuso. Prothorax subconicus, latitudine sua longior, foveis tribus magnis et aequalibus. Elytra subquadrata, basi leviter attenuata, lateribus obliquis, basi bifoveata, sulco dorsali brevissimo, ob soleto, lato. Abdomen elytris fere longius et paulo latius, segmentis dorsalibus aequalibus. Metasternum totum paululum concavum. Pedes mediocres, femoribus parum incrassatis, tibiis subrectis et simplicibus.

- ♂ Articulis antennarum 9 et 10 paulo majoribus, quadratis et longitudine aequalibus. Metasternum magis concavum. Segmentis ventralibus leviter deplanatis.
- © Articulis antennarum 9 transverso, octo vix duplo longiore, 10 subquadrato, sed leviter transverso, praecedente fere duplo longiore. — Long. 1.60 mill.

Antilles : Grenada.

Cette espèce diffère de *E. Simoni* Reitt., de S<sup>t</sup>-Thomas, par la pubescence bien moins épaisse, nullement squameuse, les articles des antennes 3-8 moins lenticulaires et les trois derniers, au contraire, beaucoup moins longs; la forme générale du corps est plus large, moins allongée. Elle diffère de *E. crussicornis* Sharp, de Panama, par les derniers articles des antennes moins longs.

### CATALOGUE.

#### HYBOCEPHALINI

RAFFRAY, Rev. d'Ent. 1890, pp. 434, 135.

#### MESTOGASTER

Schmidt, Beitr. Mon. Psel. Prag, 4838, p. 9. — Raffray, Rev. d'Ent. 4890, pp. 434, 435.

p. 296. — Raffray, Rev. d'Ent. 1890, pl. II, f. 43. Batavia.

#### METAXOIDES

Schaufuss, Psel. Siams. 1877, р. 13; Bull. Soc. ent. Fr. 1882, pp. lxxxv et cxvii. — Raffray, Rev. d'Ent. 1890, pp. 134, 135.

bruchiformis	Schaufuss, Psel.	Siams. p. 43. —	
RAFFRAY, Rev.	Ent. 1890, pl. II,	f. 42	Siam.
1			

### FILIGER

Schaufuss, Psel. Siams, 1877, p. 47. — Raffray, Rev. d'Ent. 1890, pp. 434, 435. **Hybocephalus** Schaufuss, Ann. Mus. Civ. Gen. XVIII, 4882, p. 353.

XVIII, 1882, p. 353.	
ampliventris Schaufuss, Psel. Siams, 4877, p. 17	Siam.
cariniventris Schaufuss, loc. cit. p. 47	Siam.
batavianus Raffray, Ann. Mus. Nat. Hung. Budapest, 1903, p. 92	Batavia.
p. 271 Soc. ent. Fr. 4896,	Gabon.
validus n. sp Sumatra:	Palembang.
vestitus Raffray, Rev. d'Ent. 4883, p. 242, pl. V. f. 19	Abyssinie.
opacus n. sp Sumatra	: Palembang.
minimus Schaufuss (nec Motsch.), (Hybocephalus), Ann. Mus. Civ. Gen. XVIII, 1882, p. 354	Célèbes.
? squamosus Schauf. (nec Motsch.), (Hybocephalus), loc. cit. p. 355	Birmanie.

#### HYBOCEPHALUS

Reitter (nec Schauf, nec Motsch.), Verh. z. b. Ges. Wien, 1883, p. 446. — Raffray, Rev. d'Ent. 4890, pp. 434, 436.

dentiventris	Reitter, loc. cit. p. 416. — Raffray,
Rev. d'Ent.	890, pl. II, f. 44 Bornéo: Telang.
	REITTER, loc. cit. p. 417, pl. XX, f. 16.
	Bornéo: Tetang, Tameanglaiang.

9

(450) Genera et catalogue des Psetapades.
informis Reitter, loc. cit. p. 417, pl. XX, f. 47  Borneo: Telang, Tameanglaiang.
APHARINA
REITTER, Verh. z. b. Ges. Wien, 4882, p. 295; Verh. naturf. Ver. Brünn, XX, 1882, p. 494. — Raffray, Rev. d'Ent. 4890, pp. 434, 436.
conicicollis Schaufuss (Filiger). Psel. Siams, 4877,
p. 17 Siam.
Simoni Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 1882, p. 14. Batavia.
fuscipennis Reitter, loc. cit. 4883, p. 445, pl. XX,
f. 45 Bornéo : Telang.
Squamiceps Schaufuss (Panaphantus), Tijds. Ent. XXV, p. 66; Notes Leyd. Mus. IV, p. 146. — Reit- ter Verh. z. b. Ges. Wien, 4883, p. 444. — Raf-
FRAY, Rev. d'Ent. 1890, pl. II, f. 41 Bataria.
borneensis Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 1896, p. 270.
Bornéo : Telang.
nodula n. sp Sumatra: Palembang.
armata n. sp Sumatra : Palembang.
7
PSEUDAPHARINA
Raffray, Rev. d'Ent. 4890, pp. 434, 136.
prima Reitter <i>Filiger</i> ), Verh. z. b. Ges. Wien, 4883, p. 415, pl. XX, f. 48
APHARINODES
Raffray, Rev. d'Ent. 1890, p. 435; 4895, p. 61.
squamosa Raffray, Rev. d'Ent. 1890, p. 210, pl. II.
f. 40
miranda Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 4895, p. 61, pl. II. f. 5

#### STIPESA

SHARP, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 109.

rudis Sharp, loc, cit, p. 409..... Japon.

4

### **EPHIMIA**

REITTER, Deuts. Ent. Zeits. 1883, p. 34. — RAFFRAY, Rev. d'Ent. 4890, pp. 435, 437.

Simoni Reitter, Deuts, Ent. Zeits, 1883, p. 34. Antilles: S'-Thomas. crassicornis Sharp, Biol. Centr. Amer. Col. II (1).

1887. p. 3. pl. I, f. 2...... Panama. subnitida n. sp...... Antilles : Grenada.

3

### Genre insuffisamment décrit appartenant probablement à cette tribu.

#### HYBOCEPHALUS

Мотsen. (in. litt.) Bull. Nat. Mosc. 1851, XXIV, p. 482.

minimus Motsch. loc. cit. p. 482..... Indes orientales. squamosus Motsch. loc. cit. p. 482 ..... Indes orientales.

### 43e Tribu Holozodini.

#### TABLEAU DES GENRES

- 1. (2). Corps court, épais, couvert de squamules. Palpes moyens, deuxième article renflé au sommet, 3º petit, globuleux, 4º plus long que les deux précédents réunis, un peu flagelliforme, très légèrement arrondi en dehors, un peu sinueux intérieurement, acuminé à son sommet qui est un peu recourbé en dedans.... Gen. Holozodus Fairmaire.
- 2. (4). Corps allongé, parallèle, très finement pubescent. Palpes très petits, deuxième article un peu arqué et très peu rendé au sommet, 3° très petit, un peu triangulaire, 4° bien moins long que les deux précédents réunis, brièvement ovoïde, obtus au sommet ...... Gen. Caccoplectus Sharp.

### CATALOGUE.

#### HOLOZODINI

RAFFRAY, Ann. Soc. ent. Fr. 1899, p. 518.

#### HOLOZODUS

FAIRMAIRE, Bull. Soc. ent. Fr. 4898, p. 346. — RAFFRAY.
Ann. Soc. ent. Fr. 4899, p. 548.

Hologlyptus | FAIRMAIRE, Bull. Soc. ent. Fr. 4898, p. 338.

Rafrayi Fairmaire, loc. cit. 4898, p. 338...... Madagascar.

## CACCOPLECTUS

Sharp, Biol. Centr. Amer. Col. II (I), 4887, p. 22. — Raffray, Rev. d'Ent. 4890, p. 469.

celatus Sharp, loc. cit. p. 22, pl. I. f. 44.... Guatemala, Mexique.

## 14° Tribu Pselaphini

#### TARLEAU DES GENRES

- 1. (14). Palpes maxillaires simples non pénicillés.
- 2. (6). Palpes très longs, 2° article très long, grêle, brusquement renflé au sommet, 3° petit plus ou moins globuleux.
- 4. (3 et 5). Quatrième article des palpes mince et pédonculé à la base, fortement renflé au milieu, très acuminé et longuement subulé au sommet....... Gen. **Dicentrius** Reitter.
- (2 et 13). Palpes beaucoup plus courts, 4º article très peu ou pas pédonculé à la base, ovoïde, ou longuement claviforme.

- (8). Quatrième article des palpes longuement ovoïde, non tronqué au sommet, sans trace de pédoncule à la base.
   Prothorax ovoïde-allongé...... Gen. Pselaphoxys Raffray.
- (8 et 12). Quatrième article des palpes assez allongé, régulièrement un peu claviforme, plus épais au sommet qu'à la base, régulièrement épaissi et acuminé au sommet.

- 43. (6). Palpes encore plus courts, épais, 4° article irrégulièrement triangulaire, largement tronqué au sommet. Antennes courtes, épaisses, moniliformes. Gen. Tyraphus Sharp.
- 14. (1). Palpes pénicillés.
- 46. (45). Articles 2, 3, 4 des palpes pénicillés, 4 avec deux pénicilles à l'extrémité qui est tronquée et un autre pénicille au milieu, au côté interne. Gen. Psilocephalus Raffray.

## TABLEAUX ET DESCRIPTIONS.

# Tableau du genre Pselaphus

- A 2. Tête avec un profond sillon longitudinal.
- B 2. Abdomen non impressionné à la base.
- C 7. Prothorax simple, sans fossettes ni sillon à la base.

D 3. Massue du dernier article des palpes épineuse		
on verruqueuse	Groupe	1.
D 2. Massue du dernier article des palpes avec des		
soies dressées, assez longues, non sillonnée.		
E 2. Tête à occiput non gibbeux	Groupe	11.
E 1. Tête à occiput très convexe, gibbeux	Groupe	III.
D 1. Massue du dernier article des palpes plus ou		
moins sillonnée au sommet et de chaque		
còté	Groupe	IV.
C 6. Prothorax avec un sillon simple, plus ou		
moins marqué à la base, aboutissant, de cha-		
que côté, dans une fossette médiocre et		
normale.		
D12. Prothorax ponctué ou réticulé, opaque en		
arrière du sillon transversal.		
E <sup>1</sup> 2. Pubescence très clair-semée, réduite à quelques		
longues soies	Groupe	1.
E <sup>1</sup> 4. Pubescence courte, assez dense	Groupe	VI.
D <sup>1</sup> 4. Prothorax entièrement lisse et brillant, même		
en arrière du sillon transversal	Groupe	VII.
C. 5. Prothorax avec un sillon transversal très pro-	,	
fond, presque anguleux, aboutissant, de		
chaque côté, dans une très grande impres-		
sion fovéiforme	Groupe	VIII.
C. 4. Prothorax avec un sillon transversal plus ou		
moins interrompu au milieu par une im-		
pression généralement carrée.		
D <sup>2</sup> 3. Élytres avec une strie dorsale, non carénés à		
la base, au-dessus des épaules.		
E <sup>2</sup> 2. Prothorax imponetué.		
F 2. Pubescence presque nulle, jaune	Groupe	IX.
F 4. Des soies longues, noires ou brunes, très es-		
pacées	Groupe	X.
E <sup>2</sup> 4. Prothorax ponctué à la base	Groupe	XI.
D <sup>2</sup> 2. Élytres avec deux stries dorsales.		
E <sup>3</sup> 2. Les deux stries dorsales géminées, situées vers		
le centre des élytres	Groupe	X11.
E <sup>3</sup> 1. Les deux stries dorsales très rapprochées de		
la suture; prothorax entièrement ponctué.		
opaque, son disque largement impressionné.	Groupe	XIII.
D <sup>2</sup> 1. Élytres sans strie dorsale, plus ou moins ca-		

A. RAFFRAY.

rénés latéralement à la base, au-dessus des		
épaules	Groupe	XIV.
C. 3. Prothorax avec trois petites fossettes libres a		
la base	Groupe	XV.
C. 1. Prothorax avec un sinon fongitudinal, entier. C. 1. Prothorax avec une simple fossette médiane à	Groupe	XVI.
la base.		
D'3. Prothorax un peu dilaté latéralement avec le		
bord caréné; élytres très courts, triangu-		
laires	Groupe	XVII.
D <sup>3</sup> 2. Prothorax ovale-allongé, ponctué; yeux pres-		
que nuls (ex Broun)	Groupe	XVIII.
D <sup>3</sup> 1. Prothorax ovale-allonge, imponetué; yeux nor- malement développés; élytres courts, trian-		
gulaires.		
E <sup>1</sup> 2. Massue du dernier article des palpes assez		
grande, un peu verruqueuse, sillonnée	Groupe	XIX.
E <sup>1</sup> 4. Massue du dernier article des palpes sans		
verrucosités.		
F <sup>1</sup> 2. Massue du dernier article des palpes petite,		
presque fusiforme, très acuminée au som- met, très légèrement sillonnée sur le côté	Carro	1.1.
F <sup>1</sup> 1. Massue du dernier article des palpes courte,	Groupe	ΧΧ.
mais épaisse, brièvement ovalaire, non acu-		
minée, mais obtuse ou tronquée au sommet,		
sillonnée.		
G 2. Élytres toujours plus ou moins carénés exté-		
ricurement, à la base.		
H 2. Prothorax lisse, brillant	Groupe	XXL
II 1. Prothorax réticulé, chagriné, plus ou moins opaque.	Groupe	XXII.
G 1. Élytres sans carène externe à la base	Groupe	XXIII.
B 1. Abdomen plus ou moins impressionné à la	Oronpe	24.4111.
base.		
C <sup>1</sup> 3. Massue du dernier article des palpes verru-		
queuse ; élytres légèrement carénés à la base,		
extérieurement	Groupe	XXIV.
C <sup>1</sup> 2. Massue du dernier article des palpes ponctuée, non verruqueuse, sillonnée; élytres avec		
un sillon large, assez profond, près de la		
suture	Groupe	XXV
	1	

C<sup>1</sup>1. Massue du dernier article des palpes lisse, sillonnée.

A 1. Tête allongée, plate, sans sillon longitudinal. Groupe XXVIII.

Pselaphus pubescens n. sp. — Oblongus, leviter convexus, castaneus, elytris, antennis pedibusque rufo-castaneis, totus disperse setis incurvis, pallidis restitus. Caput parum elongatum, inter oculos impressione triangulari et anterius sulco profondo. Palpi elongati, graciles, articuli ultimi parte basali tenui, clava longiore, orata, apice lateraliter fissa. Antennae ralde elongatae, graciles, articulis 1 cylindrico, 2 subquadrato, 3-10 leviter obconicis, longitudine valde crescentibus, 11 fusiformi, quatuor ultimis longitudine dimidiam partem antennae aequantibus. Prothorax oblongo-ovatus, basi utrinque foveatus, sulco transverso arcuato, simplici. Elytra leviter convexa, basi attenuata, lateribus rotundata, humeris nullis, stria dorsali subrecta, tenui. Abdomen elytris multo brevius. Metasternum convexum, obsolete sulcatum. Pedes parum elongati, femoribus sat crassis, libiis ad apicem incrassatis. — Long. 1,70 mill.

Annam.

Cette espèce est très voisine de *Ps. articularis* Schauf., de Siam: la pubescence au lieu d'être fine et dense, comme dans cette dernière, est beaucoup plus espacée, formée de soies fortes et recourbées; le prothorax est bien plus allongé et plus régulièrement ovale; les élytres sont bien plus convexes, avec les côtés arrondis et les épaules nulles.

Pselaphus vestitus n. sp. — Cette espèce est extrèmement voisine de la précédente, dont elle a les élytres convexes à côtés arrondis: mais la pubescence est comme chez Ps. articularis Schauf., tine. dense, très ténue, plus dense encore que chez l'espèce du Siam; les antennes sont encore plus grèles que chez Ps. pubescens, avec les articles 9 et 40 plus brusquement épaissis et régulièrement en ovale allongé; le prothorax est régulièrement ovoïde, mais beaucoup plus court. Elle semble intermédiaire entre articularis et pubescens; du premier elle a la pubescence, du second le facies général.

Sumatra : Palembang.

Pselaphus squamosus n. sp. — Gracilis, totus rufus, setis validis seriatim dispositis, disperse vestitus. Caput parum elongatum, inter oculos forea maxima, posterius fere usque ad collum prolongata, Ann. Soc. Ent. Fr., LXXIII 1904.

anterius sulco latissimo longitudinali. Palpi ralde elongati, articuli ultimi parte basali tenui, recta, clara aequilonga, ista clava fusiformi, obsolete apice et lateraliter sulcata. Antennae mediocres, articulis 1 multo majore, suborato, 2 subquadrato-elongato, sequentibus multo gracilioribus, 3 obconico, latitudine sua duplo longiore, 3.8 longitudine decrescentibus, 8 suborato, 9 et 10 duplo majoribus, oratis, 11 orato, acuminato, Prothorax oratus, latitudine sua paulo longior, utringue fovea laterali valida, et media basi sulco lato profundo, arcuato, foveas laterales hand attingente, Elntra latitudine sua paulo longiora, subtriangularia, humeris nullis, basi leviter transversim carinata et parum profunde biimpressa, stria dorsali nulla, setis triseriatim dispositis. Abdomen elytris majus, segmento primo dorsali magno, convero et basi transversim depresso. Metasternum convexum, apice leviter declive, Pedes clongati, femoribus clavatis, tibiis anticis et intermediis ad apicem leviter incrassatis et sinuatis, posticis subrectis. Segmento ultimo ventrali apice tuberculo longitudinali praedito, trochanteribus intermediis leviter dilatatis et truncatis S. - Long, 4.60 mill.

Le Cap: Cape Town.

Cette epèce vient auprès de *Ps. Simoni* Reitt. = *Sencieri* Coq., mais les élytres sont beaucoup plus longs, plus convexes, sans carène latérale à la base; le prothorax a trois impressions libres, une fossette de chaque côté et, au milieu, un fort sillon arqué qui ne les relie pas.

# Tableau du genre Curculionellus

Λ	4.	Prothorax rugueusement et fortement ponctué.		
В	2.	Pubescence presque nulle, jaune	Groupe	1.
B	1.	Pubescence formée de longues soies noires, re-		
		dressees, éparses	Groupe	11.
$\Lambda$	3.	Prothorax avec une ponctuation grosse, mais non		
		confluente, non râpeuse	Groupe	III.
A	2.	Prothorax avec une fine réticulation, opaque	Groupe	IV.
A	1	Corps entièrement lisse, sans ponctuation.	Groupe	1.

Curculionellus hirtus n. sp. — Totus rubro-castaneus, capite prothoraceque rugoso-punctato, caetera nitida, setis longis, nigris, erectis, in elytris seriatim dispositis, disperse totus vestitus. Caput sat elongatum, inter oculos pone medium sitos forea subrotundata, anterius sulco lato, parum profundo, nitido, postice occipite longitudinaliter obsolete impresso. Palporum articulo ultimo elongato, subflagelliformi, apice rotundato. Antennae validae, crassae, tenuiter rugosae,

articulis 1 magno, cylindrico, 2 fere quadrato, 3-6 subquadratis, perparum transversis, 7 quadrato, 8 subquadrato, leviter rotundato et paululum majore. 9 et 10 paulo majoribus et leviter crescentibus, subquadratis, leriter longioribus, 11 ovato. Prothorax subhexagonus, lateribus ante medium rotundatim angulatis, utringue forea laterali mediocri, sulco transverso arcuato, obsoletissimo. Elytra subdeplanata, latitudine sua paulo longiora, basi attenuata, lateribus obliquis, humeris notatis, obliquis, basi biforeata, stria dorsali integra, ad basin leviter elevata. Abdomen elytris subaequale. Metasternum convexum, profunde et late sulcatum. Pedes validi, femoribus clavatis, tibiis subrectis, ad apicem leriter incrassatis, trochanteribus intermediis apice spina tenui acutissima armatis. - Long. 2,40 mill. -Fig. 97.



Fig. 97.

Sumatra: Palembang.

Cette belle espèce se distingue des autres par les longues soies noires dont elle est ornée et qui forment des lignes régulières sur les élytres.

# Tableau du genre Tyraphus

1 2.	Prothorax lisse, brillant.		
B 2.	Pubescence peu épaisse, mais très distincte, assez		
	forte	Groupe L.	
B 1.	Pubescence presque nulle	Groupe H.	
A 1.	Prothorax plus ou moins finement réticulé, opaque.		
B+2.	Antennes courtes, épaisses, articles 3-40 transver-		
	saux	Groupe III	
B+1.	Antennes bien plus longues et plus grêles, articles.	,	
	au moins 9 et 10, carrés	Groupe IV	

### CATALOGUE.

# 14° Tribu Pselaphini

RAFFRAY, Rev. d'Ent. 4890, pp. 440; Trans. South Afr. Phil. Soc. 4897, p. 98. — Gannlbauer, Käf. Mittel. II, 4895, p. 842.

## **PSELAPHUS**

Herbst, Naturs. Ins. Käf. IV, 4792, p. 106. — Denny, Mon. Psel. 4825, p. 43. — Aubé, Psel. Mon. 4833, p. 19;
Ann. Soc. ent. Fr., 4844, p. 400. — Erichson, Käf. Mrk. Brandbg. I, p. 226. — Jacq. Duval, Gen. Col. Eur. I, p. 430. — Thomson, Skand. Col. III, p. 232. — Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 4884, pp. 454, 454. — Raffray, Rev. d'Ent. 4890, pp. 437, 439; Trans. S. Afr. Phil. Soc. 4897, p. 98. — Ganglbauer, Käf. Mittel. II, 4895, p. 842.

# Groupe I.

Heisei Herbst, Naturs. Ins. Käf. IV, 4792, р. 409, pl. XXXIX, II. 9, 40. — Reichenbach, Mon. Psel. 4846, р. 28, pl. I, f. 2. — Denny, Mon. Psel. 4825, р. 45, pl. IX, f. 2. — Aubé, Psel. Mon. 4833, р. 19, pl. 80, f. 1; Ann. Soc. ent. Fr. 1844, р. 101. — Jacq. Duval, Gen. Col. Eur. I, pl. 40, f. 200. — Erichson, Käf. Mrk. Brandbg. I, p. 266. — Thomson, Skand. Col. III, p. 233. — Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 4881, p. 504. — Ganglbauer, Käf. Mittel. II, 4895, p. 844.

Europe.

brevipalpis Schranck, Fn. Boic. I, p. 439. eurygaster Веск, Beitr. baier. Ins. p. 44, pl. II, f. 8. Herbstii Reichb. Mon. Psel. 4846, p. 25, pl. I, f. 4. — Aubé. Psel, Mon. 4833, p. 20, pl. 80, f. 2.

<b>bellax</b> Casey, Col. Not. V, 4893, p. 495, pl. I, f. 48
Amér. septentrionale : Massachusetts, Michigan, Illinois.
Lewisi Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1883, p. 329. Japon.
Groupe II.
lativentris Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 1882.
p. 293 Java : Batavia. Bornéo.
pilipalpis Reitter, Notes Leyd. Mus. V. p. 9
Sumatra : Soekadana.
Reitteri Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 1892, p. 496
Sumatra septentrional.
multangulus Schaufuss, Psel. Siams 1877, p. 4; Ann. Mus. Civ. Gen. XVIII, 1882, p. 356
, A
parvipalpis Reitter, Veth. z. b. Ges. Wien, 4882, p. 294 Java : Balavia. Bornéo. Singapore.
bivestitus Schaufuss, Berl. Ent. Zeits. 1887, p. 295.
Groupe III.
Erichsont Leconte, Bost. Journ. VI, p. 81. — Brex-
DEL. Bull. Un. Iowa, I. p. 244, pl. VII, f. 23. — Ca- sey, Col. Not. V, p. 495, pl. I, f. 48c
Amér, septentrionale : États de l'Est.
longiciavus Leconte, Bost. Journ. VI, p. 81. — Bren-
DEL. Bull. Un. Iowa, I. p. 244. — Casey, Col. Not.
V, p. 495, pl. I, f. 48b
Amér, septentrionale : Vallée du Mississipi, Iowa, Louisiane.
fustifer Casey, Col. Not. V, p. 495, pl. 1, f. 48b
Groupe IV.
tenuis Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874. p. 493.
Australie : Victoria.
laevicollis Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 4883,
p. 410 Ceylan.
calopygaeus Schaufuss, Berl. Ent. Zeits. 4887.
p. 294 Bornéo méridional.
pilicollis Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien. 4882. p. 293
p. A. S. C.

Anna Tid. Est VVIV 1000 a 210 C
trossulus Schaufuss, Tijds. Ent. XXIX, 1886, p. 247. Sumatra.
filipalpis Reitter, Deuts. Ent. Zeits. 4882, p. 487
Afr. occidentale : Addah.
longiceps Raffray, Rev. d'Ent. 4887, p. 33; Trans.
S. Afr. Phil. Soc. 4897, p. 94 Zanzibar. Natal.
acuminatus Motschulsky, Mém. Nat. Mosc. IV.
p. 314, pl. II, f. A. — Reitter, Verh. z. b. Ges.
Wien, 1881, p. 504
3 hirtus Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, p. 333; 1881, p. 504 (Syrie: Beyrouth, Liban).
algesiranus Sauley, Berlin. Ent. Zeits. 4870 (Beih.),
p. 87. — Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881,
p. 506 Espagne : Algésirus.
Diecki Sauley, Berl. Ent. Zeits. 4870 (Beih.), p. 87.
— Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 4881, р. 506
Espagne septentrionale.
? Saulcyi Sharp.
? Cavelli Broux, Man. N. Zeal. Col. 4893, p. 4444 Nuc-Zélande.
Groupe V.
lineatus King, Tr. Ent. Soc. N. S. Wales, 1863, p. 43.
- Raffray, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 4900,
p. 196 Australie : New South Wales, Melbourne, Victoria.
frontalis Schaufuss, Tijds. Ent. XXIX, 1886, p. 251.
antipodum Westwood, Trans. Ent. Soc. Lond. III,
4856, p. 274, pl. XVI, f. 8. — Raffray, Proc. Linn.
N. S. Wales, 4900, p. 197
Australie : New South Wales, Melbourne.
Leanus Raffray, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 1900,
p. 198 Australie: New South Wales.
unipunctatus Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 4883,
p. 410 Bornéo : Pengaron, Barabei.
biocellatus Reitter, loc. cit. 4883, p. 440
Bornéo : Télang, Tameanglaiang.
bifoveolatus Schaufuss, Psel. Siams, 1877, p. 6 Siam.
canaliculatus Schaufuss, loc. cit. p. 5 Siam.

# Groupe VI.

brevipalpis Schaefess, Nunq. ot. III, p. 483. —
Raffray, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 1900,
p. 498
squamiceps Schaufuss, Tijds. Ent. XXIX, 1886, p. 252.
mundus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 491.
Australie : Victoria.
articularis Schaufuss, Psel. Siams, 1877. p. 6 Siam.
pubescens n. sp
vestitus n. sp
Groupe VII.
tuberculifrons Raffray, Proc. Linn. Soc. N. S.
Wales, 4900, p. 499 Australie : Bridgetown.
pauper Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, IV,
p. 492. N. N. Zelande.
caviceps Schaufuss (in litt.).
meliusculus Brown, Man. N. Zeal. Col. 1893, p. 1044. Nu-Zelande.
Groupe VIII.
sulcifrons Raffray, Rev. d'Ent. 4883, p. 236,
pl. IV. f. 10
Groupe IX.
elongatus Raffray, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales,
4900, p. 200
dresdensis Herbst, Nat. Ins. Käf. IV, 4792, p. 110.
pl. XXXIX, f. 11. — Reichenbach, Mou. Psel. 1816,
p. 32, pl. 1, f. 4. — Denny, Mon. Psel. 4825, p. 47,
pl. X, f. 2. — Acbé, Psel. Mon. 1833, p. 22, pl. 80,
f. 4; Ann. Soc. ent. Fr. 1844, p. 102. — Ericuson,
Käf, Mrk. Brandbg. I. p. 267. — Thomson, Skand.
Col. III, p. 232. — Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien,
1881, p. 505. — Ganglbauer, Käf. Mittel, II, 1895,
p. 843 Europe septentrionale et moyenne.
Hejssi Paykull, Fn. Svec. 1798, III, p. 364.
longicollis Reichenbach, Mon. Psel. 1816, p. 30, pl. 1,
f. 3. — Denny, Mon. Psel. 1825, p. 46, pl. X. f. 1.
— Aubé. Psel. Mon. 1833. p. 21. pl. 80, f. 3.
1 1

Iongicornis Sauley, Ann. Soc. ent. Fr. 4863, p. 631.	
France méri	dionale. Corse.
brevicornis Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 4883.	
p. 411	Batavia.
Groupe X.	
Gestroi Schaufuss, Ann. Mus. Civ. Gen. XVIII, 4882,	
p. 356	
longepilosus Schaufuss, Tijds. Ent. XXIX, p. 248.	
pitosus Raffray, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 4900,	
p. 201	: Bruigetown.
p. 358	Célèbes.
Groupe XI.	
RAFFRAY, Proc. Linn. N. S. Wales, 4900, p. 499	
Australie : Eastern Creek,	. Rockhampton.
bipunctatus Schaufuss, loc. cit. p. 252.	
Groupe XII.	
geminatus Westwood, Trans, Ent. Soc. Lond. 1856.	
p. 273, pl. XVI, f. 9 Australe	
Groupe XIII.	
sexstriatus Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 4883,	
p. 411 Bornéo : I	ameanglai ang.
Groupe XIV.	
crassus Raffray, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales,	
4900, p. 200	
quadricostatus Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien.	
4884, p. 78	Alpes Pennines.
Groupe XV.	
tripunctatus Schaufuss, Tijds, Ent. XXIX, 4886,	
p. 252. — Raffray, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales. 4900, p. 196.	Australie.
	Attairate.
Groupe XVI.	2011
sulcicollis Broun, Man. N. Zeal. Col. 4893, p. 4445.	Nue-Zelande.

Corse.

# Groupe XVII.

Groupe XVII.
delicatus Brown, loc. cit. 4886, p. 943 N <sup>the</sup> -Zélande.
citimus Brown, loc. cit. 1893, p. 1043 N <sup>the</sup> -Zélande.
ventralis Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. XV, 1895,
p. 72
Groupe XVIII.
coecus Brown, Man. N. Zeal. Col. 1886, p. 943, Nue-Zelande.
Groupe XIX.
algericus Raffray, Bull. Soc. ent. Fr. 4896, p. 218.
Groupe XX.
pentagonus Sauley, Verh. naturf. Ver. Brünn,
XVI, 1878. p. 436. — REITTER, Verh. z. b. Ges.
Wien, 1881, p. 507
mehadiensis Frivaldsky, Termesz. Füzet. Buda-
pest, 1887, p. 21. — REITTER, Verh. z. b. Ges.
Wien, 1881, p. 507. — GANGLBAUER, Käf, Mittel, II.
4895, p. 844
Groupe XXI.
longipalpis Kiesenw, Stett. Ent. Zeits 4850, p. 222;
Ann. Soc. ent. Fr. 1851, p. 401, pl. XI, f. 3
Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 4881, p. 506.
France méridionale : Pyrénées, Alpes-Maritimes. M' Viso.
Stussineri Saulcy, Deuts. Ent. Zeits. 1881, p. 95.
Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 4881, p. 506
Istrie. Alpes-Maritimes.
argutus Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, p. 506. Corse.
Distriolatus Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 4884,
p. 78 Portugal : Coïmbre, Sierra de Geres.
tuniseus Normand, Bull. Soc. ent. Fr. 1901, p. 447.
Tunisie : Souk-el-Arba, Ain-Draham.
Revelierei Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien. 4884.
p. 506

Kiesenwetteri Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, p. 65.

# Groupe XXII.

Wrotepe XXII.
Heydeni Saulcy, Berl. Ent. Zeits. 1870 (Beih.), p. 87.
pl. II, f. 5. — REITTER, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881,
p. 507 Espagne : Asturies.
debitis Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 4883, p. 328. Japon.
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Groupe XXIII.
Ganglbaueri Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881.
p. 507 Corse.
Fiorii nom. nov
Reitteri   Fiori, Naturalista Sicil. XIII, 1894, p. 98.
Groupe XXIV.
Sencieri Coquerel, Ann. Soc. ent. Fr. 1858, p. 794,
pl. XVI, f. 3 Raffray, Bull. Soc. ent. Fr.
4896, p. 249 Algérie : Oran, Mª Onarsenis.
Simoni Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 4881, p. 508.
Espagne méridionale : Algésiras
Groupe XXV.
Chobauti Normand, Bull. Soc. ent. Fr. 1903, p. 191.
Algérie : Bou-Berak près Dellys.
Groupe XXVI.
Piochardi Sauley, Berl. Ent. Zeits. 1870 (Beih.),
p. 86 Portugal : Coïmbre, Sierra de Gerez.
Groupe XXVII.
caviventris Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 1884,
p. 78. Grèce : Morée.
clavigeroides Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien,
1881, p. 508
squamosus n. sp
squamosus n. sp Le cap : cape roun.
Groupe XXVIII.
Dizonatus Schaufuss, Tijds. Ent. XXIX, 1886.
p. 246. pl. X, ff. 3, 3°, 3°, 3°
opacus Schaufuss, loc. cit. p. 245. pl. X, ff. 1, 10. Amazones.
elegantissimus Schaufuss, loc. cit. p. 246, pl. X.
II. 2, 20, 21
and a carrier an

fuscopilosus Brown, loc. cit. 1886, p. 944.....

Nue-Zelande.

83

#### DICENTRIUS

Reitter, Verh. nat. Ver. Brünn, XX, p. 492. — Raffray, Rev. d'Ent. 4890. p. 137.

Merkli Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 1879, p. 536; Deuts. Ent. Zeits. 1885, pl. III. f. 26.......

Bulgarie.

1

## **PSELAPHISCHNUS**

RAFFRAY, Trans. S. Afr. Phil. Soc. 4897, p. 99.

squamosus Raffray, loc. cit. p. 99, pl. XVII, f. 2.

..... Le Cap : Cape Town.

1

#### **PSELAPHOXYS**

RAFFRAY, Rev. d'Ent. 4890, p. 437; Trans. Afr. Phil. Soc. 4898, p. 402.

delicatulus Raffray, Rev. d'Ent. 1882, p. 14; Trans. S. Afr. Phil. Soc. 1898, p. 403, pl. XVIII,

II. 47, 48..... Abyssinie. Le Cap : Uitenhage.

1

#### **PSELAPHOPHUS**

RAFFRAY, Rev. d'Ent. pp. 437, 439; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 4900, p. 202.

atriventris Westwood (Bryaxis), Trans. Ent. Soc. Lond. 4856, p. 270, pl. XVI, f. 2. — Raffray, Proc.

*clavatus* King, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales, 4865, p. 469.

1)1),iii	A. Harrhat.	*00)
	Var. Edwardsi King, loc. cit. p. 469. clavicornis Schauf. Nunq. ot. III, p. 483; Tijds. Ent. XXIX, 1886, p. 253. Var. simplicior Schauf. Nunq. ot. p. 484. Var. rexator Schauf. Tijds. Ent. XXIX, p. 254. anopunctatus Schauf. loc. cit. p. 254.	
bid	color Schaufuss, loc. cit. p. 253. — Raffray, Proc.	
	Linn. Soc. N. S. Wales, 4900, 203 Australie : Gaw	ler.
ea m	nicolor Raffray, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 1900,	
	p. 203 Australie: New South Wales. Tasma	nie.
sul	Iciceps Raffray, Ann. Mus. Nat. Hung. Budapest,	
	4903, p. 92 Nouvelle-Guinée: Wilhemha	fen.
4	PSELAPHOPTRUS	
	Reitter, Wien. Ent. Zeit. 1891, p. 439: 1901, p. 423.	
Ku	ibischteki Reitter, loc. cit. 4891, p. 440; 4901,	
	p. 423	lan.
Ba	nghaasi Refter, loc. cit. 4893, p. 220; 4901,	
	p. 424 Asie centrale: Margelan, Buke	tru.
	omnickii Reitter, loc. cit. 1901, p. 124	nea.
3	MARGARIS	
	Schaufuss, Nunq. of. II, p. 453. — Raffray, Rev.	

d'Ent. 4890, pp. 438, 439.

imperialis Schaufuss, loc. cit. p. 454. - Raffray. loc. cit. pl. II. f. 59...... Australie: Rockhampton. 4

### CURCULIONELLUS

Westwood, Trans. Ent. Soc. Lond. 4870, H. p. 127. - RAFFRAY, Rev. d'Ent. 4890, pp. 438, 439; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 1900, p. 204.

# Groupe I.

punctatus King, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales, 1865. p. 469. -- Raffray, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales. Australie. 4900, p. 204 (Sydney).....

angulicollis Westwood, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870,
p. 427; Thes. Ent. Oxon, pl. IV, f. 3 (Cape York).
semipolitus Schaufuss, Tijds. Ent. XXIX, 1886, p. 255
doreianus Westwood, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870,
p. 127; Thes. Ent. Oxon. pl. IV. f. 5 <sup>h</sup>
robusticornis Schaufuss, Ann. Mus. Civ. Gen.
XVIII. 1882. p. 372
Groupe II.
hirtus n. sp
Groupe III.
rugithorax Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 1882,
p. 295 Batavia.
Groupe IV.
riparius Raffray, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales,
4900, p. 205 Australie: New South Wales.
Groupe V.
glabricollis Westwood, Trans. Ent. Soc. Lond.
1870, p. 127; Thes. Ent. Ox. pl. IV, f. 4 Nouvelle-Guinée.
nitidus Schaufuss, Ann. Soc. ent. Fr. 1882, p. 44. Nouvelle-Guinée.
9
TYRAPHUS
Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 489. — Raffray, Rev. d'Ent. 1890, pp. 438, 440; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 1900, p. 205.
Groupe 1.
pilosus Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 1891, p. 494 Toukin.
vestitus n. sp
Baeri Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 1891, p. 493 Manille.
Groupe II.
testaceus Schaufuss (Tychus), Psel. Siams, 1877,
p. 4 Siam.

proportionalis Schaufuss, Tijds. Ent. XXIX, 4886,
p. 263. — Raffray, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales,
1900, p. 206 Australie: Rockhampton.
Howitti King, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales, 4865,
p. 470. — Raffray, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales,
1900, p. 206 Australie: Melbourne, New South Wales.
Sharpi Raffray, Rev. d'Ent. 4887, p. 82, pl. 1, ff. 5, 6;
Proc. Linn. N. S. Wales; 1900, p. 206 Australie?. Brésil?.
1100. Emil. 1. 5. Wates, 1909. p. 200 Australia Breste
Groupe III.
planus Sharp. Trans. Ent Soc. Lond. 4874, p. 489.
Raffray, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 1900,
p. 206. West Australia.
•
brevis Sharp, loc. cit. 4874, p. 491 West Australia.
semiopacus Schaufuss (Tychus), Psel. Siams, p. 3 Siam.
major Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 491
Australie: Champion Bag.
rugicollis Raffray, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales,
1900, p. 207
Cwanna IV
Groupe IV.
sobrinus Schaufuss, Tijds. ent. XXIX, 4886, p. 262.
Raffray, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 1900, p. 207.
Australie : Adelaide.
umbilicaris Schaufuss, loc. cit. p. 261. — Raffray.
loc. cit. p. 207 Australie: New South Wales.

### MENTRAPHUS

14

Sharp, Wien. Ent. Zeit. 4883, p. 226.

pselaphoides Share, loc. cit. 1883, p. 226..... Mésopotamie.

## **PSILOCEPHALUS**

Raffray, Rev. Mag. Zool. 1877. p. 284; Rev. d'Ent. 1890. pp. 438, 440.

formicetorum Raffray, loc. cit. 4877, p. 284. pl. III, f. 7; Rev. d'Ent. 4887, p. 31. . . . . . Abyssinie : Enderta. Lewisi Raffr.. Rev. d'Ent. 4887, p. 31, pl. 1, f. 4. Arabie : Hedja.

### 15° Tribu Ctenistini.

#### TABLEAU DES GENRES

- 1. (9). Palpes maxillaires petits, de 2 à 3 articles.
- (3). Palpes maxillaires de 2 articles. Épistome nullement dilaté latéralement.
- 3. (4). Deuxième article des palpes assez mince, court, les deux derniers articles transversaux, ankylosés, formant un nœud circulaire qui est inséré obliquement sur le premier; (on ne peut voir le premier article, les palpes pourraient en avoir trois) (ex Casey)....... Gen. Biotus Casey.
- 5. (2 et 8). Palpes maxillaires de trois articles.
- 7. (6). Palpes plus allongés, grèles, premier article petit, 2º arqué, graduellement épaissi, 3º plus court, cylindrique, avec deux soies au sommet. Épistome non dilaté sur les côtés. Antennes longues, cylindriques... Gen. Anitra Casey.
- (1). Palpes maxillaires de quatre articles, le premier très petit, mais visible.
- 10. (35). Articles des palpes plus ou moins pénicillés.
- 41. (30). Articles des palpes 2, 3, 4 pénicillés.

- (12). Antennes longues, généralement grèles, toujours avec une massue tri ou quadriarticulée, parfois très grande.
- (25). Dernier article des palpes toujours transversal, jamais oblong.
- 45. (24). Dernier article des palpes, seulement, avec un appendice latéral, son angle apical interne étant arrondi, mutique.
- 16. (20). Dessous de la tête absolument simple. Corps allongé.
- 18. (47 et 49). Antennes sans massue bien marquée, à peine épaissies à l'extrémité, les trois ou au moins les deux derniers articles ♂, beaucoup plus longs et cylindriques, le 40° généralement sinué..... Gen. Ctenisomorphus Raffray.
- 20. (46). Dessous de la tête avec une carène transversale aboutissant, de chaque côté, au-dessous des yeux, mais assez loin d'eux, à un tubercule un peu conique. Antennes un peu variables, généralement ♂, avec une massue de quatre articles assez marquée, mais jamais aussi longue que les articles 3-7 pris ensemble. Corps plus court, plus épais... Gen. Sognorus Reitter.
- 21. (45 et 24). Dernier article des palpes plus ou moins transversal, avec un appendice latéral externe très long, l'angle apical interne finement marqué, pointu et muni d'une petite soie. Massue des antennes ♂, de quatre articles grands.
- (23). Dernier article des palpes assez grêle, transversalement fusiforme ou un peu triangulaire. Sous la tête une

	forte carène transversale émettant de chaque côté une épine souvent très longue, ténue, ou un tubercule très pointu Gen. Ctenisophus Raffray.
23.	(22). Dernier article des palpes épais, brièvement et transversalement plus ou moins triangulaire. Dessous de la tête avec une forte carène longitudinale séparant deux grandes fossettes palpaires; un canthus obtus derrière les yeux
24.	(21). Dernier article des palpes assez transversal, ayant seulement un appendice latéral externe très grand : l'angle apical externe est nul, oblique, mais le milieu du côté supérieur est fortement angulé avec une soie au sommet de cet angle. Dessous de la tête avec une faible carène transversale, mucronée de chaque côté. Gen. Ctenisodes Raffray.
25.	[14]. Dernier article des palpes jamais transversal, plus ou moins allongé, très acuminé au sommet, un peu renflé au milieu avec une soie au milieu externe.
26.	(29). Massue des antennes de quatre articles 5, très grande. Épine infra-oculaire très grande, parfois bifide, parfois remplacée par un tubercule aigu. Élytres bien plus longs que le prothorax.
27.	(28). Deuxième segment dorsal beaucoup plus grand que le premier Gen. Desimia Reitter
28.	
29.	(26), Massue des antennes bien moins grande, à peine visiblement de quatre articles. Épine infra-oculaire très aiguë. Élytres pas plus longs que le prothorax
30.	(11). Articles des palpes, 3 et 4 seulement, pénicillés, 2 mutique.
31.	[32]. Trochanters des pieds postérieurs courts, insertion de la cuisse latérale et peu éloignée de la hanche. Troisième article des palpes un peu oblique, plus long que large. I très transversal, plus ou moins fusiforme. Massue de antennes de quatre articles J. Forme assez épaisse
32.	(31). Trochanters des pieds postérieurs très longs, inser-

tion de la cuisse terminale et fort éloignée de la hanche.

22

Ann. Soc. Ent. Fr., LXXIII [1904].

- Troisième article des palpes variable, mais toujours transversal, globuleux ou subtriangulaire, 4° moins gros, fusiforme on ovoide, très transversal
- 33. (34). Massue des antennes de quatre articles comme celle des Ctenistes, Marge postérieure des élytres et premier segment dorsal simples...... Gen. Poroderus Sharp.
- (33). Antennes à articles lâches, ovoïdes, massue de trois articles. Marge postérieure des élytres fortement fasciculée à l'angle sutural. Premier segment dorsal creusé de chaque côté à la base, gibbeux et fortement fasciculé au milieu..... Gen. Epicaris Reitter.
- 35, (40). Aucun article des palpes ni pénicillé ni transversal.
- 36. (37). Deuxième article des palpes assez allongé, mince à la base, très fortement en massue à l'extrémité, 3° court, brièvement ovoïde, de la grosseur de la massue du précédent, 4° plus long que le premier, mince à la base, très fortement en massue à l'extrémité, avec le sommet un peu tronqué. Prothorax tuberculé. Élytres avec des côtes.....

Gen. Odontalgus Raffray.

37. (36). Deuxième article des palpes assez long, renflé à l'extrémité. 3e grand, plus ou moins ovoide, acuminé et pubescent au sommet, 4º plus petit, brièvement claviforme, inséré sur le côté interne et vers le mieu du 3°....... ..... Gen. Narcodes King.

# TABLEAUX, NOTES ET DESCRIPTIONS.

## Chenniopsis n. gen.

L'exemplaire unique sur lequel j'établis ce nouveau genre m'a été généreusement donné par mon maître et ami L. Fairmaire et provient des chasses de M. H. Perrier dans l'intérieur de Madagascar. Malheureusement les parties postérieures de la tête et antérieures du prothorax ont été écrasées et il m'est impossible de donner une description complète de ces organes. L'exemplaire, de ce fait, est devenu si fragile, que je n'ai pu détacher un des palpes pour en faire une préparation et être absolument certain qu'il y a quatre articles, le premier article sous le microscope étant invisible. S'il n'y avait que trois articles, le premier article basilaire qui sert d'insertion au palpe, sur le mando, manquerait, ainsi que cela se produit dans plusieurs genres de Psélaphides.

Statura Ctenistis, Corpus granulosum et setoso-squamosum, Caput antrorsum valde angustatum, tuberculo antennario maximo, transverso, bilobato, oculi magni, postice siti, genis antice et utringue marime angulatis, dilatatis, Palpi maxillares minuti, quadri-vel polius tri-articulatis, articulis 1 inconspicuo, 2 sat crasso, elongato, leviter incurro et apice crassiore, 3 ovato, 4 breviter ovato, acuminato. Antennae elongalae, graciles. Prothorax antrorsum multo plus quam postice attenuatus. Elytra subquadrata, basi biforeata, stria suturali dorsalique integra, Segmento dorsali primo sequentibus minore, ventralibus 2 et 3 magnis, aequalibus, 4 et 5 brevissimis. Pedes sat elongati et graciles, simplices.

Ce genre est évidemment voisin de Chennium et de Centrotoma, En tout cas il est très différent de l'un et de l'autre, par la forme des palpes qui se rapprochent bien plus de ceux d'un Chennium, mais avec un petit article globuleux entre le dernier et le précédent : les antennes sont grèles et allongées; le corps, plus court et plus trapu, est bien moins parallèle que chez un Chennium.

Chenniopsis madecassa n. sp. — Tota rufa, granosa et

breviter subsquamoso-setosa. Antennae elongatae, graciles, articulis, 1 magno, crasso, extus leviter rotundato, intus paulum sinuato, 2 quadrato-elongato, 3-6 latitudine sua fere triplo longioribus, 3 leviter obconico, sequentibus cylindricis, 7 vix dimidio longiore quam latiore, 8 et 9 quadratis, 10 multo majore, orato, 11 adhuc multo majore, orato. Prothorax, quamvis obtritus breviter sublyratus videatur, lateribus postice rotundatus et antice valde angustatus. Elytra quadrata, basi vix attenuata, bifoveata, stria dorsali integra, subrecta. Metasternum obsolete sulcatum. Pedes sat elongati, femoribus parum crassis, tibiis rectis ad apicem leviter incrassatis. - Long. 2 mill. - Fig. 98.



Fig. 98.

Madagascar.

# Tableau du genre Ctenistes

- A 2. Appendices des palpes longs, droits.
- B 2. Élytres un peu o, pas plus 2, longs que le prothorax.... Groupe 1.

B 1. Élytres presque deux fois o, notablement Q, plus	
longs que le prothorax.	
C 2. Articles 4-7 des antennes lenticulaires.	
D 4. Prothorax ayant à la base une fossette variable se	
prolongeant plus ou moins en sillon	Groupe II.
D 3. Prothorax entièrement sillonné	Groupe III.
D 2. Prothorax avec une fossette oblongue, sans sillon.	
	Groupe IV.
D 4. Fossette du prothorax indistincte	Groupe V.
C 4. Articles des antennes 4-7 légèrement transver-	
saux, presque carrés	Groupe VI.
A 4. Appendices des palpes très longs et recourbés	Groupe VII

Ctenistes palpalis Reichenbach. — Cette espèce qui, de même que Ct. Staundingeri Schauf., a la fossette médiane du prothorax en forme de sillon ne dépassant pas le millieu en avant, est remarquable par son prothorax qui porte des hachures longitudinales un peu obliques. Elle semble avoir une aire géographique très étendue. Le Ct. canaliculatus Reitt., du Caucase et de Turcomanie, dont je connais les deux sexes, lui est certainement identique : j'en possède une femelle de Smyrne provenant de la collection Reitter qu'il m'est impossible d'en séparer. M. de Peyerimhoff m'a communiqué une autre femelle de la Palestine méridionale, chez laquelle je ne puis constater aucune différence et enfin je possède un couple de Birmanie que j'ai reçu de M. Dhorn et qui me semble également identique aux exemplaires de Ct. palpalis que j'ai de France méridionale, Corse. Dalmatie, Roumanie et Tarsous. Le Ct. Staundingeri a les antennes beaucoup plus allongées et plus grèles.

**Ctenistes crassicornis** n. sp. — Elongatus, rufo-castaneus, albido-squamoso-setosus. Caput ovale, antice angustatum, tuberculo antennario cordiformi, sulcato, basi oblonge foreato, foreis duabus alteris rotundatis inter oculos. Palporum articulis, 2 mediocri, curvato et apice abrupte clarato, 3 magno, intus rotundato, 4 gracili, transversim fusiformi. Antennae crassae, haud multo elongatae, articulis 4-7 subquadratis, moniliformibus, 8-10 inter se subaequalibus, latitudine sua plus quam tripto longioribus, latitudine perparum crescentibus, 8 praecedente vix crassiore, 8 et 9 cylindricis, 10 apice acuminato. Prothorax conicus, laevis, latitudine sua longior, sulco longitudinali basali trientem haud superante. Elytra latitudine sua longiora, ad basin leviter attenuata, lateribus et humeris obliquis, istis leviter notatis, stria dor-

sali profunda, leviter incurva. Segmento dorsali primo sequente dimidio breviore. Metasternum concavum. Segmento ultimo ventrali medio profunde impresso et utrinque obtuse tuberculato. Pedes elongati, femoribus posticis crassioribus, tibiis rectis ad apicem perparum incrassatis S. — Long. 2 mill.

Birmanie.

Cette espèce dont je ne connais qu'un mâle a les antennes relativement courtes et épaisses, les articles 4-7 sont aussi longs que larges, au lieu d'être transversaux, les suivants sont, par contre, moins longs, et la massue se trouve beaucoup moins marquée. Elle ne pourrait être comparée qu'à Ct. Braunsi Raffr, de l'Afrique australe qui est plus parallèle surtout aux élytres, avec les derniers articles des antennes s'épaississant davantage. Les palpes sont aussi très différents : dans Ct. crassicornis, le 3º article est gros, tout à fait arrondi en dedans, avec le côté externe droit, dans Ct. Braunsi, il est en triangle très transversal et très acuminé en (dedans.

### Ctenisomimus n. gen.

Ce genre nouveau est représenté par une seule espèce, Ct. O'Neili, que j'avais décrite comme Soynorus, en émettant l'idée qu'elle formait une transition entre Ctenistes et Soynorus et diminuait la valeur de ce dernier genre. Je n'avais pas alors pris en considération la face inférieure de la tête qui, dans cette tribu, a une grande importance et qui fournit un excellent caractère pour différencier Sognorus de Ctenistes. Le nouveau genre a la face inférieure de la tête simple comme Ctenistes, et la même forme de corps allongée et parallèle, tandis que les antennes sont du même type que Soynorus, avec une massue de trois articles très peu accentuée.

# Tableau du genre Sognorus

A 2. Articles des antennes o toujours au moins aussi	
longs que larges, non moniliformes.	
B 3. Élytres à peine aussi longs que le prothorax, très	
triangulaires; antennes assez épaisses	Groupe 1.
B 2. Élytres un peu plus longs que le prothorax, mais	
toujours moins de 1 3 plus longs.	
C 2. Antennes assez courtes et épaisses, articles seule-	
ment un peu plus longs que larges	Groupe II.
C. I. Antennes longues, grêles, articles deux fois plus	•
lange and largue	Granne III

Groupe IV.
Groupe V.
Groupe V.
Groupe VI.
Groupe VII.
Groupe VIII.
Groupe IX.
Groupe I.
Groupe 1.
Groupe II.
Groupe II. Groupe III.
Groupe II.
Groupe II. Groupe III. Groupe IV.
Groupe II. Groupe III.
Groupe II. Groupe III. Groupe IV.
Groupe II. Groupe III. Groupe IV.

s'épaississant graduellement, 8 trois fois plus long que large. Tête assez courte, très brièvement ovale. fortement étranglée avant le tubercule antennaire. Prothorax convexe, même un peu gibbeux de chaque côté de la fossette médiane qui est légèrement sulciforme. Élytres assez convexes. Palpes à 3º article bien plus long que large, presque en triangle isocèle, 4º petit, transversalement ovoïde.

Q Antennes assez allongées, articles 3-7 un peu obconiques, égaux, de moitié plus longs que larges, 8 un peu plus étroit, transversal, 9 presque globuleux, 40 plus long que les deux précédents réunis, un peu obconique, beaucoup plus gros. 11 subcylindrique. obtus au sommet. - Long. 4,60 mill. validicornis n. sp.

(119 Antennes un peu moins longues et plus épaisses, articles

8-40 s'épaississant graduellement, 8 trois fois, 9 à peine deux fois, 40 largement deux fois. 11 plus de deux fois plus longs que larges, le dernier un peu épaissi et brusquement atténué au sommet. Tête plus étroite. à côtés un peu parallèles. Prothorax moins convexe, nullement gibbeux autour de la fossette médiane. Troisième article des palpes moins allongé, à peine plus long que sa plus grande largeur. - Fig. 99.

Q Antennes semblables, mais un peu plus courtes, articles 3-7 un peu moins longs, 8 fortement et 9 légèrement transversaux. 40 moins obconique, moins gros, 44 au contraire, proportionnellement beaucoup plus gros, ovoïde.



- Long. 4,60 mill..... Bowringi n. sp.

C<sup>1</sup> 1. Antennes, surtout la massue, notablement plus courtes. articles 8-40 presque de même épaisseur, cylindriques, 11 notablement plus épais et presque ovoide. Tête un peu triangulaire. Prothorax nullement gibbeux. Palpes plus grèles et plus petits, mais conformés comme chez Ct. validicornis. - Long. 1,40 mill. squamosus Raffray (1).

<sup>(1)</sup> Dans la description originale je n'avais sous les yeux que des femelles, el l'exemplaire que j'ai indiqué comme femelle est une variété ou pourrait être une autre espèce dont le mâle serait encore inconnu.

B¹ 4. Massue des antennes ♂, beaucoup plus courte et plus épaisse, très tranchée, articles, 8 un peu obconique, à

> peine plus long que large. 9 un peu plus étroit, presque transversal, 40 un peu plus gros et carré. 11 plus gros, presque du double plus long, ovoïde un peu allongé, obtus au sommet. Le 3e article des palpes est presque ovoïde, un peu triangulaire à la base et oblique. le 4º aussi long que lui, fusiforme et transversal. Tête assez large, un peu triangulaire avec des yeux énormes. Prothorax plus court que dans les espèces précédentes, presque transversal, nullement gibbeux. Élytres à peu près carrés. Espèce très distincte

Fig. 100.

par la massue des antennes plus courte et plus épaisse. — ♀ inconnue. — Long. 1.40 mill. — Fig. 100...

..... irregularis n. sp.

## Gen. Ctenicellus n. gen.

Ce nouveau genre est presque de tout point semblable à Ctenisophus et j'avais même attribué à ce dernier le Ct. laticollis qui, avec l'espèce nouvelle décrite plus loin, constitue ce nouveau genre.

Le dessous de la tête, qui présente des caractères intéressants dans cette tribu, est construit tout différemment. Chez Ctenisophus on voit en arrière de la gorge, non loin du cou, une forte carène transversale, bien limitée et obliquement tronquée de chaque côté, où elle est terminée par un angle aigu ou une épine plus ou moins longue. Dans Ctenicellus, la conformation est tout autre : il v a encore une carène transversale, mais moins accentuée et qui se prolonge, de chaque côté, en fort canthus arrondi; en arrière des veux,




Fig. 101. Tête de Ctenisophus vernalis vue en dessous.

une carène longitudinale mince, en lame de couteau, descend du menton et se réunit perpendiculairement à la carène transversale : de chaque côté de cette carène longitudinale, dans l'angle formé par l'intersection des deux carènes, la gorge est creusée en fossette ronde qui aide à

loger les palpes qui sont d'ailleurs bien plus épais et plus courts que dans Ctenisophus.

Ce nouveau genre diffère aussi de Enoptostomus Schaum, en ce que le 2º article des palpes est pénicillé, tandis qu'il est mutique dans Enoptostomus. Le dessous de la tête présente du reste, dans ces deux genres, beaucoup d'analogie: dans les deux il y a la carène longitudinale, mais dans Enoptostomus, la carène transversale fait défaut et, en tout cas, si on en pressent des vestiges, sous l'épaisse pubescence glanduleuse



Fig. 102.
Tête de Clenicellus major
vue en dessous.

qui garnit l'intersection de la gorge et du cou, il n'y a pas trace de son prolongement latéral en canthus en arrière des yeux.

Pour faire mieux comprendre les différences, je donne les figures du dessous de la tête de *Ctenisophus vernalis*, — Fig. 401, et de *Ctenicellus major*, — Fig. 402.

Ctenicellus major n. sp. - Elongatus, rufus, albido-squamosus. Caput triangulatim elongatum, fronte constrictum, tuberculo antennario leviter transverso, basi oblonge foreata et foreis duabus alteris rotundatis inter oculos maximos. Palpi crassi, articulis 2 brevi, crasso, apice ralde clarato, breviter sed distincte appendiculato, 3 magno, crasso, oblique et irregulariter orato, 4 crasso, transversim triangulari, angulo interno apicali acute et brevissime appendiculato, 3 et 4 extus longe appendiculatis. Antennae elongatae, articulis 1 subquadrato, 2 quadrato-elongato, 3.6 latitudine sua paulo longioribus et longitudine decrescentibus, 7 quadrato, sequentibus crassioribus et ad apicem latitudine leviter crescentibus, 8 fere triplo, 9 et 10 duplo latitudine sua longioribus, 8 et 9 cylindricis, 10 leviter obconico, 11 latitudine sua triplo longiore, subcylindrico, ad apicem teriter incrassato. obtuso. Prothorax leviter transversus, antice angustatus, ad medium lateribus rotundatus, dein ad basin leviter sinuose attenuatus, utrinque sulco laterali sinuato, parum profundo, disco obsolete trigibboso, forea media basali oblonga. Elytra latitudine sua longiora, basi leriter attenuata, lateribus leviter obliquis, basi biforeata, stria dorsali integra, subrecta. Abdomen elytris subaequale, segmento primo dorsali sequentibus paulo breviore. Metasternum profunde sulcatum. Pedes simplices. - Long. 2,10 mill.

Australie : Melbourne.

Cette espèce diffère de *C. laticollis*, par la taille bien plus grande, la forme plus allongée, mais surtout par les antennes bien plus longues, les articles de la massue tous beaucoup plus longs que larges.

# Tableau du genre Desimia

A	2.	Pubescence assez abondante, un peu squameuse,		
B	3.	Tète longue, étroite (sans les yeux), atténuée en		
		avant, assez convexe	Groupe	I.
В	2.	Tête à peine plus longue que large, assez rétrécie		
		en avant, assez convexe	Groupe	11.
В	1.	Tète un peu plus longue que large, peu rétrécie en		
		avant, entièrement concave en dessus	Groupe	III.
A	1.	Pubescence presque nulle	-	

Desimia caviceps n. sp. — Elongata, subparallela, parum conrexa. Caput latitudine sua longius, lateribus subparallelum, fronte abrupte incisum, tuberculo frontali subquadrato, transverso, medio sulcato, lateribus postice obliquo et subcarinato, vertice concavo, anterius sulco longitudinali lato et profundo, posterius foreis duabus, occipite transversim convexo, infra spina post-oculari brevissima, obtusa. Oculi permagni. Palpi minuti, graciles, articulis 2, 3, 4 oratis, 2 et 3 paulo crassioribus, 4 magis fusiformi, apice longe et maxime acuminato, istis tribus, extus, minute appendiculatis. Prothorax breviter ovatus, fovea media basali orata, angulis dense squamosis. Elytra latitudine sua multo longiora, ad basin vix attenuata, humeris notatis, stria suturali dorsalique profunda, basi lata. Abdomen elytris subaequale, postice attenuatum, segmento primo dorsali sequente dimidio longiore. Metasternum profunde sulcatum. Pedes elongati, femoribus parum crassis, tibiis anticis leviter medio incrassatis, posticis longis, rectis, gracilibus of. - Long. 2 mill.

Afrique australe : Reddesburg.

Cette espèce diffère de toutes les autres par sa forme bien plus allongée, plus plate; l'épine post-oculaire est à peine distincte.

# Tableau du genre Enoptostomus

1	4.	Massue des antennes grande, bien marquée, les ar-		
		ticles 8-40 croissant graduellement ou subégaux.	Groupe	1.
A	3.	Massue très tranchée, articles, 9 de moitié plus long		
		one 8, 40 carré	Groupe	11.

Enoptostomus crassicoruis n. sp. — Oblongus, rufo-castaneus, antennis pedibusque rufis, disperse albido-squamosus. Caput trapezoidale, anterius leviter attenuatum, deplanatum, fronte abrupte constrictum, tuberculo frontali mediocri, cordiformi, sulcato et basi minute foveato, vertice inter oculos foveis duabus. Palporum articulis 2 subangulato et apice multo crassiore, 3 oblique et irregulariter fusiformi, 4 paulo minore, et graciliore, transversim fusiformi, duobus altimis breviter appendiculatis. Oculi maximi. Antennae parum elongatae, sat crassae. Prothorar leviter transversus, antrorsum altenuatus, medio taleribus leriter rotundatus, dein ad basin subrectus, basi sulcis tribus brevibus. Elytra latitudine sua vix longiora, basi attenuata, lateribus obliquis, stria dorsali integra, subrecta. Abdomen elytris fere longius, segmento primo dorsali sequente fere dimidio breviore. Metasternum profunde sulcatum. Femoribus parum incrassatis, tibiis leviter ad avicem crassioribus et incurvis.

- 3 Antennarum articulis 1. 2 quadrato-elongatis, 3-7 moniliformibus, sat validis, sequentibus crassioribus, 8 subcylindrico, latitudine sua dimidio longiore, 9, 10 quadratis, 10 atlamen paululum majore, 11 multo majore, ovato, apice obtuso.
- Antennarum articulis 3-7 moniliformibus, 6 et 7 perparum longioribus, 8 et 9 leviter transversis, 10 multo majore, subconico-truncato, latitudine aequilongo, 11 magno, orato, obtuso. Elytra paululum breviora. — Long. 1,40-1,60 mill.

Sumatra : Palembang.

Cette espèce qui provient du même pays que Ctenisophus irregularis, pourrait être facilement confondue avec ce dernier auquel elle ressemble beaucoup, mais dont elle diffère profondément par ses caractères génériques.

# Tableau du genre Odontalgus

- A 2. Segments dorsaux de l'abdomen sans tubercules caréniformes; antennes variables, mais toujours assez grêles.
- B 2. Antennes longues, grêles, articles 3-7 plus longs que larges, allant en décroissant...... Groupe 1.

B 4. Antennes moins longues, plus épaisses, articles 4	- 7
carrés	Groupe II.
A 4. Segments dorsaux de l'abdomen avec 5 tubercu	les
caréniformes: autennes très épaisses, artic	les
2-10 transversaux	Groupe III.

**Odontalgus gracilis** n. sp. — Subovatus, parum crassus, castaneus, vel rufo-castaneus, parum nitidus, dense albido-squamosus, pedibus et antennis rufis, istarum articulis tribus ultimis infuscatis. Caput triangulatim elongatum, luberculo antennario mediocri, basi foveato, occipite transversim elevato, vertice abrupte declivi et bifoveato. Antennae elongatue, graciles, articulis 1 cylindrico, 2 ovato, 3-7 obconicis, longitudine decrescentibus, 3 latitudine sua duplo longiore, 8 minuto, valde transverso. Prothorax subconicus, valde cruciatim tuberculatus et trifoveatus. Elytra quadrata, basi leriter attenuata, carinis parum elevatis. Abdomen medio longitudinaliter carinatum, segmentis dorsalibus apice medio leriter mucronatis et brevissime fasciculatis. Metasternum totum profunde sulcatum, isto sulco pubescentia glandulosa obtecto. Pedes mediocres, femoribus parum incrassatis, tibiis leriter sinuatis.

- Antennarum articulis 3-7 paulo brevioribus, 9, 10, 11 crassioribus, clavam magnam formantibus, latitudine sua triplo longioribus, cylindricis, 11 ad apicem incrassato et summo rotundato. Metasternum multo profundius sulcatum, utrinque subgibbosum.
- 2 Antennarum articulis 3-7 paulo longioribus, 9, 10, 11 ovatis. 10 praecedente dimidio majore, 11 multo majore, duobus praecedentibus cunctis longiore, apice obtuso. Long. 4.20-4.30 mill.

Sumatra : Palembang.

Cette espèce diffère de Od. vestitus Schauf., par ses antennes beaucoup plus longues, la coloration plus terne et les côtes des élytres moins larges, moins saillantes; l'abdomen est caréné longitudinalement au milieu.

Odontalgus validus n. sp. — Crassus, piceo-vel rufo-castaneus, subopacus, sat dense squamosus. Caput fronte minus constrictum, tuberculo antennario mediocri, profunde sulcato et basi foveato, foveis duabus atteris inter oculos, occipite sat elevato, postice profunde sinuato. Antennae crassae, articulis 1 cylindrico, 2 quadrato-elongato, 3-7 subcylindricis, latitudine sua paulutum longioribus, 8 minore, leviter transverso, 9 subgloboso, 10 duplo majore, subgloboso, 11 magno, subcylindrico, latitudine sua plus quam duplo longiore, apice rotundato.

Prothorax irregulariter conicus, maxime cruciatim trituberculatus et quinque-foceatus. Elytra subquadrata, basi leviter attenuata et lateribus paulo rotundata, carinis latis, sat elevatis. Abdomen postice rotundatum, haud carinatum. Metasternum totum late sulcatum. Femoribus parum crassis, tibiis simplicibus, rectis \( \otimes\). — Long. 1,60-4.70 mill.

Sumatra: Palembang.

Bien que je ne connaisse de cette espèce que la femelle, je n'hésite pas à la considerer comme nouvelle. Elle est beaucoup plus grosse que les autres espèces du même pays, variant du châtain foncé au châtain roux, peu brillante et densément squameuse. Elle ressemble davantage à Od. vespertinus Raffr., d'Abyssinie, mais les antennes sont beaucoup plus épaisses.

### CATALOGUE.

#### CTENISTINI

RAFFRAY, Rev. d'Ent. 4890, pp. 440, 441; Trans. S. Afr. Phil. Soc. 4897, p. 100. — GANGLBAUER, Käf. Mittel. II, 4895, p. 845.

#### BIOTUS

CASEY, Bull. Calif. Ac. Sc. 1887, p. 456; Col. Not. V, p. 497.

formicarius Casey, Bull. Cal. Ac. Sc. 4887, p. 456.

— Brendell, Bull. Un. Iowa, I, 4890, p. 233, pl. VI.

1. 44.

Californie.

1

#### ATINES

Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. 1868, p. 127. — Casey, Col. Not. V, p. 497.

monilicornis Brendet. Proc. Ent. Soc. Phil. 1866, p. 190; Bull. Un. Iowa, I. p. 232, pl. VI, f. 45. — Casey, Col. Not. V, p. 498. — Raffray, Rev. d'Ent. 1890, pl. II, ff. 47, 47.

<b>brevicornis</b> Casey, Col. Not. V, 1893, p. 498
2
CHEXXIUM
CHEAMCM
Latreille, Gen. Crust. Insect. III, 4807, p. 77. — Aubé. Psel. Mon. 4833, p. 14; Ann. Soc. ent. Fr. 4844, p. 88. — Jacq. Duval., Gen. Col. Eur. I, p. 433. — Sauley, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz (Spec. I), p. 44. — Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 4884, pp. 450, 453. — Raffray, Rev. d'Ent. 4890, pp. 440, 442. — Ganglbauer, Kaf. Mitteleur. II, 1895, p. 845.
bituberculatum Latreille, Gen. Crust. Insect. HI.
4807, р. 77. — Агве́, Psel. Mon. 4833, р. 44, pl. 78.
f. 2; Ann. Soc. ent. Fr. 1844, p. 89. — Jacq. Duval.
Gen. Col. Eur. I, pl. 42, f. 208. — SAULEY, Spec. I.
p. 43. — Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 4881.
p. 456; Deuts. Ent. Zeits. 1887, p. 503. — GANGL-
BAUER, Kaf. Mitteleur. II. 1895, p. 503.
Larve Xambeu, Rev. d'Ent. 4889, p. 332; Ann.
Soc. Linn. Lyon. XXXIX, 1892, p. 61. — Gangl-
BAUER, Käf. Mittel. II, 4895, p. 846
France, Allemagne, Italie, Autriche, Espagne.
Paulinoi Refter, Deuts. Ent. Zeits. 4887, p. 503
Portugal : Guarda.
Eppelsheimi Reitter, loc. cit. p. 504 Italie: Modène.
Steigerwaldi Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 4881.
p. 456 Croatie.
Prometheus Sauley, Pet. nouv. ent. 4875, p. 39;
Verh. naturf. Ver. Brünn, XVI. 1878, p. 131, pl. 11,
1. 41. — Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881.
p. 456
antennatum Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881,
p. 456 Caspienne : Hamarat.
Kiesenwetteri Saulcy, Spec. I, p. 44. — Refter,
Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, p. 456 Salonique.
judaeum Sauley, loc. cit. p. 45. — Reitter, loc. cit.
p. 456 Jérusalem.

#### ANITRA

Casey, Col. Not. V. 1893, p. 499.

glaberula Casey, loc. cit. p. 500, pl. 1. ff. 45, 45a.....

Amér. septentrionale : Arizona.

1

#### CHENNIOPSIS

madecassa n. sp...... Madagascar : Suberbieville.

#### CENTROTOMA

Heyden, Stett. Ent. Zeits, 1849, p. 182. — Jaco. Duval. Gen. Col. Eur. I. p. 133. — Sauley, Spec. I. p. 46. — Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 4881, pp. 450, 453. — Raffray, Rev. d'Ent. 1890, p. 440, 142. — Ganglbauer, Käf. Mittel. II, 1895, p. 848.

Jucifuga Heyden, Stett. Ent. Zeits. 4849, p. 482. —
 Jacq. Duval, Gen. Col. Eur. I, pl. 43, f. 213. —
 Sauley, Sp. I, p. 48. — Reftter, Verh. z. b. Ges. Wien, 4884, p. 457. — Ganglbauer. Käf. Mittel. II, 4895, p. 848.

... Autriche. Allemagne. France orientale. Italie septentrionale.

Ludyi Reitter, Naturg, Ins. Deutschl, III, p. 20; Verh.

z. b. Ges. Wien. 1884, p. 63..... Tyrol méridional : Bozen.

penicillata Schaufuss, Sitzg. Ges. Isis, Dresd. 1863.

p. 23; Nunq. ot. II, p. 363. — SAULCY, Spec. I, p. 48.

—Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, p. 457; 1884.

p. 63. — Ganglbauer, Käf. Mittel. II. 4895, p. 848. France méridionale : Tarbes, Béziers, Pyrénées.

...... Portugal : Guarda. Espagne centrale. Syric.

rubra Sauley, Ann. Soc. ent. Fr. 1864, p. 258 (Syrie).

Brucki Sauley, Spec. 1, p. 50..... Salonique.

globulipatpus Schmidt, Beitr. Mon. Psel. p. 14,

pl. II, f. 10...... Inde : Calcutta.

prodiga Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 107.

Japon.

#### CTENISTES

REICHENBACH, Mon. Psel. 1816, p. 75. — AUBÉ, Psel. Mon. 1833, p. 47; Ann. Soc. ent. Fr. 4844, p. 96. — Jacq. Duyal, Gen. Col. Eur. J. p. 132. — Saulcy, Bull. Metz (Sp. 1), 4874, p. 55.

- Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, pp. 450, 453

Raffray, Rev. d'Ent. 1890, pp. 444, 142.
 Ganglbauer, Käf. Mittel. II, 1895, p. 849.

Dionyx Le Pelet. et Serv., Enc. Meth. Ins. X, 1825, p. 221.

# Groupe I.

andalusicus Sauley, Berl. Ent. Zeits. 4870 (Beih.).

p. 480; Spec. I, p. 62. — Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 484. p. 458. . . . . . . . Andalousie : Sierra de Cordoba.

deserticola Raffray, Rev. d'Ent. 4882, p. 9. pl. I.

zanzibaricus Raffray, Rev. d'Ent. 4887, p. 24... Zanzibar.

# Groupe II.

..... Europe méridionale et orientale. Syrie.

Dejeani Serville, Encycl. Méth. X. p. 221. — Aubé, Psel. Mon. 4833, p. 48, pl. 70, f. 2.

canaliculatus Reitter, Deuts. Ent. Zeits, 1887, p. 504. (Caucase, Turcomanie, Birmanie).

Standingeri Schaufuss, Sitzg. Ges. Isis. Dresd. 4861,
 p. 47; 4863, p. 115, pl. VIII, f. 1; Nunq. ot. I, p. 38.
 — Sauley, Bull. Metz (Sp. I', p. 59. — Reitter.
 Verh. z. b. Ges. Wien, 4881, p. 458... Andalousie. Tunisie sud.

23

# Groupe III.

William III
samenensis Raffray, Rev. Mag. Zool. 1877, p. 281.
pl. III. ff. 4. 9. 40 Abyssinie : Sémiène, Ayamié.
imitator Reitter, Deuts. Ent. Zeits. 1882, p. 479.
RAFFRAY, Trans. S. Afr. Phil. Soc. 4897, p. 104
Afr. occidentale : Addah, Natal : Salishury.
parviceps Raffray, Rev. d'Ent. 1887, p. 26
Arabie : La Hadj , Hedjaz.
opacus Schaufuss (Enoptostomus). Nunq. ot. III.
p. 511 Index orientales.
Groupe IV.
brevicornis Saulcy, Spec. I. p. 61. — Reitter, Verh.
z. b. Ges. Wien, 1881. p. 458 Algérie : Oran.
australis Raffray, Rev. d'Ent. 4887, p. 25; Trans.
S. Afr. Phil. Soc. 4897, p. 403
Le Cap : Stellenbosch, Uitenhage. Orange : Bothaville. Natal.
mitis Schaufuss, Tijds, Ent. XXV, p. 74; Notes Leyd.
Mus. IV. p. 454 Bornéo. Batavia. Sumatra nord et sud.
? oculatus Sharp. Trans. Soc. Ent. Lond. 4874,
р. 110
Groupe V.
Marthae Reitter, Deuts, Ent. Zeits, 1891, p. 49
Arménie : Araxe, Ordoubad.
Groupe VI.
Braunsi Raffray, Trans. S. Afr. Phil. Soc. 4898.
p. 406, pl. XVIII, f. 25 Le Cap: Port Elizabeth.
crassicornis n. sp
Groupe VII.
curvidens Raffray, Rev. d'Ent. 1882, p. 10 Abyssinie : Boyos.
Espèce douteuse.
mimeticus Sharp, Trans. Soc. Ent. Lond. 1883.
p. 295 Japon.
19

Ann. Soc. Ent. Fr., LXXIII [1904].

#### **CTENISOMORPHUS**

RAFFRAY,	Rev.	d'Ent	. 4890	, pp.	140.	142;
Ann.	Soc.	ent. F	r. 189	2. p.	497.	

major Raffray, Rev. Mag. Zool. 4877. p. 280. pl. III.	
f. 2 Abyssinie	: Samarh.
elaniticus Raffray, Bull. Soc. ent. Fr. 4903, p. 485.	
Palestine	: Akabah.
alternans Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 4892, p. 498,	
pl. X. f. 40	Sumatra.

#### CTENISOMIMUS

#### SOGNOBUS

REITTER, Verh. naturf. Ver. Brünn, XX, p. 202; Verh. z. b. Ges. Wien, 4881, p. 458. — RAFFRAY, Rev. d'Ent. 4890, pp. 141. 143; Trans. S. Afr. Phil. Soc. 4898, p. 404. — CASEY, Col. Not. V, 4893, p. 201. Pilopius CASEY, Col. Not. VH, 4897, p. 617.

## Groupe I.

**Oberthüri** Perez ap. Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien. 4881, p. 458... Espagne: Escorial. Portugal: Sierra d'Estrella.

## Groupe II.

consobrinus Leconte Bost Journ VI 1850 p 79

P. IV.
— Brendel, Bull. Un. Iowa, I, p. 236, pl. VI. f. 17.
Casey, Col. Not. VII. 4897, p. 619
Amér, septentrionale : Est du Mississipi,
calcaratus Baudi, Berl. Ent. Zeits. 4869, p. 405. —
Saulcy, Spec. I, p. 63. — Reitter, Verh. z. b. Ges.
Wien, 4881, p. 458

### Groupe III.

# Groupe IV.

Heydeni Reitter, Deuts. Ent. Zeits. 1870, p. 373 Amasia.
birmanus Schaufuss (Enoptostomus), Tijds. Ent.
XXIX, 4886, p. 276 Birmanie.
Groupe V.
Peyerimhoffi Raffray, Bull. Soc. ent. Fr. 4903.
p. 186 Palestine : Bosra & Edom.
Groupe VI.
lacustris Casey, Col. Not. VII, 1897, p. 649
Canada, Michigan, Indiana, Illinois, Iowa,
saginatus Casey, loc. cit. p. 620 Canada. Massachusetts.
georgianus Casey, loc. cit. p. 621. Amér, septentrionale : Géorgie.
piceus Leconte, Bost. Journ. VI, p. 79 Brendel.
Bull. Un. Iowa, I, p. 235, pl. VI, f. 18. — Casey, Col.
Not. VII. p. 619 Amér, septentrionale ; Est du Mississipi.
iowensis Casey, Col. Not. VII, p. 622. Amér. septentrionale: Iowa.
granicollis Casey, loc. cit. 4897. p. 622
Amér. septentrionale : New York.
floridanus Casey, loc. cit. p. 623. Amér. septentrionale: Floride.
Zimmermanni Leconte, Bost. Journ. VI. p. 79.
Brendel, Bull. Un. Iowa, I. p. 236. — Casey, Col.
Not. V. p. 501; loc. cit. VII. p. 619.
cinderella Casey, Col. Not. VII, 1897, p. 624 Texas.
impressipennis Casey, loc. cit. 1897. p. 624 Texas.
pulvereus Leconte, Ann. Lyc. V, p. 214. — Brendel,
Bull. Un. Iowa, I. p. 234, pl. VI. f. 16. — Casey, Col. Not. V, p. 501; loc. cit. VII, p. 619
Amér. septentrionale : Pensylvanie, Californie, Arizona?
ocularis Casey, Col. Not. V. 4893, p. 502
Amér. septentrionale : Arizona.
abruptus Casey, loc. cit. p. 502. Amér. septentrionale : Arizona.
Groupe VII.
gibbiventris Reitter, Verh, z. b. Ges. Wien, 4882,

p. 283..... Java : Balaria.

## Groupe VIII.

angustior Fairmaire (Centrophthalmus), Bull. Soc.	
ent. Fr. 1898, p. 337. — Raffray, Ann. Soc. ent.	
Fr. 4899. p. 519	Madagascar.
Groupe IX.	
Simoni Reitter, Deuts. Ent. Zeits. 4882, p. 479	
Afrique occiden	tale : Addah.

Espèces d'affinités douteuses.

 breviceps
 Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1883, p. 296.
 Japon.

 discedens
 Sharp, loc. cit. 4883, p. 296.
 Japon.

 25

#### CTEXISOPHUS

RAFFRAY, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 1900, p. 208.

## Groupe I.

Wales, 4863, p. 40. — Raffray, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1900, p. 242

## Groupe II.

morosus Raffray, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 1900, p. 209. Tasmanie, Australie: Port Augusta, Swan River, Melbourne.

patruelis Raffray, loc. cit. p. 240..... Australie: Swan River.

inaequalis Raffray, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales.

4900. p. 244..... Australie: Swan River.

papuanus Raffray, Ann. Mus. Nat. Hung. Budapest,

1903, p. 93...... Nouvelle-Guinée : Baie de l'Astrolabe.

parvus Sharp. Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 486.

..... Australie : Victoria.

Adelaidae Blackburn, Trans. R. Soc. S. Austr. 1889. p. 136
Simplex Sharp, Trans. Soc. Ent. Lond. 1874, p. 486.  Australia: Victoria.
Groupe III.
impressus Sharp, loc. cit. p. 485. — Baffray, Proc. Linn. N. S. Wales, 4900, p. 214 Australie : Melbourue.
Groupe IV.
tenebricosus Blackburn, loc. cit. 1889, p. 137  **Vustralie*: Port Lincoln.
Groupe V.
Bowringi n. sp
validicornis n. sp Sumatra : Palembang.
squamosus Raffray (Enoptostomus), Ann. Soc. ent. Fr. 1892, p. 499 Sumatra nord et sud.
irregularis n. sp
15
CTENICELLUS
laticollis Raffray, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 1900, p. 213, pl. X, f. 36
major n. sp Australie : Melbourne.
2
CTENISODES
Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 1896, p. 274.
laticeps Raferay, loc. cit. p. 275 Mexique.

#### DESIMIA

REITTER, Verh. naturf. Brünn, XX, p. 202; Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, p. 437. — RAFFRAY, Rev. d'Ent. 1890, pp. 89, 91.

Tetracis Sharp, Ent. Monthl. Mag. XI, p. 79.

### Groupe I.

Ghilianii Aubé, Ann. Soc. ent. Fr. 1844, p. 99. — Sauley (*Tmesiphorus*), Spec. I, p. 53. — Reitter,

Verh. z. b. Ges. Wien, 4881, p. 457. (Cadix) Espagne méridle :
integricollis Fairmaire, Ann. Soc. ent. Fr. 1858, p. 793, pl. XVI, f. 4. (Algérie).
complex Share, Ent. Monthl. Mag. XI, p. 79. Tanger.
Darius Sauley (Tmesiphorus', loc. cit. p. 54 Perse.
parvipalpis Raffray, Rev. Mag. Zool. 4873, p. 363.
pl. XV, f. 4; Rev. d'Ent. 1883, p. 233
gibbicollis Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 4899, p. 519
Sharpi Raffray, Rev. d'Ent. 1883, p. 233. pl. IV,
ff. 7, 8
abyssinica n. sp
Groupe II.
frontalis Raffray, Rev. d'Ent. 1887, p. 22 0
Zanguebar : Kilowa.
2 depilis Raffray, loc. cit. p. 24.
arabica Raffray, loc. cit. p. 23 Arabic: Hedjaz.
Groupe III.
caviceps n. sp Afrique australe : Reddeshurg.
Groupe IV.
subcalva Reitter, Deuts. Ent. Zeits. 1882, p. 180.
pl. VIII, f. 6
10
CTENISIS
Raffray, Rev. d'Ent. 1890, pp. 444, 443; Ann. Soc. ent. Fr. 1896, p. 271. — Casey, Col. Not. V, 1893, p. 503.
aequinoctialis Aubé, Ann. Soc. ent. Fr. 4844, p. 98.
Schaufuss, Berl. Ent. Zeits. 4887, p. 288. — Raf-
FRAY, Ann. Soc. ent. Fr. 1896, p. 273
dispar Sharp (Desimia, Biol. Centr. Amer. II (1),
1887, p. 2, pl. 1, f. 1 Mexique. Guatemala.
brevicollis Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 4896, p. 272.

amazonica Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 4896,
p. 272
Raffrayi Casey, Col. Not. V, 1893, p. 503 Mexique: Arizona.
dispar # Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 1896, p. 272.  — Brendel, Trans. Amer. Ent. Soc. XX, p. 282;
Ent. News, 1894, p. 159.
angustata Raffray, Ann. Soc. Ent. Fr. 1896, p. 274.
Amérique méridionale <sub>s</sub> ; Pampas.
nasuta Raffray, loc. cit. 1896, p. 273 Amazones.
6 LAPHIDIODERUS
Raffray, Rev. d'Ent. 1887, p. 20; Trans. S. Afr. Phil. Soc. 1897, p. 400.
capensis Raffray, Rev. d'Ent. 1887, p. 21, pl. 1,
ff. 2, 3; Trans. S. Afr. Ph. Soc. 4897, pp. 401, 402.
Le Cap : Cape Town
brevipennis Raffray, Trans. S. Afr. Phil. Soc. 1897, p. 102
2
ENOPTOSTOMUS
Schaum ap. Woll. Cat. Col. Can. 1864, p. 528, — Sauley.
Spec. I, p. 65. — Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, p. 459. — Raffray, Rev. d'Ent.
1890, pp. 141, 143.
Groupe 1.
Aubei Rosenhauer, Thier, Andal. 4856, p. 62. —
Sacley, loc. cit. p. 67 Andalousie. Portugal, Maroc. Algerie.
barbipalpis Fairm. Ann. Soc. ent. Fr. 1858, p. 792,
pl. XVI, f. 5. — Reitter. Verh. z. b. Ges. Wien.
1881, p. 459.
Godarti Sauley, Ann. Soc. ent. Fr. 1864, p. 258.  Desbrochersi Baffray, Pet. Nouv. ent. 4874, p. 460.
Algérie : Bouksoul.
Leprieuri, Saulcy, Pet. nouv. ent 1875, p. 539.
Wollastoni Schaum ap. Woll. Cat. Col. Can. 1864.
p. 529 Canaries.

om an marrian
globulicornis Motsch. Bull. Nat. Mosc. 4851, IV,
p. 481. — Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881,
p. 459 Grèce. Iles orientales de la Méditerranée
Asie Mineure, Perse, Syrie, Egypte, Algérie
ponticus Baudi, Berl. Ent. Zeits 1869, p. 406. — Sauley, Spec. I, p. 68.
/ ^ · · · ·
Groupe II.
Chobauti Gulleb. Bull. Soc. ent. Fr. 4897, p. 223.  Algérie: Ghardaïa.
Groupe III.
Doderoi Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 1884, p. 64 Sardaigne.
Judaeorum Reitter, loc. cit. p. 64 Syrie: Liban, Caiffa.
madagascariensis Raffray, Ann. Soc. ent. Fr.
1899, p. 520 Madagascar : Suberbieville, Betsiboka.
Perrieri Fairmaire (Ctenistes), Bull. Soc. ent. Fr. 4899, p, 345.
Groupe IV.
Abeillei Guilles. L'Échange, 4896, p. 48. Syrie : Liban, Caïffa.
nitidulus Raffray, Rev. d'Ent. 1887, p. 22 Arabie : Hedjaz.
crassicornis n. sp Sumatra : Palembang.
formicarius Raffray, Rev. Mag. Zool. 1877, p. 282,
pl. III, ff. 3, 15; Rev. d'Ent. 1887, p. 21
Abyssinie : Enderta, Hamacen, Géralta, M'-Aladjié.
alternans Raffray, Ann. S. Afr. Mus. II, 4901, p. 125. Rhodesia: Salisbury.
Espèces douteuses.
birmanus Schaufuss, Tijds. Ent. XXIX, p. 276 Birmanie.
clandestinus Schaufuss, loc. cit. p. 277 Amazones.
48
PORODERUS
Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1883, p. 294.

SHARP, Trans. Ent. Soc. Lond. 1883, p. 294.	
armatus Sharp, loc. cit. 1874, p. 411; 1883, p. 294.	Japon.
medius Sharp, loc. cit. 1874, p. 414	Јарон.

(482) Genera et catalogue des Psélaphides.	361
similis Sharp, loc. cit. 1874, p. 112	Japon.
siamensis Schaufuss (Enoptostomus), Nunq. et. III, p. 511; Ann. Mus. Civ. Gen. XVIII, 1882, p. 361.	Siam.
<b>Diarmatus</b> Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 1892, p. 498, pl. X, f. 19	matra nord.
Espèces douteuses.	
angusticeps Schaufuss (Enoptostomus), Berl. Ent. Zeits. 1887, p. 289	Ceylan.
javanus Schaufuss (Enoptostomus), Tijds. Ent. XXV, p. 73; Notes Leyd. Mus. IV, p. 453	Java.
7 EPICARIS	
Reitter, Verh. naturf. Ver. Brünn, XX, p. 184.	
RAFFRAY, Rev. d'Ent. 1890, p. 144.  Taphrophorus Schaufuss, Ann. Mus. Civ. Gen. 1882,	р. 350.

# ventralis Raffray, Rev. d'Ent. 1882, p. 8, pl. I, f. 8.

..... Abyssinie : Keren. Afrique occidentale : Dakkar.

Doriae Schaufuss, Ann. Mus. Civ. Gen. 1882, p. 351.

...... Abyssinie : Keren.

#### ODONTALGUS

RAFFRAY, Rev. Mag. Zool. 1877, p. 286; Rev. d'Ent. 1890, p. 141; Trans. S. Afr. Phil. Soc. 4897, p. 105.

P === , ===== = = = = = = = = = = = = =				
Groupe I.				
longicornis Raffray, Trans. S. Afr. Phil. Soc.				
1898, p. 414 Le Cap : Vitenhage, Rhodesia : Salisbury.				
gracilis n. sp				
validus n. sp				
tuberculatus Raffray, Rev. Mag. Zool. 1877, p. 287,				
pl. III, f. 5 Abyssinie : Semienė, Sloa, Keren.				
Groupe II.				
Raffrayi Reitter, Deuts. Ent. Zeits. 1882, p. 477,				
pl. VIII. f. 2 Afrique occidentale: Addah.				

palustris Raffray, Rev. d'Ent. 4887, p. 27...... Zanzibar.

Groupe III.

costatus Raffray, Trans. S. Afr. Phil. Soc. 4897,
p. 406, pl. XVII, f. 9. . . . . . . . Le Cap: Cape Town.

## 46° Tribu Tyrini.

#### TABLEAU DES GENRES

- 1. (4). Palpes maxillaires de 3 articles, le premier grand.

- 4. (1). Palpes de 4 articles, le premier très petit.
- 5. (80). Tarses à deux ongles égaux ou subégaux.
- 6. (79). Tête triangulaire ou plus ou moins trapézoïdale, plus ou moins atténuée en avant, avec un tubercule antennaire plus ou moins marqué et les antennes peu distantes à leur insertion.
- 7. (26). Palpes plus ou moins anormaux.
- (11). Troisième article des palpes très grand, longuement triangulaire ou ovoïde, 4º très petit, subulé, inséré au sommet du 3º.
- (10). Troisième article des palpes triangulaire, sans sillon, tronqué plus ou moins obliquement au sommet, 4º in-

séré	à l'angle	interne de l	la	troncature
				Gen. Centrophthalmus Schmidt

- 10. (9). Troisième article des palpes, ovoïde, acuminé à la base, longuement sillonné à la face supéro-interne, 4 inséré au sommet, un peu en dedans, et dans le sillon..... ..... Gen. Centrophthalmosis n. gen.
- 11. (8 et 45). Troisième article petit, plus ou moins brièvement triangulaire. 4° grand, oblong ou ovoïde, avec l'angle interne prolongé en pointe.
- 12. (13). Quatrième articles des palpes un peu en carré, plus ou moins long, tronqué au sommet. Corps simplement pubescent. Abdomen et élytres sans carènes, ceux-ci avec une strie suturale profonde... Gen. Acylopselaphus Raffray.
- 12 et 14. Quatrième article des palpes très grand, arrondi, 2º avec un appendice sétiforme allongé. Pubescence simple. Élytres convexes, sans strie, même suturale...... ..... Gen. Zeatyrus Sharp.
- 14. (13). Quatrième article des palpes ovoïde, creusé en dessus d'une large fossette. Pubescence très courte, ràpeuse. Élytres et abdomen avec des carènes. Articles 2 et 3 des palpes avec un très petit appendice sétiforme..... ..... Gen. Ctenotillus Raffray.
- 11 et 16). Palpes très grands: tous les articles très irrégu-15 liers, se repliant les uns sur les autres. 2º grand, sécuriforme, avec deux appendices sétiformes, l'un à l'angle inférieur, l'autre au milieu, 3º inséré a l'angle supérieur du précédent, pyriforme à la base, avec l'extrémité très longuement prolongée en appendice sétiforme. 4º replié sur le 2°, très fortement subulé au sommet et acuminé, angulé en dessous au milieu et longuement appendiculé. Cardo des mâchoires muni, à l'angle basal externe d'une très longue épine..... Gen. Leanymus Raffray.
- 16. [45 et 49]. Troisième article des palpes très fortement et 4: plus ou moins transversaux, sans appendices.
- 17. (18). Troisième et 4º articles des palpes très transversaux. presque foliacés, comme une massue de Scarabéide. Pas d'épine infra-oculaire..... Gen. Geophyllus Leconte.
- 18, 47). Troisième article des palpes très transversal. 4º plus

- 20. (19 et 21). Palpes non pénicillés, articles, 2 simple, 3 triangulaire, avec l'angle externe apical obtusément prolongé.
  4 plus ou moins arrondi en dehors, avec l'angle apical interne prolongé et pointu; cet article est paríois contourné.
  Gen Sintectodes Reitter.
- 22. (21 et 23). Articles des palpes 2, 3, 4 très longuement appendiculés et pénicillés, 3 et 4 bien plus longs que larges,
  4 presque fusiforme, très acuminé au sommet, appendice inséré vers le milieu externe...... Gen. Raphitreus Sharp.

- 26, (7 et 73). Palpes absolument simples, grands, sans aucun

- appendice ni déformation, d'ailleurs variables de forme, & article toujours ovoïde, subglobuleux ou cylindrique, pointu, obtus ou plus ou moins tronqué à l'extrémité, avec ou sans sillon au côté interne, mais jamais longuement subulé au somme!
- (32). Trochanters antérieurs très longs, en massue, avec l'insertion des cuisses tout à fait terminale.
- (28). Palpes beaucoup plus grèles, médiocrement longs, articles 2 et 3 graduellement épaissis vers le sommet. 3 plus ou moins allongé.

- 32. (27). Trochanters antérieurs beaucoup plus courts, pas en massue, avec l'insertion des cuisses latérale, très oblique, sans cependant toucher la hanche.
- 33. (50). Troisième article des palpes plus ou moins allongé, toujours plus long que large, grêle ou plus ou moins pédonculé à la base, et plus ou moins épaissi au sommet.
- 34. (39°. Quatrième article des palpes allongé ou ovale ou fusiforme, toujours pointu au sommet, avec l'appendice terminal dans l'axe longitudinal de l'article.
- 35. (36). Palpes longs, 4c article allongé, grèle, très fusiforme et très fortement acuminé au sommet, 3c un peu
  moins long, graduellement et assez faiblement en massue.
  Tête plus longue que large. Prothorax gibbeux, la fossette
  médiane petite, les latérales peu visibles en dessus......
  Gen. Ancystrocerus Raffray.

Obs. — Ici se placerait probablement le genre *Palimbolus* Raffr.. dont je ne connais pas le type (*Tyrus mirandus* Sharp , et qui, d'après une étude plus approfondie, me semble devoir être identique à *Didymoprora*.

- 40. (39 et 41). Palpes presque aussi longs que les antennes, 4º article très mince dans sa première moitié basale, en massue à l'extrémité (cette massue fendue comme chez Pselaphus), 3º au moins aussi long que le dernier, sa base très mince, son extrémité très fortement en massue, 2º conforme pareillement, un peu plus long. Corps allongé, rétréci antérieurement. Tête ovale, avec un tubercule an-

- 41. (40 et 49). Quatrième article des palpes portant extérieurement, à son sommet, une troncature plus ou moins petite, oblique, dans laquelle est inséré l'appendice terminal qui est ainsi dirigé obliquement en dehors.
- (48). Premier segment dorsal beaucoup plus grand que les suivants.
- 43. (46). Élytres beaucoup plus longs que larges.

..... Gen. Neotyrus Raffray.

45. [44]. Premier segment dorsal sculement un peu plus grand que le suivant. Tête longue, mais non ou à peine rétrécie en avant. Prothorax avec trois fossettes libres. Palpes grands, articles 2 et 3 régulièrement en massue, 4 longuement ovoïde ou brièvement fusiforme, toujours brièvement, mais fortement pédonculé à la base......

...... Gen. Tyropsis Sauley.

46. (43 et 47). Élytres carrés Ç, un peu plus longs que larges J. Yeux situés au milieu des côtés. Tête assez courte, brusquement et profondément étranglée avant le tubercule antennaire, qui est très marqué, petit et transversal. Premier segment dorsal presque aussi grand que les suivants réunis qui sont très visibles. Deuxième et 3° articles des palpes régulièrement en massue, minces à leur base. 4° longuement ovalaire, assez brièvement pédonculé

- 47. (46). Élytres nettement transversaux σ et φ. Tête pas rétrécie en avant, tubercule antennaire aussi large qu'elle et peu marqué. Yeux situés près des tempes postérieures. Le reste comme le genre précédent..... Gen. Durbos Sharp.
- 48. (42). Premier segment dorsal pas plus grand que les suivants. Palpes très longs, assez grèles, articles 2 et 3 régulièrement en massue, 4 fusiforme, tous plus ou moins pédonculés à leur base, troncature oblique terminale du 4° article très petite. Forme du corps assez régulièrement ovale. Élytres très longs, épaules à peine marquées. Abdomen très déclive. Prothorax avec trois fossettes libres dont la médiane très petite.................. Gen. Gerallus Sharp.
- 49. (41). Palpes plus courts et plus épais, 4° article ovoïde sillonné en dedans, troncature terminale plus grande, 2° et 3° très fortement en massue, tous très brièvement, mais fortement pédonculés à leur base. Forme du corps atténuée en avant, élargie en arrière. Élytres moins longs, à épaules bien marquées. Abdomen un peu plus court que les élytres. Prothorax avec un très fort sillon transversal, unissant deux fossettes latérales. Gen. **Hamotulus** Schaufuss.
- 50. (33 et 53). Troisième article des palpes à peine plus long que large, nullement aminci ni pédonculé à la base, plus ou moins ovoïde ou triangulaire, toujours plus ou moins dilaté en dedans. 4º ovoïde, tronqué plus ou moins obliquement à la base et au sommet.
- 51. (52). Troisième article des palpes ovoïde, notablement plus long que large, légèrement renflé, en dedans, au milieu. 4° assez brièvement et très obliquement tronqué à la base, un peu caréné longitudinalement à sa face supérieure, portant au sommet, à l'extérieur, une large troncature oblique à pourtour caréné, avec son angle interne légèrement prolongé en une dent comprimée et en dessous, une autre dent très comprimée.................... Gen. Abascantus Schaufuss.
- 52. (51). Troisième article des palpes assez variable de longueur, mais toujours un peu plus long que large, très obliquement tronqué à la base et au sommet, un peu élargi

- au milieu au côté interne, & gros, ovoïde, simple, fortement et obliquement tronqué à la base et au sommet..... Gen. Tyromorphus Raffray.
- 53. (50 et 56). Troisième article des palpes subglobuleux, très légèrement triangulaire, aussi long que large. & légèrement tronqué à la base, obtus ou acuminé au sommet, plus ou moins sillonné.
- 54. (55). Quatrième article des palpes gros, très acuminé au sommet, presque conique, avec un sillon très fin, à peine visible. Corps ovale allongé. Prothorax avec trois fossettes libres, dont les latérales sont peu visibles en dessus.....

  Gen. Taphrostethus Schaufuss.
- 55. (54). Quatrième article des palpes ovoïde, obtus, arrondi au sommet, avec un fort sillon. Corps élargi en arrière, atténué en avant. Prothorax avec trois fossettes, dont la médiane très petite, reliées par un sillon transversal.....

  Gen. Aploderina n. gen.
- 56. (53). Troisième article des palpes très court, nettement triangulaire, tronqué au sommet et à la base, 4° variable, généralement gros, toujours largement tronqué à la base, avec ou sans sillon longitudinal.
- (60). Quatrième article des palpes sans sillon longitudinal à la face interne. Prothorax avec trois fossettes et un sillon transversal.
- 58. [39]. Premier article des palpes très petit, presque invisible, 2º grand, allongé, un peu arqué, légèrement renflé un peu avant le sommet qui est légèrement atténué, 3º très court, triangulaire, 4º très gros et très grand, largement et carrément tronqué à la base, presque conique et très pointu au sommet. Premier segment dorsal presque du double plus grand que le suivant.... Gen. Horniella Raffray.
- (57). Quatrième article des palpes toujours plus on moins sillonné en dedans.

- 61. (62). Premier segment dorsal beaucoup plus grand que les autres, seul faiblement rebordé. Dernier article des palpes médiocre, ovale, obtus au sommet, sillonné seulement dans sa moitié terminale...... Gen. Apharus Reitter. 62. (61 et 63). Premier segment dorsal beaucoup plus grand que les autres, étroitement rebordé, les suivants très courts et très étroitement rebordés. Quatrième article des palpes long, cylindrique, pointu à l'extrémité, entièrement sillonné..... Gen. Cercoceropsis n. gen. 63. (62). Abdomen entièrement et largement rebordé. 64. (71). Quatrième article des palpes variable, mais toujours plus ou moins ovoide, pointu ou obtus au sommet. 65. (66). Massue des antennes formée d'un seul article, le dernier très gros...... Gen. Cercocerus Leconte. 66. (65). Massue des antennes toujours formée de trois articles. 67. (70). Forme assez allongée. Prothorax plus long que large. Trois premiers segments dorsaux subégaux ou diminuant de longueur du premier au troisième.. Gen. Hamotus Aubé. 68. (69). Prothorax avec trois grandes fossettes libres...... ...... Subg. Hamotus s. str. 69. (68). Prothorax avec un sillon transversal reliant les fossettes, dont la médiane est variable et fait parfois défaut. ..... Sub. Hamotoides Schaufuss. 70, (67), Forme courte, large, aplatic. Prothorax transverse avec un sillon transversal. Segments dorsaux augmentant légèrement du premier au troisième. Massue des antennes triarticulée, très grande et très tranchée..... ..... Gen. Phamisulus Reitter. 74. (64 et 72). Quatrième article des palpes subglobuleux ou très brièvement ovalaire, très arrondi au sommet en dehors et rectiligne en dedans, finement mais entièrement sillonné en dedans. Prothorax avec trois fossettes spongieuses, reliées par un sillon transversal. Massue des antennes triarticulée, mais courte. Segments dorsaux égaux......
- 72. (71). Quatrième article des palpes très long, cylindrique, presque filiforme, entièrement sillonné en dedans. Trois fossettes spongieuses libres au prothorax. Massue des an

..... Gen. Pseudohamotus Raffray.

- tennes triarticulée, médiocre. Premier segment dorsal un peu plus grand que les suivants. Gen, Cercoceroides Raffray.
- 73. (26 et 76). Quatrième article des palpes long, gros à la base. longuement subulé à partir du milieu.
- 74. (75). Quatrième article des palpes sillonné au côté interne. obtusément acuminé au sommet, 3° triangulaire, à peine plus long que large. Prothorax avec trois grandes fossettes spongieuses libres. Segments dorsaux subégaux. Corps assez fortement atténué en avant, élargi en arrière...... ..... Gen. Cercocerulus n. gen.

75. (74). Quatrième article des palpes absolument sans sillon au côté interne, très fortement subulé du milieu à l'extrémité qui est mince, mais cependant très légèrement renflée, avec une très petite troncature terminale plus ou moins oblique, 3º beaucoup plus long que large, ovoïde ou plus ou moins triangulaire, fortement pédonculé à la base. Prothorax sans fossettes ni sillons. Tête généralement armée 3. Premier segment dorsal plus grand que les suivants....

..... Rytus King.

- 76. (73. Palpes petits et courts.
- 77. (78). Deuxième article des palpes légèrement arqué, épaissi vers l'extrémité, 3º globuleux, petit, 4º aussi long que les deux précédents réunis, ovoïde, acuminé, Trochanters intermédiaires relativement courts, bien que l'insertion de la cuisse soit encore nettement terminale et lointaine de la hanche, mais oblique. Corps assez court, épais, convexe, très atténué en avant. Tête conformée comme celle des Tuchus. Prothorax avec trois petites fossettes relices par un sillon transversal. Premier segment dorsal un peu plus grand ..... Gen. Pseudotychus Raffray.
- 78. (77). Deuxième article des palpes, épaissi à l'extrémité, 3° et 4° tout à fait petits, le dernier acuminé d'un côté du sommet. Tête courte, avec un tubercule frontal portant l'insertion de l'antenne en avant. Trochanters intermédiaires allongés. Trois premiers segments dorsaux subégaux, leur marge latérale très large; les segments ventraux apparaissent en dessus et en dehors, ce qui fait paraître la bordure marginale double (ex Sharp).....

- 80. (5). Deux ongles aux tarses.
- 81. (82). Palpes courts, assez grêles, 2° article très arqué, graduellement et faiblement épaissi au sommet. 3° obconique, un peu plus long que large, 4° à peine aussi long que le second, très fortement atténué et aciculé vers le sommet. Yeux situés tout à fait en avant, sur une proéminence des joues séparée de la tête par un sillon. Élytres relativement courts. Abdomen très grand......

..... Gen. Pseudophanias Raffray.

## TABLEAUX, NOTES ET DESCRIPTIONS.

# Tableau du genre Centrophthalmus avec les espèces nouvelles.

- A 2. Tête avec trois fossettes seulement.
- B 2. Au moins une épine ou un tubercule post-oculaires; antennes toujours avec une massue bien marquée.
- C 2. Une seule épine post-oculaire.
- D 2. Épine post-oculaire bien marquée, plus ou moins acérée.
- E 2. Carinules du premier segment dorsal ne dépassant pas, au plus, les deux tiers de la longueur du segment.

F 2. Carinules du premier segment dorsal renfermant
un peu plus de la moitié de la largeur du segment ; articles des antennes généralement oblongs ou
tout au moins carrés, jamais moniliformes.
G 2. Dernier article des antennes simple 3.
H 3. Articles 8-10 des antennes pas plus longs que larges
♂ et ♀ Groupe II.
II 2. Articles 8-9 plus longs que larges, 40 a peu près
carré Groupe III.
H 4. Articles 8-10 tous plus longs que larges Groupe IV.
Espèces grandes, châtain-rougeâtre ou roussâtre,
I 2. Épais, châtain-rougeâtre foncé, pubescence brune, fine,
très longue. Articles des antennes 3-7 obconiques, 8 deux
fois 1.2. 9 et 10 deux fois plus longs que larges. 10 ob-
conique. 11 une fois 1 2 sculement plus long que 10, un peu plus gros et obliquement atténué au sommet qui
est obtus. Deuxième segment dorsal très peu plus grand
que le premier. Trochanters intermédiaires armés d'une
très forte épine; métasternum concave J. Articles 8 et 9
deux fois et 40 à peine plus longs que larges : métaster-
num convexe Q. — Long, 2,60 mill guinacensis n. sp.
1 1. Plus allongé, plus plat, châtain-roux, assez clair, pubes-
cence fauve, plus forte et plus courte. Articles des an- tennes 3-7 cylindriques, 8 deux fois 12, 9 et 40 deux
fois plus longs que larges, H très grand, plus long que
les deux précédents réunis, renflé vers l'extrémité où il
est obliquement atténué, et moins obtus au sommet.
Deuxième segment dorsal double du précédent; trochan-
ters simples; métasternum simplement sillonné ♂. —
Articles des antennes 8 et 9 un peu moins longs, 40 à peine plus long que large ♀. — Long. 2-2,20 mill
abyssinicus n. sp.
6 1. Dernier article des antennes plus ou moins pédonculé
ou comprimé à la base Groupe V.
F 4. Carinules abdominales ne renfermant pas plus de la moi-
tié de la largeur des segments Groupe VI.
h 2. Articles 3-7 des antennes carrés, 8-10 plus longs que
larges mais diminuant progressivement un peu de Ion-

gueur. Carinules abdominales un peu divergentes sur le 2º segment dorsal et dépassant un peu la moitié de sa longueur. Articles des antennes 8 pas plus de deux fois. 9 à peine deux fois, 10 pas même une fois 1 2 plus longs que larges, 41 plus régulièrement ovoïde, à peine atténué à la base et moins renflé vers le sommet qui est arrondi, avec les côtés rectilignes, oblique vers l'extrémité. Trochanters intermédiaires fortement noueux à l'extrémité, près de l'insertion de la cuisse. Châtain-foncé-rougeàtre, antennes et pieds plus clairs, pubescence fauve.

- Long. 2.30 mill..... birmanus n. sp.

- h 1. Articles des antennes 3-7 carrés, 8 et 9 de moitié seulement plus longs que larges, 40 carré.
- i 2. Troisième article des palpes largement triangulaire, le côté qui forme la troncature supérieure presque aussi long que le côté interne. Carinules abdominales renfermant à peine la moitié de largeur des segments. Antennes épaisses, fortes, dernier article régulièrement ovalaire. Tête aussi large que longue, entre le front et l'occiput (sans le tubercule antennaire), un peu trapézoïdale. Prothorax assez convexe, pas plus long que large, largement arrondi sur les côtés au milieu. Elytres pas plus longs que larges. Forme un peu épaisse, châtain-roux, élytres, antennes et pieds plus clairs, longue pubescence jaune.
  - ♀ Antennes un peu plus courtes, surtout les articles 8 et 9. Long. 4.70 mill...... sinensis n. sp.
- i 1. Troisième article des palpes en triangle étroit, beaucoup plus long que large. Carinules abdominales renfermant amplement la moitié de la longueur des segments; 2º segment dorsal d'un tiers à peine plus grand que le premier.
- j 2. Prothorax presque en hexagone, un peu plus rétréci en avant, anguleux et arrondi au milieu, plus long que large. Antennes assez épaisses, fortes, dernier article assez brièvement ovoïde, un peu plus gros et très arrondi au sommet. Tête plus courte, plus arrondie sur les côtés. Élytres notablement plus longs que larges, assez fortement atténués à la base. Châtain, antennes et

pieds roux, pubescence brunatre, assez longue. -Long, 2.20 mill..... papuanus n. spec.

1. Prothorax très cordiforme, sa plus grande largeur tout à fait en avant et, de là à la base, à côtés rectilignes. Antennes un peu plus grêles, dernier article semblable. Tête un peu plus longue, nettement triangulaire, côtés rectilignes, obliques. Élytres un peu plus longs que larges, à peine rétrécis en avant et presque carrés. Châtain-clair, pubescence jaunâtre. — Long. 2,10 mill.

..... angustipalpus n. sp.

E 4. Carinules abdominales aussi longues que les deux segments dorsaux et atteignant la marge postérieure du second..... Groupe VII.

Carinules abdominales du premier segment dorsal très divergentes, renfermant, à la base, 1/3 seulement et, à la marge postérieure, plus de la moitié de la largeur ; celles du 2º segment parallèles, renfermant plus de la moitié de la largeur. Corps avec des tubercules sétifères, moins serrés sur les élytres. Tête plus longue que large, fortement triangulaire, très étroite au front; 3e article des palpes largement triangulaire, à côtés rectilignes, angle apical externe très marqué, troncature très oblique. Antennes très robustes, articles 3-7 à peu près carrés, augmentant très légèrement de longueur, 8 et 9 un peu ovoïdes. 8 à peine deux fois, 9 au moins deux fois et 1,2 plus longs que larges, 10 un peu obconique, plus gros au sommet que les précédents et un peu plus long que large, 11 grand, presque aussi long que les deux précédents réunis, fortement épaissi et obtus au sommet. Prothorax plus long que large, un peu ovoïde, anguleusement arrondi vers le milieu. Élytres pas beaucoup plus longs que larges, un peu atténués vers la base, les côtés obliques. Deuxième segment dorsal à peine 4/3 plus grand que le premier. Châtain-rougeâtre foncé, pubescence forte, hérissée, brunâtre. - Long. 2,70 mill....

..... bicarinatus n. sp.

D 1. Épine post-oculaire courte, parfois réduite à un tubercule pointu. Carinules abdominales renfermant plus de la moitié de la largeur des segments . . . . . Groupe VIII.

(, 1	yeux. Carinules abdominales renfermant un peu plus de 1 3 de la largeur et dépassant la moitié		
	du 2º segment	Groupe	IX.
В 4	. Tête absolument dépourvue de tubercule ou d'é-		
	nine derrière les veux plate et simple Antennes		

pine derrière les yeux, plate et simple. Antennes sans massue, les articles intermédiaires plus gros que les derniers (forme un peu anormale)...... Groupe X.

Obs. — Ce groupe ne comprend qu'une espèce *C. paria* Schmidt, que je ne connais pas. La 4º fossette de l'occiput doit être très petite, à en juger par la figure de Schmidt et je ne serais pas surpris qu'elle ne fût qu'accidentelle; on apercoit parfois, sous un certain jour, une très légère dépression médiane qui n'est pas une fossette. L'espèce n'en est pas moins très distincte de toutes les autres par le 8º article des antennes qui est au moins deux fois plus long que le 9º.

## Centrophthalmosis n. gen.

J'ai déjà indiqué (Rev. d'Ent. 1882, p. 47), les caractères tirés des



Fig. 103.

palpes, communs à certaines espèces de *Centro-phthalmus*, que je considérais alors comme formant un groupe à part dans ce genre, dont elles ne diffèrent, du reste, par aucun autre caractère : je crois cependant nécessaire de créer pour elles une coupe générique distincte.

Aux caractères indiqués déjà dans le tableau, on peut ajouter que le 3º article est plus grand, sa face inférieure et le bord externe supérieur sont convexes, granuleux, la face interne supérieure qui est très largement creusée est lisse et ses bords sont crénelés. — Fig. 103.

Centrophthalmosis inexpectus n. sp. — Antennes épaisses, articles, 4 cylindrique, 2 cylindrique un peu plus long que large. 4-7 transversaux, 8-10 un peu transversaux, 14 ovoïde, tronqué à la base, arrondi au sommet. Forme générale allongée et parallèle. Tête assez large, peu rétrécie en avant, tubercule antennaire rugueux, non sillonné, mais fovéolé à la base. Prothorax aussi large que long, ovoïde. Élytres carrés. Abdomen long, 2° segment dorsal plus du

double du premier, carinules renfermant au moins la moitié de la largeur et atteignant la moitié de la longueur du 2° segment. Épine infraoculaire réduite à un tubercule pointu. Entièrement châtain-rougeâtre clair, \$. — Long. 4,80 mill.

Afrique occidentale : Côte de l'Or.

**Centrophthalmosis sulcatus** n. sp. — Antennes épaisses, articles, 1 un peu plus court, 2 carré, 3 un peu transversal, 4-7 transversaux, 8-40 un peu transversaux, 41 presque globuleux. Tête plus arrondie et plus rétrécie en avant, tubercule autennaire lisse, profondément et longuement sillonné. Prothorax plus long que large, un peu cordiforme. Élytres carrés. Abdomen moins long, 2º segment moins du double plus long que le précédent, carinules semblables, très fortes. Entièrement roux, ♀. — Long, 1,50 mill.

Abyssinie : Enderta.

Centrophthalmosis Reitteri n. sp. — Châtain-rouge, élytres plus clairs. Tête très allongée, mais assez fortement triangulaire; antennes très épaisses, articles, 4 brièvement conique, 2 carré, 3 obconique, 4-7 transversaux, 8-10 un peu plus longs que larges ♂, carrés ♀, 41 ovoïde un peu acuminé. Prothorax à peine plus long que large, légèrement cordiforme. Élytres un peu plus longs que larges, très légèrement atténués vers la base. Abdomen long, 2º segment dorsal plus de deux fois plus long que le premier, carinules renfermant plus de la moitié de la largeur et atteignant le milieu du 2º segment. — Long. 2.20 mill.

Abyssinie.

## Tableau du genre Tmesiphorus

A 6 Abdomen portant dans toute sa longueur une très

. To. Andomen portains dans tout sa longuetti, tim tres	
forte et très épaisse carène médiane; un tuber-	
,	
cule de chaque côté sur le premier segment	
Assemb	Commo
dorsal	caroupe 1.
A 5. Trois carènes sur les trois premiers segments dor-	
. To. Tree curents sur its trees premiers segments dor	
saux	Groupe II.
A 4. Trois carenes lines, entières, sur les deux premiers	
comments deponds	Campa III
segments dorsaux	Groupe III.
A 3. Une carène médiane fine, entière, sur les trois	
premiers segments dorsaux et, sur le premier.	
	(1 11'
de chaque côté, une carène raccourcie	Groupe IV.

1 9 Un tubercule caréniforme à l'extremité des trois

A 2. On tubercule carefulorine a rextremite des trois	
premiers segments dorsaux, une carène latérale	
obtuse sur les deux premiers	Groupe V.
A 1. Deux carènes latérales, pas de médiane sur les	
segments dorsaux.	
B 5. Carènes latérales entières sur les trois premiers	
segments dorsaux	Groupe VI.
B 4. Carènes latérales entières sur les deux premiers	
segments dorsaux	Groupe VII
B 3. Carènes latérales entières sur le premier segment	1
dorsal, plus ou moins raccourcies sur le 2º	Groupe VIII
B 2. Carènes latérales visibles sur le premier segment	•
dorsal seulement, entières ou à peu près; pu-	
bescence courte	Groupe IX.
B 1. Carènes latérales très courtes, visibles seulement	
à la base du premier segment; pubescence	
longue, fine	Groupe X.

**Tmesiphorus punctatus** n. sp. — Oblongus, obscure castaneus, antennis pedibusque dilutioribus, nitidus, totus disperse punctis sat magnis, brevissime piliferis, ornatus. Caput valde elongatum, angustum, anterius vix attenuatum, fronte profunde sulcata et utrinque oblonge nodosa, vertice inter oculos foveis duabus maximis, latera tangentibus, occipite transversim convexo, temporibus infra, et oculis medio,



Fig. 101.

ciliatis, spina post-oculari deficiente. Palpi testacei, articulis 2 apice maxime clavato, gibboso, 3 oblongo, medio intus obtuse angulato, 4 oblongo, intus basi

valde nodoso, apice conico et acuminato. Antennae crassae, articulis 1 cylindrico, 2 quadrato, 3 obconico, 4-8 transversis, 9 magno, trapezoidali. latitudini suae maximae aequilongo, 10 maximo, irregulariter ovato, intus infra excavato et angulo basali interno



Fig. 105.

acuto, 11 orato, intus basi sinuatim impresso, intus dilatato et obtuse bidentato. Prothorax cordatus, antice lateribus subnodosus, dein lateribus

forea laterali leviter sinuatus, basi media forea ralida et supra tuberculo minuto, acuto. Elytra leviter transversa, humeris notatis, sulco dorsali profundo, medium paulo superante. Abdomen elytris longius, convexum, lateribus rotundatum, carinulis tribus validis, acutis et integris. Metasternum late subcordatim impressum. Pedes validi, tibiis anticis medio extus incrassatis, incurvis, intermediis et posticis gracilioribus, ante apicem leviter sinuatis 5.— Long. 2.20 mill.— Fig. 104 et 105

Afrique occidentale : Assinie.

Voisin de Tm. collaris et rugicollis Raffr., mais la ponctuation est bien moins forte et non confluente sur la tête et le prothorax et la carène médiane ne se prolonge pas sur les 3° et  $\Psi$  segments dorsaux.

Les derniers articles des antennes sont représentés vus en dessus et en dessous dans la tigure 405.

**Tmesiphorus Arrowi** n. sp. — Elongatus, totus rufus, subopacus, minute granulosus, sat dense setis depressis obtectus. Caput elongatum, angustum, anterius angustatum, lateribus obliquum, tuber-

culo frontali mediocri, impresso, inter oculos foveis duabus, dente post-oculari valido, obtuso. Palpi sat elongati, articulis, 2 angulato, ad apicem incrassato et extus obtuse angulato, longe appendiculato. 3 oblongo, extus medio angulato, longissime appendiculato, 4 basi transverso, subcylindrico, compresso, apice rotundato, angulo apicali interno longe et valde producto et acuto. Antennae elongatae, graciles, articulis I cylindrico, elongato, 2 quadrato, 3-7 obconicis, latitudine sua longioribus, 8 leviter transverso, 9, 10, 11, cylindricis, 9 plus



Fig. 106.

quam duplo, 10 dimidio, 11 quadruplo latitudine sua longioribus, 11 apice acuminato. Prothorax latitudine sua multo longior, antrorsumattenuatus, lateribus ante medium leviter rotundatis et dein ad basin rectilineis, leviter obliquis, pone medium fovea laterali dense pubescente, media basi fovea parum conspicua. Elytra latitudine sua multo longiora, lateribus subparallela, stria dorsali intus carinata, medium superante. Abdomen elytris longius, lateribus subparallelum, segmentis tribus primis dorsalibus bicarinatis, istis carinis paulo plus quam dimidiam partem disci includentibus. Metasternum postice sulcatum. Pedes elongati, femoribus anticis crassioribus, infra sulcatis, tibiis anticis medio perparum crassioribus, ante apicem incurvis, intermediis gracilibus, ante apicem sinuatis, posticis gracilibus fere rectis. — Long. 2,80 mill. — Fig. 106.

Australie: Adelaide River.

Cette espèce a un peu le facies de *Tm. formicinus* Mac Leay, mais la gracilité et la longueur des antennes l'en distinguent nettement, ainsi que les carènes abdominales plus fortes.

Ce bel insecte doit être myrmécophile. Je suis heureux de le dédier à M. Arrow qui m'a libéralement communiqué de nombreux et intéressants Psélaphides du British Museum.

**Tmesiphorus Dispina** n. sp. — Oblongus, castaneus, opacus, totus confertim rugoso-punctatus, setis brevissimis squamiformibus, dispersis et adpressis ornatus. Caput validum, elongatum, anterius le-




Fig. 107.

riter attenuatum, lateribus obliquum, tuberculo frontali mediocri, sulcato, isto sulco basi oblonge foveato, inter oculos foveis duabus rotundatis, mediocribus, occipite postice obsolete impresso, spina post-oculari sat valida, acuminata, et altera posterius magis obtusa et minore. Palporum articulis 2 leviter arcuato, apice clavato, minute appendiculato, 3 oblongo-ovato, extus medio leviter crassiore et longius appendiculato, 4 valde globoso, angulo interno apicati longe conico et acuto. Antennae validae, articulis 1 breviter conico, 2 quadrato, 3 breviter conico, 4 8 transversis, 9 et 10 multo majoribus, leviter obconi-

cis el latitudine crescentibus, 9 plus quam duplo et 10 dimidio latitudine sua longioribus, 11 subgloboso-ovato. Prothorax cordatus, lateribus, ante medium rotundatus, dein ad apicem compressus, sinuatus et lateraliter foveatus, disco convexus, fovea media basali minuta, oblonga, supra obsolete gibbosus. Elytra transversa, ad basin attenuata et lateribus rotundata, sulco dorsali mediocri, medio attenuato. Abdomen magnum. convexum, lateribus rotundatum, segmento primo dorsali bicarinato, istis carinis parum elevatis, leviter obsoletis et plus quam dimidiam partem disci includentibus. Metasternum rugosum, postice impressum. Pedum anticorum femoribus crassioribus, tibiis extus incrassatis, leviter incurvis, tibiis intermediis et posticis gracilibus, ante apicem leviter sinuatis. — Long. 2.60 mill. — Fig. 107.

Sumatra: Palembang.

Cette espèce est voisine de *Tm. Raffrayi* C. Schauf. (*subumbrosus* Raffr.), de Birmanie, mais les antennes sont plus épaisses et le *4*° article des palpes est plus fortement globuleux.

Tmesiphorus squamosus n. sp. — Praecedenti valde affinis,

differt pubescentia magis dispersa, sculptura corporis magis alutacea. Palporum articulis 4 multo minus rotundato, basi extus dilatato, haud globoso, angulo interno apicali minus anguste producto, toto magis securiformi, 2 et 3 magis angulatis, brevius appendiculatis. Carinulis segmenti primi dorsalis obsoletis. — Fig. 408.

Sumatra: Palembang.

Cette espèce est voisine de la précédente; mais sa pubescence est plus écartée et son corps est plus alutacé.



Fig. 108.

Elle diffère aussi par la forme des palpes, dont le 4º article est plus sécuriforme, avec les 2º et 4º articles plus angulés et plus brièvement appendiculés.

**Tmesiphorus aspericollis** n. sp. — Sat crassus, obscure castaneus, elytris rubris, antennis pedibusque obscure rufis, longe et sat dense pubescens, capite et prothorace (in isto fortius) granuloso-punc-



Fig. 109.

tato. Caput sat latum et breve, antice angustatum, lateribus obliquum, tuberculo antennario
transverso, obsolete sulcato, inter oculos foveis
duabus mediocribus, pone oculos tuberculo acuto,
valido. Palpi minores et graciliores, articulis 2
valde arcuato, apice incrassato, extus leriter
angulato et longius appendiculato, 4 breriore,
irregulariter subtriangulari, apice sinuose truncato, angulis apicalibus prominentibus, externo
rotundato, interno acuto. Antennae validae,
elongatae, articulis 1 cylindrico, 2 quadrato,
3 breviter obconico, 4-7 quadratis, 8-10 majoribus et crescentibus, latitudine sua perparum

longioribus, 11 magno, ovato, basi truncato. Prothorax breviter ovatus, convexus, fovea media basali mediocri, oblonga, lateralibus densius pubescentibus. Elytra transversa, basi attenuata et rotundata, sulco dorsali divergente, vix medium attingente. Segmento primo dorsali sequente majore, basi utrinque brevissime carinato, istis carinis latere approximatis. Tibiis anticis medio extus crassioribus, leviter incurvis, intermediis et posticis subrectis, gracilibus. — Long. 1,85 mill. — Fig. 109.

Sumatra: Palembang.

Cette espèce est très voisine de *Tm. tuberculatus* Raffr., mais les antennes sont plus longues et bien moins épaisses. la sculpture du prothorax est formée d'une ponctuation granuleuse un peu confluente, tandis que chez *tuberculatus* elle consiste en de fortes granulations assez espacées. Elle diffère de *Tm. pubescens* Raffr., de Java, par les articles des antennes 4-7 pas plus longs que larges et le dernier moins fort, et aussi par le prothorax moins granulé.

**Labomimus Harmandi** n. sp. — Oblongus, castaneus, setis adpressis, brevibus, dispersis vestitus. Caput rugoso-punctatum, valde elongatum et antrorsum attenuatum, lateribus obliquum, foveis tribus

aequalibus, tuberculo frontali oblongo, sulcato. Palpi mediocres, articulis 2 leviter arcuato, apice incrassato, extus angulato et breviter acute producto, 3 latitudine aequilongo, extus valde angulato et breviter subobtuse producto, triangulari, 4 fusiformi, basi extus leviter tuberculato, apice acuto. Antennae elongatae, graciles, articulis 1 elongato, cylindrico, 2 ovato, 3-8 obconicis, latitudine sua longioribus, clara magna, triarticulata. Prothorax irregulariter subhexagonus, antice plus et postice minus attenuatus, ante medium ampliato-rotundatus, disco longitudinaliter gibbosus, medio sulco tenui, postice in forea desinente, foveis lateralibus mediocribus, lateribus et basi strigosis. Elytra subtriangularia, lateribus obliquis, humeris notatis, sulco dorsali obsoleto, inter eum et suturam disco longitudinaliter elevato, strigoso, Abdomen magnum, segmento primo dorsali elytris subaequali, basi striolis duabus brevibus dimidiam partem disci includentibus. Femoribus clavatis, tibiis gracilibus, anticis leviter sinuatis, intermediis et posticis leviter incurris.



Fig. 110.

- Antennarum clava maxima, articulis 9 obconico, 10 cylindrico, paulo breviore, 11 obtongo-ovato, acuminato. Metasternum totum convarum, juxta coxas intermedias utrinque arcuatim carinatum. Elytra latitudine sua paulutum longiora. Femoribus anticis, medio, et trochanteribus intermediis apice, breviter, acute spinosis. Segmentis ventralibus deplanatis.
  - Antennarum clava multo minore, articulis 9 ovato, 10 obconico, 11

breviter ovato. Etytra latitudine aequilonga. Metasternum sulcatum, utvinque, juxta coxas intermedias, apophysi brevi truncata praeditum. Femoribus anticis longe, intermediis breviter medio spinosis, trochanteribus intermediis apice augulatim dilatatis et prominulis, anticis longe et valde spinosis. — Long. 3,40 mill. — Fig. 110.

Inde : Sikkim.

Cette espèce diffère de *L. Reitteri* Sharp, du Japon, par son prothorax en quelque sorte caréné longitudinalement; cette carène forte, large et sillonnée.

L'ai grand plaisir à dédier ce magnitique insecte à M. le Dr Harmand, Ministre de France à Tokio, qui l'a découverte et en a enrichi les collections du Muséum de Paris, ainsi que de bien d'autres insectes intéressants.

Subulipalpus myrmecophilus n. sp. — Oblongus, rufo-casta. neus, elytris, basi excepta, rubescentibus, minute granulosus, pube tenui, subrecta sat dense restitus. Caput latitudine sua longius, deplanatum, postice breviter ovatum, fronte lateribus parallela, capite angustiore, sulvata, inter oculos foreis duabus minutis; infra utringue obtuse et angulatim carinatum. Palpi elongati, graciles, articulis 2 apice clarato, 3 clarato, longissime triangulari, breviore, 4 elongato, ad apicem leviter clavato et summo valde acuminato. Antennae elongatae, graciles, articulis 1 cylindrico-elongato, 2 multo breviore, 3-8 elongatis, cylindricis, 9 et 10 majoribus, apice clavatis, 11 fusiformi. Prothorax latitudine sua longior, antice attenuatus, a medio ad basin lateribus parallelis, medio hand rotundatus, valde converus, sulco transverso arcuato. Elytra quadrata, stria dorsali brevissima. Abdomen elytris longius, subconvexum, segmentis dorsalibus aequalibus, Metasternum late sed parum profunde impressum. Segmento ultimo ventrali basi transversim impresso et apice valde sed obtuse subarcuatim carinatoelevato. Pedes graciles, elongati, femoribus leviter clavatis, anticis, inter medium et basin infra, minute et acute spinosis, trochanteribus anticis tenuiter unispinosis, intermediis valde bispinosis, tibiis intermediis leviter incurvis, caeteris rectis J. — Long. 2.70 mill.

Hong-Kong (avec des fourmis).

Très voisin de *S. spinico.ris* Schauf., de Siam; en diffère par le prothorax simplement très convexe, mais sans gibbosité en avant du sillon transversal.

Ancystrocerus carinatus n. sp. — Oblongus, castaneus, vel

rufo-castaneus, dense, sat breviter ciliatus. Capite et praesertim prothorace fortissime et dense, elytris et abdomine disperse, granulosis, Caput deplanatum, valde triangulare, in fronte sulco transverso, tuberculo antennario magno, transverso, sulcato, isto sulco fere usque ad occiput postice productum, istis sulcis crucem formantibus, inter oculos foreis duabus mediocribus. Palpi graciles, articulis 2 et 3 apice claratis, 3 paulo breviore, 4 gracili, fusiformi, valde acuminato. Antennae validae, elongatae, articulis 1 breviter cylindrico, 2 fere quadrato, 3-7 obconicis et latitudine sua parum longioribus, 8-10 subcylindricis, latitudine sua plus quam duplo, 11 fere quadruplo, longioribus, 11 ad apicem leviter clavato, Prothorax subcordatus, ante medium lateribus rotundatus, dein postice leviter sinuatus, triforeatus, absque sulco, supra foveam mediam disco acute tuberculato. Elytra convera, quadrata, lateribus et humeris rotundata, sulco dorsali medium attingente. Abdomen elytris longius, segmentis dorsalibus aequalibus et medio longitudinaliter omnibus carinatis. Metasternum gibbosum, posterius declive et impressum. Segmentis ventralibus longitudinaliter obsolete impressis. Pedes validi, elongati, femoribus parum crassis, tibiis sat crassis, anticis medio leviter incrassatis, leviter arcuatis, intermediis ad apicem leviter incurvis et intus ciliatis of. — Long. 2,30 mill.

#### Sumatra.

Voisin de Anc. longicornis Raffr., mais les antennes sont plus grèles, le prothorax moins long et plus cordiforme, l'abdomen est caréné dans toute sa longueur, tandis que dans longicornis, le premier segment dorsal seulement est caréné.

Didymoprora semipunctata n. sp. — Elongata, antrorsum attenuata, picea, elytris sanguineis, antennis pedibusque rufo-castaneis, sat longe brunneo-pubescens. Caput parce punctatum, elongatum, antrorsum attenuatum, tuberculo antennario magno, elongato, valde sulcato, foveis tribus glandulosis, occipite medio obsolete foveato. Antennae validae, articulis 1 cylindrico, parum elongato, 2 simili, minore, 3 obconico, latitudine sua paulo longiore, 4-7 cylindricis, 4 et 7 subquadratis, 5 et 6 paulo longioribus, 8 leviter transverso, 9 et 10 majoribus, leviter transversis. 11 fere angustiore, subconico. Prothorax parce et minute punctatus, latitudine sua longior, hexagonus, medio rotundatus et sublobatus, antice et postice sinuatus, foveis tribus magnis, glandulosis, quarum lateralibus oblongis, anterius sulco obsoleto productis, media postice ad basin sulcum longitudinalem emittente. Elytra latitudine sua multo longiora, basi leviter attenuata, humeris obliquis, basi bifoveata, sulco dorsali obsoleto, lato et brevi. Abdomen

magnum, postice attenuatum, segmentis dorsalibus tongitudine aequalibus. Pedes validi, simplices 5. — Long. 3.40 mill.

Australie: Queensland.

Cette espèce ressemble à *D. puncticollis* Raffr., mais son prothorax est encore plus nettement hexagonal, avec les côtés presque lobés; cette partie du corps étant finement et peu deusément ponctuée.

## Tableau du genre Tyropsis

A	in .	Amennes	semplables dans les deux sexes	Groupe	1.
1.	1.	Antennes	différentes dans les deux sexes.		
B	2.	Tête non	excavée	Groupe	11.
B	1.	Tèle exca	vée .	Groupe	Ш

Schaufussia nasuta n. sp. - Oblonga, rufa, tota grosse, in prothorace fortius et crebrius, punctata, breviter flavo-pilosa. Caput clongatum, antrorsum attenuatum, vertice occipiteque una alto, plano, vertice anterius abrupte truncato et medio emarginato, medio breviter aurantiaco-ciliato, fronte tota excavata, tuberculo maximo, rotundato. tuberculo antennario fronte parum latiore, hand elevato, obsolete sulcato. Palpi parum elongati, articulis 2 basi tenui, apice maxime clavato-ovato, 3 paulo angustiore, subconico, apice attenuato, 4 praecedente vir longiore, fere fusiformi, apice oblique et minute truncato. Antennae elongatue, graciles, articulis 1 elongato-cylindrico, 2 cylindrico, latitudine sua paulo longiore, 3 leviter obconico, longiore, 4, 5, 6 cylindricis, longitudine decrescentibus, 7 quadrato, perparum transverso, 9 et 10 majoribus et paulo crescentibus, trapezoidalibus et perparum transversis, 11 mediocri, breviter ovato, basi truncato, apice acuminato. Prothorar capite latior, convexus, breviter subcordatus. Elytra latitudine sua longiora, ad basin attenuata, lateribus rotundata, sulco dorsali obsoleto, ante medium evanescente. Segmento dorsali primo caeteris majore, carinulis duabus obsoletis, breribus, plus quam dimidiam partem disci includentibus. Metasternum late concavum. Segmentis ventralibus deplanatis. Pedes elongati, femoribus incrassatis, anticis basi breviter sed valde dentatis, trochanteribus anticis valde angulatim dilatatis, compressis et acutis, intermediis obtuse angulatis, tibiis gracilibus, anticis et intermediis leviter incurvis, posticis subrectis of. -Long. 2 mill.

South Australia

Cette espèce diffère de Sch. formosa King, par sa forte ponctuation et l'armature de la tête un peu différente.

## Tableau du genre Gerallus

Prothorax lisse ou à peine ponctué; élytres ponc- tués		
Tableau du genre <b>Tyromorphus</b> .		
Entièrement ponctué, au moins sur la tête et le	Graune	ī

#### Aploderina n. gen.

A 1. Entièrement lisse ..... Groupe II.

Allongé. Palpes maxillaires assez courts, 2º article en massue, 3º globuleux, 4º ovoïde, un peu allongé, obtus au sommet, fortement sillonné. Antennes longues, massue triarticulée. Tète allongée, atténuée en avant, tubercule antennaire très médiocre. Prothorax atténué en avant et en arrière, avec deux fossettes latérales réunies par un sillon transversal et une petite fossette médiane. Abdomen très fortement marginé; segments dorsaux subégaux.

Ce genre ressemble beaucoup, comme facies, à certains *Tyropsis*, mais la conformation des palpes est très différente et se rapproche davantage de celle des *Hamotus*: le 4° article est sillonné en dedans,




Fig. 111.

mais le 3° est gros, globuleux, ce qui le différencie de *Hamotoides* avec lequel il pourrait \*ètre confondu, en raison de son sillon transversal au prothorax.

Aploderina sulcicornis n. sp. — Rufocastanea, antennis pedibusque pallidioribus. Caput anterius trifoveatum, tuberculo antennario capite angustiore et basi valde constricto. Antennae elongatae, articulis 1 elongato, 2 cylindrico, et longiore quam latiore, cylindrico, primo breviore, 3 obconico, secundo longiore, 4-7 latitudine sua longioribus et longitudine decrescentibus, 8 leviter transverso, 10 praecedente fere duplo latiore, valde transverso, apice sinuato et infra emarginato, 11 elongato, cylindrico. apice rotundato, profunde transversim et angulatim excavato, supra processu compresso, cyathiformi et ciliato. Prothorax capite paululum longior et

vix latior, anterius magis quam posterius angustatus, foveis duabus lateralibus, sulco transverso junctis, et foveola media minuta. Elytra latitudine sua longiora, basi altenuata, humeris obliquis, notatis, sulco dorsali lato, sed parum profundo et brevissimo. Abdomen elytris aequale, segmento primo dorsali, medio, carina longitudinali, tenui, postice abbreviata, ornato. Metasternum convexum, vix impressum. Pedes sat elongati, graciles, tibiis fere rectis. Abdomen infra depressum 5.— Long. 2,30 mill.— Fig. 111.

Haute Bolivie: Yuracaris.

Les deux derniers articles des antennes sont représentés vus en dessous.

#### Cercoceropsis n. gen.

Atténué en avant, élargi en arrière, convexe. Palpes et antennes comme ceux des *Cercoceroides*, 4º article très allongé, cylindrique, grèle, finement et entièrement sillonné au côté interne. Premier segment dorsal très grand, étroitement marginé, les autres petits, abruptement déclives, très étroitement marginés. Pieds longs et grèles. Métasternum court.

Ce genre est très voisin de *Cercoceroides*, il s'en sépare par le facies tout différent, la dimension du premier segment dorsal de l'abdomen, sa marge latérale qui est réduite à une carène, et la longueur des pieds. Il tient à la fois des *Apharus* par son abdomen et des *Cercoceroides* par ses palpes.

Cercoceropsis longipes n. sp. -Ferruginea, elytris dilutioribus, palpis tarsisque testaceis, longe, valde subhirsute sed parum dense pubescens. Caput latitudine sua longius, anterius leviter attenuatum, tuberculis antennariis parum notatis, leviter sulco divisis, justa oculos foreolis minutis duabus, vertice convexo. Antennae crassae, breves, articulis 4-8 leviter transversis, 9 et 10 magnis, valde transversis, 11 breviter ovato, magno, apice obtuso et basi truncato. Prothorax latitudine sua longior, anterius attenuatus, foreis tribus aequalibus, liberis. Elytra humeris attenuata, sulco dorsali brevi. Abdomen elytris brevius et paulo latius. Metasternum leviter impressum. Tibiis praesertim posticis




Fig. 112.

elongatis, gracilibus, leviter sinuatis  $\varsigma$ . — Long. 1.60-1.80 mill. — Fig. 112.

Brésil: Matto Grosso.

#### TABLEAUX, NOTES ET DESCRIPTIONS.

## Genre Hamotus Aubé.

Les Hamotus, confinés exclusivement dans le Nouveau Monde et nombreux dans l'Amérique centrale et méridionale, sont d'une étude difficile, les espèces étant construites sur un type très uniforme et, ne différant entre elles que par des caractères d'une appréciation délicate, tels que les proportions relatives des articles des antennes.

Le D<sup>e</sup> Schaufuss (*Berl. Ent. Zeits.* 4887), et Ed. Reitter (*Verh. z. b. Ges. Wien*, 4882), ont déjà étudié ce genre, mais depuis, le nombre des espèces s'est considérablement accru et je pense qu'en donnant un tableau de toutes les formes connues, il sera plus facile de caractériser celles qui sont nouvelles.

Ce sont des insectes épais, avec un tubercule antennaire plus ou moins accentué et des antennes robustes : le 3° article des palpes est très petit, triangulaire, le 4° très variable, généralement tronqué à la base, pour s'appliquer contre un des côtés du 3°; il est toujours plus ou moins sillonné au côté interne, avec l'appendice terminal inséré, non pas exactement au sommet de l'article, mais latéralement, dans le sillon.

# Tableau du genre Hamotus avec les espèces nouvelles.

- A 3. Fossette médiane du prothorax grande, ronde, absolument libre.

- C 2. Article des antennes 3 et 4 à peine plus longs que larges,

5, 6, 7 trois fois, 8 de moitié plus longs que larges, 9 et 10 un peu plus gros, deux fois plus longs que larges, 11 presque aussi long que les trois précédents réunis, cylindrique, arqué en dedans, premier cylindrique, très long. Tête ovale, tubercule antennaire transversal, sillonné, fossettes du vertex petites. Quatrième article des palpes fort, presque exlindrique, atténué au sommet et à la base. Prothorax plus long que large, ovoïde, fovéole médiane petite, ronde. Elytres carrés, sillon dorsal divergent ne dé-




Fig. 113. Fig. 114. Fig. 115. H. longi- H. ster- H. longeceps. nalis. pilosus.

passant pas le milieu. Segments dorsaux égaux. Châtain-rouge foncé, pubescence noire.

O Métasternum ayant, à la base, deux apophyses très longues, comprimées et recourbées à l'extrémité. Tibias antérieurs comprimés à l'extrémité, avec un fort éperon triangulaire, intermédiaires obtusément, mais fortement angulés avant l'extrémité qui est épaisse. Lông, 3.49 mill. — Fig. 114...... sternalis n. sp.

Var. 2 of Métasternum avec deux forts tubercules. Tibias

Var. \$ 5 Métasternum avec deux forts tubercules. Tibias comme chez la femelle. Articles 9-41 des antennes moins épaissis. \$ Métasternum et tibias simples.

Obs. — lei viendraient se placer les deux espèces suivantes qui me sont inconnues.

Articles des antennes 2, 3, 4 subégaux, 5 et 6 assez al-

longés, 7 et 8 plus courts, mais plus longs que larges. 9 et 10 allongés, à peine plus épais. 11 très long, étroit, son bord interne courbe; dernier article des palpes grand..... grandipalpis Sharp.

Articles intermédiaires des antennes non transversaux. 9 et 40 allongés, intermédiaires comme largeur entre les précédents et le dernier, qui est allongé, assez épais, pas tout a fait deux fois aussi long que large; dernier article des palpes grand..... rostratus Sharp.

C 1. Articles des antennes 1 cylindrique-allongé, 2 et 3 un peu plus longs que larges, 4-8 carrés, 9 et 40 notablement plus gros, un peu plus longs que larges; 4º article des palpes grand, ovoïde, très acuminé au sommet, tronqué à la base; prothorax ovoïde; fossettes céphaliques situées en avant et plus distantes entre elles que des yeux.

D 2. Onzième article des antennes régulièrement ovoïde, gros. plus long que les deux précédents réunis; fossette médiane prothoracique aussi grande que les latérales; premier segment dorsal notablement plus grand que le 2°. ..... gracilicornis Reitter.

D 1. Onzième article des antennes longuement ovale et sinué en dedans, plus long que les trois précédents réunis. Fossette médiane prothoracique plus petite que les latérales. Premier et 2º segments dorsaux égaux. Tibias assez grèles, légèrement sinués en dedans, avant l'extrémité. Métasternum sillonné. — Long. 3 mill. — Fig. 417 (p. 392)..... **boliviensis** n. sp.

Obs. — Ici doit se placer probablement l'espèce suivante que je ne connais pas.

Articles des antennes 2 plus long que large, 3, 4, 5 carrés, 6, 7, 8 à peine transversaux, 9 et 10 carrés, plus gros. 41 allongé, arrondi au sommet, plus long que les trois précédents réunis; premier segment dorsal plus grand que le second..... badius Schaufuss.

- B 4. Antennes toujours beaucoup plus courtes et plus épaisses; articles 9 et 40 toujours plus ou moins transversaux.
- C<sup>1</sup>2. Premier segment dorsal égal au suivant.
- D<sup>1</sup>3. Articles des antennes 4-8 carrés..... Groupe II

E 2. Forme assez allongée; articles des antennes 9 et 10 de même longueur et presque de même largeur, 41 brièvement ovoïde, à peine plus long que les deux précédents réunis; tête peu rétrécie en avant; fossette médiane prothoracique beaucoup plus grande que les latérales; dernier article des palpes petit, presque cylindrique......

..... parviceps Reitter.

- E 1. Forme courte, trapue; articles des antennes, 10 presque de moitié plus long que le 9°, beaucoup plus fort, tous les deux plus grands que dans l'espèce précédente, 11 aussi long que les trois précédents réunis, un peu plus épais et arrondi au sommet, ses côtés légèrement obliques; tête plus convexe en arrière, plus rétrécie en avant; fossette médiane prothoracique à peine plus grande que les latérales; dernier article des palpes plus grand, fusiforme .... subtilis Schaufuss.
- D' 2. Articles des antennes 4-5 carrés..... Groupe III.
- E' 2. Élytres rugueusement ponctués sur les côtés, presque lisses sur le disque...... inaequalis Reitter.
- E<sup>1</sup> 1. Élytres entièrement lisses.
- F 2. Antennes peu épaisses, articles 9 et 40 égaux, peu transversaux.

- F 1 Antennes bien plus épaisses, articles 1 cylindrique, allongé, 2 carré, très peu plus long que large, 3-5 carrés, 6-8 un peu transversaux, 9 un peu plus grand, légèrement transversal, 10 pas plus long, mais de moitié plus large, très transversal, 11 presque globuleux, un peu plus long que les deux précédents réunis, plus arrondi en dehors qu'en dedans, un peu anguleux au sommet, un peu aplati. Tête sans tubercule frontal, presque carrée, deux fossettes très éloignées l'une de l'autre, front



Fig. 116. Fig. 147. Fig. 118. H. globu- H. boli- H. punctilifer. viensis. pennis.

profondément et large. ment sillonné. Dernier article des palpes ovoïde, arrondi au sommet. Prothorax presque circulaire, trois fossettes égales. Élytres carrès, un peu atténués à la base, sillon dorsal excessivement court. Segments dorsaux égaux. Métasternum impressionné en arrière. Pieds simples. Châtain-rougeâtre foncé, élytres un peu plus clairs, pubescence longue et foncée. -

Long. 2,50 mill. — Fig. 416..... globulifer n. sp.

- D<sup>1</sup> 1. Articles des antennes 4-8 transversaux.
- E<sup>2</sup> 2. Pubescence claire, plus ou moins jaune..... Groupe IV.
- F<sup>1</sup>3. Antennes assez épaisses, articles 3-5 visiblement moins transversaux que 6-8.
- G12. Tibias postérieurs rentlés au milieu, ayant à leur face interne une grande fossette oblongue, pubescente. Articles 9 et 10 des antennes en carré transversal, plus grands que les précédents, égaux entre eux, 11 gros, presque aussi large que long, plus arrondi en dehors et un peu oblique au sommet. Fossettes céphaliques pas plus distantes entre elles que des yeux. Dernier article des palpes médiocre, ovoïde, acuminé, entièrement et protondément sillonné. Prothorax subglobuleux, trois grandes



Fig. 122.

fossettes rondes, égales. Élytres carrés, atténués vers la base, épaules rondes, sillon dorsal très court. Segments dorsaux égaux. Métasternum creusé, relevé de chaque côté, en avant, presque auriculé et caréné. Châtain-rouge, très foncé, élytres un peu plus clairs, antennes et pieds châtains. — Long. 2,90 mill. — Fig. 122.

..... tibialis n. sp.

- G<sup>1</sup>4. Tibias postérieurs simples ou simplement sinués.
- II 2. Fossettes frontales également distantes entre elles et des yeux; antennes pas très épaisses, articles 9 et 10 égaux entre eux, très transversaux, 11 aussi long que les trois précédents réunis et de 1 3 plus long que large, très oblique extérieurement au sommet qui est assez acuminé. Long. 2,40 mill................................ frontalis Reitter.
- H 1. Fossettes frontales plus grandes et plus distantes entre elles que des yeux; dernier article des antennes obtusément arrondi au sommet.
- 1 2. Dernier article des palpes petit, obtus au sommet, silion assez étroit et raccourci à la base; dernier article des antennes régulièrement arrondi au sommet; tibias postérieurs sans éperon.
- J 1. Dernier article des antennes aussi long que les cinq précédents réunis, plus ovoïde, plus arrondi sur les côtés.
  Élytres assez fortement et presque rugueusement ponctués, sauf sur le disque en avant. Tête assez longue, tubercule antennaire très largement et profondément sillonné. Prothorax plus long que large, bien plus fortement
  atténué en avant qu'en arrière, sa plus grande largeur à
  peu près au milieu, fossettes grandes, spongieuses. Élytres
  carrés, atténués vers la base, côtés obliques, sillon dorsal
  ne dépassant pas le tiers, un peu divergent. Abdomen
  pas plus long que les élytres. Châtain-rougeâtre foncé,
  élytres rougeâtres, antennes et pieds châtains. Long.
  2.30 mill. Fig. 118 (p. 392). . . . . . punctipennis n. sp.
- 1 1. Dernier article des palpes grand, acuminé, entièrement et très largement sillonné. Articles des antennes 9 et 10

OBS. — lei viendrait sans doute se placer *H. furcifer* Schauf., mais la couleur de la pubescence n'est pas indiquée par l'auteur.

- F¹ 2. Antennes plus courtes et plus épaisses, articles 3-8 devenant graduellement et insensiblement de plus en plus transversaux.
- 622. Dernier article des palpes assez grand et complètement sillonné.
- H¹ 2. Taille 3,10 mill. Couleur foncée, pubescence d'un fauve foncé; forme épaisse; dernier article des antennes 4 4 plus long que large, articles 3-8 pas très fortement transversaux, 9 et 10 seulement un peu plus larges et moins transversaux; éperon terminal des tibias postérieurs épais, obtus au sommet; fossettes céphaliques à peine aussi distantes entre elles que des yeux.......

..... globifer Reitter.

- H¹ 1. Taille 2,50 mill. Couleur châtain clair, pubescence d'un fauve doré; forme allongée; antennes à peu près semblables, articles 9 et 10 un peu plus forts, 11 moins de 1 4 plus long que large; éperon des tibias postérieurs tin et pointu; fossettes céphaliques un peu plus distantes entre elles que des yeux..... auricapillus Reitter.
- G<sup>2</sup> 1. Dernier article des palpes moins grand, sillon raccourci vers la base; éperon terminal des tibias postérieurs très fin, coudé.
- H<sup>2</sup> 2. Taille 2.20 mill. Forme épaisse; tubercule frontal formé de deux tubercules très profondément séparés et un peu obliques; antennes épaisses, articles 3-8 bien transversaux, 9 et 10 bien plus larges et bien plus transversaux, 11 court, épais, ses côtés presque parallèles.

arrondi au sommet, aussi long que les trois précédents réunis: élytres un peu transversaux; fossettes frontales plus distantes entre elles que des yeux; châtain-clair... ..... robustus Schaufuss.

- H24. Taille 2.10 mill. Forme plus allongée. Tubercules frontaux largement séparés, mais pas obliques. Antennes semblables. 11° article plus arrondi sur les côtés, surtout en dehors, légèrement oblique au sommet, aussi long que les quatre précédents réunis. Fossettes frontales larges, mais peu profondes, également distantes entre elles et des yeux. Prothorax pas plus long que large, plus rétréci en avant qu'en arrière, trois fossettes movennes, égales. Élytres en carré un peu plus long que large, sillon dorsal n'atteignant pas tout à fait le milieu. Métasternum impressionné en arrière. Châtainfoncé, élytres rougeatres, plus clairs..... butbifer n. sp.
- F<sup>1</sup> 1. Antennes très courtes et très épaisses.
- G<sup>3</sup>2. Tibias postérieurs sans éperon, pubescence forte, longue, couchée, assez clair-semée, fauve-doré; tête plate; articles des antennes 3-8 transversaux. 9 et 10 plus du double plus longs, bien moins transversaux. 41 presque aussi long que les quatre précédents réunis, assez régulièrement ovoide, obtus au sommet; prothorax plus long que large, assez régulièrement ovoide; élytres un peu plus longs que larges; châtain-rougeâtre foncé, élytres rougeatres. - Long. 2,20 mill. . . . bryaxoides Aubé.

Obs. — Ici viendrait sans doute se placer II. claviger Schauf., qui m'est inconnu et qui, d'après son auteur, aurait les antennes plus fortes.

- G34. Un éperon fin et recourbé aux tibias postérieurs, pubescence plus courte, fine soyeuse, plus épaisse.
- H<sup>3</sup>3. Dernier article des antennes très rétréci à la base, presque globuleux, pas plus long que les trois précédents réunis, 6-8 très transversaux, mais pas lenticulaires, 9 et 40 pas beaucoup plus larges, mais deux fois plus longs, bien moins transversaux, augmentant un peu de grosseur; prothorax presque conique, à côtés arrondis; élytres carrés; abdomen très grand. - Long. 2,25 mill. ..... inflatus Raffray.

H<sup>3</sup>2. Dernier article des antennes peu rétréci à la base, aussi

- E<sup>2</sup> 1. Pubescence plus ou moins brune, foncée..... Groupe V.
- F<sup>2</sup> 2. Antennes fortes, assez longues, articles 3-5 légèrement. 6-8 plus fortement transversaux, 9 et 10 du double plus longs, pas beaucoup plus larges que 8 et bien moins transversaux; 4° article des palpes grand, arrondi au sommet.
- (3.3. Pubescence longue, dressée; forme épaisse, assez courte; fossette médiane prothoracique aussi grande que les latérales; dernier article des antennes un peu obliquement ovoïde, plus arrondi en dehors, obtus au sommet, aussi long que les quatre précédents réunis; 4° article des palpes à sillon un peu raccourci à la base. Long.

  2.70 mill. . . . . . . . . . . . . . fuscopilosus Reitter.
- G<sup>†</sup>1. Pubescence assez courté, couchée; forme plus allongée; fossette prothoracique médiane plus petite que les latérales; dernier article des antennes à côtés plus paral-

lèles, plus obtus au sommet, aussi long que les quatre précédents réunis : 4º article des palpes entièrement sillonné. - Long. 2.40 mill..... crassipalpus Raffray.

- Antennes beaucoup plus courtes, grêles, à massue très forte, très tranchée, articles 3-8 très transversaux: & article des palpes ovoïde, obtus au sommet, son sillon entier; forme courte, épaisse; éperon des tibias postérieurs très fin, recourbé,
- G<sup>3</sup> 2. Dernier article des antennes pas beaucoup plus long que les quatre précédents réunis, presque globuleux, pas rétréci à la base, arrondi au sommet; forme courte; châtain plus ou moins foncé, élytres, antennes et pieds plus clairs; massue des antennes très tranchée, 9° arcle deux fois plus large que le 8°, 10° encore plus large. - Long. 2,20 mill..... brevicornis Reitter.
- G<sup>5</sup> I. Dernier article des antennes aussi long que les 6 précédents réunis, très grand, rétréci à la base, plus large et un peu obliquement obtus au sommet, 3-8 très transversaux, 9 et 40 moins larges et moins transversaux que dans l'espèce précédente. Tête ronde, un peu transversale, tubercule antennaire beaucoup plus étroit et sillonné, deux fossettes situées en avant et aussi distantes entre elles que des yeux. Prothorax brièvement ovoïde, plus atténué en avant qu'en arrière, trois fossettes égales. Élytres un peu transversaux, sillon dorsal très large, mais très court. Roux plus clair sur les élytres, les pieds et les antennes; pubescence assez fournie.

- C<sup>1</sup>4. Premier segment dorsal plus grand que le suivant.
- D<sup>2</sup> 2. Dernier article des antennes avec une grande dépression fovéiforme à la face inférieure, près de la base... Groupe VI. Antennes courtes, épaisses, articles 3-8 transversaux, 6-8 plus transversaux que les précédents, 9 et 40 un peu grands, 41 très brièvement ovoïde, plus arrondi en dehors et un peu oblique au sommet. Dernier article des palpes médiocre, oblong, un peu acuminé au sommet, son sillon étroit un peu raccourci à la base. Tête plus

longue que large, tubercule antennaire très largement sillouné, deux fossettes au moins aussi distantes entre elles que des veux. Prothorax brièvement ovoïde,



Fig. 119. Fig. 120. Fig. 121. H. vulpi-H. sulci-H. cavipalpus. cornis. nus.

plus atténué en avant. fossettes égales. Élytres à peine aussi longs que larges, un peu atténués vers la base, sillon dorsal large et très court. Premier segment dorsal d'un tiers plus long que le suivant. Éperons des tibias postérieurs épais et obtus. Châtain-foncé, élytres rougeâtres, antennes et pieds roux-foncé, pu-

bescence brunàtre, longue, hérissée. — Long. 2.40 mill. - Fig. 420..... cavicornis n. sp.

D<sup>2</sup> 1. Dernier article des antennes simple, sans fossette.

E<sup>3</sup> 2. Ponctuation sur les élytres forte, ridée, granu-

leuse sur les côtés et nulle sur le disque ..... Groupe VII.

Tête, sans le tubercule antennaire, transversalement convexe, tubercule antennaire large, entièrement sillonné, deux petites fossettes, beaucoup plus distantes entre elles que des yeux. Dernier article des palpes petit, oblong, acuminé, son sillon entier. Antennes relativement peu épaisses, avec la massue très forte, articles 3-5 peu, 6-8 très transversaux, 9 et 10 de plus en plus larges. 41 très grand, pas plus long que sa plus grande largeur, aussi long que les quatre précédents réunis, arrondi en dehors un peu en arrière du milieu et ensuite oblique vers le sommet qui est obtus. Prothorax aussi long que large, très atténué en avant et fortement arrondi sur les côtés, un peu après le milieu. fossettes grandes, égales. Élytres carrés, sillon dorsal large mais très court et obsolète. Premier segment dorsal presque deux fois plus long que le suivant. Éperon des tibias postérieurs épais et tronqué. Entièrement châtain-roussâtre, pubescence longue, brunâtre, assez dense. - Long. 2 mill..... rugosus n. sp.

E<sup>3</sup> 1. Élytres imponetués.


F<sup>3</sup> 2. Pubescence brune...... Groupe VIII.

- G65 Articles des antennes 3-6 plus longs que larges, 7 et 8 carrés, 9 légèrement, 10 plus fortement transversaux, 11 épais, gros, rétréci à la base, oblique en dehors, vers le sommet qui est obtusément acuminé, un peu plus long que les deux précédents réunis. Dernier article des palpes assez fort, ovoïde, un peu acuminé et entièrement sillonné. Tête à peu près carrée, arrondie, tubercule antennaire fort, très largement sillonné, deux fossettes assez fortes, un neu plus distantes entre elles que des veux. Prothorax un peu plus long que large et légèrement cordiforme, sa plus grande largeur avant le milieu, convexe, disque longitudinalement un peu gibbeux, surtout en arrière au-dessus de la fossette médiane qui est grande, égale aux latérales. Élytres un peu plus longs que larges, un peu atténués à la base, sillon dorsal large, très diffus et extrèmement court. Premier segment dorsal un tiers plus grand que le suivant. Forme robuste, plus large en arrière. Éperon terminal des tibias postérieurs long, fin et acuminé. Châtain-foncé, élytres rougeatres, pieds et antennes roux, avec le dernier article de celles-ci beaucoup plus clair; pubescence longue, hérissée. — Long. 2,60 mill..... bicolor n. sp.
- G<sup>6</sup>3. Articles des antennes, tous légèrement transversaux, celles-ci moins épaisses, à massue moins forte, articles 9 et 10 presque deux fois plus grands, égaux entre eux, 11 grand, atténué à la base, un peu oblique vers le sommet qui est très obtus. Dernier article des palpes grand, acuminé, entièrement et largement sillonné. Fossettes céphaliques assez fortes, plus distantes entre elles que des yeux. Prothorax un peu cordiforme, à peine plus

- long que large, fossettes médiocres, égales, spongieuses; pubescence longue, hérissée.
- H:2. Forme allongée; châtain clair; dernier article des antennes plus long que les quatre précédents réunis; éperon des tibias postérieurs épais, long, angulé à la base, obtus au sommet. Long. 2,40 mill... cavipalpus Raffray.
- H14. Forme courte, épaisse. Châtain très foncé, élytres rougeâtres. Dernier article des antennes pas plus long que les quatre précédents réunis. Éperon des tibias postérieurs moins fort et surtout plus court. Long. 2.40 mill. Fig. 449 (p. 398)...... sulcipatpus n. sp.


662. Articles des antennes 3-40 de plus en plus transversaux,

- 9 et 40 subégaux entre eux, plus larges que le 8°, 44 gros, un peu oblique, rétréci à la base, arrondi en dehors, un peu obliquement, vers le sommet qui est très obtus, aussi long que les cinq précédents réunis; antennes plus courtes et plus épaisses. Dernier article des palpes beaucoup plus petit, oblong, un peu obtus au sommet, son sillon étroit et raccourci à la base. Fossettes céphaliques un peu plus distantes entre elles que des veux. Tête peu convexe, tubercule antennaire assez étroit, largement sillonné. Prothorax un peu plus long que large, presque régulièrement ovoide, trois grandes fossettes égales. Élytres un peu plus longs que larges. légèrement atténués vers la base, sillon dorsal large, superficiel, s'effacant au premier tiers. Forme assez robuste. Éperon des tibias postérieurs long, fin et acuminé. Châtain très foncé, élytres un peu rougeatres, antennes et pieds ferrugineux; pubescence longue, hérissée. — Long. 2.40 mill...... Grouvellei n. sp.
- G<sup>6</sup>1. Antennes extrèmement épaisses, articles 4-40 fortement transversaux, 11 très large, dernier article des palpes plus petit et plus grèle que dans *singularis* Reitt, auquel if ressemble (ex Sharp)..... parvipalpis Sharp.
- F<sup>3</sup> 4. Pubescence fauve, beaucoup plus claire...... Groupe IX.
- 672. Articles des antennes 3 plus long que large, 4, 5, 6 carrés, très faiblement transversaux, 9 et 10 un peu plus grands, plus transversaux.
- H<sup>5</sup> 2. Antennes assez grêles et allongées; dernier article des




Genera et catalogue des Psélaphides





Genera et catalogue des Psélaphides





Genera et catalogue des Psélaphides



- palpes petit, parallèle, très obtus au sommet, son sillon raccourci; éperon terminal des tibias postérieurs long, mais assez épais et tronqué au sommet.
- 11 2. Tête médiocre, assez allongée, bien plus étroite que le prothorax, fossettes grandes, un peu transversales, également distantes entre elles et des yeux; articles des antennes 10 subégal à 9, 41 rétréci à la base, un peu oblique, arrondi en dehors et oblique vers le sommet qui est obtusément acuminé, aussi long que les quatre précédents réunis; prothorax plus long que large, cordiforme, fossettes grandes, ovales; élytres convexes; marge du premier segment dorsal plate; châtain-rougeâtre clair. Long. 2,30 mill...... ursulus Schaufuss.
- 1º 1. Tête grande, presque aussi large que le prothorax, tubercule antennaire petit, largement divisé en deux, fossettes petites, profondes, rondes, un peu plus distantes
  entre elles que des yeux. Articles des antennes 10 un
  peu plus large que le 9°, 11 à côtés presque parallèles,
  arrondi au sommet, un peu plus long que les quatre
  précédents réunis. Prothorax plus long que large, assez
  brusquement atténué en avant et presque étranglé,
  côtés presque droits, fossettes petites, subégales. Élytres
  un peu transversaux, plats, à peine atténués à la base,
  sillon dorsal très diffus et très court. Marge latérale du
  premier segment dorsal convexe, presque gibbeuse,
  surtout en arrière. Châtain-rougeàtre foncé uniforme,
  pieds et antennes plus clairs. Long. 2,30 mill......

..... simplex n. sp.

- H<sup>5</sup> 1. Antennes plus épaisses, plus courtes; dernier article des palpes fort, arrondi en dehors, légèrement acuminé au sommet, fortement et complètement sillonné; éperon des tibias postérieurs court, épais et tronqué.
- Iº 1. Taille 2,60 mill Dernier article des antennes plus long que les quatre précédents réunis, gros, fortement ré-Ann. Soc. Ent. Fr., LXXIII [1904].

tréci à la base, légèrement arrondi en dedans, très arrondi en dehors et un peu oblique vers le sommet qui est acuminé; tibias sans cils spéciaux à l'extrémité..... singularis Reitter....

- G<sup>7</sup>1. Articles des antennes 3-10 devenant progressivement de plus en plus transversaux.
- H<sup>6</sup>2. Dernier article des palpes médiocre, presque parallèle. obtus au sommet, son sillon raccourci; dernier article des antennes gros, court. arrondi, très obtus au sommet; fossettes céphaliques profondes, rondes, plus distantes entre elles que des yeux.
- 13 2. Dernier article des antennes aussi long que les quatre précédents réunis, au moins aussi large que long: prothorax plus long que large, atténué en avant, mais non étranglé de chaque côté en arrière, côtés presque droits, mais légèrement sinués par la fossette latérale très grande, fossette médiane forte, mais un peu moins grande; éperon des tibias postérieurs assez long, peu épais, sinué et obtus; marge de l'abdomen large......

centralis Reitter.

- If 4. Dernier article des antennes pas plus long que les trois précédents réunis, presque aussi large que long; prothorax à peine plus long que large, arrondi sur les côtés, trois fossettes égales; éperon des tibias postérieurs assez fin, droit, un peu acuminé; marge de l'abdomen étroite..... brevimarginatus Schaufuss.
- H°4. Dernier article des palpes grand, arrondi en dehors, acuminé au sommet, son sillon très large et entier; pubescence assez épaisse, un peu couchée; châtain, élytres plus clairs; fossettes céphaliques médiocres, rondes, un peu plus distantes entre elles que des yeux; prothorax un peu cordiforme, fossettes moyennes, subégales; élytres carrés, peu atténués vers la base; éperon des tibias postérieurs grand, fort, épais, un peu obtus.
- 11 2. Articles des antennes 9 et 10 notablement plus larges que les précédents, aussi transversaux. 41 aussi long que les quatre précédents réunis, de 1 4 plus long que large, très rétréci à la base, élargi et très fortement arrondi en dehors au milieu, très oblique vers le sommet qui est

obtusément acuminé; prothorax un peu plus long que large; forme assez allongée; coloration peu foncée. — Long. 2,70 mill. — Fig. 121, p. 398..... vulpinus Reitter.

F 1. Articles des antennes 9 et 40 à peine plus larges et bien moins transversaux que les précédents, 41 aussi long que les cinq précédents réunis et de 1/3 plus long que large, droit au côté interne, légèrement arrondi en dehors et un peu oblique vers le sommet qui est très obtus. Prothorax un peu plus large que long et plus cordiforme, Forme plus courte, plus épaisse. Coloration foncée.

- Long. 2,40 mill..... soror n. sp.

- A 2. Fossette médiane du prothorax absolument libre, mais un peu transversale, émettant de chaque côté un vestige de sillon très court, plus ou moins visible...... Groupe X.
- B¹ 1. Tête assez allongée, fortement rétrécie en avant, fossettes à peine plus distantes entre elles que des yeux. Dernier article des palpes plus fort, plus ovoïde, son sillon entier, large. Antennes un peu moins longues, articles, 3 subcylindrique, à peine plus long que large, 4-6 carrés, 7-8 légèrement transversaux. 9 et 10 plus gros, transversaux, 41 épaissi vers le sommet qui est arrondi. Prothorax à peine plus long que large, régulièrement arrondi sur les côtés, presque aussi atténué en avant qu'en arrière. Élytres carrés, légèrement atténués vers la base, sillon dorsal fort, mais très court. Premiers segments dorsaux égaux. Tibias postérieurs sans éperon ©; trochanters simples. Métasternum fortement sillonné entre

- deux tubercules assez forts et pointus. Châtain-rouge assez clair. Long. 2,90 mill...... decipiens n. sp.
- A 1. Fossette médiane prothoracique grande, ronde, reliée aux latérales par un sillon transversal très obsolète, large, superficiel ou plus ou moins interrompu... Groupe XI.
- B<sup>2</sup> 2. Sillon transversal du prothorax assez marqué sur le disque, mais interrompu sur les côtés et n'atteignant pas les fossettes latérales.
- C<sup>2</sup>2. Articles des antennes 1 long, cylindrique, 2 et 3 cylindrigues, 2 deux fois plus long que large, 4-6 un peu plus longs que larges, 7 et 8 carrés, 9 et 40 beaucoup coup plus gros, carrés. 11 allongé, rétréci à la base. arrondi en dehors, au-dessus du milieu, et oblique vers le sommet qui est obtusément acuminé. Tête plus longue que large, très peu rétrécie en avant, deux très grandes fossettes plus distantes entre elles que des côtés. Dernier article des palpes ovoïde, acuminé, son sillon entier. Prothorax un peu plus long que large, brièvement et régulièrement ovoide, convexe. Elytres carrés, sillon dorsal très divergent, large et très court. Premier segment dorsal plus grand que le suivant. Châtain-foncé, élytres un peu rougeâtres, antennes et pieds ferrugineux; pubescence brune, fine, longue redressée, pieds assez longuement ciliés. - Long. 3,40 mill. - Fig. 445. p. 389.

. . . . . . . . longepilosus n. sp.

- B24. Sillon transversal du prothorax entier, large, mais très superficiel. Antennes longues, arficles 4 long, cylindrique, 2 cylindrique un peu plus long que large, 3 obconique, presque deux fois plus long que large, 3-6 un peu plus longs que larges, 7 et 8 carrés, 9 et 40 plus gros et plus longs que larges, 14 ovoîde-allongé, plus long que les trois précédents réunis, à peine épaissi vers le sommet qui est acuminé, très légèrement sinué en dedans vers le milieu. Tête beaucoup plus longue que

large, côtés presque parallèles, tubercule antennaire avec un sillon large et profond, fossettes grandes, rondes, plus distantes entre elles que des yeux. Dernier article des palpes gros, ovoïde, acuminé, son sillon entier. Prothorax plus long que large, assez régulièrement ovoïde. Élytres plus longs que larges, atténués vers la base, sillon dorsal très large, court, pas divergent. Premier segment dorsal plus grand que le suivant. Un éperon épais, long, très obtus et accolé aux tibias postérieurs. Châtain-foncé, élytres rougeàtres, pubescence fauve, longue, fine, hérissée. — Long. 3,60 mill. — Fig. 413.

p. 389. . . . . longiceps n. sp.

### Sous-genre Hamotoides Schauf.

Les dernières espèces du sous-genre *Hamotus* semblent former une transition au sous-genre *Hamotoides* auquel elles enlèvent sa valeur.

Dans Hamotoides la fossette médiane du prothorax est variable : souvent elle manque complètement et, quand elle existe, elle est généralement moins grande et en tout cas jamais spongieuse; le sillon transversal est bien marqué, profond, entier; la massue des antennes triarticulée est plus grande, très tranchée et le dernier article n'est jamais aussi gros; la tête est plus large, plus aplatie, plus étranglée en avant et par conséquent plus séparée du tubercule antennaire; le prothorax est plus cordiforme; il n'y a jamais d'éperon aux tibias postérieurs.

Le Dr Schaufuss (Berl. Ent. Zeits. 4887, p. 312), a rapporté Hamotus clavicornis Reitt., en reproduisant simplement la diagnose de ce dernier, à un Hamotoides du Musée de Berlin qui est nécessairement une espèce toute différente. Le clavicornis, dont je possède le type, n'a pas de sillon transversal au prothorax et rentre, par conséquent, dans le sous-genre Hamotus. Le clavicornis Schauf., qui d'ailleurs n'est pas décrit, doit donc être mis de côté.

## Tableau du sous-genre Hamotoides avec les espèces nouvelles.

- A 2. Fossette médiane du prothorax encore grande et bien marquée.
- B 2. Fossettes latérales du prothorax situées tout à fait sur les côtés qui sont entaillés par elles, sinueux et noueux au

- dessus de ces fossettes; articles des antennes 9 et 40 carrés, égaux entre eux. 11 brièvement ovoïde, arrondi au sommet; pubescence jaune..... nodicollis Raffray.
- B 1. Fossettes latérales du prothorax situées en dessus, et en dedans du bord qui n'est pas entaillé par elles.
- C. 2. Dernier article des palpes allongé, recourbé en dedans, acuminé; articles des antennes 9 plus long que large, 10 un peu plus long, à peine aussi long que large, 11 très grand, subarrondi, mais un peu plus long que large (ex Sharp) ..... pubiventris Sharp.
- C. 1. Dernier article des palpes régulièrement ovoïde, acuminé.
- D 3. Articles des antennes 9 et 10 presque subglobuleux, à angles arrondis, 9 à peine aussi long que large, 10 bien plus grand et très légèrement plus long que large, 41 grand, régulièrement ovoïde, acuminé. - Long. 2,50 mill. ..... appendiculatus Reitter.
- D 2. Neuvième article des antennes deux fois plus grand que le 8°, 40° carré, deux fois plus grand que le 9°, mais presque de même longueur, 41° très grand, oblique, ovoide. - Long. 1.60 mill. (ex Schaufuss)...... ..... sanguinifer Schaufuss.

OBS. - Ici viendrait sans doute se placer H. Emeryi Wasm., que je ne connais pas.

- D 4. Articles des antennes 9 carré, 40 un peu plus large et légèrement transversal, 44 notablement plus large et aussi long que les deux précédents réunis.
- E 2. Strie dorsale des élytres très courte.
- F 2. Deuxième segment dorsal plus grand que le premier; dernier article des palpes brièvement ovoide, épais. -Long. 2, 1/3 mill. (ex Sharp)..... vicinus Sharp.
- F 1. Segments dorsaux 1 et 2 subégaux : dernier article des palpes longuement ovoïde, moins épais; arrière-corps plus étroit, massue antennaire un peu plus étroite. -Long. 2, 1/3 mill. (ex Sharp ...... difficilis Sharp.
- E 1. Strie dorsale des élytres profonde, bien limitée, atteignant le milieu; dernier article des palpes ovoïde, assez allongé et acuminé; forme assez allongée. - Long. 2,30 mill..... monachus Reitter.

- A 1. Fossette médiane du prothorax petite ou marquée simplement par un renflement médian du sillon transversal.
- B12. Pubescence brune, plus ou moins foncée.
- C12. Pubescence d'un brun foncé; articles des antennes 4-8 moniliformes, 5-8 transversaux, massue très grande, 9 un peu trapézoïdal et très legèrement transversal, 40 plus grand, cylindrique, plus long que large, presque deux fois plus long que 9, 14 régulièrement ovoïde, relativement peu allongé et bien obtus au sommet. tritomus Reitler.

..... nigropilosus a. sp.

- B<sup>1</sup> I. Pubescence fauve.
- C<sup>2</sup> 4. Articles des antennes 4-8 à peine aussi longs que larges, 9 carré, 10 plus long que large, obconique, 11 assez brièvement et régulièrement ovoïde... suturalis Schaufuss.
- C<sup>2</sup> 3. Articles des antennes 4, 5 légèrement transversaux, 6, 7 très transversaux.
- D<sup>1</sup> 2. Élytres avec une ponctuation très espacée, plus ou moins forte et rugueuse.
- E<sup>1</sup>1. Articles des antennes 9 un peu transversal, 10 carré, plus grand, 11 brièvement et régulièrement ovoïde, assez gros, obtus au sommet. Long. 2.10 mill. Reichei Raffray.

- C22. Articles des antennes 4-8 égaux, transversaux.
- D24. Articles des antennes 9 légèrement transversal, 40 un peu plus gros, à peine aussi long que large, 41 gros, assez brièvement ovoïde et obtus, un peu oblique, antennes plus courtes et plus épaisses; pubescence plus claire, fine et redressée; forme courte, épaisse; tète subitement un peu étranglée avant le tubercule antennaire, fossettes beaucoup plus distantes entre elles que des yeux; prothorax pas plus long que large, cordiforme, pas de fossette médiane, sillon transversal simplement un peu renflé au milieu; élytres carrés, strie dorsale atteignant le milieu; segments dorsaux égaux; trochanters antérieurs avec une épine apicale plus ou moins longue, acérée. Long. 2-2,20 mill. . . . . . . . . bellus Schaufuss.
- C<sup>2</sup> 1. Articles des antennes 4-8 de plus en plus transversaux, 9 et 40 beaucoup plus gros, transversaux, 40 un peu plus fortement, 41 très brièvement ovoïde, obtus au sommet. Tête brusquement rétrécie, mais non entaillée avant le tubercule antennaire qui est beaucoup plus étroit qu'elle, mais pas largement sillonné, fossettes plus distantes entre elles que des yeux. Prothorax plus long que large, côtés presque droits de la base jusqu'au devant du milieu où ils sont un peu arrondis et, de là. rétrécis en avant, sillon transversal à peine élargi, mais un peu angulé au milieu. Élytres carrés, strie dorsale large, diffuse, s'effacant au milieu. Segments dorsaux égaux. Métasternum largement sillonné. Trochanters antérieurs mutiques. Forme épaisse, courte. Châtain-roux. élytres, antennes et pieds roux, pubescence très épaisse. couchée, fauve. - Long. 2 mill...... hirtus n. sp.

## Tableau du genre Pseudohamotus avec une espèce nouvelle.

A 3. Articles des antennes 3 un peu obconique, plus long que large, 4-6 carrés, 7 et 8 très légèrement transversaux.
 9 et 40 plus gros et légèrement transversaux, 41 très brièvement ovale et très obtusément acuminé; tubercules antennaires gros, noueux, profondément séparés et étranglés à leur base. — Long. 2,30-2,60 mill.

inflatipalpus Reitter.

- A 2. Antennes plus courtes, plus épaisses, articles 3, à peine plus long que large, 4 et 5 carrés, 6-8 transversaux, 9 et 10 plus gros, transversaux, 10 plus fortement transversal; tête assez longue, assez fortement atténuée en avant, tubercule antennaire moins marqué et non noueux, à peine rétréci à la base. Long. 2,50 mill..... conjunctus Reitter.

fauve. — Long. 2.80 mill. . . . . . . . planiceps n. sp

Obs. — Les *Hamotus curtipalpus* et *latipalpus* Sharp, appartiennent certainement à ce genre, mais les descriptions sont si sommaires qu'il est impossible de les faire entrer dans un tableau.

# Tableau du genre Cercoceroides avec les espèces nouvelles.

A 2. Articles des antennes 3 un peu plus long que large, 4 à 3 carrés. 6-8 transversaux. 9 et 10 plus gros, transver-

- saux, 11 grand, ovoïde, tronqué à la base, un peu oblique vers le sommet qui est obtusément acuminé.
- B 2. Tête à peine plus longue que large, à peine rétrécie en avant, tubercule antennaire médiocre; métasternum avec deux fortes apophyses recourbées en hameçon et obtuses, assez étroitement sillonné; abdomen fortement impressionné longitudinalement o; métasternum un peu gibbeux, fortement impressionné au milieu longitudinalement o; pubescence grise. Long. 2,30 mill.....

..... Germaini Raffray.

- A 4. Articles des antennes 3 plus long que large, 4-7 carrés. 8 légèrement transversal, 9 et 40 plus gros, presque carrés, 11 presque cylindrique, obtus au sommet. Tête étroite, deux fois plus longue que large, brusquement étranglée à la base du tubercule antennaire qui est fortement bilobé, deux fossettes beaucoup plus distantes entre elles que des yeux. Prothorax à peine plus large que long, très arrondi sur les côtés, et plus atténué en avant, trois grandes fossettes libres, spongieuses, Élytres plus longs que larges, à peine rétrécis à la base, sillon dorsal très grand, divergent, atteignant le milieu. Premier segment dorsal un peu moins grand que le suivant. Métasternum avec deux petits tubercules très pointus, à pointe recourbée, largement concave entre eux. Segments ventraux déprimés au milieu. Châtain un peu rougeatre, élytres rouges, antennes et pieds ferrugineux, pubescence brun-rouge, hérissée. — Long. 2,50 mill...

#### Cercocerulus n. gen.

Ce genre est fondé sur un insecte décrit par Schaufuss sous le nom de *Phalepsus hirsutus*, mais qui s'éloigne des *Phalepsus* par ses ongles

égaux. Le dernier article des palpes a, il est vrai, la même forme renflée à la base, amincie et subulée au sommet, comme aussi d'ailleurs dans le genre australien Rytus; mais dans Cercocerulus, ce même article est étroitement mais fortement sillonné en dedans, jusqu'à la partie renflée, sans que ce sillon alteigne la base, ce qui le fait rentrer dans le groupe des Hamotus: le 3° article des palpes est petit, obconique, un peu plus long que large, le 2° est presque droit, long, mince sur ses deux premiers tiers et renflé au sommet. — Fig. 123.



Fig. 123.

Je donne ci-dessus (fig. 123), un dessin du palpe de Cercocerulus hirsulus Schaufuss.

### Tableau du genre Rytus

### Genre Pseudophanias Raffr.

Ce genre est peu connu et se compose d'une dizaine d'espèces spéciales, jusqu'à ce jour, à Singapore, Penang et Sumatra.

Ces insectes ressemblent énormément aux Ancystrocerus de la même région et qui ne sont pas beaucoup plus connus qu'eux. Ils en diffèrent cependant par l'inégalité très prononcée des ongles des tarses et par les palpes; la tête quoique ayant un aspect similaire, est en réalité toute autre. Ils rappellent vaguement aussi les Centrophthalmus, dont ils sont d'ailleurs très éloignés.

Les palpes sont petits avec les articles 2 assez long, courbé, progressivement épaissi vers le sommet qui est tronqué carrément, 3 beaucoup plus petit, obconique, un peu plus long que large, 4 moins long que le 2°, mince, très acuminé au sommet. Les yeux sont placés à la partie antérieure de la tête, sur un plan très inférieur au vertex et séparés

par un large sillon semicirculaire, qui s'étend, en avant, sous le tubercule antennaire qu'il isole de l'épistome. Il y a généralement un tubercule sur le disque du prothorax, au-dessus de la fossette médiane basilaire. Les pieds sont longs.

Comme il y a des modifications à apporter aux espèces déjà décrites et que plusieurs sont nouvelles, je crois préférable d'en donner un tableau.

## Tableau du genre Pseudophanias avec les espèces nouvelles.

A 2. Ovale-allongé, presque fusiforme. Antennes longues, grèles. Couleur cannelle, peu brillant, pubescence rude. courte, couchée. Ponctuation grosse, subocellée, con-



Fig. 124.

fluente, sur la tête et le prothorax. bien moins grosse et plus éparse sur les élytres. Tête plus longue que large, arrondie en arrière avec l'occiput convexe, déprimée transversalement sur la ligne postérieure des yeux, tubercule frontal en carré long, profondément sillonné. Yeux gros, saillants. Palpes grêles. Antennes atteignant la marge postérieure des élytres, sans massue distincte, articles bien plus longs que larges, 3-7 augmentant de longueur, cylindriques, 8-40 très légèrement ovales, 8 plus long que 7, 8-10 augmentant de largeur. de même longueur, 11 longuement et régulièrement ovale, obtus au sommet. Prothorax gibbeux, cordiforme, un tubercule assez acéré, au-dessus de la fossette basilaire qui est large mais

peu profonde. Élytres convexes, plus longs que larges, atténués à la base, côtés un peu arrondis, épaules presque nulles, strie dorsale atteignant le milieu. Abdomen plus long que les élytres, atténué en arrière, très largement marginé, un peu plat, segments dorsaux diminuant de longueur, à la base deux vestiges de carinules très courtes, renfermant les 2 3 de la largeur. Métasternum gibbeux, impressionné en arrière. Pieds longs,

cuisses peu renflées, rugueusement ponctuées, tibias longs, droits. — Long. 2 mill. — Fig. 124. . elegans n. sp.

- A 1. Forme plus courte, plus épaisse, plus élargie en arrière : antennes épaisses.
- B 5. Ponctuation très peu visible, éparse sur la tête et le prothorax, nulle sur les élytres.
- C. 2. Antennes relativement assez longues, mais épaisses, articles, 1 cylindrique, allongé, 2, 3, 7 carrés, 4, 5 cylindriques, un peu plus longs que larges, 8-40 un peu plus gros et grossissant progressivement, à peine plus longs que larges. 11 aussi long que les trois précédents réunis, sinué en dessous à la base, un peu élargi ayant le sommet qui est obtusément acuminé. Tête plus longue que large, arrondie et convexe en arrière, très fortement atténuée à la base du tubercule antennaire qui est grand, un peu élargi en avant, profondément sillonné, deux grandes fossettes transversales. Prothorax à peine plus long que large, un peu cordiforme, gibbeux, avec un tubercule assez pointu au-dessus de la fossette médiane basilaire qui est petite et ronde. Élytres transversaux, atténués vers la base, épaules gibbeuses, sillon dorsal très court. Abdomen grand, obtus en arrière, premier segment dorsal plus grand, deux carinules peu éloignées de la marge latérale et très courtes. Métasternum gibbeux, impressionné en arrière. Pieds robustes, simples. Châtain-rougeâtre foncé, ponctuation pilifère, très espacée et peu visible sur le prothorax, pubescence courte, couchée brune. - Long. 3-3,20 mill..... robustus n. sp.
- B 4. Ponctuation remplacée sur le prothorax par de fins tuber-

cules espacés, ponctuation forte sur les élytres, mais pas confluente. Articles des antennes 1 brièvement cylindrique, 2 presque carré, 3-40 transversaux, 3-8 pas de moitié plus larges que longs, 9 et 10 presque du double plus larges que longs, 11 assez régulièrement ovoïde, arrondi au sommet; au côté interne, une carène longitudinale dont le sommet forme une pointe mousse en avant. Tête avec quelques points épars, un peu plus longue que large, peu atténuée et pas étranglée avant le tubercule antennaire qui est grand, très profondément sillonné; deux fovéoles peu distinctes. Prothorax lisse avec des granulations tuberculiformes sétigères, fines et éparses, presque ovoïde allongé, plus rétréci en avant qu'en arrière, gibbeux, un petit tubercule acéré audessus de la fossette basale qui est petite, oblongue. Élytres avec une ponctuation assez forte, éparse, plus dense sur les côtés, presque nulle sur le disque, carrés. convexes, arrondis sur les côtés et aux épaules, strie dorsale très courte. Abdomen imponctué, court, deux carinules assez fortes, renfermant plus de la moitié de la largeur du disque et atteignant le tiers. Métasternum élevé, plat, fortement et rugueusement ponctué, impressionné en arrière. Ferrugineux plus ou moins foncé, élytres un peu plus clairs, antennes et pieds châtainroux; pubescence longue, épaisse, fauve, peu couchée.

- Long. 2 mill..... tuberculatus n. sp.

B 3. Ponctuation simple, non confluente, mais forte, égale sur la tête, le prothorax et les élytres. Articles des antennes transversaux, 9 et 40 un peu plus gros. 44 brièvement ovoïde, arrondi au sommet.....

...... (\$\varphi\$ heterocerus Raffr., olim)... punctatus n. sp.

B 2. Ponctuation pas très grosse mais confluente sur la tête et les élytres qui sont opaques, très fine et éparse sur le prothorax qui est brillant; antennes encore plus épaisses, à articles plus transversaux, 41 grand, fortement échancré en dehors, avant l'extrémité........

heterocerus Raffray.

B 4. Ponctuation très grosse, même plus ou moins ocellée, confluente sur la tête et le prothorax qui sont opaques, nulle sur les élytres.

- C12. Antennes assez courtes et épaisses.
- D 3. Articles des antennes 1 cylindrique, assez long. 2, 4, 5 carrés, 3 un peu plus long que large, 6 et 7 très légèrement transversaux. 8 plus grand, carré, 9 et 40 de mème largeur, transversaux. 41 pas tout à fait aussi long que large, très arrondi et très obtus au sommet. comprimé (3 article 8 plus gros); tête avec une granulation assez forte et confluente; prothorax avec une grosse ponctuation ocellée; élytres avec une granulation éparse et très fine; métasternum 3 convexe, triangulairement et profondément impressionné à la base....

..... malaianus Raffray.

- D 4. Article des antennes 1 cylindrique, assez allongé, 2 carré. 3 obconique, mais un peu transversal, 4-40 légèrement transversaux, grossissant insensiblement à partir du 8° et de plus en plus transversaux, 41 à peine plus long que large, très arrondi sur les côtés, obtusément acuminé au sommet, comprimé en dessous à la base, 9 et 10 plats en dessous. Tête plus longue, plus atténuée en avant. Métasternum of très largement et profondément concave entre deux carènes bien marquées, assez sinueuses et se terminant, près des hanches intermédiaires, par un tubercule un peu conique, mais mousse au sommet, sillonné au fond de la concavité; Q convexe de chaque côté, largement et profondément impressionné. sauf en arrière. Sculpture, pubescence et coloration comme dans les deux précédents. -- Long. 2,40-2,40
- C<sup>1</sup>1. Antennes bien plus courtes et plus épaisses, articles, 4 cylindrique, 2-10 fortement transversaux, 8-10 plus forts et grossissant légèrement, 11 assez brièvement ovoïde,

arrondi au sommet; ponctuation de la tête et du prothorax très grosse, ocellée, confluente; prothorax sans tubercule; élytres presque triangulaires. **cribricollis** Raffray.

Phalepsus vulgaris n. sp. — Concexus, antice attenuatus, rubro-castaneus, elytris paulo dilutioribus, brevissime et disperse pubescens. Caput elongatum, subovatum, antrorsum perparum attenuatum, ante oculos utrinque tuberculatum, leviter constrictum, tuberculo frontali magno, sulcato. Antennae elongatae, articulis 1 et 2 cylindricis et latitudine sua paulo longioribus, 3 obconico, latitudine sua longiore, 3-8 longitudine decrescentibus, 8 subtransverso, 9 et 10 multo majoribus et crescentibus, quadratis, 11 oblongo-ovato, parum acuminato. Prothorax capite fere brevior sed latior, subconicus, sulco transverso arcuato, in foveam lateralem desinente. Elytra magna, convexa, busi attenuata, humeris notatis, basi bifoveata, sulco dorsali brevissimo. Abdomen brevissimum, segmento primo dorsali majore. Metasternum late sed parum profunde impressum. Pedes elongati, simplices, femoribus vix incrassatis, tibiis rectis, gracilibus. — Long. 1,30-1.40 mill.

Paraguay.

Cette espèce est plus grande que *Ph. nanus* Schauf., avec les antennes plus longues, les élytres plus atténués à la base; elle diffère de *Ph. sub-globosus* Westw., par l'absence de sillon sur la tête et par sa pubescence.

Phalepsus cavicornis n. sp. — Praecedente magis elongatus et minus convexus, eodem colore et pubescentia. Caput latitudine sua longius, ante oculos utrinque magis tuberculatum, juxta istos tuberculos posterius foveatum, anterius leviter constrictum, tuberculo frontali obsolete sulcato. Antennae validae, minus elongatae, articulis 1 et 2 cylindricis, 3 obconico, latitudine sua paulo longioribus, 4-8 quadratis, 9 et 10 multo majoribus, 9 subquadrato, 10 subtransverso, 11 ovato, basi truncato et supra fovea magna, rotundata notato. Prothorax conicus, latitudine sua paulo longior, sulco transverso valde arcuato. Elytra magna, basi minus attenuata, humeris obliquis, notatis. Abdomen breve, segmento dorsali primo majore. Metasternum sulcatum. Pedes simplices, elongati, graciles. — Long. 4,50 mill.

Brésil: Matto Grosso.

Facile à distinguer par la grande fossette qui se trouve sur la base du dernier article des antennes.

#### CATALOGUE.

#### TYRINI

Raffray, Rev. d'Ent. 1890, pp. 44, 162; Trans. S. Afr. Phil. Soc. 4897, p. 107. — Ganglbauer, Käf. Mitteleur. H. 4895, p. 850.

#### SOMATIPION

Schaufuss, Nunq. ot. II, p. 457. — Raferay, Rev. d'Ent. 1890, pp. 145, 451.

globulifer Schaufuss, loc. cit. p. 458. — Raffray, loc. cit. pt. III, f. 31........... Australie: King George's Sound.

#### ENANTIUS

Schaufuss, Psel. Siams, 1877, p. 48. — Raffray, Rev. d'Ent. 1890, pp. 145, 451.

fortis Raffray, Rev. d'Ent. 1895, p. 63...................... Singapore. rostratus Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 1883,

p. 390, pl. XX, f. 1..... Bornéo: Tameanglaiang.

punctipennis Schaufuss, Psel. Siams, 4877. p. 48... singapuriensis Raffray, Rev. d'Ent. 1895. pp. 63,

Singapore,

Simm.

<u>5</u> 64.

#### CENTROPHTHALMUS

Schmidt, Beitr. Mon. Psel. Prag, 1838, p. 7. — Saulcy, Spec. I, p. 70. — Raffray, Rev. d'Ent. 1390, pp. 146, 453; Trans. S. Afr. Phil. Soc. 4898, p. 407. Camaldus Fairmaire, Ann. Soc. ent. Fr. 4863, p. 637.

### Groupe 1.

## 539 Groupe II. armatus Raffray, Rev. Mag. Zool. 4877, p. 285, pl. III, f. 6. . . . . . . . . . . Abyssinie : Enderta, Guéva. Groupe III. divisus Reffer, Verh. z. b. Ges. Wien, 1883, p. 390. ..... Bornéo : Telang. acutispina Raffray, Rev. d'Ent. 4887, p. 34..... Zanzibar. punctipennis Schaufuss, Psel. Siams, 1877, p. 21... ........... Siam. Singapore, Célèbes, Java. Bornéo, Sumatra, Var. munctatissimus Schaufuss, loc. cit. p. 22; Tiids. Ent. XXV, p. 73; Notes Leyd. Mus. IV, p. 453. — RAFFRAY, Rev. d'Ent. 4895, p. 73. quadristriatus Schaufuss, Psel. Siams, 1877, p. 22 praecipuus Schaufuss, Ann. Mus. Civ. Gen. XVIII, 1882, p. 360..... Celèbes ; Makassar. Groupe IV. sternalis Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 4896, p. 276. ..... Sumatra : Palembang, Siam, indicus Raffray, Bull. Soc. ent. Fr. 4898, p. 287... ..... Inde : Guzerath. femoralis Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 1882. p. 284..... Batavia. Sumatra nord et sud. gracitis Raffray, Ann. S. Afr. Mus. II, 1901, p. 126. ...... Rhodesia : Salisbury. guinacensis n. sp..... Afrique occidentale : Côte de l'Or. abyssinicus n. sp...... Abyssinie : Haramat. Clementis Schaufuss, Psel. Siams, 1877, p. 20..... Siam. forticornis Schaufuss, loc. cit. p. 21. Marshalli Raffray, Trans. S. Afr. Phil. Soc. 1898. p. 407, pl. XVIII, ff. 22, 23...... Rhodesia: Salisbury. Groupe V. grandis Reitter, Deuts. Ent. Zeits. 4882, p. 481.

..... Afrique occidentale : Addah.

..... Abyssinie : Keren, Endertc.

rubens Raffray, Rev. d'Ent. 1882, p. 25......

# Groupe VI.

dominus Reitter, Deuts. Ent. Zeits. 1882, p. 181
Afrique occidentale : Addah.
inacqualis Schaufuss, Psel. Siams, 1877, p. 22. , Siam. Célèbes,
birmanus n. sp
sinensis n. sp
papuanus n. sp
angustipalpus n. sp
Groupe VII.
bicarinatus n. sp Afrique occidentale : Gabon.
grandicornis Raffray, Ann. S. Afr. Mus. H. 1901,
p. 125 Rhodesia : Salisbury.
Groupe VIII.
villosulus Fairmaire, Ann. Soc. ent. Fr. 1863,
p. 638. — Sauley, Spec. I. p. 71. Maroc. Tunisie: Casabianca,
Algérie : Constantine, Biskra, Oran.
brevispina Raffray, Trans. S. Afr. Phil. Soc. 1898,
pp. 408, 415, pl. XVIII, f. 24 Le Cap : Vilenhage.
Toveatus Fairmaire, Bull. Soc. ent. Fr. 1898, p. 336.  — Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 1899, p. 521 Wadayascar.
— паттат, апп. 30с. сп. 11. 1833. р. 321 знанцияна.
Groupe IX.
granosus Raffray, Rev. d'Ent. 1895, p. 74 Singapore.
Dispina Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 1883, p. 390,
pl. XX, f. 2 Bornéo.
Groupe X.
laevis Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 4896, p. 276, pl. II,
f. 9 Bornéo. Sumatra : Palembang.
Espèce d'affinités douteuses.
paria Schmidt, Beitr. Mon. Psel. Prag. p. 8, pl. 1, f. 1.
Inde : Calcutta.
31

## CENTROPHTHALMOSIS

exilis Raffray (Centrophthalmus), Rev. d'Ent. 4882,
p. 27, o Abyssinie : Keren, Enderta.
⊊ grandipalpis Raffray, loc. cit. p. 26.
muticus Raffray, Bull. Soc. ent. Fr. 1898, p. 521.
Madagascar : Suberbieville.
monilis Kaffray, Rev. d'Ent. 1882, p. 27 Abyssinie : Keren.
Reitteri n. sp
inexpectus n. sp Afrique occidentale : Addah.
sulcatus n. sp
barbatus Reitter [Centrophthalmus], Deuts. Ent.
Zeits. 4882, p. 483, pl. VIII, f. 4
7
ACYLOPSELAPHUS
Raffray, Rev. d'Ent. 1883, p. 237; 1890, pp. 147, 154;
Ann. Soc. ent. Fr. 4903, p. 326.
The second of th
madagascariensis Raffray, Ann. Soc. ent. Fr.
madagascariensis Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 4903, p. 326 et fig
madagascariensis Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 4903, p. 326 et fig
madagascariensis Raffray. Ann. Soc. ent. Fr. 4903, p. 326 et fig
madagascariensis Raffray. Ann. Soc. ent. Fr. 4903, p. 326 et fig
madagascariensis Raffray. Ann. Soc. ent. Fr. 4903, p. 326 et fig
madagascariensis Raffray. Ann. Soc. ent. Fr. 4903, p. 326 et fig
madagascariensis Raffray. Ann. Soc. ent. Fr. 4903, p. 326 et fig
madagascariensis Raffray. Ann. Soc. ent. Fr. 4903, p. 326 et fig
madagascariensis Raffray. Ann. Soc. ent. Fr. 4903, p. 326 et fig
madagascariensis Raffray. Ann. Soc. ent. Fr. 4903, p. 326 et lig
madagascariensis Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 4903, p. 326 et fig
madagascariensis Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 4903, p. 326 et fig
madagascariensis Raffray. Ann. Soc. ent. Fr. 4903, p. 326 et fig
madagascariensis Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 4903, p. 326 et fig

#### CTENOTILLUS

RAFFRAY, Ann. Soc. ent. Fr. 1896, p. 277

costatus Raffray, loc. cit. p. 278, pl. XI, f. 5. . . . . Sumatra : Palembana.

1

#### ZEATYRUS

Sharp, Ent. Month!, Mag. XVIII, 1881, p. 48.

Parmipalpus Broux, Man. N. Zeal, Col. 1881, p. 662.

1

#### LEANYMUS

RAFFRAY, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 1900, p. 219.

palpalis Raffray, loc. cit. p. 220, pl. X, ff. 5, 6...

...... Australie : Clarence et Tweed Rivers.

1

### CEOPHILLUS

Leconte, Bost. Journ. Nat. Hist. VI, 1850, р. 73. — Brendel, Bull. Un. Iowa, 1, 1890, р. 226.

monitis Leconte, loc. cit. p. 73. — Brendel, loc. cit. p. 226, pl. VI, ff. 7, 8, 9. — Raffray, Rev. d'Ent. 1890, pl. III, f. 7...... Amérique septentrionale: Illinois, Ohio.

#### CEDIUS

Leconte, Bost. Journ. Nat. Hist. VI, 1850, p. 75. — Brendel. Bull. Un. Iowa, I, 1890, p. 228. — Raffray, Rev. d'Ent. 1890, pp. 145, 152. — Casey, Col. Not. VII, 1893, p. 625.

Ziegleri Leconte, Bost. Journ. Nat. Hist. VI, p. 75.

— Brendel, Bull. Un. Iowa, I, p. 228, pl. VI, ff. 11, 11<sup>a</sup>. — Casey, Col. Not. VII. p. 626. — Raffray, Rev. d'Ent. 1890, pl. III, f. 12.

...... Amérique septentrionale : Ohio, Wissouri, Iowa.

robustus Casey, Col. Not. VII, 1893, p. 626....... Amérique septentrionale : Distr. de Colombie

400 (543) spinosus Leconte, Bost. Journ. Nat. Hist. VI, p. 74. - Brender, Bull. Un. Iowa, I. p. 229, pl. VI. f. 40. - Casey, Col. Not. p. 266. Amérique septentrionale : Pensylvanie. 3 **PSELAPHOCERUS** RAFFRAY, Rev. d'Ent. 1887, p. 28; 4890, pp. 141, 152; Trans. S. Afr. Phil. Soc. 4897, p. 409. Peringueyî Raffray, Rev. d'Ent. 1887, p. 29, pl. X, f. 44; Trans. S. Afr. Phil. Soc. 4897, p. 440, pl. XVII, f. 40..... Le Cap: Cape Town. diversus Raffray, Trans. S. Afr. Phil. Soc. 4897. p. 444, pl. XVII. f. 41..... Le Cap : Cape Town. amicus Raffray, loc. cit. 1898, p. 409, pl. XVIII, ff. 43, 44..... Le Cap : Stellenbosch. acutispina Baffray, loc. cit. 1898, p. 410, pl. XVIII, W. 41, 42..... Le Cap : Uitenhage, Port Elizabeth. heterocerus Raffray, Rev. d'Ent. 1887, p. 30, pl. I. ff. 8, 9; Trans. S. Afr. Phil. Soc. 4897, p. 111. pl. XVII. 1. 12. . . . . Le Cap : Constancia, Stellenbosch. antennatus Raffray, Trans. S. Afr. Phil. Soc. 4897, p. 142, pl. XVII. f. 13...... Le Cap : Cape Town. nodicornis Raffray, loc. cit. 1898, p. 414, ... Le Cap : Vitenhage 7 SINTECTODES Refiter, Verh. naturf. Ver. Brünn, XX, p. 485. — RAFFRAY, Rev. d'Ent. 1890, p. 145. diversipalpus Reitter, Deuts. Ent. Zeits. 1885,

3

p. 333, pl. H. f. 20. . . . . . . . . Ceylan : Nuwara-Eliya. Crassus Schaufuss, Berl. Ent. Zeits. 1887, p. 296... Centan. tortipalpus Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 4901, p. 28. ..... Ceylan : Anuradhapura.

TMESIPHORUS

LECONTE, Bost. Journ. Nat. Hist. VI, 1850, p. 75. - Brendel, Bull. Un. Iowa, I. 1890, p. 230. — RAFFRAY, Rev. d'Ent. 1890, pp. 445, 151.

Sintectes Westwood, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, II, p. 430.

Japon.

## Groupe 1.

denticornis RAFFRAY, Rev. d'Ent. 1882, p. 12. pl. 1, f. 11-pl. II, f. 12..... Abyssinie : Keren.

## Groupe II.

costatus Weise, Deuts. Ent. Zeits. XXI, 1877, p. 99. Japon.

### Groupe III.

punctatus n. sp...... Afrique occidentale : Assinie.

rugicollis Raffray, Trans. S. Afr. Phil. Soc. 1897.

pp. 108, 109. . . . . . . . . Natal : Frere, Zanguebar : Lindi.

collaris Baffray, Rev. Mag. Zool. 1877, p. 282, pl. III.

f. 1; Rev. d'Ent. 1887, p. 28; Trans. S. Afr. Phil.

Soc. 1897, p. 109...... Zanguebar : Bagamoyo, Minkindani.

clavatus Raffray, Rev. d'Ent. 1895, p. 67, pl. II, f. 7. Singapore.

### Groupe IV.

carinatus SAY, Journ. Ac. Phil. IV, p. 97. -- LE-

CONTE, Bost. Journ. Nat. Hist. IV, p. 76. Bren-

DEL, Bull. Un. Iowa, I, p. 232. - Lacordaire, Gen. Col. Atlas), pl. XVI, f. 2.....

..... Amérique septentrionale : Kansas, Missouri.

## Groupe V.

termitophilus Raffray, Proc. Linn. Soc. N. S.

Wales, 4900, p. 215...... Australie: Swan River.

# Groupe VI.

Arrowi n. sp...... Australie : Adelaide River.

### Groupe VII.

Kingi Mac Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales, 1873, p. 151. - RAFFRAY, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales,

1900, p. 214. Australie: New South Wales, Gayndah, Brigham.

Mac Leayi King, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales, 1863,

p. 40: 1864, p. 102. - Raffray, Proc. Linn. Soc.

N. S. Wales, 4900, p. 214..... Australie.

#### Westwoodi nom. nov.

carinatus | Westwood Sintectodes , Trans. Ent. Soc.

Lond. 1870, p. 130; Thes. Ent. Oxon. pl. IV, f. 10. Australia.

speratus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 403.

# Groupe VIII.

titotipe viii.
costalis Leconte, Bost. Journ. Nat. Hist. VI, p. 77
Brendel, Bull. Un. Iowa, I, p. 231, pl. VI, f. 13
Amérique septentrionale : Missouri, Kansas, Pensylvanie.
Var. rostratus Schaufuss, Berl. Ent. Zeits. 1887, p. 296.
armatus Raffray, Rev. d'Ent. 1882, p. 11 Singapore.
formicinus Mac Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales.
4863, p. 370, — Raffray, Proc. Linn. Soc. N. S.
Wales, 1900, p. 215 Australie.
papuanus Raffray, Rev. d'Ent. 1882, p. 11
Nouvelle-Guinée : Port-Dorey, Amberbaki.
? crassicornis Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 4883,
р. 299
? princeps Sharp, loc. cit. p. 299 Japon.
Groupe IX.
Raffrayi C. Schaufuss, Cat. Psel. p. 89.
umbrosus   Raffray, Rev. d'Ent. 1883, p. 288, pl. IV.
f 9 Birmanie.
bispina n. sp Sumatra : Palembang.
squamosus n. sp
umbrosus Raffray, Rev. d'Ent. 1882, p. 10 Java.
Groupe X.
pilosus Raffray, Rev. d'Ent. 1895, p. 65 Singapore, Penang,
Simoni Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 1891, p. 495 Manille.
transversus Raffray, Bev. d'Ent. 1895, p. 66 Singapore.
pubescens Raffray, loc. cit. 4882, p. 13 Java: M-Gedeh.
aspericollis n. sp Sumatra : Palembang.
tuberculatus Raffray, loc. cit. 1895, p. 66
Penang. Sumatra: Palembang.
30

## RAPHITREUS

Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1883, II, p. 298. Raffray, Rev. d'Ent. 1890, p. 145, 451.

speratus Sharp, loc. cit. 1874, p. 109 : 1883, p. 298. Japon.

dentimanus Raffray, Rev. d'Ent. 1890, p. 211, pl. III, ff. 3, 3', 3''. Annam: bords du Son. Tonkin: Lien Son. Singapore.

#### EULASINUS

SHARP, Ent. Month. Mag. 1892, III, p. 240.

Walkeri Sharp, loc. cit. p. 240...... Chine: Hes Chusan.

#### LABOMINES

SHARP, Trans. Ent. Soc. Lond. 1883, p. 300.

#### **PSELAPHODES**

Westwood, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, II, p. 129. — Raffray, Rev. d'Ent. 1890, pp. 146, 152.

Atherocolpus RAFFRAY, Rev. d'Ent. 1882, p. 45.

villosulus Westwood, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 129; Thes. Ent. Oxon. pl. IV, f. 6.

foveolatus Raffray, Rev. d'Ent. 4882, p. 45, pl. 1,

f. 13; 1895, p. 68. . . . . . . . . . Singapore. Penang.

Simoni Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 1893, p. 462. Ceylan: Cottawa. sumatrensis Raffray, loc. cit. 1896, p. 277......

..... Sumatra : Palembang.

heterocerus Raffray, Rev. d'Ent. 1882, p. 16, pl. II,

ff. 14-16. Java : M-Godeh.

#### LASINUS

SHARP, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 106. — RAFFRAY, Rev. d'Ent. 1890, p. 146.

9

#### TYRUS

Aubé, Psel. Mon. 1833, p. 15: Ann. Soc. ent. Fr. 1844, p. 89. –
Erichson, Käf. Mk. Brandbg. I, p. 263. — Jacq. Duval.,
Gen. Col. Eur. I, p. 432. — Thomson, Skand. Col. III, p. 239. —
Saulcy, Spec. I, p. 76. — Reitter, Verh. z. b. Ges.
Wien, 1881, p. 450. — Brendel. Bull. Un. Iowa, I, 1890,
p. 237. — Raffray, Rev. d'Ent. 4890, pp. 146, 453. —
Ganglbauer, Käf. Mitteleur. II, 4895, p. 850. —
Casey, Col. Not. VII, 1897, p. 627.

Pytna Casey, Bull. Cal. Ac. Sc. 4887, p. 47. Pseudotyrus Rafyray, Rev. d'Ent. 4890, pp. 146, 153. Pselaphodes error Raffray, Rev. d'Ent. 4895, p. 69.

mucronatus Panzer, Fn. Germ. 89, p. 41. - Aubé. Psel. Mon. 4843, p. 46, pl. 78, f. 3: Ann. Soc. ent. Fr. 4844, p. 90. - Jaco, Duval, Gen. Col. Eur. 1. pl. 42, f. 206. - Erichson, Kaf. Mk. Brandb. I. p. 263. — Thomson, Skand. Col. III, p. 239. — SAULEY, Spec. I, p. 78. - REITTER, Verh. z. b. Ges. Wien, 4881, p. 459. - Ganglbauer, Käf. Mitteleur, II, 4895, p. 854..... Europe. Autriche. Allemagne. ..... France méridionale et orientale, Alsace, Grèce, Espagne. sanguineus Paykull, Fn. Svec. III, p. 363. - Thomson, Skand. Col. III, p. 239. insignis Reichenbach, Mon. Psel. 1816, p. 6. pl. II. costatus Fleischer, Verh. naturf. Ver. Brünn, XXVII. 1888, p. 86. calcuratus Schaufuss, Tijds. Ent. XXX, 4887, p. 405. ......? Brésil : Minas Geraes. sexspinosus Schaufuss, loc. cit, p. 405..... ? Bresil. Obs. - Ces deux localités dernières doivent être erronées, les deux exemplaires originaux étant identiques à mucronatus. Peyroni Sauley, Spec. I, p. 79...... Asie Mineure: Taurus. japonicus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 4883, p. 302. Japon. corticalis Raffray (Pseudotyrus). Rev. d'Ent. 4890. Singapore. histrio Schaufuss, Berl. Ent. Zeits. 4887, p. 297 ..... Ceylan : Nuwara-Eliga.

carinifer Casev. Col. Not. VII. 1897, p. 658
Amerique septentrionale : Ctah.
corticinus Casey (Pytna), Bull. Cal. Ac. Sc. 4887,
p. 458. — Brendel, Bull. Un. Iowa, 4890, pl. VI,
f. 20.
humeratis Aubé Hamotus, Ann. Soc. ent. Fr. 1844.
р. 93. — Schaum. Wiegur. Arch. 1851. II. р. 479. — Brendel, Bull. Un. Iowa, I, р. 237. pl. VI, f. 49. —
Casey, Col. Not. VII, 1897, p. 627
Amer. septh : New-York, Tennessee, Mariposa, Canada.
compar Leconte, Bost. Journ. Nat. Hist. IV, p. 80.
semiruber Casey, Col. Not. VII, 1897, p. 629
consimilis Casey, Col. Not. VII, 1897. p. 629
Amérique septentrionale : Kentucky, Indiana.
clavatus Raffray, Rev. d'Ent. 1895, p. 69 Singapore.
Espèces appartenant probablement au genre Tyromorphus.
Howitti King, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales, 1866,
p. 301 Australie : Victoria.
speciosus King, loc. cit. 1865. p. 168 Australie : Clyde River.
Espèces de genre douteux.
compressicollis Schaufuss, Tijds. Ent. XXX, 4887.
p. 104, pl. VIII, f. 2 a-c
piceus King, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales, 1866.
p. 301 Australie: South Creek, Camperdown.
15
SUBULIPALPUS
Schaufuss, Psel. Siams, 1877, p. 23. — Raffray, Rev. d'Ent. 1890, pp. 446, 453.
spinicoxis Schaufuss, loc. cit. p. 23 Raffray,
loc. cit. pl. III, f. 32
myrmecophilus n. sp
2 A NOVETBOOKEDITE
ANCYSTROCERUS
Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 1893, p. 300.
patlidus Raffray, Rev. d'Ent. 1895, p. 70 Singapore.

militaris Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 1896, p. 279.
Sumatra: Palembany.
sumatrensis Raffray, loc. cit. 1893, p. 501, pl. X,
f. 17 Sumatra nord.
punctatus Raffray, Rev. d'Ent. 1895, p. 71. Singapore. Penang.
rugicollis Raffray, loc. cit. 1895, p. 72 Singapore.
laevipennis Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 1896,
p. 279 Sumatra : Palembang.
Iongicornis Raffray, Rev. d'Ent. 1895, p. 73 Penang.
carinatus n. sp
8
MARELLUS
Motschulsky, Bull. Mosc. 1851, IV, p. 481. — Saulcy, Spec.
I, p. 73. — Reftter, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881,
pp. 450, 453. — Raffray, Rev. d'Ent. 1890, pp. 146, 453; Trans. S. Afr. Phil.
Soc. 1897, p. 113.
filipalpis Raffray, Rev. d'Ent. 4887, p. 35, pl. 1, f. 1.
Zanguebar: Kilwa.
aegyptiacus Motsch. Bull. Mosc. 1851, IV, p. 481.
— Saulcy, Spec. I, p. 75. — Reitter. Verh. z. b.
Ges. Wien, 4881, p. 459. Égypte.
palpator Raffray, Rev. Mag. Zool. 1877, p. 285,
pl. III, ff. 8-13 Abyssinie : Hamaren, rivière Guera.
granosus Raffray, Trans. S. Afr. Phil. Soc. 1897,
p. 413
<b>Diskrensis</b> Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 1884, p. 82; Deuts. Ent. Zeits. 1885, pl. II, f. 16
5
DIDYMOPRORA
Raffray, Rev. d'Ent. 1890, p. 148.

Victoriae King, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales, 1865, p. 168, pl. X, f. 39. — Raffray, Proc. Linn. Soc.

N. S. Wales, 1900, p. 222. ..... Australie; Melbourne,

armata Raffray, loc. cit. 1900, p. 223 Australie : Clyde River.
Leana Raffray, loc. cit. p. 223. pl. X. f. 38
puncticollis Raffray, loc. cit. p. 224, pl. X, f. 37.  Australie: Tamworth.
dimidiata Baffray, loc. cit. p. 225 Australie : Bridge Town.
semipunctata n. sp Australie : Queensland.
6
? PALIMBOLUS
Raffray, Rev. d'Ent. 1890, pp. 149, 159.
mirandus Share (Tyrus), Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, IV. p. 488
T .
SPILORHOMBUS
Raffray, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 1900, p. 225.
hirtus Raffray, loc. cit. p. 226 Australie : Swan River.
1
LETHENOMUS
Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 1895, p. 396.
villosus         Schaufuss         (Aploden)         Tijds         Ent. XXIX           p. 268, pl. X, ff. 4, 4a, 4b         Chili
TYROGETUS
Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. XII, 1893, p. 164.
optandus Broun, loc. cit. p. 164
1
NEOTYRUS
Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 4895, p. 396.
gibbicollis Schaufess (Aplodea', Tijds. Ent. XXIX.  p. 269, pl. XI, ff. 4, 4a, 4b 4c
TYROPSIS

Sauley, Spec. I. p. 80. — Raffray, Rev. d'Ent. 1890, pp. 149, 160; Ann. Soc. ent. Fr. 1895, p. 393 (Revision). Aplodea Reitter, Verh. naturf, Ver. Brünn, XX, p. 186.
— Raffray, Rev. d'Ent. 1890, pp. 149, 160.

# Groupe L

castanea Blanchard (Pselaphus), in Gay, Hist. Chil.	
V, p. 563, pl. 32, f. 11. — Raffray, Revis. pp. 391,	
397. — Reitter, Deuts. Ent. Zeits. 1885, p. 321. —	
Schaufuss, Tijds. Ent. XXIX, 1886, p. 273.	
Cherrolati Sauley, Spec. I, p. 82.	
Elsbethae Reitter, Deuts. Ent. Zeits. 1883, p. 48;	
1885, p. 321.	
cosmoptera # Schaufuss (non Blanchard). Tijds.	411
Ent. XXIX, 1886, p. 273	Chili.
hirta Reitter, Deuts. Ent. Zeits. 1888, p. 243. — Raf-	
FRAY, Revis. p. 397 Brésil : Bi	umenau.
pilifera Reitter, loc. cit. p. 243. — Raffray, Revis.	
p. 397 Bresit : S	o-Paula.
	1
valdiviensis Reitter (non Blanchard), Deuts. Ent.	411.11.
Zeits, 1885, p. 322. — Raffray, Revis. p. 398	Chili.
Groupe H.	
·	
adumbrata Reitter, loc. cit. p. 322. — Raffray,	4:1 -1.
Revis. p. 398	Chili.
palpalis Reitter, loc. cit. 1883, p. 48, pl. 1, ff. 1-3.	
Raffray, Revis. p. 398, %.	
prueses Schaufuss, Tijds. Ent. XXIX, p. 270, pl. Xl.	
1. 2, 2a 2b, \$	Chili.
difformis Schaufuss, Nunq. ot. III, 484. — Raffray,	
	Chili.
Revis. p. 399	tantit.
spinuta Reitter, Deuts. Ent. Zeits. 1885, p. 323, pl. II.	
f. 2. Raffray, Revis. p. 399	Chili.
Groupe III.	
cavifrons Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 1895, pp. 394,	
400.	
valdiviensis # Schaufuss (non Blanchard nec Reit-	
TER', Tijds, Ent. XXIX, 1886, p. 273	Chili.

#### SCHAUFUSSIA

RAFFRAY, Rev. d'Ent. 1883, p. 238; 1890, pp. 149, 160, pl. III, f. 11; Ann. Soc. ent. Fr. 1896, p. 132.

formosa King Tyrus', Trans. Ent. Soc. N. S. Wales,

1863, p. 41, pl. XVI, f. 1, Q. Paramatta). Australie. Tasmanie.

brevis Schaufuss (Bryaxis), Nunq. ot. III, 4880,

p. 498. - RAFFRAY, Rev. d'Ent. 4883, p. 239, pl. IV,

f. 45, of et ? Tasmanie).

angustior Raffray, loc. cit. 4883, p. 239, pl. IV.

1. 46 (N. S. Wales).

2 intermedia Schaufuss (Durbos), Tijds. Ent. XXIX, 1886, р. 291.

affinis Schaufuss Durbos, loc. cit. p. 291 Tasmanie.

\* constrictinasus Schaufuss (Tyromorphus), loc. cit.

p. 285 Tasmanie ..... Australie : Wide Bay.

nasuta n. sp . . . . . . South Australia.

9

### DURBOS

Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, IV, p. 495. — Raffray.
 Rev. d'Ent. 1890, pp. 149, 159; Proc. Linn. Soc.
 N. S. Wales, 1900, p. 233.

priscus Sharp, loc. cit. p. 495...... Australie: Champion Bay. interruptus Schaufess, Tijds. Ent. XXIX, p. 291.

..... Australie : Sydney.

٧)

#### GERALLUS

Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 493. — Raffray.
 Rev. d'Ent. 1890, pp. 150, 160; Proc. Linn.
 Soc. X. S. Wales, 1900, p. 234.

Zozimus Schaufuss, Tijds. Ent. XXIX. p. 293.

## Groupe I.

Q globulicornis Schaufuss, Tijds, Ent. XXIX, p. 295.

dimidiatus Raffray, Proc. Linn. Sec. N. S. Wales,
1900, pp. 235, 236 Australie: Swan River.
nanus Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, IV, p. 494.
- Raffray, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 4900,
p. 235 Australic ouest.
Groupe H.
modestus Schaufuss, Tijds. Ent. XXIX. p. 295. —
Raffray, loc. cit. 4900, p. 235
longipes Schaufuss, loc. cit. p. 294. — Raffray, loc. cit. 4900. p. 236
palpalis King, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales, 4863,
p. 42, pl. XVI, f. 5a. — Raffray, Proc. Linn. Soc.
N. S. Wales, 4900, p. 236
Australie : New South Wales. Tasmanie.
cribratipennis Schaufuss, Tijds. Ent. XXIX.
p. 292. — Raffray, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 1900, p. 236
7
HAMOTULUS
Schaufuss, Tijds. Ent. XXX, p. 408. — Raffray, Rev.
Schaufuss, Tijds. Ent. XXX, p. 408. — Raffray, Rev. d'Ent. 4890, pp. 448, 459; Proc. Linn. Soc.
Schaufuss, Tijds. Ent. XXX, p. 408. — Raffray, Rev. d'Ent. 4890, pp. 448, 459; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 1900, p. 248.
Schaufuss, Tijds. Ent. XXX, p. 408. — Raffray, Rev. d'Ent. 4890, pp. 448, 459; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 1900, p. 248.  Tychotyrus Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. 4893, p. 468.
Schaufuss, Tijds. Ent. XXX, p. 408. — Raffray, Rev. d'Ent. 4890, pp. 448, 459; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 1900, p. 248.
Schaufuss, Tijds. Ent. XXX, p. 408. — Raffray, Rev. d'Ent. 4890, pp. 448, 459; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 1900, p. 248.  Tychotyrus Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. 4893, p. 468.  mutandus Sharp (Tyrus, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, IV, p. 487 Nouvelle-Zélande: Auckland.  dispar Raffray, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 4900,
Schaufuss, Tijds. Ent. XXX, p. 408. — Raffray, Rev. d'Ent. 4890, pp. 448, 459; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 1900, p. 248.  Tychotyrus Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. 4893, p. 468.  mutandus Sharp (Tyrus, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, IV, p. 487
Schaufuss, Tijds. Ent. XXX, p. 408. — Raffray, Rev. d'Ent. 4890, pp. 448, 459; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 1900, p. 248.  Tychotyrus Broux, Ann. Mag. Nat. Hist. 4893, p. 468.  mutandus Sharp (Tyrus, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, IV, p. 487
Schaufuss, Tijds. Ent. XXX, p. 408. — Baffray, Rev. d'Ent. 4890, pp. 448, 459; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 1900, p. 248.  Tychotyrus Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. 4893, p. 468.  mutandus Sharp (Tyrus, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, IV, p. 487
Schaufuss, Tijds. Ent. XXX, p. 408. — Raffray, Rev. d'Ent. 4890, pp. 448, 459; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 1900, p. 248.  Tychotyrus Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. 4893, p. 468.  mutandus Sharp (Tyrus, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, IV, p. 487
Schaufuss, Tijds. Ent. XXX, p. 408. — Raffray, Rev. d'Ent. 4890, pp. 448, 439; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 1900, p. 248.  Tychotyrus Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. 4893, p. 468.  mutandus Sharp (Tyrus, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, IV, p. 487
Schaufuss, Tijds. Ent. XXX, p. 408. — Baffray, Rev. d'Ent. 4890, pp. 448, 459; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 1900, p. 248.  Tychotyrus Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. 4893, p. 468.  mutandus Sharp (Tyrus, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, IV, p. 487
Schaufuss, Tijds. Ent. XXX, p. 408. — Raffray, Rev. d'Ent. 4890, pp. 448, 439; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 1900, p. 248.  Tychotyrus Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. 4893, p. 468.  mutandus Sharp (Tyrus, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, IV, p. 487

7

Raffray, Rev. d'Ent. 1883. p. 72. — Schaufuss, Tijds. Ent. XXIX, p. 106..... Australie: King George's Sound.

#### ABASCANTUS

Schaufuss, Tijds. Ent. XXIX, p. 258. — Raffray, Rev. d'Ent. 1890. pp. 148, 460; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 1900, p. 233.

sannio Schaufuss, loc. cit. p. 258. — Raffray, Rev. d'Ent. 4890, pl. III, ff. 15, 15... Australie: King George's Sound.

#### TYROMORPHUS

Raffray, Rev. d'Ent. 1883, p. 240; 1890, pp. 149, 459; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 4900, p. 227.

### Groupe I.

humeralis Westwood (*Tyrus*), Trans. Ent. Soc. Lond. 4865, III, p. 272. pl. XVI, f. 5. — Raffray. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 4900, p. 227. Australie: Melbourne.

nigricornis Raffray, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 4900, pp. 227, 228...... Australie : Clarence et Tweed Rivers.

cribricollis Raffray, Ann. Mus. Nat. Hung. Budapest, 4903, p. 94...... Nouvelle-Guinée: Baie de l'Astrolabe.

comes Schaufuss, Tijds. Ent. XXIX, p. 285. -- Raffray, Proc. Linn. Soc. N. S. W. 1900, pp. 228, 231. Australie: Rockhampton.

#### Groupe II.

nitidus Raffray, Rev. d'Ent. 1883, p. 241, pl. V, Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII [1904].

28

434	A. Raffray. (555)
ſ	f. 17, 48; Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 1900.
1	). 228 Australie : Clyde River.
laev	ris Raffray, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 4900.
_ 1	o. 228, 232 Australie : Tweed River.
10	
	TAPHROSTETHUS
	Schaufuss, Bull. Soc. ent. Fr. 4882, p. cl.i. —
	Raffray, Rev. d'Ent. 4890, pp. 447, 454.
Ep	icaris Schaufuss (error), Ann. Mus. Civ. Gen. XVIII, p. 370.
han	notoides Schaufuss, Ann. Mus. Civ. Gen. XVIII,
4	882, p. 370 Bornéo : Sarawak.
java	nicus Raffray (Tyrus), Rev. d'Ent. 4882, p. 30.
	Java : M'-Salak.
	atus Raffray ( <i>Tyrus</i> ), loc. cit. 1882, p. 29
	Nouvelle-Guinée : Port-Dorey.
sum	atrensis n. sp Sumatra: Palembang.
_	ispina Raffray, Ann. Mus. Nat. Hung. Buda-
_ 1	est, 1903. p. 95 Nouvelle-Guinée : Wilhemhafen.
5	
	APLODERINA
sule	icornis n. sp
1	
	HORNIELLA
	Hornia   Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 1901, p. 29.
hirt	ella Raffray, loc. cit. p. 30 Ceylan : Banderwalla.
1	Tarritari beretti prove Organi r banaratan.
1	HAMOTOPSIS
	Raffray, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 1900, p. 217,
America	
	Palasiae Raffray, loc. cit. p. 247, pl. X, f. 8.  Australie: Clarence River.
'	Zustine, tautent meet.
1	APHARUS
	AT HARCO

REITTER. Deuts. Ent. Zeits, 4882, p. 129. — RAFFRAY, Rev. d'Ent. 4890, pp. 147, 154.

Mülleri Reitter, loc. cit. p. 130, pl. V. f. 4. . . . Brésil : So-Paolo.

Colombie.

armipes Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 1891, p. 318. ..... Venezuela : Caracas. CERCOCEROPSIS longipes n. sp...... Bresil : Matto Grosso. 4 CERCOCERUS Leconte, Class. Col. N. Amer. 1, 1861, p. 57. — RAFFRAY, Ann. Soc. ent. Fr. 1896. pp. 135, 136. Hamotus Brendel (non Aubé), Bull. Un. Iowa, I. p. 240. Upoluna Schaufuss, Tijds, Ent. XXIX, p. 283. — RAFFRAY, Rev. d'Ent. 1890, pp. 147, 154. batrisoides Leconte, New. Spec. Col. I, p. 27. -Motschulsky, Étud. ent. 4856, p. 46, pl. I. f. 4. — Brendel, Bull. Un. Iowa, 1890, p. 240, pl. VII, f. 28. ..... Amérique septentrionale : Pensylvanie, Nouvelle-Orléans. flavitarsis Schaufuss. (Upoluna), Tijds. Ent. XXIX. 1886, p. 283. — RAFFRAY, Rev. d'Ent. 1890, pl. III. HAMOTUS AUBÉ, Ann. Soc. ent. Fr. 1844, p. 92. -RAFFRAY, Rev. d'Ent. 1890, pp. 148, 154; Ann. Soc. ent. Fr. 1896, pp. 133 et suiv.; 1891, p. 319. — Schaufuss, Berl. Ent. Zeits, XXXI, 1887, p. 298. Subg. Hamotus s. str. grandipalpis Sharp. Biol. Centr. Amer. Col. II (4), p. 9. pl. I. f. 4...... Panama. rostratus Sharp, loc. cit. p. 8...... Panama. gracilicornis Reitter, Deuts. Ent. Zeits, 4882. p. 131..... Brésil : Caraca, Blumenau, Colombie

..... Brésil : Blumenau,

? badius Schaufuss, Berl. Ent. Zeits. 1887, p. 300...

parviceps Reitter, Deuts, Ent. Zeits, 1888, p. 230.

(557)

transversalis Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 1882.
p. 373 Colombie.
barbatus Schaufuss, Berl. Ent. Zeits. 1887, p. 304.
- Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 1891, p. 324 Colombie.
fuscopilosus Reitter, Deuts. Ent. Zeits. 1888, p. 228. Tambillo.
crassipalpus Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 1891.
p. 320 Venezuela : Colonie Tovar.
impunctatus Reitter, Deuts, Ent. Zeits, 1888,
p. 229 Brėsil : Blumenau.
laetus n. sp
gracilipes Reitter, Deuts. Ent. Zeits. 1888, p. 228.
Brésil : Blumenau.
brevicornis Reitter, loc. cit. p. 227.
cavicornis n. sp
rugosus n. sp
bicolor n. sp
Fauveli n. sp
cavipalpus Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 1891,
p. 321 Venezuela : Caracas, San Esteban.
sulcipalpus n. sp
Grouvellei n. sp
parvipalpis Sharp, Biol. Centr. Amer. Col. II (4),
1887, p. 8
ursulus Schaufuss, Berl. Ent. Zeits 1887, p. 307 Mexique.
simplex n. sp
setipes Sharp, Biol. Centr. Amer. Col. II (1), 1887,
p. 7, pl. I, f. 3
singularis Reitter, Deuts, Ent. Zeits, 4882, p. 133. Mexique.
centralis Reitter, loc. cit. 1888, p. 229 Brésil : Bhumenau.
vulpinus Reitter, loc. cit. 1888, p. 227 Brésil : Blumenau.
brevimarginatus Schaufuss, Berl. Ent. Zeits. 4887,
309 Perou : Pozuzu.
soror n. sp Venezuela : Caracas.
lateritius Aubé, Ann. Soc. ent. Fr. 1844. p. 92. —

Klug, in Cat. Dejean, éd. 3, p. 465. — Schaufuss,
Berl. Ent. Zeits. 1887, pp. 300, 320. — Raffray,
Ann. Soc. ent. Fr. 1891, p. 322.
tenuivornis Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 1882.
p. 373 Venezuela : Colombie.
decipiens n. sp
longepitosus n. sp
micans Reitter, Verh. z. b.Ges. Wien. 1882, p. 371.
Venezuela. Colombie.
longiceps n. sp
Subg. Hamotoides
Schaufuss, Berl. Ent. Zeits. 1887, p. 298. — Raffray.
Rev. d'Ent. 1890, pp. 148, 154; Ann. Soc. ent. Fr. 1896, p. 137.
nodicollis Raffray, Rev. d'Ent. 1883, p. 240 Mexique.
appendiculatus Reitter. Deuts. Ent. Zeits. 1888,
p. 225 Brésil : Blumenau.
publicentris Sharp, Biol. Centr. Amer. Col. II (1).
4887, p. 4
/ 1
sanguinipes Schaufuss, Berl. Ent. Zeits. 1887, p. 311. Cayenne.
Emeryi Wasmann, Krit. Verz. Myrm. Termit. Berlin.
4894, p. 244 Brésil : Joinville.
difficilis Sharp, Biol. Centr. Amer. II (4), p. 4 Guatemala.
vicinus Sharp, loc. cit. p. 5 Guatemala.
monachus Reitter, loc. cit. 4882. p. 434. — Sharp,
Biol. Centr. Amer. Col. II (4), 1887, p. 6
Mexique : Yucatan. Guatemala.
nigropilosus n. sp Para.
tritomus Reitter, Deuts, Ent. Zeits, 4882, p. 432. —
Sharp, Biol. Centr. Amer. Col. II (1), 1887. p. 4
Guatemala, Mexique : Yucatan, Nicaragua, Panama, Colombie,
suturatis Schaufess, Nunq. ot. III, 1879, p. 508;
Berl. Ent. Zeits. 4887, p. 311 Mexique: Yucatan.
commodus Schaufuss, Nunq. ot. HI, p. 509; Berl.
Ent. Zeits. 1887, p. 310
ин. вень. 1007, р. 510 желеры : Гасанан.

Reichel Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 4891, p. 325
Venezuela : Cumana.
hilaris Schaufuss, Berl. Ent. Zeits. 1887, p. 311 Colombie.
flavopilosus Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 1891.
p. 325 Venezuela : San Esteban.
bellus Schaufuss (Phamisulus), Tijds. Ent. XXIX,
p. 267 Brésil : Sº-Paolo, Matto Grosso, Paraguay central.
hirtus n. sp Antilles : Grenada.
71

#### PHAMISULUS

REITTER, Deuts. Ent. Zeits. 4888, p. 234. — RAFFRAY, Rev. d'Ent. 1890, pp. 148, 155; Ann. Soc. ent. Fr. 4896, p. 137.

Phamisus Schaufuss (non Aubé), Tijds. Ent. XXIX, p. 265.

Neophamisus Reitter, Deuts. Ent. Zeits. 4888, p. 234.

Deerbour

#### **PSEUDOHAMOTUS**

Raffray, Rev. d'Ent. 1890, p. 148, 454; Ann. Soc. ent. Fr. 1896, p. 137.

inflatipalpus Reitter, Deuts. Ent. Zeits. 1888, p. 225.	
— Raffray, Rev. d'Ent. 1890, p. 213, pl. III, f. 6.	
Brésil .	: Blumenau.
curtipalpis Sharp, Biol. Centr. Amer. Col. H (4), 1887.	
р. б	Panama.
latipalpis Sharp, loc. cit. p. 6	Guatemala.
conjunctus Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 1882.	
p. 371 Brésil : Petropolis , Rio	de Janeiro.
ptaniceps n. sp	Brésil.

## CERCOCEROIDES

RAFFRAY, Ann. Soc. ent. Fr. 4896, p. 437.
Cercocerus # RAFFRAY, Rev. d'Ent. 1890, pp. 148, 154.
Germaini Raffray, Rev. d'Ent. 4890, p. 243, pl. H, ff. 9, 9'
tuberculatus n. sp Brésil : Matto Grosso.
simplex n. sp Brésil : Matto Grosso.
3
CERCOCERULUS
hirsutus Schaufuss (Phalepsus), Tijds. Ent. XXIX,
1886, p. 256
1
RYTUS
King, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales, 4866, p. 302. — Raffray, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 4900, p. 237.
p. 467. — Raffray, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 1865, 1900, p. 237.
? porcellus Schaufuss, Nunq. ot. III, p. 509  Australie : Clyde River.
procurator Schaufuss, Tijds. Ent. XXIX, p. 286. —
Raffray, loc. cit. p. 238, J Australie : Clyde River. • orientalis Schaufuss, loc. cit. p. 287.
emarginatus King, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales,
1866, p. 303. — Raffray, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 1900, p. 239, ♂
subulatus King, loc. cit. 4865, p. 403. — Raffray,
loc. cit. p. 239
gemmifer Schaufuss, Tijds. Ent. XXIX, 4886, p. 286.
— Raffray, loc. cit. p. 240

Howarthi Raffray, Ann. Mus. Nat. Hung. Budapest,

7

#### **PSEUDOTYCHUS**

RAFFRAY, Trans. S. Afr. Phil. Soc. 4897, p. 414.

nigerrimus Raffray, loc. cit. p. 414, pl. XVII, f. S.

..... Le Cap : Newlands.

#### EUDRANES

SHARP, Ent. Monthl. Mag. II, III, 1892, p. 241.

Carinatus Sharp, loc. cit. p. 242..... Australie : Adelaide River.

### RYXABIS

WESTWOOD, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 433.

anthicoides Westwood, loc. cit. p. 133; Thes. Ent.

Oxon. pl. IV, f. 12..... Singapore.

#### PSEUDOPHANIAS

RAFFRAY, Rev. d'Ent. 1890, pp. 150, 161.

elegans n. sp	Sumatra : Palembang.
robustus n. sp	Sumatra : Palembang.
pilosus Raffray, Rev. d'Ent. 1895, p. 76	Penang.
tuberculatus n. sp	Sumatra : Palembang.

punctatus nom. nov.

\$\text{\$\text{\$\graphi\$}\$ heterocerus Raffray, Rev. d'Ent. 1895, p. 76.... Singapore.}\$\$\$ heterocerus Raffray, loc. cit. p. 76, pl. II, f. 6... Singapore.

malaianus Raffray, Rev. d'Ent. 1890, p. 214, pl. III,

ff. 1, 1'...... Penany.

Penang.

♀ malaianus Raffray, loc. cit. 1895, p. 75.

10

8

#### PHALEPSUS

Westwood, Trans. Ent. Soc. Lond. 4870, II, p. 431.
Phalespus Raffray, (error), Rev. d'Ent. 1890, pp. 150, 152.
ampliventris Schaufuss, Nung. ot. III, p. 482; Tijds.
Ent. XXIX. p. 257 Amazones.
marcHoides Reitter, Deuts. Ent. Zeits. 4888, p. 242.
Brésil : Blumenau.
vulgaris n. sp Paraguay central.
nanus Schaufuss, Nunq. ot. III. p. 485 Amazones.
subglobosus Westwood, Trans. Ent. Soc. Lond.
1870, p. 431; Thes. Ent. Oxon, pl. IV, f. 41 Amazones.
? <b>batesellus</b> Westwood, loc. cit. p. 431 Amazones.
cavicornis n. sp
fuminicola Schaufuss, Tijds. Ent. XXIX, p. 256 Amazones.

## 47° Tribu Schistodactylini

RAFFRAY, Rev. d'Ent. 1890, p. 162.

Un seul genre..... Schistodactylus Raffray.

### CATALOGUE.

#### SCHISTODACTYLUS

RAFFRAY, Rev. d'Ent. 4883, p. 243; 4890, 462.

## 48° Tribu Arhytodini

Un seul genre..... Arhytodes Reitter.

#### DESCRIPTIONS.

Arhytodes brevicornis n. sp. - Rubro-castaneus, elytris rubris, disperse albido-squamosus, capitis et prothoracis sulcis, elytrorum et abdominis segmentorum margine postica albido-glanduloso dense squamulosis, Caput elongatum, ante oculos constrictum, fronte breviter sulcata, sulcis alteris duobus posterius in occipite angulatim junctis. Oculi magni. Antennae elongatae, articulis 1 subobconico, 2 et 4 leviter transversis, 3, 5, 6, 7, 8 subelongato-quadratis, latitudine sua paululum longioribus, 8 et 9 subcylindricis, ad apicem attamen nonnihil crassioribus, 9 praecedente plus quam duplo longiore, 11 fere dimidio breviore, apice obtuso. Prothorax perparum transversus, antrorsum valde attenuatus basi media angulatus, disco carinatus, sulco transverso valido, medio angulato et lateribus recurvo. Elytra elongata, basi attenuata. humeris fere nullis et tantummodo convexis, interstitio brevi, non elevato, stria dorsali integra, subrecta. Segmentis dorsalibus apice medio non gibbosis, sed densius albido-squamosis. Metasternum profundissime sulvatum. Segmentis ventralibus leviter deplanatis. — Long. 2,50 mill.

Brésil: Minas Geraes.

Cette espèce ne pourrait être confondue qu'avec la femelle de *Ar. restitus* Westw., mais tous les articles des antennes sont encore plus courts et le prothorax est beaucoup moins transversal.

Arbytodes boliviensis n. sp. — Praecedenti affinis, densius albido-squamosus. Caput magis elongatum, sulcis obliquis postice usque ad collum productis. Antennae elongatae, articulis 1 elongato, cylindrico, 2 quadrato, 3-8 longitudine crescentibus, 3 duplo et 8 fere triplo latitudine sua longioribus, 9 et 10 octo triplo, 11 dimidio longioribus, isto apice obtuso. Prothorax latitudine aequilongus, conicus, valde carinatus, sulco transcerso minus angulato. Elytra elongata, basi attenuata, lateribus obliqua, humeris fere nullis, interstitio brevi, plano, stria dorsali fere nulla. Segmentis dorsalibus apice medio minutissime gibbosis. Metasternum vix sulcatum Q. — Long. 2.70 mill.

Haute-Bolivie: Yuracaris.

Par l'absence de strie humérale aux élytres, cette espèce doit se ranger à côté de Ar. rubripennis et margaritaceus Raffr., dont elle diffère par la longueur proportionnellement plus grande du dernier article des antennes dans le même sexe, et l'aplatissement des épaules et de l'interstrie dorsal des élytres.

#### CATALOGUE

#### ARHYTODINI

RAFFRAY, Rev. d'Ent. 4890, p. 462.

#### ARHYTODES

Reitter, Verh. naturf. Ver. Brünn, XX, p. 209.

— Raffray, Rev. d'Ent. 4890, p. 463;

Ann. Soc. ent. Fr. 1894, p. 237.

Rhytus Westwood, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 126.

Oberthüri Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 4891, p. 327,

vestitus Westwood, Trans. Ent. Soc. Lond. 1870, p. 426; Thes. Ent. Oxon. pl. III, f. 7. — Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 4891, p. 328, pl. VI, f. 40.....

Brésil : Petropolis, Theresopolis, Blumenau, Nouveau-Friboury.

brevicornis n. sp. . . . . . . . . . . . . Brésil : Minas Geraes.

margaritaceus Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 1891,

p. 328, pl. VI, f. 44..... Venezuela : San Esteban.

rubripennis Raffray, loc. cit. p. 329, pl. VI, f. 12.

..... Venezuela : Caracas, San Esteban.

6

#### II. Sous-famille CLAVIGERINI.

## TABLEAU DES GENRES

Obs. — Le premier article des antennes étant généralement invisible, ne sera mentionné et décrit que lorsqu'il affectera une forme particulière, mais il sera toujours compté dans le nombre des articles.

- 1. (72). Tête toujours munie d'un cou, non engagée dans le prothorax.
- 2. (3). Abdomen composé de 4 segments dorsaux visibles en dessus. Antennes de 4 articles, 2° carré, 3° long, obconique, 4° beaucoup plus long, sinué latéralement et en dessous,

- arrondi et non tronqué au sommet. Prothorax cordiforme, étranglé et aplati sur les côtés... Gen. Anaclasiger Raffray.
- (2). Abdomen composé de 3 segments dorsaux visibles en dessus.
- 4. (9). Antennes de 2 articles, le premier invisible en dessus.
- 6. (5). Abdomen toujours plus ou moins excavé à la base, fasciculé au moins sur la marge latérale.
- 8. (7). Antennes très variables, mais toujours beaucoup plus longues que la tête n'est large, celle-ci cylindrique, allongée. Prothorax variable. Élytres simples. Excavation abdominale variable, toujours grande, marge latérale toujours plus ou moins interrompue et fasciculée en dedans.

  Gen. Articerus Dalman.
- 9. (4 et 34). Antennes de 3 articles.
- 41. (40). Tarses simples, sans lamelle.
- 12. (13). Prothorax et élytres carénés. Antennes épineuses, épaisses, courtes. avec une forte troncature terminale. Prothorax transversal. Marge des élytres sans fascicule

- de poils. Abdomen avec une cavité transversale portant huit pinceaux de poils, sa marge simple..... ..... Genre Theocerus Raffray.
- 13. 12. Prothorax sans carenes. Antennes non épineuses.
- 14. [31]. Deuxième article des antennes plus gros que la base du troisième.
- 15. (26). Troisième article des antennes sans sutures
- 16. (17). Abdomen portant extérieurement, à la marge latérale, des lobes additionnels provenant d'une expansion des segments ventraux. Deuxième article des antennes transversal, 3º long, en massue tronquée. Tête cylindrique, relativement courte. Élytres simples. Abdomen avec une forte excavation transversale à la base, sa marge fasciculée en dedans..... Gen. Amblycerus Raffray.
- 17. 16. Marge latérale de l'abdomen sans lobes additionnels externes.
- 18. (49). Antennes très comprimées, très longues, élargies vers le sommet, sans troncature. Tête courte, pas beaucoup plus longue que large. Élytres avec des vestiges de carinules à la base, leur angle externe postérieur largement tronqué et un peu fasciculé, leur marge postérieure avec plusieurs soies. Abdomen très profondément et transversalement excavé, avec, dans le fond, deux gros paquets de poils dorés, sa marge latérale simple, fasciculée en dedans. ..... Gen. Neocerus Wasmann.

- 19. (18). Antennes plus ou moins en massue et tronquées à l'extrémité.
- 20. (23). Antennes à dernier article plus ou moins conique, graduellement en massue.
- 21. (22). Tête très allongée, plutôt élargie et tronquée au sommet en avant. Antennes longues, peu épaisses. Élytres simples. Abdomen avec une large dépression simple, un peu transversale à la base, sa marge latérale simple, fasciculée en dedans...... Gen. Commatocerus Raffray.
- 21). Tête beaucoup plus courte, plus ou moins atténuée en avant. Antennes plus courtes et plus épaisses. Angle postérieur des élytres largement tronqué et parfois un peu fasciculé. Abdomen avec une large dépression basale

- simple, sa marge latérale parfois un peu étranglée ou dilatée à la base, avec deux forts fascicules superposés.... Gen. **Fustiger** Brendel.
- (20). Antennes longues, grêles, sinueuses, un peu comprimées, brusquement élargies au sommet et largement tronquées.
- 24. (25). Tête longue, atténuée en avant des yeux, un peu élargie et tronquée tout à fait en avant. Prothorax transversal. Élytres simples. Abdomen simplement déprimé à la base, sa marge latérale simple, à peine fasciculée......

  Gen. Apoderiger Wasmann.
- 25. [24]. Tête courte, large, non élargie au sommet. Prothorax transversal. Élytres simples. Abdomen profondément et transversalement excavé à la base, sa marge latérale un peu dilatée et relevée en carène fasciculée en dedans.....

  Gen. Trymalius Fairmaire.
- 26. (15). Troisième article des antennes avec des sutures révélant la fusion de plusieurs articles en un seul.
- 27. 28). Antennes assez courtes, sans troncature au sommet qui est arrondi, article 3 avec deux sutures. Tête courte spatuliforme, élargie en avant. Prothorax un peu transversal. Élytres avec l'angle postérieur externe largement tronqué et, près de lui, un long et mince pinceau de poils. Abdomen profondément et transversalement excavé, sa marge latérale relevée à la base, fortement fasciculée.....

  Gen. Hadrophorus Fairmaire.
- 28. (27.) Antennes avec une forte troncature au sommet.

- 31. (44). Deuxième article des antennes moins gros que la base du 3<sup>e</sup> qui est plus ou moins cylindrique et tronqué au sommet.
- 32. (33). Des yeux. Troisième article des antennes tout à fait cylindrique, également tronqué à la base et au sommet. Élytres à peu près carrés, avec des épaules bien marquées, leur angle postérieur externe largement tronqué. Excavation abdominale très transversale, peu profonde; marge latérale de l'abdomen un peu dilatée-arrondie en dedans et fasciculée...... Gen. Commatoceropsis Raffray.
- 33. (32). Pas d'yeux. Troisième article des antennes plus ou moins cylindrique, arrondi à la base. Élytres triangulaires, sans épaules, un peu fasciculés à l'extrémité, près de l'angle externe qui est tronqué-arrondi. Abdomen bien plus large à la base que les élytres, son excavation large, plus ou moins brièvement fasciculée de chaque côté, dans le fond, sa marge simple, fortement fasciculée......

..... Gen. Adranes Leconte.

- 34. (9 et 56). Antennes de 4 articles.
- (40). Marge postérieure des élytres et excavation abdominale sans fascicules; la marge latérale est seule un peu fasciculée.
- 36. (37). Deuxième article des antennes en forme de champignon, ovale à la base, terminé au sommet par une grande carène annulaire, 3° gros, conique, très peu plus large que long, 4° long, plus mince, presque fusiforme, tronqué au sommet. Abdomen avec une simple dépression transversale à la base et une petite impression stigmatiforme de chaque côté au fond, marge simple avec un petit pinceau de poils.......... Gen. Rhynchoclaviger Wasmann.
- 37. (36). Deuxième article des antennes simple.
- 38. (39). Marge de l'abdomen non interrompue, simplement un peu dilatée-arrondie et brièvement ciliée en dedans, une dépression transversale simple à la base de l'abdomen.

  Antennes assez grêles, un peu comprimées vers l'extrémité, 2° article transversal, 3° obconique, plus long que large, 4° très long. Angle postérieur externe des élytres fortement échancré..................... Gen. Articeropsis Wasmann.

- [35]. Abdomen et marge postérieure des élytres plus ou moins fasciculés.
- 41. (50). Prothorax et élytres sans côtes ciliées.
- 42. (45). Élytres fasciculés à l'angle externe postérieur qui est tronqué ou arrondi. Abdomen avec une grande excavation simple.

- 45. (42). Marge postérieure des élytres parfois anguleuse, toujours fasciculée vers le milieu. Excavation abdominale divisée en trois compartiments (le médian le plus large) par un processus fasciculé qui correspond au faisceau de poils de la marge des élytres.
- (46). Antennes longues. Tête élargie et arrondie ou tronquée en avant.

48. (49). Dernier article des antennes largement tronqué au sommet. Tête très longue, élargie et arrondie au sommet. Marge postérieure des élytres tronquée et fasciculée à peu près au milieu. Excavation abdominale transversale; les lobes qui la divisent en trois, sont peu éloignés de la marge et sont fasciculés, les cavités latérales sont très petites et la marge est un peu fasciculée......

..... Gen. Fustigeropsis Raffray.

- 49. (48). Dernier article des antennes arrondi au sommet avec une troncature terminale très petite. Tête moins allongée, tronquée carrément au sommet, Marge postérieure des élytres simplement fasciculée. Cavité abdominale médiane très grande, s'étendant en arrière, séparée des latérales qui sont petites, par un processus caréniforme cilié; marge à peine ciliée en dedans...... Gen. Thysdarius Fairmaire.
- 50. (41). Prothorax et élytres avec des côtes qui sont formées surtout par des soies rigides, plus ou moins couchées les unes sur les autres.
- 54. (52). Élytres non fascisculés à la marge postérieure, mais munis d'une simple soie. Excavation abdominale simple, non fasciculée. transversale, marge latérale fasciculée. Antennes variables, 2° article transversal, 3° conique, aussi long ou plus long que large. 4° plus ou moins court, régulièrement en massue et plus long, ou atténué vers le sommet et alors plus court, mais toujours plus long que le 3°. Prothorax plus long que large.... Gen. Radamellus n. gen.

53. (52). Élytres avec un faisceau de poils vers le milieu de de la marge postérieure, correspondant à un faisceau qui divise en trois la cavité abdominale, qui est grande, transversale; marge latérale ciliée. Articles des antennes 2 trans-

- versal, 3 obconique, pas plus long que large, 4 allongé, à peu près cylindrique.
- 54, (55). Prothorax plus long que large ou au moins carré. Tête petite, atténuée en avant.. Gen. Radamides Wasmann.
- 56. (34 et 69). Antennes de cinq articles.
- (63). Cinquième article des antennes beaucoup plus long que tous les autres réunis.
- 58. (62). Articles des antennes irréguliers.
- 60. (59 et 61). Articles des antennes 2 transversal, 3 en forme de champignon, mince à la base, avec une large carène an nulaire au sommet. 4 de même largeur que la base du 5 et appliqué contre elle, transversal, 5 assez long, tronqué à la base, appliqué contre le 4°, à peu près cylindrique, cependant très légèrement atténué vers le sommet. Tête sans carènes, triangulaire en avant. Prothorax légèrement transversal, tuberculé sur les côtés. Élytres avec des vestiges de fines carènes, leur angle postérieur externe tronqué. Abdomen avec une large dépression transversale simple, marge latérale assez étroite, relevée à la base, longuement et fortement fasciculée...... Gen. Fusifer Raffray.
- 61. (60). Articles des antennes 2 assez gros, transversal, 3 petit, transversalement noueux. 4 en champignon très court, très mince à la base et composé presque uniquement par un anneau circulaire, large, mince et tranchant. 5 long, fortement trigone, appliqué à la base contre le 4, mais ce-

pendant un peu plus étroit que lui, ses côtés fortement crénelés, un peu atténué vers le sommet. Tête fortement pluricarénée, ses bords tranchants, fortement crénelés, Prothorax pluricaréné, ses bords tranchants et fortement crénelés. Élytres avec de fines carènes. Abdomen comme dans le genre précédent...... Gen. Paussiger Wasmann.

- [58]. Articles des antennes simples.
- 63. (64). Articles des antennes 2 très transversal, 3 et 4 carrés. ce dernier peu distinct du 5° qui est très long, à peine en massue, droit. Tête courte, très atténuée, triangulaire en avant. Prothorax un peu transversal, Élytres simples, leur angle postérieur externe tronqué. Cavité abdominale grande. transversale ; près de la marge il y a un tubercule caréné; marge simple, fasciculée à la base.....

..... Gen. Commatocerodes Péringuey.

- 63). Articles des antennes 2 transversal. 3 allongé, grêle, subcylindrique, 4 brièvement obconique, 5 grand, subcylindrique, arrondi et un peu plus épais à la base. Tête longue, cylindrique, tronquée au sommet. Élytres simples, leur angle postérieur externe arrondi. Excavation abdominale très grande, terminée, en arrière, par une carène arquée : marge latérale très épaisse, carénée en dessus, sinuée en dehors, longuement et fortement ciliée à l'intérieur... ..... Gen. Syrraphesina Raffray.
- 65. (57 et 66). Cinquième article des antennes plus court que les deux précédents réunis, 2º très petit. 3º et 4º subégaux. brièvement ovoïdes, 3e plus long que chacun d'eux, subconique. Élytres simples. Abdomen avec une simple dépression transversale, tuberculée de chaque côté près de la marge qui est simple et peu fasciculée.....

..... Gen. Clavigerodes Raffray.

- 66. (65). Cinquième article des antennes plus court que le précédent.
- 67. (68). Antennes assez épaisses, 2° article transversal, 3° allongé en massue, 4º ovoïde, un peu plus court. 5º encore plus court, subobconique, largement tronqué au sommet. Élytres simples, leur angle postérieur externe arrondi. Abdomen transversalement impressionné à la base, très profondément excavé de chaque côté, sa marge latérale un peu-

- élargie à la base, presque gibbeuse et ciliée en dedans, un long pinceau de poils en dehors...... Gen. Bironia Raffray.
- 68. (67). Antennes plus grêles, plus longues. 2° article carré. 3° obconique, un peu plus long que large, 4° très long, presque cylindrique, 5° pas aussi long que la moitié du précédent, plus épais et très légèrement obconique. Marge postérieure des élytres un peu angulée et fasciculée près du milieu, en dehors. Abdomen avec une impression basale transversale profonde, mais très étroite, avec une cicatrice et une petite carène de chaque côté, sa marge latérale à peine fasciculée.......................... Gen. Braunsiella Raffray.
- 69. [56]. Antennes de 6 articles.
- 70. (71). Des yeux. Antennes assez courtes et épaisses, articles 2 et 3 petits, 4 et 5 subégaux, presque ovoïdes, 6 notablement plus long, presque cylindrique. Élytres simples, leur angle postérieur externe arrondi. Abdomen avec une impression transversale, assez étroite, plissé, et avec un petit tubercule près de la marge qui est simple et très peu fasciculée en dedans........... Gen. Clavigeropsis Raffray.
- (1). Tête sans cou, engagée dans le prothorax qui est toujours très transversal.
- 73. (74). Tête transversale, sans fossette antennaire inférieure; antennes assez longues, minces, de 4 articles, articles 2 et 3 petits, 4 long, cylindrique. Prothorax très transversal, très atténué en avant, arrondi, ses angles postérieurs aigus, embrassant les épaules des élytres; sur le prothorax et les élytres il y a des soies rigides couchées, disposées en séries caréniformes; marge postérieure

74. (73). — Tête ovale, présentant, en dessous, une fossette antennaire dans laquelle se loge au repos l'antenne qui est courte, biarticulée; le premier article invisible, le 2º assez longuement ovoïde, sans troncature terminale. Prothorax très transversal, plus étroit que les élytres, ses angles antérieurs et postérieurs carrés. Élytres simples. Abdomen entièrement et profondément excavé en dessus, émarginé à l'extrémité, avec une très longue et forte soie sur les côtés de l'émargination, qui forment un angle arrondi; marge latérale élargie à la base, atténuée à l'extrémité, fasciculée à la base, plus fortement à l'extrémité, avec un long et fin pinceau de poils extérieur.

..... Gen. Pseudacerus Raffray.

### TABLEAUX, NOTES ET DESCRIPTIONS.

## Tableau du genre Articerus

Tablean du geme Articelus	
A 2. Marge latérale de l'abdomen fortement interrompue, largement mais brièvement fasciculée en dedans.	
B 4. Antennes longues, droites, régulièrement et pro-	
gressivement en massue	Groupe L
B 3. Antennes longues, plus ou moins sinuées ou com-	
primées et assez brusquement en massue à l'extré- mité.	
C 2. Prothorax au moins aussi long que large, conique.	
cordiforme, ou en carré long	Groupe II.
C 4. Prothorax très transversal	Groupe III.
B 2. Antennes courtes, larges, comprimées, non atté- nuées à l'extrémité dont la troncature est aussi	
grande que la plus grande largeur de l'article	Groupe IV.
B 4. Antennes courtes, comprimées, plus ou moins ova-	
les, atténuées à l'extrémité dont la troncature est	
petite, bien plus étroite que la plus grande largeur	
de l'article	Groupe V.

A 1. Marge latérale de l'abdomen à peine visiblement in

Fustiger Smithi n. sp. - Elongatus, sat convexus, rufo-castaneus, totus, abdomine excepto, brevissime setosus, abdomine laevi, apice setis aliquot dispersis, longis et erectis ornato. Caput subcylindrieum, confluenter punctatum, anterius fronte triangulatim declive, pone oculos foreis duabus sulciformibus, Antennae elongatae, articulis 2 subquadrato, leviter transverso, 3 elongato, subcylindrico, perparum sinuato, apice sat abrupte incrassato et truncato. Prothorax confluenter punctatus, punctis majoribus, fere conicus, lateribus vix rotundatus, basi impressionne vix perspicua. Elutra vix perspicue basi disperse subrugoso-punctulata, latitudine sua longiora, ad basin attenuata, humeris rotundata, carinula dorsali tenui et medio abbreviata, Abdomen magnum, basi transversim et arcuatim profunde excavatum, disco valde convexum, postice subtruncatum, margine laterali basilata, fasciculata, valde et abrupte constricta, dein rotundatim ampliata et postice attenuata. Metasternum valde convexum, segmento ventrali ? longitudinaliter bicarinato, transversim depresso et utrinque nigroforeuto. Pedes simplices.

Anternae paulo magis elongatae et infra magis sinuatae. Metasternum magis convexum. Segmentis ventralibus deplanatis. — Long. 4,65 mill.

Antilles : St-Vincent.

Comparée à F. Fuchsi Brend., cette espèce a les antennes bien plus longues, plus sinueuses et plus brusquement élargies vers le sommet; la ponctuation de la tête et du prothorax est moins grande et moins occlée; les élytres sont plus longs; l'abdomen est plus fortement étranglé sur les côtés à la base.

Fustigeropsis simplex n. sp. — Elongatus, parum converus, rufus, capite, prothorace et antennis minute alutaceis et setis aliquot dispersis ornatis, elytris minutissime et disperse granulosis et breviter setosis, cum setis aliquot longioribus dispersis, abdomine laevi, pubescentia magis dispersa, brevi. Caput elongatum, subcylindricum, fronte leviter crassius et rotundatum, pone oculos foveis duabus. Antennae elongatae, articulis 2 quadrato 3 obconico, latitudine aequilongo, 4 valde elongato, recto, gradatim et leviter ad apicem incrassato, summo truncato. Prothorax sat convexus, latitudine aequilongus, leviter cordatus, basi vix

perspicue impressus. Elytra latitudine sua longiora, ad basin attenuata, humeris notatis, impressione intra humeros brevissima, margine postica sinuata, medio emarginata et late breviter fasciculata. Abdomen magnum, convexum, lateribus leviter rotundatum, antice posticeque subaequaliter attenuatum, basi excavatione profunda transversa, simplici, ntrinque tuberculo truncato, fasciculato definita. Metasternum convexum, postice leviter impressum. Pedes simplices, tibiis rectis \$\varrho\$.—Long. 2,40 mill.

Afrique du Sud: Orange River Colony, Bothaville.

Cette espèce ressemble beaucoup à *F. Peringuegi* Raffr., mais les antennes sont encore un peu plus longues; l'excavation de la base de l'abdomen est profonde, mais étroite, son bord postérieur est simplement droit au lieu d'être trilobé comme dans *Peringuegi*.

## Radamellus n. gen.

Ce nouveau genre dont j'avais déjà fait pressentir la nécessité (Ann. Soc. ent. Fr. 1899, p. 525), est très voisin de Radama Raffr., et Radamides Wasmann, dont il est cependant indispensable de le séparer. Comme eux, il a 4 articles aux antennes; le premier, comme toujours invisible, le 2º transversale, le 3º conique, un peu variable de longueur, a peine plus large que long chez minutus Raffr., notablement plus long chez spinipennis Raffr., le 4º grand, plus ou moins obconique; mais le caractère réellement différentiel réside dans la conformation de l'abdomen, différente dans ces trois genres.

Dans Radama, l'excavation de la base est transversale, allant d'une marge à l'autre, profonde, mais étroite et simple, c'est-à-dire sans faisceaux de poils; la marge postérieure des élytres est presque entièrement garnie, sur toute sa largeur, d'un épais faisceau de poils courts, qui remplit presque complètement l'excavation abdominale; la marge latérale n'est pas, ou à peine fasciculée.

Dans Radamides, l'excavation abdominale est divisée par deux tubercules fasciculés en trois compartiments, dont le médian beaucoup plus grand; les tubercules fasciculés de l'abdomen correspondent à un très fort fascicule de la marge postérieure des élytres qui n'est pas autrement fasciculée; la marge latérale est fortement fasciculée.

Dans Radamellus, l'excavation abdominale est très grande, allant d'une marge à l'autre et plus large, simple, parfois avec un très petit pinceau de poils près de la marge laterale; la marge postérieure des élytres n'est pas fasciculée et présente seulement une épine variable. formée évidemment de poils agglutinés; la marge latérale abdominale est très fortement fasciculée.

La forme des cavités abdominales, de leurs armatures et de leurs faisceaux de poils, prend une très grande importance chez les Clavigérides. Elle modifie considérablement leur facies et elle est d'un grand secours pour caractériser des genres très dissemblables dans leur ensemble et dans leur aspect, mais en réalité très voisins les uns des autres.

# Tableau du genre Claviger

A	2.	Base de l'abdomen avec une impression transver-		
		sale assez étroite et, au milieu, une forte impres-		
		sion longitudinalement ovale, profonde et très		
		distincte.		
B	2.	Antennes épaisses, le 3° article n'étant jamais plus		
		de trois fois plus long que large.		
C	5.	Articles des antennes 3-5 transversaux	Groupe	I.
0	4.	Articles des antennes 3 aussi long que large, 4 et		
		5 transversaux	Groupe	II.
C	3.	Articles des antennes 3 plus long que large, 4 pres-		
		que carré, 5 transversal	Groupe	Ш.
C	2.	Articles des antennes 3 et 4 plus longs que larges,		
		5 transversal	Groupe	IV.
C	1.	Articles des antennes 3 et 4 plus longs que larges.		
		5 carré	Groupe	V.
B	1.	Antennes bien plus longues et plus grêles, le 3° ar-		
		ticle étant toujours au moins quatre fois plus long		
		que large	Groupe	VI.
A	1.	Base de l'abdomen largement déprimée, sans im-		
		pression longitudinale ovale médiane, mais avec		
		deux fortes strioles marquant l'emplacement de		
		l'impression qui a disparu ; antennes assez longues		
		et grêles	Groupe	VII.

Claviger Montandoni n. sp. — Cette espèce est extrèmement voisine de Cl. Emgei Reitt., avec laquelle il serait très facile de la confondre, mais elle en diffère par la proportion des articles des antennes. qu'une mensuration micrométrique, comparative pour ces deux espèces, fera ressortir.

Ces dimensions sont exprimées en cinquantièmes de millimètre.

4

Cl. Em	gei	C	l. Monta	indoni	
Article 3 .	22				17
- 4.	12				40
- 5.	10				8
<b>→</b> 6.	20				17
Lang totale	64				52

Chez Cl. Montandoni l'antenne est donc notablement plus courte, l'article 3 est proportionnellement plus court, le 5° presque transversal, tandis qu'il est notablement plus long que large chez Cl. Emgei; l'impression médiane de la base de l'abdomen est plus large, plus superficielle, les sillons qui la limitent de chaque côté sont bien moins accentués.

Roumanie: Plainesci.

Je suis heureux de le dédier à M. Montandon qui l'a découvert et auguel je le dois.

#### CATALOGUE.

#### CLAVIGERINI

(Voyez syn. Ann. Soc. ent. Fr. 1903, p. 488).

#### ANACLASIGER

RAFFRAY, Rev. d'Ent. 1890, p. 163.

	AY, loc. cit. p. 216, pl. III, ff. 21,	411
21'		Singapore.
1	DISARTHRICERUS	

RAFFRAY, Rev. d'Ent. 4895, p. 78.

integer RAFFRAY, loc. cit. p. 78, pl. H, f. 40....... Singapore.

### MASTIGER

Motschulsky, Bull. Nat. Mosc. 4854, IV, p. 501.

Raffray, Rev. d'Ent. 4890, p. 464.

abruptus Motschulsky, loc. cit. p. 504..... Calcutta,

brevicornis.	RAFFRAY.	Rev. d'Ent. 4890, p. 246.	
pl. III, f. 22			Singapore.

#### ARTICERUS

DALMAN, Sv. Vet. Ak. Handl. 1825, p. 398. — Норе, Trans. Ent. Soc. Lond. IV, 4845, p. 406. — Schaufuss, Ann. Mus. Civ. Gen. XVIII. 4882, p. 476. — Raffray, Rev. d'Ent. 4890, pp. 464, 466.

## Groupe I.

Selysi Schaufuss, Nunq. ot. III, p. 481; Am	n. Mus.
Civ. Gen. 1882, p. 189	ıstralie : Swan River,
hamatipes Raffray, Proc. Linn. Soc. N. S.	Wales,
4900, р. 241, pl. X, f. 40 Аг	ustralie : Swan River.
cultripes Raffray, Proc. Linn. Soc. N. S.	Wales,
p. 243, pl. X, f. 23	stralie : Bridge Town.
bipartitus Raffray, Proc. Linn. Soc. N. S.	Wales,
p. 242 Au	ıstralie : Swan River.

# Groupe II.

Fortnum! Hope, Trans. Ent. Soc. Lond. 1845. p. 106.
pl. VII, ff. 4, 4a. — Lacordaire, Gen. Col. II, p. 182.
- Schaufuss, Ann. Mus. Civ. Gen. p. 482, ff. a-d.
Australie : Adélaide.
Q Odewahni Pascoe, Journ. Proc. Ent. Soc. Lond. V, 4866, p. XV. (Gawler).

Duboulayi Waterhouse, Ent. Monthl. Mag. I, 1865.	
p. 149 et fig Australie: Swan River,	Victoria.
Deyrollei Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1874, p. 514.	Australie.

f. 1...... Australie: Swan River.

# Groupe III.

nitidicollis Raffray, Ann. Mus. Nat. Hung. Budapest, 1903, p. 97, pl. II, f. 5......... Australie: Mont. Victoria.

Kingius Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 4874, p. 512.
Australie occidentale.
gibbulus Sharp, loc. cit. p. 513 Australie : Champion Bay.
spinifer Sharp, loc. cit. p. 513 Australie nord-ouest.
Groupe IV.
Westwoodi Sharp, loc. cit. p. 510 Australie occidentale.
curvicornis Westwoon, Trans. Ent. Soc. Lond. 1856,
p. 275, pl. XVII, ff. 2a-d. — Raffray, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, 4900, pl. X, f. 24
Australie: Melbourne, New South Wales.
falcatus Raffray, loc. cit. p. 244, pl. X, f. 25
Groupe V.
p. 276, pl. XVII, f. 4
Pascoeus Sharp, loc. cit. 1874, p. 541 Australie occidentale.
angusticollis Westwood, loc. cit. 4856, p. 275,
pl. XVII, f. 4
setipes Westwood, loc. cit. p. 276, pl. XVII, f. 3  Australie: Melbourne.
Oxon. pl. IV, f. 2. — Sharp, loc. cit. 4874, p. 510.
Australie occidentale : Swan River.
brevipes Sharp, loc. cit. 4874, p. 512. Australie: Champion Bay.
asper Blackburn, Trans. Roy. Soc. S. Austr. 1889.
p. 138
Groupe VI.
aurifluus Schaufess, Ann. Mus. Civ. Gen. XVIII,
4882, p. 194
24 ELASMATUS
Raffray, Ann. Mus. Nat. Hung. Budapest, 1903, p. 97.
lamellipes Raffray, loc. cit. p. 98, pl. II, f. 3 Nouvelle-Guinée.

4

#### THEOCERUS

RAFFRAY, Ann. Soc.	ent. Fr.	1896, 1	). 280.
--------------------	----------	---------	---------

crenutatus Raffray, loc. cit. p. 280, pl. XI, f. 4...

Madagascar : Imérina.

#### AMBLYCERUS

RAFFRAY, Rev. d'Ent. 1895, p. 79.

reticulatus Raffray, loc. cit. p. 79, pl. II, J. 41.... Singapore.

#### NEOCERUS

Wasmann, Deuts. Ent. Zeits. 4893, p. 405.

compressicornis Wasmann, loc. cit. p. 103, pl. V.

#### COMMATOCERUS

RAFFRAY, Rev. d'Ent. 1882, p. 1; 1890, pp. 164, 166.

elegantulus Raffray, loc. cit. p. 1, pl. I, f. 2.....

Abyssinie: Massaoua.

#### FUSTIGER

Brendel, Proc. Ent. Soc. Phil. 1866, p. 189. — Schaufuss, Ann. Mus. Civ. Gen. 1882, p. 197.

- Raffray, Rev. d'Ent. 1890, pp. 164, 166.

Commatocerinus Wasm. Deuts. Ent. Zeits. 1897, p. 260.

Hetschkoi Reitter, Deuts. Ent. Zeits. XXXII, 1888,

p. 225. . . . . Brésil : Blumenau.

Reitteri Wasmann. Deuts. Ent. Zeits. 1893, p. 104.

brasiliensis Westwood, Trans. Ent. Soc. Lond.

1856, p. 277, pl. XVII, f. S...... Brésil : Nouveau-Fribourg.

amazonicus Westwood, loc. cit. 1869. p. 319; Thes.

Ent. Oxon, pl. IV. & 1. — Schaufuss, Ann. Mus.

Fuchsi Brendel. Proc. Ent. Soc. Phil. 4866, p. 490; Bull. Un. Iowa, I, 4890, p. 222, pl. VI, f. 6.— Schaufuss, Ann. Mus. Civ. Gen. XVIII, 4882, p. 499.  Amér. septentrionale: Tennessee, Arizona.
catifornicus Brendel, Ent. Amer. V. 1889. p. 197;
Bull, Un. Iowa, I. 1890, p. 223 Californie
festivus Schaufuss, Nunq. ot. III, p. 481; Ann. Mus.
Civ. Gen. XVIII, 4882, p. 201 et fig Amazones
testudineus Schaufuss, Ann. Mus. Civ. Gen. 1882.
p. 499 Pérou : Pozuzu
Fauveli Raffray, Bull. Soc. ent. Fr. 1898, p. 287
Haute Bolivie : Yuracaris
Ranavalonae Wasmann (Commutocerinus), Deuts.
Ent. Zeits. 4897, p. 261. pl. I, f. 1 Ste-Marie de Madagascar
laevis Raffray (Commatocerinus). Ann. Soc. ent. Fr.
1899, p. 522 Madagascar : Suberbieville

# APODERIGER

Wasmann, Deuts. Ent. Zeits. 1897, p. 263.

cervinus Wasmann, loc. cit. p. 264, pl. I. ff. 4, 4a...

...... Madagascar : Imérina.

1

19

#### TRYMALIUS

Fairmaire, Bull. Soc. ent. Fr. 1898, p. 345, Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 1899, p. 524.

fovcicollis Fairmaire, loc. cit. p. 346. Madagascar: Suberbieville.

#### HADROPHORUS

Fairmaire, Bull. Soc. ent. Fr. 1898, p. 342. — Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 1899, p. 522.

humerosus Fairmaire, Bull. Soc. ent. Fr. 1898, p. 343....

Madagascar: Suberbieville.

# NOVOFUSTIGER

Wasmann, Deuts. Ent. Zeits, 4893, p. 106.
Raffrayi Wasmann, loc. cit. p. 106, pl. V, f. 7
1
PSEUDOFUSTIGER
Reitter, Deuts, Ent. Zeits, 1884, p. 167,
**Stricti cornis** Reit. (Articerus), loc. cit. 1883, p. 33.  — Raffr. Rev. d'Ent. 1890, pl. III. ff. 24. 24'
Antilles : S'-Thomas.
1 COMMATOCEROPSIS
RAFFRAY, Rev. d'Ent. 1890, pp. 164, 167.
madagascariensis Raffray (Commutocerus), loc.
cit. 1882. p. 230. pl. IV. f. 1. Madagascar : Côte est, Fantoumizi.
ADRANES
Leconte, Bost. Journ. Nat. Hist. VI, 4850, p. 83. — Brendel.
Bull. Un. Iowa, I, 1890, p. 220. — RAFFRAY,
Rev. d'Ent. 1890, pp. 464, 167,
coecus Lebonte, loc. cit. p. 83. — Brendel, loc. cit.
p. 220, pl. 1, ff. 4, 5
Lecontei Brendel. Proc. Ent. Soc. Phil. 1865, p. 255;
Bull. Un. Iowa, I, 1890, p. 221. pl. VI, ff. 1. 2
Amér. septentrionale : vallée du Mississipi.
Taylori Wickham. Canad. Ent. XXX, 1904, p. 27
Californie méridionale.
pacificus Wickham, Canad. Ent. XXX, 1901, p. 26.
Amér. septentrionale : Cañon City.
RYNCHOCLAVIGER
Wasmann, Stett. Ent. Zeit, 1891, p. 4,
Cremastogastris Wasmann, loc. cit. p. 5, pl. 1.
ff. 1-5 Madagascar : Imérina.
1

#### ARTICEROPSIS

ARTICERUPSIS
Wasmann, Wien. Ent. Zeit. XII, 4893, p. 257.
Sikorae Wasmann, loc. cit. p. 257
ARTICERONOMUS
Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 4897, p. 268.
nitidus Raffray, loc. cit. p. 269 Madagascar : Diego Suarez
DIARTIGER
Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 4883, p. 329. — Raffray, Rev. d'Ent. 4890, p. 465.
fossulatus Sharp, loc. cit. p. 330. — Waterhouse. Aid Ident. Ins. pl. 446. — Raffray, Rev. d'Ent. 1890, pl. II, ff. 23, 23'
spinipes Sharp, loc. cit. p. 331. — Waterhouse, loc.  cit. pl. 446
FUSTIGERODES
Reitter, Deuts. Ent. Zeits. 4884, p. 468. — Raffray, Rev. d'Ent. 4890, pp. 464, 467; Trans. S. Afr. Phil. Soc. 4897, p. 447. — Wasmann, Wien. Ent. Zeit. 4898, p. 96.
Novoclaviger Wasmann, Krit. Verz. myrm. term. Arthr. 4894. p. 244; Wien. Ent. Zeit. 1897, p. 202. — Raffray, Trans. S. Afr. Phil. Soc. 4897, p. 119.
majusculus Péringuey, Trans. S. Afr. Phil. Soc. 4888, p. 84. — Raffray, Trans. S. Afr. Phil. Soc. 4897, p. 448, pl. XVII, f. 7 Le Cap: Cape Town, Newlands
Braunsi Wasmann, Wien. Ent. Zeit. 1897. p. 201 Le Cap : Port Elizabeth
capensis         Péringuey, Trans. S. Afr. Phil. Soc. 1888,           p. 84. — Raffray, Trans. S. Afr. Phil. Soc. 1897,           p. 417; Rev. d'Ent. 1890, pl. III, ff. 19, 19'           Le Cap: Graham's Town

Wroughtoni Wasmann (Novoclaviger), Krit. Verz.
myrm. term. Arthr. p. 215. — Raffer. Trans. S. Afr.
Phil. Soc. 4897, p. 419, pl. XVII. f. 6... Natal.? Delagoa Bay.
auriculatus Wasmann, Wien. Ent. Zeit. 4898, p. 98.
Le Cap: Port Elizabeth.

#### ARTICERODES

RAFFRAY, Rev. d'Ent. 1890, p. 164.

syriacus Sauley, Ann. Soc. ent. Fr. 1865, p. 45; Spec.
I. p. 22. — Raffray, Rev. d'Ent. 1890, pl. III, ff. 20,
20'... Syrie: Caïffa, St-Jean d'Acre, Saida. Abyssinie: Enderta.
ponticus Sharp, L'Abeille (Nouv. et faits), 1878, p. 62.
(Mésopotamie).

bucharicus Reitter, Deuts. Ent. Zeits. 1900. p. 30. (Bokhara, Karatak).

#### FUSTIGEROPSIS

Raffray, Rev. d'Ent. 1890, pp. 164, 167; Trans. S. Afr. Phil. Soc. 1897, p. 116.

#### THYSDARIUS

FAIRMAIRE, Bull. Soc. ent. Fr. 1904, p. 117.

**Thysdrus** | Fairmaire, loc. cit. 1898, p. 344. — Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 1899, p. 523.

Perrieri Fairmaire, loc. cit. p. 345. Madagascar : Suberbieville.
gracilis Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 1899. p. 523...
Madagascar : Suberbieville.

9

#### PAUSSIGER

(587)

Wasmann, Wien. Ent. Zeit. 1893, p. 257.

Timicornis Wasmann, loc. cit. p. 257; Deuts. Ent.
Zeits. 4887, pl. I. f. 5. — Raffray, Ann. Soc. ent.
Fr. 4896, pl. XI. f. 4, 4'.... Madagascar: Amparafararantsir.

#### COMMATOCERODES

Péringuey, Trans. S. Afr. Phil. Soc. 4888, p. 85. — Raffray, Rev. d'Ent. 4890, pp. 464, 468; Trans. S. Afr. Phil. Soc. 4897, p. 420.

Raffrayi Péringuey, loc. cit. 1888, p. 86, pl. I, f. 3.

— Raffray, Rev. d'Ent. 1890, pl. III, ff. 26, 26';
Trans. S. Afr. Phil. Soc. 1897, p. 120......

Transvaal: Potchefstrom, Zoutpansberg.

#### SYRRAPHESINA

RAFFRAY, Ann. Mus. Nat. Hung. Budapest, 1903, p. 100.

pticiventris Raffray, loc. cit. p. 100, pl. II, f. 1. Nouvelle-Guinée.

#### CLAVIGERODES

Raffray, Rev. Mag. Zool. 1877, p. 279; Rev. d'Ent. 1882. p. 2; 1890, p. 165.

abyssinicus Raffray, Rev. Mag. Zool. 4877, p. 279, pl. III, ff. 44, 42; Rev. d'Ent. 4882, pl. I, f. 4; 4890, p. III, ff. 29, 29'. — Schaufuss, Ann. Mus. Civ. Gen. XVIII, 4882, p. 38...... Abyssinie: Hamacen, Enderta. Mareb.

#### MIROCLAVIGER

Wasmann, Deuts. Ent. Zeits. 1893, p. 108.

cervicornis Wasmann, loc. cit. p. 108, pl. V, f. 19.

Madagascar ; Andrangoloaka.

Alluaudi Raffray, Ann. Soc. ent. Fr. 1897, p. 270.

..... Madagascar : Diego Suarez.

#### FUSIFER

RAFFRAY, Ann. Soc. ent. Fr. 4899, p. 524.

## RADAMELLUS

#### RADAMA

RAFFRAY, Rev. d'Ent. 1883, p. 64.

#### RADAMIDES

Wasmann, Deuts. Ent. Zeits. 4897, p. 261.

trifoveolatus Wasmann, loc. cit. p. 262, pl. I. ff. 2,

2ª..... Ste-Marie de Madagascar.

sulcicollis Fairmaire, Bull. Soc. ent. Fr. 4899, p. 316.

..... Madayascar : Betsiboka.

#### IMERINA

RAFFRAY, Ann. Soc. ent. Fr. 1896, p. 281.

breviceps Raffray, loc. cit. p. 282, pl. XI, f. 3.... Madagascar.
Wasmanni Raffray, loc. cit. p. 282, pl. XI, f. 2.. Madagascar.

2)

9

:3

#### BIRONIA

RAFFRAY, Ann. Mus. Nat. Hung. Budapest, 4903, p. 99.

cavernosa Raffray, loc. cit. p. 99, pl. II, f. 2.. Nouvelle-Guinée.

1

#### BRAUNSIELLA

RAFFRAY, Bull. Soc. ent. Fr. 1904, p. 201.

publicentris Raffray, loc. cit. p. 202 et fig......

..... Le Cap : Willowmore.

#### CLAVIGEROPSIS

RAFFRAY, Rev. d'Ent. 4882, p. 3; 1890, p. 465.

formicaria Raffray, loc. cit. 4882, p. 4, pl. I, f. 5; 4890, pl. III, ff. 28, 28'....

....... Abyssinie : Enderta, Sloa, Mareub, Haramat, Keren.

#### CLAVIGER

Preyssler, Verz. Böhm. Ins. 4790, p. 68. — Müller, Germ. Mag. 1848, p. 72. — Aubé, Psel. Mon. 4833, p. 64; Ann. Soc. ent. Fr. 4844, p. 454. — Jacq. Duval. Gen. Col. Eur. I, p. 428. — Thomson, Skand. Col. III, p. 240. — Sauley, Spec. I, p. 24. — Reitter, Naturg. Ins. Deutsch. III, p. 2. — Raffray, Rev. d'Ent. 4890, pp. 465, 468. — Ganglbauer, Käf. Mitteleur. II, 4895, p. 852.

Clavifer Laporte, Ét. Ent. 4835, p. 437; Hist. nat. Ins. I, p. 206.

# Groupe 1.

Caucase.

ibericus Motschulsky, Bull. Nat. Mosc. 1844, p. 823; 1854, IV, p. 502.....

Tiflis.

pyrenaeus Raffray, Rev. d'Ent. 1887, p. 49.....

Basses-Pyrénées : St-Jean-de-Luz.

testaceus Preyssler, Verz. Böhm. Ins. 4790, p. 68, pl. III, f. V. — Jaco. Duval, Gen. Col. Eur. I, pl.

Caucase

40, f. 197. - SAULCY, Spec. I, p. 26. - REITTER, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, p. 448, pl. XIX, f. 2. - GANGLBAUER, Käf. Mittel, II, 1895, p. 854..... ..... Allemagne, Finlande, Pologne, Hongrie, Alpes Lombardes, foreolatus Müller, Germ. Mag. III, 4848, p. 75. --AUBÉ, Psel. Mon. 1833, p. 64, pl. 94, f. 1; Ann. Soc. ent. Fr. 1844, p. 453. — Thomson, Skand. Col. III. D. 241. (Nymphe) Müller, Germ. Mag. III, p. 108, pl. II. f. 15. (Larve) L. HEYDEN, Jahrb. Nass. Ver. Naturg. XXIX-XXX, 1876 et 1877, p. 201. Perezi Saulcy, Petit. nouv. ent. 1875, p. 539. — REITTER, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, p. 448.... ..... Espagne : Guadarrama. Groupe II. nitidus Hampe, Wien. Ent. Monats. VII, 1863, p. 287. SAULCY, Spec. I, p. 27. — REITTER, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, p. 448, pl. XIX, f. 3. - GANGLBAUER. Käf. Mittel. II, 1895, p. 854...... Croatie, Bosnie, Serbie, carniolicus Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien. 1881, p. 448. (Carniole). Kaufmanni Reitter. Wien. Ent. Zeit. 1894, p. 299. (Herzégovine : Sablanica). barbarus Bedel, Bull. Soc. ent. Fr. 1884, p. cxxiv. ..... Algérie : Mahadid, Grande Kabylie. Brucki Sauley, Spec. I. p. 27. - Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, p. 448, pl. XIX, f. 4...... ..... Pyrénées-Orientales : Le Vernet. Piochardi Sauley, loc. cit. p. 28. - Reitter, loc. cit. p. 448, pl. XIX, f. 5..... Portugal: Branuelas. Jusitanicus Saulcy, loc. cit. p. 29. - Reitter, loc. cit. p. 448, pl. XIX, f. 6..... Portugal: Sierra de Jeres. Groupe III. Duvali Saulcy, Ann. Soc. ent. Fr. 1863, p. 33; Spec. I, p. 30. — Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 4881. p. 449, pl. XIX, f. 7..... France méridionale

Justinac Reitter, Deuts. Ent. Zeits, 1887, p. 264.

Antoniae Reitter, Wien. Ent. Zeit. 1893, p. 220
Arménie : Ordubad.
Katharinae Escherich, Wien. Eut. Zeit. 1897, p. 231.
Syrie : Brousse.
Groupe 1V.
Pouzaui Saulcy, Ann. Soc. ent. Fr. 1862, p. 288;
Spec. 1, p. 32. — Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien,
1881, p. 449, pl. XIX, f. 8
France méridionale : Collioure, Port-Vendres, Banyuls-sur-Mer.
Sauleyi Ch. Brisout, Ann. Soc. ent. Fr. 4866,
p. 363. — Saulcy, Spec. I, p. 31. — Reitter. Verh.
z. b. Ges. Wien. 1881, p. 449 Espagne: Escorial.
caspicus Reitter, Verh. z. b. Ges. Vien, 4881, p. 449,
pl. XIX, f. 9 Mer Caspienne: Weri.
Araxidis Reitter, Wien. Ent. Zeit. 1890, p. 490
Arménie : Ordubad.
ottomanus Escherich, Wien. Ent. Zeit. 4897, p. 231. Syrie: Brousse.
Groupe V.
Groupe V.
Groupe V.  Ocrtzeni Reitter, Deuts. Ent. Zeits. 1885, p. 372 Re de Crète.
Groupe V.  Octzeni Reitter, Deuts. Ent. Zeits. 1885, p. 372 Re de Crète.  colchieus Motschulsky, Nouv. Mém. Mosc. V, p. 444, pl. XVI, f. A. — Aubé, Ann. Soc. ent. Fr. 4844, p. 454. — Saulcy, Spec. I, p. 34. — Reitter, Verh.
Groupe V.  Octzeni Reitter, Deuts. Ent. Zeits. 1885, p. 372 Re de Crète.  colchieus Motschulsky, Nouv. Mém. Mosc. V, p. 444, pl. XVI, f. A. — Aubé, Ann. Soc. ent. Fr. 4844,
Groupe V.  Octzeni Reitter, Deuts. Ent. Zeits. 1885, p. 372 Re de Crète.  colchieus Motschulsky, Nouv. Mém. Mosc. V, p. 444, pl. XVI, f. A. — Aubé, Ann. Soc. ent. Fr. 4844, p. 454. — Saulcy, Spec. I, p. 34. — Reitter, Verh.
Groupe V,  Octizeni Reitter, Deuts. Ent. Zeits. 1885, p. 372 Re de Crète.  colchieus Motschulsky, Nouv. Mém. Mosc. V, p. 444, pl. XVI, f. A. — Aubé, Ann. Soc. ent. Fr. 4844, p. 454. — Saulcy, Spec. I, p. 34. — Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 4881, p. 449. pl. XIX, f. 40 Caucase: Tiflis.
Groupe V,  Octizeni Reitter, Deuts. Ent. Zeits. 1885, p. 372 Re de Crète.  colchieus Motschulsky, Nouv. Mém. Mosc. V, p. 444, pl. XVI, f. A. — Aubé, Ann. Soc. ent. Fr. 1844, p. 454. — Saulcy, Spec. I, p. 34. — Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, p. 449. pl. XIX, f. 40 Caucase: Tiflis.  bimaculatus Motschulsky, Bull. Nat. Mosc. 4844,
Groupe V.  Octzeni Reitter, Deuts. Ent. Zeits. 1885, p. 372 Re de Crète.  colchicus Motschulsky, Nouv. Mém. Mosc. V, p. 414, pl. XVI, f. A. — Aubé, Ann. Soc. ent. Fr. 4844, p. 454. — Saulcy, Spec. I, p. 34. — Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 4881, p. 449. pl. XIX, f. 40 Caucase: Tiflis.  bimaculatus Motschulsky, Bull. Nat. Mosc. 4844, p. 823; 1845, p. 46.
Groupe V.  Octzeni Reitter, Deuts. Ent. Zeits. 1885, p. 372 Re de Crète.  colchicus Motschulsky, Nouv. Mém. Mosc. V, p. 414, pl. XVI, f. A. — Aubé, Ann. Soc. ent. Fr. 4844, p. 454. — Saulcy, Spec. I, p. 34. — Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 4881, p. 449. pl. XIX, f. 40 Caucase: Tiflis. bimaculatus Motschulsky, Bull. Nat. Mosc. 4844, p. 823; 1845, p. 46.  olympicus Escherich, Wien. Ent. Zeit. 4897, p. 232.
Groupe V.  Octioni Reitter, Deuts. Ent. Zeits. 1885, p. 372 Re de Crète.  colchicus Motschulsky, Nouv. Mém. Mosc. V, p. 444, pl. XVI, f. A. — Aubé, Ann. Soc. ent. Fr. 4844, p. 154. — Saulcy, Spec. I, p. 34. — Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, p. 449. pl. XIX, f. 40 Caucase: Tiftis.  bimaculatus Motschulsky, Bull. Nat. Mosc. 4844, p. 823; 1845, p. 46.  olympicus Escherich, Wien. Ent. Zeit. 1897, p. 232.  Syrie: Brousse.  nebrodensis Ragusa. Bull. Soc. Ent. Ital. III. p. 495.
Groupe V.  Octioni Reitter, Deuts. Ent. Zeits. 1885, p. 372 Re de Crète.  Colchicus Motschulsky, Nouv. Mém. Mosc. V, p. 414, pl. XVI, f. A. — Aubé, Ann. Soc. ent. Fr. 4844, p. 154. — Saulcy, Spec. I, p. 31. — Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, p. 449. pl. XIX, f. 40 Caucase: Tiftis.  bimaculatus Motschulsky, Bull. Nat. Mosc. 4844, p. 823; 1845, p. 46.  Olympicus Escherich, Wien. Ent. Zeit. 1897, p. 232.  Syrie: Brousse.
Groupe V.  Octizeni Reitter, Deuts. Ent. Zeits. 1885, p. 372 Re de Crète.  colchicus Motschulsky, Nouv. Mém. Mosc. V, p. 414, pl. XVI, f. A. — Aubé, Ann. Soc. ent. Fr. 1844, p. 154. — Saulcy, Spec. I, p. 31. — Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, p. 449. pl. XIX, f. 10 Caucase: Tiflis.  bimaculatus Motschulsky, Bull. Nat. Mosc. 4844, p. 823; 1845, p. 46.  olympicus Escherich, Wien. Ent. Zeit. 1897, p. 232.  ——————————————————————————————————
Groupe V.  Octizeni Reitter, Deuts. Ent. Zeits. 1885, p. 372 Re de Crète.  colchicus Motschulsky, Nouv. Mém. Mosc. V, p. 414, pl. XVI, f. A. — Aubé, Ann. Soc. ent. Fr. 1844, p. 154. — Saulcy, Spec. I, p. 31. — Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, p. 449. pl. XIX, f. 10 Caucase: Tiflis.  bimaculatus Motschulsky, Bull. Nat. Mosc. 1844, p. 823; 1845, p. 46.  olympicus Escherich, Wien. Ent. Zeit. 1897, p. 232.  — Syrie: Brousse.  nebrodensis Ragusa. Bull. Soc. Ent. Ital. III. p. 195. — Saulcy, Spec. 1, p. 33. — Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, p. 449
Groupe V.  Octizeni Reitter, Deuts. Ent. Zeits. 1885, p. 372 Re de Crète.  colchicus Motschulsky, Nouv. Mém. Mosc. V, p. 414, pl. XVI, f. A. — Aubé, Ann. Soc. ent. Fr. 1844, p. 154. — Saulcy, Spec. I, p. 31. — Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 1881, p. 449. pl. XIX, f. 10 Caucase: Tiflis.  bimaculatus Motschulsky, Bull. Nat. Mosc. 4844, p. 823; 1845, p. 46.  olympicus Escherich, Wien. Ent. Zeit. 1897, p. 232.  ——————————————————————————————————
Groupe V.  Octizeni Reitter, Deuts. Ent. Zeits. 1885, p. 372 Re de Crète.  colchicus Motschulsky, Nouv. Mém. Mosc. V, p. 414, pl. XVI, f. A. — Aubé, Ann. Soc. ent. Fr. 4844, p. 154. — Saulcy, Spec. I, p. 31. — Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 4881, p. 449. pl. XIX, f. 40 Caucase: Tiflis.  bimachalus Motschulsky, Bull. Nat. Mosc. 4844, p. 823; 1845, p. 46.  olympicus Escherich, Wien. Ent. Zeit. 1897, p. 232.  Syrie: Brousse.  nebrodensis Ragusa. Bull. Soc. Ent. Ital. III. p. 495. — Saulcy, Spec. I, p. 33. — Reitter, Verh. z. b. Ges. Wien, 4881, p. 449

Wordendon's on Pourusuis Disinossi
Montandoni n. sp Roumanie : Plainesci.
Emgei Reitter. Deuts. Ent. Zeits. 1885, p. 372 Grèce: Eubée.
Revelierei Saulcy, Spec. I. p. 34. — Reitter, Verh.
z. b. Ges. Wien, 4881, p. 449, pl. XIX, f. 41 Corse.
Groupe VII.
elysius Reitter, Deuts. Ent. Zeits, 1884, p. 47,
Grèce : Morée, Cumani,
apenninus Baudi, Berl. Ent. Zeits. 4869, p. 445. —
Saulcy, Spec. I, p. 35. — Reitter, Verh. z. b. Ges.
Wien, 1881, p. 450, pl. XIX, f. 12
Handmanni Wasmany, Wien, Ent. Zeit. 1898, p. 135. Bosnie.
longicornis Müller, Germ. Mag. III, p. 85. — Aubé,
Psel. Mon. 1833, p. 62, pl. 94, f. 2; Ann. Soc. ent.
Fr. 1844, p. 45. — Sauley, Spec. I, p. 36. — Reit-
Ter. Verh. z. b. Ges. Wien, 4881, p. 450, pl. XIX,
f. 13. — Ganglauer, Käf. Mittel. II, p. 85 France: Allemagne.
32
SEMICLAVIGER
Wasmann, Deuts. Ent. Zeits. 1893, p. 102.
Sikorae Wasmann, loc. cit. p. 103, pl. V. f. 3
Madagascar : Andrangoloaka.

## PSEUDACERUS

RAFFRAY, Rev. d'Ent. 1895, p. 80.

furcatus Raffray, loc. cit. p. 81, pl. II. f. 12..... Singapore.

# Liste des espèces mentionnées, mais non décrites

par V. de Motschulsky.

Acmaeo	notus, Bull. Mosc. 1851, p. 483.
id.	Motschulskyi, loc. cit. p. 483 Indes orientales.
Articeru	s Hageni, loc. cit. p. 502 Indes orientales.
Batrisus	antennatus, Bull. Mosc. 1845, p. 45; 1851, p. 488 Caucase.
id.	armiger, loc. cit. 1851, p. 485 Bengale.
id.	bryaxoides, loc. cit. p. 484 Bengale.
id.	bucephalus, loc. cit. p. 487 Indes orientales.
id.	Chevrieri, loc. cit. p. 486 Suisse.
id.	collaris, Ét. ent. 1855, p. 16 Panama.
id.	cylindricus, loc. cit. p. 15 Panamu.
id.	Dennyi, Bull. Mosc. 1851, p. 487 Indes orientales.
id.	Eriwanus, loc. cil. 1845, p. 45; 1851, p. 488 Caucase.
id.	excavatus, loc. cil. 1851, p. 485 Bengale.
id.	femoralis, loc. cit. p. 487 Indes orientales.
id.	fossulatus, loc. cit. p. 489 Bengale.
id.	foveicollis, loc. cit. p. 488 Bengale.
id.	frontalis, Ét. ent. 1855, p. 16 Panama.
id.	grandis, Bull. Mose. 1851, p. 489 Indes orientales.
id.	Helferi, loc. cit. p. 489 Indes orientales.
id.	Lecontei, loc. cit. p. 486 Indes orientales.
id.	longulus, loc. cit. p. 488 Imérétie.
id.	macrocerus, loc. cit. p. 487 Indes orientales.
id.	mucronatus, loc. cil. p. 485 Indes orientales.
id.	nitidulus, loc. cit. p. 486 Indes orientales.
id.	nodifrons, loc. cit. p. 485 Indes orientales.
id.	nodosus, loc. cit. p. 486 Bengale.
id.	obtusicornis, loc. cil. 1845, p. 45; 1851, p. 487 Géorgie.
id.	pexus, loc. cit. 1851, p. 489 Bengale.
id.	piliferus, loc. cil. p. 484 Bengale.
id.	puncticollis, loc. cit. p. 485 Indes orientales.
id.	Reichenbachi, loc. cil. p. 486 Indes orientales.
id.	sculpticollis, loc. cit. p. 489 Indes orientales.
id.	spiniventris, loc. cit. p. 486 Indes orientales
id.	tauricus, loc. cit. p. 488 Russie méridionale.
id.	ventralis, loc. cit. p. 484 Indes orientales.
Bryaxis	castanoptera, Bull. Mosc. 1851, p. 491 Calcutta.
id.	clavata, loc. cit. p. 491
id.	consanguinea, Ét. ent. 1855, p. 16 Panama.

Bryaxis cornigera, loc. cil. p. 16
id. corniventris, loc. eil. 1856, p. 7 Amérique septentrionale.
id. crassicornis, Bull. Mosc. 1851, p. 492 ('alculta.
id. curvicera, loc. cit. 1853, p. 4 New York.
id. decorata, Bull. Mosc. 1851, p. 494 Index orientales.
id. dilatata, loc. cit. p. 492 Index orientales.
id. extensa, loc. cit. p. 494 Indes orientales.
id. glabrella, Ét. ent. 1854, p. 16 Panama.
id. indistincta, Bull. Mosc. 1851, p. 491 Bengale.
id. lata, loc. cil. p. 491 Calcutta.
id. macrura, El. ent. 1855, p. 16 Panama.
id. nitida, loc. cit. p. 16 Panama.
id. pilifera, Bull. Mosc. 1851, p. 494?
id. simplex, loc. cit. p. 491 Index orientales.
id. suturella, loc. cit. p. 491 Indes orientales.
Bythinus pedestris, loc. cil. 1845, p. 45, 1851, p. 497. Indes orientales.
Centrophthalmus Horsfieldi, Bull. Mosc. 1851, p. 479. Indes orientales.
id. longicornis, loc. cit. p. 480 Indes orientales.
id orbicollis, loc. cil. p. 480 Bengale.
id. pilosus, loc. cit. p. 480 Index orientales.
id. thoracieus, loc. cit. p. 480 Indes orientales.
Cercocerus perplexus, El. enl. 1855, p. 16
Ctenistes aequatorialis, Ét. ent. 1855, p. 16 Panama.
id. angusticollis, Bull. Mosc. 1851, p. 481 Indes orientales.
id. birmanensis, loc. cit. p. 481 Indes orientales.
id. costulatus, loc. cit. p. 481 Indes orientales.
id. elegans, loc. cit. p. 482 Égypte.
id. hindustanus, loc. cit. p. 482 Indes orientales.
id. longicornis, loc. cil. p. 482 Index orientales.
id. pilicollis, loc. cil. p. 481 Égypte.
Euplectus adustus, Ét. ent. 1856, p. 15 Panama.
id. antennatus, loc. cil. p. 15 Panama.
id. brachyurus, Bull. Mosc. 1851, p. 500 Indes orientales.
id. breviusculus, loc. cit. p. 500 Indes orientales.
id. cephalotes, loc. cit. 1845, p. 46 Russie.
id. cordicollis, Ét. ent. 1855, p. 16 Panama.
id. elongatus, Bull. Mosc. 1851, p. 501 Indes orientales.
id. infuscatus, loc. cit. p. 500 Indes orientales.
id. ligneus, loc. cit. 1845, p. 46 Cuucase.
id. pulcher, loc. cit. 1851, p. 499 Index orientales.
id. robustus, Ét. ent. 1855, p. 15 Panama.
id. tropicalis, loc, cit. p. 15 Panama.
Eupsenius aequatorialis, Ét. ent. 1855, p. 16 Panama.

Glyptosoma Paulinae, Bull. Mosc. 1851, p. 480 Indes on	rientales.
Harmophorus gibbioides, loc. cit. p. 490 Indes of	cientales.
Mecochelia impressa, loc. cit. p. 481 Indes or	ientales.
	ientales.
Metaxis Bull, Mosc. 1851, p. 490.	
id. corpulentus, loc. cit. p. 490 Indes or	rientales
id. lativentris, loc. cit. p. 490 Indes or	cientales.
id. politus, loc. cit. p. 490 Indes or	cientales.
id. robustus, <i>Ét. ent.</i> 1855, p. 16	Panama.
Pselaphus elegans, Bull. Mosc. 1851, p. 483 Index or	rientales.
Rhexius simplex, Ét. ent. 1856, p. 7 Amérique septen	trionale.
Trichonyx aequinoctialis, Ét. ent. 1855, p. 15	Panama.
	Panama.
Trimicerus Ét. ent. 1855, p. 16.	
id. pacificus, loc. cit. p. 16	Panama.
id. rivalis, loc. cit. p. 16	Panama.
Trimium abdominale, Bull. Mosc. 1851, p. 499 Indes or	rientales.
Tychus angusticollis, Ét. ent. 1856, p. 7 Amérique septem	rtrionale.
id. dilatatus, Bull. Mosc. 1851, p. 496 Indes or	cientales.
id. nigripennis, Ét. ent. 1856, p. 7 Amérique septen	strionale.
id. pilosus, loc. cil. 1855, p. 16	Panama.
id. ruber, Bull. Mosc. 1845, p. 44	Oural.
id. serricornis, loc. cit. p. 11	Arménie.

# Explication des planches.

# PLANCHE 1

Fig.	1.	Aulaxus trisulcatus Raffr.
	2.	— — Palpe maxillaire.
_	3.	Diastictulus punctipennis Raffr.
_		— — Palpe maxillaire.
		<ul><li>— Derniers segments ventraux ♂.</li></ul>
	6.	Capnites angustus Raffr.
	7.	— — Palpe maxillaire.
	8.	Lioplectus nitidus Raffr.
	9.	— — Palpe maxillaire.
	10.	<ul> <li>Trois derniers segments ventraux.</li> </ul>
	11.	Vidamus convexus Sharp.
_	12.	— — Palpe maxillaire.
_	13.	Brouniella laevifrons Broun.
	14.	
-	15.	— — Palpe maxillaire.
	16.	Euglyptus elegans Broun.
		Zelandius obscurus Broun.
_	18.	Palpe maxillaire.
_	19.	Tomoplectus cordicollis Raffr.
—	20.	<ul> <li>Trois derniers segments ventraux 5.</li> </ul>
		Melba parmata & Reitt.
	22.	<ul> <li>Appendice latéral du 3° segment ventral.</li> </ul>
	23.	Ptectomorphus spinifer Broux.
-	24.	<ul> <li>Palpe maxillaire.</li> </ul>
-	25.	Pseudotrimium microcephalum Raffr.
	26.	Euplectodina hipposideros Schauf.
	27.	— — Derniers segments ventraux 5.
	28.	<ul> <li>— Derniers segments ventraux ♀.</li> </ul>

# PLANCHE 2

Fig. 1. Trymalius foveicollis Fairm.
2. Hadrophorus humerosus Fairm.
3. Thysdarius Pervieri Fairm.

6. Ephymata mucronata Raffr.
 7. — Palpe maxillaire.
 8. Sintectodes tortipalpus Raffr.

9. — Palpe maxillaire.

- 40. Enantius fortis RAFFR.

– 41. – – Palpe maxillaire.

- 12. Spilorhombus hirtus RAFFR.

– 43. – Palpe maxillaire.

- 14. Batrisinus elegans RAFFR.

- 45. Acrocomus cribratus RAFFR.



# L'ÉCLOSION DES ŒUFS DE LESTES VIRIDIS

Van der Lind. (Nevr.)

par l'abbé Pierre.

(Pl. IV).

Depuis les premières observations de la ponte de *Lestes viridis* (¹), M. le c¹e de Rocquigny-Adanson a publié de nouveaux et plus complets documents sur les manœuvres de cet intéressant Névroptère (²).

D'autre part, M. le Professeur A. Giard a donné une vue d'ensemble sur la ponte des *Lestes*, et mis en évidence l'harmonieuse solution fournie par *L. viridis* au problème du parasitisme (3).

Il restait à savoir comment s'effectuait le passage dans l'eau de jeunes larves dont l'organisation est incompatible avec une vie aérienne. Par l'examen des œufs tirés à diverses époques de tissus végétaux, où ils sont déposés, on avait constaté que le développement embryonnaire s'y faisait lentement. Ni l'époque, ni le mode d'éclosion n'étaient indiqués. Ainsi pour Lestes sponsa dont la ponte est moins surprenante, puisqu'elle se fait en partie seulement hors de l'eau, sur des plantes plus ou moins immergées (des joncées), on se bornait à dire que les œufs placés hors de l'eau se développaient comme les autres et que les jeunes larves gagnaient l'eau après l'éclosion (4). Je ne sais si L. sponsa, dont le mode de ponte semble être un acheminement vers celui de L. rividis. n'a pas aussi quelque facon spéciale de gagner l'eau; ce qui est sûr. c'est que L. viridis a une méthode curieuse qui ne laissera pas d'intéresser les habitués de l'entomologie. Et, sans fixer à la Sagesse Créatrice les limites de vues bornées, j'affirme volontiers que cette méthode donne au moins la solution simple des difficultés que faisait surgir l'emplacement des œufs. Il fallait en effet que le jeune évitat l'action nuisible de l'air, si courte qu'elle fût, et ne fût point exposé le plus souvent, en tombant maladroitement du rameau, à périr sur une terre desséchée.

<sup>(1)</sup> Revue Scient. du Bourb. et du Centre de la France, t. XV, 1902, p. 181.

<sup>(2)</sup> Id., t. XVI, 1903, p. 189.

<sup>(3)</sup> Feuille des Jeunes naturalistes, t. XXXIII, 1902-1903, p. 189.

<sup>(4)</sup> M. Girard, Traité d'Entom., t. II, p. 335 (1876).

I

Je décrirai d'abord les faits tels que je les ai observés.

Du 21 au 30 mars des observations minutieuses ont été faites sur un rameau de Salix aurita, couvert de bourrelets, cueilli aux environs de Moulins dès le commencement de mars. Ces observations ont été confirmées par d'autres, conduites plus largement, dans la première quinzaine d'avril, sur divers rameaux que M. E. Lemée avait eu l'obligeance de m'envoyer d'Alencon.

Dès que j'aperçus des larves dans l'eau où plongeait la base du rameau de saule, je piquai ce rameau au centre d'un pot de 6cm de rayon. Je disposai un verre plein d'eau, de 3cm 1,2 de diamètre, dont le bord, à peine saillant au-dessus de terre, était à un centimètre du rameau. A intervalles irréguliers je mis en plein air le sujet d'observation. Tantôt je laissais la terre sèche, tantôt je l'arrosais abondamment. J'ai essayé aussi l'immersion des bourrelets. Enfin pour étudier la conduite de l'insecte sur l'eau je me suis servi d'un verre, indépendant du système précédent, et d'un diamètre plus grand (7 cent.).

Voici les résultats acquis dans ces conditions :

I's Sortie de l'œuf. — Ordinairement, au moment de l'éclosion, l'extrémité arrondie de l'œuf est légèrement saillante. Le chorion s'ouvre à ce niveau, et le jeune se hisse rectilignement d'abord, c'est-à-dire, étant donné la position de l'œuf, tangentiellement au rameau. Ce premier mouvement est presque toujours rapide, et dégage au moins toute la région thoracique. L'opération se poursuit avec des efforts variables, l'insecte s'incline sur les lèvres du bourrelet, comme le fait un homme pour sortir d'une fosse; il se tend, s'arc-boute contre le rameau, se plie sur lui-mème. Chacun de ces efforts l'approche du terme. Enfin, quand il ne reste plus à dégager que la fine extrémité du corps, il s'arc-boute une dernière fois (schéma 1) (¹), ou bien se met en boucle sans utiliser le rameau, et se lance plus ou moins loin par un mouvement de détente.

La durée des efforts est courte quand l'atmosphère est chaude et humide et quand les tissus sont gonflés d'eau.

Dans le cas d'immersion des bourrelets, le dégagement m'a paru difficile; l'animal paraissait flasque. Je n'ai d'ailleurs étudié ce cas qu'incomplètement; de nouvelles observations sont nécessaires qui peut-être établiront l'impossibilité de l'éclosion dans ces circonstances.

<sup>(1)</sup> Je tiens à réserver la question anatomique dans les dessins que je fournis.

Si le rameau est trop sec, la traction est lente, difficile, et même impossible : l'insecte périt à moitié dégagé du chorion.

La mesure exacte du phénomène n'est point commode, parce que l'attention n'est attirée qu'après le commencement. Cependant voici quelques données.

En 3/4 de minute environ un insecte est sorti complètement d'un fragment de tissu que je détachais au scalpel, et cela avec la précipitation d'un lombric qui sort de la terre qu'on piétine. — D'autres, que je ne dérangeai pas, sont sortis et partis, l'un en 1 minute 1/2. l'autre en 7 minutes environ; un troisième donnait son dernier mouvement de ressort 1/2 minute après le dégagement de la partie thoracique. M. de Rocquigny, à qui, après maint insuccès, j'ai eu le plaisir de pouvoir procurer la vue d'une de ces éclosions, a noté 4 minute 1/2 entre le début de la sortie et le départ.

L'amplitude de la projection dépend de l'état de lassitude acquis pendant le dégagement. Le minimum a cu lieu quand l'insecte, après s'être détendu, est resté collé par la tête. Souvent la chute s'est produite presque verticalement. D'autres fois la projection a été assez violente pour lancer l'insecte en dehors des limites du pot (à plus de 6 centimètres par conséquent), dans la figure de l'observateur.

Les sorties ont pu être provoquées par l'arrosage de la terre et du rameau. Elles ont eu lieu le jour et la nuit. Un arrosage fait le soir était suivi d'éclosions pendant la nuit. Le 29, le rameau, peu vivant. n'avait rien donné de 41 heures du matin à 6 heures du soir : après un arrosage, j'eus cinq éclosions de 6 heures à 9 heures.

2 État du jeune insecte à la sortie de l'œuf. — L'insecte qui déploie tant de talents musculaires pour la sortie de l'œuf n'est pas une larve libre. Recouvert de la membrane amniotique, il n'a point l'usage de ses membres, qui, maintenus appliqués contre le corps à l'état normal, s'en éloignent en séjournant dans l'alcool (schéma 2). Cette sorte de momie mesure 2 1 2 mill. Sur terre, elle s'agite comme les nymphes de coléoptères dont elle rappelle l'aspect. Elle se plie en arc, forme le cercle complet, se boucle même de quelque façon en croisant les extrémités du corps, et exécute, dans la détente, des sauts d'amplitude variable. Elle ne se déplace pas autremenent sur terre ; mais sur l'eau elle paraît jouir en outre de la faculté de glisser rapidement et rectilignement.

Toutes les éclosions que j'ai observées, en dehors des cas d'immersion des bourrelets pour lesquels je ne puis ni nier ni affirmer, ont donné des larves ainsi emmaillotées.

La pellicule qui sert de fourreau mérite de fixer l'attention. Selon la

comparaison très juste de M. de Rocquigny, elle ressemble à une délicate cotte de mailles. Sa surface est garnie de minimes reliefs chitineux, arqués, uni ou pluridentés. Ces arcs dont l'épaisseur diminue graduellement du milieu de l'arc aux extrémités sont tous ouverts en avant. Ils sont disposés en séries transversales ou ceintures très rapprochées, de manière à ce que les arcs d'une série alternent avec ceux de l'autre, et que, dans une même série, l'extrémité d'un arc paraisse se perdre dans la région limitée par l'arc voisin. La pellicule est donc très finement écailleuse. J'ai largement schématisé cet aspect dans les dessins qui accompagnent ce texte, et à part, dans le schéma 4.

Les arcs, mesurés parmi les plus grands, avaient une corde de  $\frac{1}{90}$  de millimètre.

3º Le jeune cherche l'eau. — La chute sur l'eau se fait ou immédiatemment par suite du mouvement de ressort qui tire l'insecte de l'œuf, ou plus tard, après une série de sauts sur terre. J'ai suivi de nombreux sujets : que la terre soit sèche ou humide, ils n'ont qu'un souci, celui de chercher l'eau par des sauts répétés. C'est un spectacle intéressant que d'assister aux efforts de ces filets blancs, à peine visibles; étendus dans un repos réparateur, ils s'arc-boutent de temps à autre pour se détendre brusquement et se porter ainsi à une faible distance. Tel jeune, après trois sauts, dont le plus ample mesurait trois centimètres sur terre, a été assez heureux pour tomber dans le petit verre d'eau; il lui a fallu huit minutes. Tel autre a sauté pendant deux heures sans avoir la même bonne fortune; parfois il faisait des sauts de cinq centimètres sans jamais quitter le terrain du pot d'observation. Un saut le rapprochait du verre d'eau, un autre l'en éloignait. Quoi qu'il en soit, les bestioles finissent presque toujours par gagner l'eau.

Les circonstances, ici, leur offraient d'ailleurs des difficultés spéciales, puisque le bassin n'avait que 3 4/2 cent. de diamètre.

La verticale du point le plus élevé de la trajectoire d'un des sauts mesurait sensiblement trois centimètres.

Sur la surface lisse du bois de mon bureau les larves exécutaient aussi des sauts.

We Le dépouillement de la membrane. — La mise en liberté définitive de la larve s'effectue dès que celle-ci est sur l'eau. La terre humide et même boueuse n'a pas suffi. Voici la description du phénomène complet, suivi à la loupe, pour un jeune déposé avec un fin pinceau sur l'eau du grand verre :

I<sup>re</sup> phase. — Le jeune ne s'enfonce point. Il reste étendu sur le dos, et se repose des efforts, qu'il a faits pendant deux heures environ, pour trouver l'eau.

2º phase. — Il exécute une série de mouvements brusques qui consistent d'abord en courbures du corps dans un plan vertical. Ces mouvements ont lieu, soit par en haut, soit par en bas, sans aucune progression horizontale. Il se tend et se détend. Puis un mouvement de flèche porte rapidement l'insecte, étendu, du milieu aux bords du verre, et inversement, sans changement d'orientation de l'animal.

3º phase. — Revenu au milicu, le jeune semble immobile; mais en réalité son corps est soumis à des ondulations de très faible amplitude. Il est toujours étendu sur le dos. C'est le moment de la sortie. En effet, par une ouverture de la partie antérieure dorsale du fourreau, la larve sort obliquement, la face tournée en haut, en progressant tout doucement, pendant que le fourreau est immobile. L'aspect du phénomène est curieux. Les yeux de la bête, d'un brun foncé, semblent interroger à leur tour l'observateur. La tête soufrée, et le corps d'un ambré très clair tranchent délicieusement sur le cristal de l'onde, où les pattes s'étalent incolores et flottantes. Mais l'opération ne va pas sans effort jusqu'au bout. Quand une grande partie de l'abdomen est déjà tirée, il y a reprise de mouvements brusques.

4º phase. — La larve se place verticalement et exécute des contorsions en divers sens, pendant que le fourreau reste absolument fixe dans sa portion horizontale. Enfin un dernier mouvement de ressort tend à arracher complètement l'extrémité abdominale. Il ne réussit pas (schéma 3). La larve se repose en prenant la position oblique, et donne bientôt un autre coup de ressort qui la délivre. Elle se retourne aussitôt, et plonge obliquement dans l'eau, où elle évolue avec beaucoup de gracieuseté. Elle se plaît à rester immobile au milieu de la masse liquide; ou bien elle cherche à se dissimuler le long des parois, sur lesquelles d'ailleurs elle peut marcher.

L'opération que je viens de décrire a duré 13 minutes. Ce temps n'est pas normal. Une autre larve s'est dégagée en moins de trois minutes. Le séjour sur terre et les efforts qu'elles y dépensent en sauts répétés nuisent à leur vitalité. La délivrance de la larve peut même en être rendue impossible, ou se faire suivant un processus troublé. Un jeune, contusionné, est resté engagé de la tête dans le fourreau pelliculaire; ce fourreau faisait office de flotteur, la larve pendait au dessous. Elle vécut assez longtemps dans cet état.

La larve n'a pas été en contact direct avec l'air pendant la durée du dépouillement.

La seule mesure de la durée totale des phénomènes, que j'aie pu prendre, a donné les résultats suivants :

A moitié dégagé de l'œuf à 9 h. 46, un jeune tomba à terre à 9 h. 49. Ann. Soc. Ent. Fr., LXXIII [1904]. Après trois sauts, il fut sur l'eau à 9 h. 24, et se dépouilla en moins de trois minutes; obligé de le quitter, je le retrouvai évoluant librement à 9 h. 27. On peut admettre que l'insecte a effectué son passage du rameau dans l'eau en 41 minutes.

#### II.

Il est permis d'étendre le résultat de ces observations, en l'appliquant à l'évolution normale de Lestes viridis.

4º L'éclosion du jeune L. viridis se fait en deux temps : l'œuf, non immergé, donne une larve encore emmaillotée dans la membrane amniotique. Cette membrane a l'aspect d'une très fine cotte de mailles. A cet état, le jeune a la faculté de sauter. — A la surface de l'eau, la larve sort de son fourreau par la partie dorsale appliquée contre l'eau, et plonge dans la masse liquide pour y poursuirre son évolution.

2º La sortie du fourreau est préparée par des mouvements divers,

contorsions régulières sur place, et translation rectiligne.

3º Cette sortie ne s'opère point en terre humide; l'eau franche est nécessaire.

- 4º Pendant la sortie le fourreau reste immobile à la surface de l'eau.
- 5º Les conditions optima de l'éclosion sont une atmosphère chaude et humide et l'état de végétation du rameau.
- 6° Dans ces conditions les efforts mécaniques de traction sont réduits au minimum et le mouvement de projection en avant du rameau a son maximum d'amplitude. Dès lors, étant donné d'une part la position des rameaux au-dessus de l'eau et d'autre part l'emplacement normal de la ponte, qui parait être la face inférieure du rameau, comme le fait remarquer M. E. Lemée (1), il est probable que les jeunes sautent le plus souvent, en pleine eau, du premier coup. Si la chute a lieu sur les mottes émergées ou les plantes aquatiques, soit à cause de la faiblesse du saut, soit à cause de l'orientation de la ponte (2), les sauts répétés finis-
  - (1) Bull. de la Soc. ent. de Fr., 1903, nº 2, p. 32.
- (2) Dans les lieux où L. viridis abonde, les rameaux sont couverts de tous côtés. Après un nouvel et attentif examen au parc de Baleine, M. de Rocquign y m'écrit (10 janvier) que « l'emplacement des lésions par rapport au sot ou à l'ean est indifférent. » J'estime, avec le savant ami dont j'ai mis souvent à contribution, au cours de cette étude, et la sagacité et la science, que la distinction des faces est chose puérile, étant donné le faible diamètre des rameaux. Mais je reste convaincu que d'instinct la libellule cherche la face du rameau tournée vers l'eau. J'explique l'indifférence apparente de l'emplacement de la ponte, dans certains cas, par la subordination du choix de l'emplacement le plus avantageux, au besoin de pondre : l'instinct

sent par rendre au milieu liquide les insectes ainsi mat tombés. L'abondance de la ponte compense les pertes possibles.

- 7º Les sauts ne paraissent pas orientés.
- 8° Le passage de l'œuf au sein de l'œu, doit demander un temps très court, deux minutes au plus.
- 9º Quelle que soit sa durée, à aucun moment, la larce n'est en contact direct avec l'air.
- 40° Les éclosions s'échelonnent au moins durant les mois de mars et d'avril.

#### III.

Y a-t-il d'autres Agrionines à suivre un pareil processus? M. R. Martin, l'éminent spécialiste, m'écrivait, tout en faisant ses réserves, que les larves lui ont toujours semblé libres à la sortie de l'œuf. Il exceptait d'ailleurs L. riridis, dont il n'a point observé les larves : c'est la seule larve de Lestes que ne possède point sa riche collection. Si réellement L. riridis est le seul à pondre sur les arbres, tout à fait en dehors de l'œu, on ne voit pas pourquoi le jeune des autres espèces ne laisserait point dans le chorion la membrane embryonnaire? La persistance de cette membrane paraît en effet avoir deux fins : protéger la larve contre l'action de l'air, et lui permettre de sauter sans dommage pour ses membres très délicats. Sa différenciation sculpturale est d'ailleurs favorable à la sortie de l'œuf et au dépouillement sur l'eau.

On sait que la formation des feuillets et membranes embryonnaires chez les Libellules est particulière (¹). M™ H. Heymons (née Tschuproff) vient de publier les résultats remarquables de son étude d'Epitheca bimaculata, Charp. Déjà, en 4896, M. le Prof. Heymons avait donné dans les mémoires de l'Académie de Berlin les traits fondamentaux de l'évolution embryonnaire chez les Odonates et les Éphémérides (²). Je n'ai pu avoir entre les mains cette dernière publication. Mais M™ Heymons a eu l'obligeante attention de m'adresser une

de la conservation de l'espèce n'est pas indivisible, et, comme toutes les forces, il a sa sphère d'action; au centre il a son intensité maxima, à la surface il serait à sa limite d'effet.

- (1) Brandt, Beiträge zur Entwicklungsgeschichte der Libell, etc. (Mém. de l'Acad. de St-Péters., 7" série, XIII, 1864).
- (2) H. Tschuproff, Ueber die Entwicklung der Keimblätter bei den Libellen. (Zool. Anzeiger, von Pr. E. Korschelt, oct. 1903).
- Prf. Heymons, Grundzüge der Entwicklung und des Körperbaues von Odonaten und Ephemeriden. (Abhandl. Akad. d. Wissensch. Berlin 1896).

copie du dessin de l'embryon d'*Epitheca bimaculata*, tel que M. le Prof. Heymons l'a représenté (¹) après l'éclosion. Cet insecte est encore enveloppé de l'amnios comme le jeune *Lestes viridis*. De plus, comme le fait remarquer M<sup>mc</sup> Heymons (²), le sommet de la région cervicale porte un épaississement chitineux qui permet à l'embryon de fendre la capsule gélatineuse, où les œufs sont contenus.

Ainsi, dans le cas d'Epitheca bimaculata comme dans celui de Lestes riridis, la persistance et les particularités de structure de l'amnios ont une raison évidente : le jeune est armé pour le travail qu'il doit faire, ou défendu contre le milieu qu'il doit traverser, avant d'arriver à son élément.

Dans la note par laquelle j'annonçais le résultat de mes observations Bull, de la Soc. entom. de France, nº 2, p. 30-31, 1904), j'appliquais le nom de prolarre à cet état particulier de la larve de L. viridis à sa sortie de l'œuf. Je ne connaissais pas alors les belles études de M. et Mme Heymons, qui n'ont point cru devoir qualifier d'un nom spécial l'embryon d'Epitheca bimaculata éclosant dans des conditions semblables. Je ne maintiens donc point ce terme, qui, je le reconnais volontiers avec M. le Pr. A. Giard, insinue l'idée d'un stade morphologique. M. le Pr. Giard, dans ses observations à propos de ma note (Bull., nº 2, p. 31-32, 1904), rappelle très heureusement la découverte de M. J. Künckel d'Herculais sur l'éclosion des Criquets : le jeune Criquet est aussi revêtu de l'amnios. C'est qu'il aura, lui aussi, avant d'arriver au jour, un travail spécial à produire en dehors du chorion, M. Künckel d'Herculais nomme larce rampante le jeune Criquet ainsi emmailloté. Je ne crois pas pouvoir user de cette dénomination pour le jeune Lestes, qui, lorsqu'il ne se boucle pas pour sauter, reste étendu sans progresser. Il est sans doute préférable de maintenir simplement le nom d'embryon tant que les deux phases d'éclosion ne sont pas accomplies.

M. A. Giard, dans la note citée plus haut, regarde comme un nouvel argument en faveur de la parenté des Odonates avec les Orthoptères, le mode d'éclosion de Lestes viridis (larve). J'ajouterai, en terminant, que M<sup>me</sup> Heymons trouve une grande ressemblance entre le développement de l'entoderme chez les Libellules (Epitheca) et le développement du même feuillet chez les Myriapodes (Scolopendra) et chez les Thysanoures (Lepisma) (3).

(1) Op. cit., fig. 3, tab. I.

(3) H. Tschuproff, op. cit., p. 33.

<sup>(2) «</sup> Interessant ist bei dem Epithecaembryo besonders eine um Kopf befindliche Chitinleiste die zum durchschneiden der Gallertmasse dient, in welcher sämtliche Eier zusammen eingeschlossen liegen. » (In litt.)

# MONOGRAPHIE DES GUÊPES OU VESPA (suite\*)

par Robert DU BUYSSON.

(Pl. V à X).

## SYSTÉMATIQUE.

Les Guèpes ont une aire de dispersion très étendue dans l'hémisphère septentrional. Elles habitent toute l'Europe, le bassin de la Méditerranée, celui de la Mer Rouge, toute l'Asie, les îles de la Malaisie et même la Nouvelle-Guinée. Elles ne semblent pas descendre dans le Pacifique au-dessous du 10° degré de latitude sud. On les retrouve dans toute l'Amérique du nord, jusque vers le tropique du Cancer. Une seule ouvrière de V. norwegica l'. var. marginata Kirby [V. peruana Sauss.] a été capturée dans les montagnes du Pérou, mais rien ne laisse supposer que cet habitat est normal.

Pai vu la V. crabro L. provenant de la Nouvelle-Hollande, la V. orientalis L. de Madagascar, de la Guyane et du Brésil, la V. germanica F. de la Nouvelle-Calédonie, la V. cincta F. de la Nouvelle-Hollande, du Brésil, et du Pérou, mais ce sont des habitats accidentels. Ces insectes sont issus de femelles débarquées avec des bois, des emballages, etc... qui leur ont servi de refuge pendant la traversée. On n'a jamais vu de Guèpes habitant naturellement la partie australe de l'Afrique et de l'Amérique, ni l'Australie. Quelques espèces sont spéciales a l'Amérique, d'autres à l'Indo-Malaisie, comme aussi on en compte qui sont communes à l'Europe, à l'Asie et à l'Amérique.

l'ai fait trois tableaux de détermination : deux pour les espèces de l'Europe, de l'Asie, de l'Afrique et de l'Océanie. L'un de ceux-ci est réservé aux màles, qui ne pourraient pas être déterminés d'une facon convenable avec le tableau des femelles. Le troisième comprend les Guèpes américaines.

En dehors de l'ouvrage de M. de Saussure, on doit consulter, pour les espèces américaines, deux notices qui sont pleines de mérite : 4º Tableau des espèces de Vespa trouvées dans les États-Unis et descriptions de deux espèces nouvelles, par M. J. Mac Farland (Transactions of the american entomological Society, vol. XV. 4888; 2º Vespinae des États-Unis et du Canada par M. H.-W. Lewis (Transact. of the

<sup>(\*)</sup> Voir les Annales, vol. LXXII, 1903, p. 260-288, pl. III et IV.

americ, entom. Society, vol. XXIV, 1897). Je dois signaler également le travail du Rév. Thomas W. Fyles, dans le Thirty-third annual report of the entomological Society of Ontario 1902 (1903). Il a pour titre The paper-making Wasps of the province of Québec. On y trouve de nombreux renseignements sur la nidification des Guépes du Canada.

l'ai réuni à la fin de ce travail les diagnoses des espèces que je n'ai pas pu identifier et dont il ne m'a pas été possible de voir les types. Les auteurs anciens donnaient le nom de Vespa à un grand nombre d'Hyménoptères autres que des Vespides, par exemple à des Sphégides, des Euménides, des Pompilides, des Scoliides, etc. Même plus récemment, on trouve de semblables fautes de nomenclature, moins excusables que celles datant de la fin du xvine siècle. Ainsi la Vespa samsaulica Radoszkowsky (Horae Societatis entomologicae Rossicae, t. XXI, 1887, p. 400) est sans doute un Euménide. Quant aux auteurs anciens, il est presque toujours très difficile de reconnaître d'une manière positive les insectes qu'ils ont décrits. La Vespa lutea Coquebert (Illustratio iconographica Insectorum, 1804, tab. XXI, fig. 10), me semble être une Vespa bicolor F. dont le mesonotum aurait été figuré jaune par un artiste peu consciencieux. La Vespa tripunctata Schenck (Jahrb. Ver. Naturk. Nassau XVI, 1861, p. 16 et 17), est une Vespa silvestris Scop, ou une Vespa media Degeer ou peut-être une V. norwegica F. Il s'agit d'une seule femelle envoyée de Haute-Franconie, Bamberg, par le Dr Funk.

La Paravespa Komarowi Radoszkowsky, dont j'ai vu le type par l'aimable intermédiaire de M. le D<sup>r</sup> E. Ritter von Niezabitowski, n'appartient pas à la famille des Vespidae, mais à celle des Eumenidae.

Depuis la publication de la première partie de cette étude, plusieurs personnes et un certain nombre de Musées m'ont communiqué des matériaux considérables. Je leur dois ici l'expression de mes sincères remerciments, qui s'adressent particulièrement à MM. W.-H. Ashmead. de Washington; H.-T. Fernald, de Amherst; Th.-W. Fyles. de Lévis, près Québec; le conseiller aulique D<sup>r</sup> A.-B. Meyer et le D<sup>r</sup> K.-M. Heller, du Musée de Dresde; E. Ray Lankester, Sir G.-F. Hampson. W.-F. Kirby, Esq. et le Colonel Ch.-T. Bingham, du Musée de Londres; le D<sup>r</sup> I. Bolivar, G.-M. Dusmet, et M. Martinez Escalera, du Musée de Madrid; le D<sup>r</sup> P. Magretti, de Milan; M. C. Ritsema, du Musée de Leyde; M. le major L. von Heyden, du Musée Senckenberg de Francfort-sur-Main.

Enfin je remercie tout spécialement mon ami M. G. Lépine, au talent duquel je dois les jolis clichés qui terminent cette étude.

# TABLEAU DICHOTOMIQUE

pour la détermination des femelles et des ouvrières.

# Espèces de l'Europe, l'Afrique, l'Asie et l'Océanie.

1. Ocelles très éloignés du bord postérieur de la tête, (les deux ocelles postérieurs éloignés du bord postérieur de la tête d'une longueur approximative de quatre à six fois, ou plus même, celle qui les sépare entre eux); pronotum toujours muni antérieurement d'une carène transversale (groupe des Frelons, pl. 1V, 4903, fig. 3)	2.
<ul> <li>Ocelles touchant presque le bord postérieur de la tête, (les deux ocelles postérieurs éloignés du bord postérieur de la tête au maximum d'une longueur double de</li> </ul>	
celle qui les sépare entre eux); pronotum avec ou sans carène transversale près de la tète, (groupe des Guèpes, pl. IV, 4903, fig. 4)	
2. Clypeus profondément échancré antérieurement, avec une petite dent très distincte au fond de l'échancrure	)
<ul> <li>Clypeus plus ou moins profondément échancré ou sinué antérieurement, sans trace de dent au fond de l'échan-</li> </ul>	}.
Tête entièrement noire ou ferrugineux obscur, ou brun- ferrugineux; ailes ferrugineux-roussâtre analis	F.
4. Tête jaune	; ;
Tête noire en dessus; corps étroit, subparallèle; tous les segments tergites de l'abdomen marginés de jaune     parallela André var. Biroi Buyss. var. n	OV
5. Corps étroit, subparallèle; abdomen avec les segments tergites 1 à 4 largement marginés de jaune; ailes ferrugineuses, hyalines	
<ul> <li>Corps large, trapu, robuste; abdomen entièrement brun, sauf le 6° tergite qui est toujours jaune, ou avec les segments l'à 5 étroitement lisérés de jaune; ailes noires, fortement enfumées</li></ul>	. 42
6. Corps entièrement noir	
1	

	Corps non entièrement noir	8.
7.	Orbites internes des yeux et une tache mal définie de	
	chaque côté à la base du 2º tergite abdominal ferrugi-	
	neux; abdomen glabre ou presque glabre	Dumas
	cincta F. var. picea	
	Pas de couleur ferrugineuse; abdomen velouté deust	a Lep.
8.	Abdomen et pattes entièrement jaune clair; parfois une teinte sombre obscurcit légèrement la base des deux pre-	
	miers tergites abdominaux	9.
	Abdomen et pattes jamais entièrement jaunes en même	
	temps	40.
q	Corps presque glabre; jamais de pubescence veloutée, ni	
٠,٠	doréebic	olor F
_	Abdomen et pattes jaune-doré, avec de nombreux poils	
	dressés et une courte pubescence veloutée, dorée	
	mongolica	André
10.	Ailes noires, fortement enfumées; 6° tergite abdominal	
	jaune; tête jaune, très grosse, très dilatée postérieure-	C.
	ment derrière les yeux magnifi	ca Sm
_	Ailes non entièrement noires, ferrugineuses ou hyalines au moins dans la moitié apicale	41.
		11.
11.	Sixième tergite abdominal ferrugineux, le 2º entièrement ferrugineux	12.
	Sixième tergite abdominal autrement coloré	13.
10		10.
12.	aver deux points ferrugineux orient	alis I.
	Abdomen unicolore, les 3e et 4e tergites jamais jaune-clair.	
	Binghami	Buyss
13.	Sixième tergite abdominal jaune, plus ou moins largement	
	marginé de noir bellicosa	Sauss
_	Sixième tergite abdominal noir ou jaune	14.
14.	Sixième tergite abdominal toujours noir	45.
_	Sixième tergite abdominal toujours jaune	26.
15.	Tête et thorax entièrement noirs	16.
10.	Tête et thorax colorés en partie de jaune ou de ferrugi-	
	neux	49.

46. Corps entièrement noir, avec le 2º tergite ou le 4º et le 2º tergite de l'abdomen jaune-orangécincta	
- Abdomen autrement coloré	
47. Les trois premiers tergites abdominaux largement mar- ginés de jaune-orangé, doré; angles antérieurs du cly- péus courts	
— Abdomen entièrement noir, on avec un étroit liséré jaune sur le bord du 2º tergite	
48. Angles antérieurs du clypeus courts, arrondis : partie pos- térieure de la tête, lobes du pronotum et pubescence du corps roux-ferrugineux ; troncature antérieure du 1° segment abdominal droite, abrupte Dybowskii And	lré.
<ul> <li>Angles antérieurs du clypeus aigus; tête et thorax noir profond: pubescence noire; troncature antérieure du 4<sup>er</sup> tergite abdominal arrondie en avant deusta Le</li> </ul>	ep.
49. Thorax noir, sauf le postécusson et souvent une tache sur le segment médiaire jaune vif; abdomen entièrement noir ou avec quelques-uns des segments étroitement lisérés de jaune; ponctuation de l'avant-corps petite, profonde, irrégulière, ruguleuse, devenant très serrée.	
coriacée sur le front entre les antennes fervida s	im.
Thorax autrement coloré	
	•
20. Hanches antérieures tachées de jaune-clair; petite taille 18-23 mill.; abdomen avec tous les segments tergites plus ou moins largement marginés ou lisérés de jaune.	
bellicosa Sau	SS.
— Hanches antérieures non tachées de jaune-clair; taille ordi- nairement plus grande 22-38 mill.; jamais tous les ter- gites de l'abdomen marginés de jaune	
21. Bord postérieur de la tête distinctement sinué-échancré au vertex; clypeus subimponctué, brillant, lisse; (abdomen noir profond; le 1 <sup>cr</sup> tergite ferrugineux avec une bande noire transversale, ou noir avec une étroite bordure jaunâtre)	šnī.
Bord postérieur de la tête nullement échancré au vertex ; clypeus ponctué, ruguleux	
22. Abdomen entièrement noir, brillant Dybowskii And	dré
- Abdomen entièrement noir, mais recouvert d'un très fin	

duvet couché qui le rend terne; ou bien abdomen autrement coloré	22 his
22 <sup>bis</sup> Abdomen noir terne ou avec le 4 <sup>cr</sup> et parfois le 2 <sup>c</sup> tergite étroitement lisérés de jaune pâle ou de ferrugineux	22 ter
— Abdomen autrement coloré	23.
22 <sup>ter</sup> Premier tergite abdominal étroitement liséré de jaune pâle; clypeus avec le milieu du bord antérieur déprimé, non réticulé	Buyss.
<ul> <li>Premier tergite abdominal avec l'extrème bord ferrugi- neux; clypeus non déprimé au milieu du bord antérieur, mais fortement ponctué-réticulé</li></ul>	Buyss.
23. Abdomen large, court, largement tronqué à la base, très velu; tous les tergites fauves avec des bandes transversales indistinctes un peu plus foncées variabilis	Buyss.
<ul> <li>Abdomen allongé, plutôt étroit, non particulièrement velu; teujours des segments tergites entièrement noirs</li> </ul>	24.
24. Premier et deuxième tergites de l'abdomen ferrugineux, marginés de jaune-clair, le plus souvent avec une bande transversale brune au milieu, la couleur ferrugineuse ou brune faisant presque toujours deux échancrures dans la marge jaune du 2° tergite; le 3° et souvent le 4° marginés de jaune-clair	is Sm.
— Deuxième tergite abdominal entièrement jaune-orangé ou avec la base ferrugineuse ou noire; le 1 <sup>cr</sup> noir ou jaune- orangé en totalité ou en partie; les 3 <sup>c</sup> et 4 <sup>c</sup> toujours noirs, très rarement avec un fin liséré jaunâtre	25.
25. Tête fortement dilatée dans sa partie postérieure, derrière les yeux, jaune avec une tache noire entourant les ocelles; thorax beaucoup plus large; écusson et postécusson, et souvent la carène transversale antérieure du pronotum et deux taches sur le segment médiaire, jaunes	D
<ul> <li>ducalis Sm. var. soror</li> <li>Tête assez forte, mais sans dilatation particulière derrière les yeux, noire ou ferrugineuse; thorax proportionnel-</li> </ul>	Buyss.
lement moins large; écusson et postécusson noirs ou	cta F.
26. Tête très grosse, jaune, dilatée derrière les yeux; 1 <sup>er</sup> et	
2º tergites abdominaux toujours tricolores par zones	

transversales très distinctes : jaune ou jaune-ferrugi- neux en avant, brun foncé au milieu et jaune postérieu-
rement mandarinia Sm.
Tête normale; 4er et 2e tergites abdominaux jamais tricolores en même temps
27. Abdomen très velu, entièrement noir-brun ou marron, sauf le 6° tergite qui est jaune; le 4° tergite parfois avec un liséré jaune pâle plus ou moins complet 28.
- Abdomen autrement coloré; velu normalement (excepté chez les V. rivax et mongolica André)
28. Premier tergite abdominal large, à peu près aussi large que le 2°, la tronçature antérieure très abrupté; abdomen brun-noir velouté, ayant la forme d'une ellipse largement
tronquée sur un bout ; joues courtes variabilis Buyss.  — Premier tergite abdominal rétréci, beaucoup moins large que le 2°, la troncature antérieure subarrondie; abdomen marron, brillant, ayant la forme d'une ellipse à peu près régulière; joues nulles Binghami Buyss.
29. Abdomen recouvert, en outre des poils dressés, d'une très fine pubescence couchée, veloutée, fauve-doré ou noire, ordinairement avec des reflets changeants dorés 30.
- Abdomen non-velouté
30. Abdomen entièrement jaune, avec le 1er tergite noir-brun,
nettement liséré de jaune eulemoides Buyss.
- Abdomen autrement coloré 31.
31. Deuxième tergite abdominal très largement marginé de jaune
— Deuxième tergite abdominal étroitement marginé de jaune. 33.
32. Corps long, étroit, couvert de longs poils jaunes, tibias et tarses toujours jaunes mongolica André.
<ul> <li>Corps distinctement plus trapu, à pubescence courte et beaucoup moins abondante; tibias intermédiaires et pos- térieurs plus ou moins noirs ou bruns en dessus. auraria Sm.</li> </ul>
33. Abdomen velouté de noir profond; 1er tergite largement marginé de jaune vif, le 3e presque entièrement jaune, les autres segments noirs ou étroitement lisérés de jaunevivax Sm.

- Abdomen velouté, à reflets changeants fauves ou subdorés
34. Quatrième tergite abdominal jaune avec une échanceure noire, rectangulaire sur le disque; abdomen parfois sans
reflets fauves velutina Lep.
- Quatrième tergite abdominal jaune, souvent avec une
étroite entaille triangulaire noire, au milieu; toujours des
reflets fauves ou subdorés sur l'abdomen auraria Sm.
35. Corps de petite taille, 48 à 23 mill.; hanches, au moins les
antérieures, tachées de jaune clair ; 4er tergite abdominal
coloré seulement de noir et de jaune bellicosa Sauss.
- Corps de taille beaucoup plus grande, 20 à 23 mill. ; hanches
nullement tachées de jaune; 1er tergite abdominal tou-
jours partiellement coloré de ferrugineux 36.
0 1
36. Les quatre premiers tergites abdominaux étroitement lisé-
rés de jaune
— Tous les segments tergites de l'abdomen, sauf le 4er, large-
ment marginés de jaune ; le 5° sans tache particulière
crabro L.
36bis Le 5° tergite avec une tache médiane rectangulaire jaune,
touchant le bord apical Oberthuri Buyss.
— Le 5° tergite sans tache médiane jaune
crabro L. var. tartarea Buyss.
37. Pronotum avec une carène transversale antérieurement. 38.
Pronotum sans carène transversale
38. Carène transversale du pronotum n'existant que sur les
côtés, près des hanches antérieures; corps grêle, étroit,
entièrement testacé-roussàtre
— Carène du pronotum visible dès le milieu antérieur ; corps
autrement conformé et coloré
39. Clypeus brillant, le bord antérieur profondément échancré
chez la ♀, distinctement sinué chez l'♀; thorax grêle,
rétréci antérieurement ; 2º tergite abdominal rétréci dans
sa partie antérieure doryloides Sauss.
— Clypeus terne, le bord antérieur faiblement sinué chez la 🤉
et chez l';; thorax plus robuste, large antérieurement;
2º tergite abdominal nullement rétréci à la base
Barthelemyi Buyss.

40. Carène transversale du pronotum jaune en entier ou en
partie
abdominaux noirs bordés de jaune
41. Carène du pronotum franchement jaune 42.
- Carene du pronotum jaune en dessus, parce que la bordure
jaune du bord postérieur du pronotum est très large; abdomen avec tous les segments très largement marginés
de jaune clair, les bordures jaunes avec des échancrures
noires; clypeus couvert de points épars, devenant assez
serrés près du bord antérieursilvestris Scop. var. sumptuosa Buyss.
42. Abdomen presque entièrement jaune, couvert d'un fin duvet
doré; 4er tergite noir seulement sur la troncature anté-
rieure ; clypeus imponctué sur le disque lama Buyss.
<ul> <li>Abdomen avec le 1<sup>er</sup> et le 2<sup>e</sup> tergite noirs, marginés de jaune, sans duvet spécial doré; clypeus régulièrement</li> </ul>
couvert de points médiocres espacés media Deg.
43. Clypeus régulièrement couvert de points épars, devenant
assez serrés près du bord antérieur ; tibias antérieurs ex-
ceptionnellement tachés de noir en dessus; carène du pronotum forte silvestris Scop.
Clypeus avec quelques gros points épars, encore plus dis-
persés en ayant; tibias antérieurs toujours tachés de
noir en dessus; carène du pronotum faible, visible sur-
tout sur les côtés (excepté chez la Var. adulterina Buyss.).  norwegica F.
44. Abdomen entièrement recouvert d'un fin duvet soyeux, à
reflets dorés, ou le 1er et le 2e tergites veloutés de noir,
avec quelques reflets changeants, dorés; troncature du 1ºc tergite presque concave orbata Buyss.
- Aucun des segments abdominaux velouté 45.
45. Abdomen presque entièrement jaune-orangé; troncature
du 1er tergite, le 6e en entier et une échancrure médiane
à la base des autres segments noirs ; joues presque nulles.
— Abdomen autrement coloré
46. Ornements de la tête blanchâtres, tous les tergites abdomi-

	naux étroitement et régulièrement marginés de blanc- ivoire; joues nulles	47.
_		48.
47.	Premier tergite abdominal avec deux taches blanches	
	transversales sur le haut de la troncature antérieure, qui	
	est concave; 6° tergite ordinairement entièrement noir;	
	hanches noires; clypeus éparsement ponctué	a la '
	Pas de taches blanches sur le haut de la troncature anté-	nare.
	rieure du 4er tergite abdominal; la troncature antérieure	
	du 1er tergite abdominal non concave; le 6e tergite ordinai-	
	rement marginé de blanc; hanches tachées de blanc;	
	ponctuation du clypeus un peu plus serrée. japonica S	auss.
48.	Devant du scape jaune	
	germanica F. var. flaviceps Sm. et var. stizoides B	
_	De tant an ecop.	49.
49.	The state of the s	50.
-	1100	51.
50.	Deuxième tergite abdominal régulièrement marginé de	
	jaune, le reste entièrement noir ou avec une petite tache jaune-roussâtre de chaque côté, isolée dans le noir	
	Schrencki	Rad.
	Deuxième tergite abdominal en grande partie roux, tou-	
	jours plus ou moins largement taché de jaune ou de	
	roux sur les côtés, ces taches plus ou moins confondues	
	avec la marge jaune ruf	a 1
51.	Deuxième tergite abdominal (presque toujours avec deux	
	taches transversales jaunes dans la partie noire; (angles antérieurs du clypeus longs, subaigus chez la ♀)	
	rufa L. var. austriaca	Panz.
_	Deuxième tergite abdominal sans taches jaunes isolées	
	dans la partie noire; angles antérieurs du clypeus tou-	
	Trees, but a second sec	2.
52.	Bordure jaune du 4er tergite abdominal régulière, entière,	
	sauf au milieu où il existe une petite incision brusque-	
	ment entaillée dans le jaune; ponctuation un peu plus serrée	Rad
-	Bordure jaune du 4er tergite abdominal se rétrécissant gra-	
		53.

53. Premier tergite de l'abdomen noir, avec une bordure jaune soufre échancrée seulement au milieu; tête plus petite, thorax moins large, rétréci en avant..... vulgaris L. Premier tergite de l'abdomen noir sur la troncature antérieure, jaune en dessus avec trois taches noires touchant la troncature antérieure; tête plus grosse, plus épaisse et plus large, ainsi que le thorax..... germanica F. TABLEAU DICHOTOMIQUE pour la détermination des mâles Espèces de l'Europe, l'Afrique, l'Asie et l'Océanie. 1. Ocelles très éloignés du bord postérieur de la tête; antennes munies de tyloïdes; (groupe des Frelons)..... Ocelles touchant presque le bord postérieur de la tête; antennes sans tyloïdes, excepté chez la V. media Deg.; (groupes des Guèpes)..... 17. 2. Le 6° sternite abdominal entier, arrondi à son extrémité: bord postérieur de la tête profondément sinué-échancré. ..... basalis Sm. Le 6º sternite abdominal plus ou moins sinué ou échancré au sommet..... 3. 3. Le 6° sternite abdominal très profondément échancré... Le 6° sternite abdominal légèrement sinué..... 12 4. Les 1er et 2e tergites abdominaux veloutés..... 5 Les 1er et 2e tergites abdominaux non veloutés...... 6 3. Les trois premiers tergites abdominaux étroitement lisérés de jaune..... velutina Lep. Le 4er tergite abdominal ordinairement muni d'un étroit liséré jaune; tous les autres segments très largement bordés de jaune ou presque entièrement jaunes. auraria Sm. 6. Septième tergite abdominal noir : joues courtes...... Gli-Septième tergite abdominal jaune; joues longues...... 7.

6bis Abdomen noir avec le le et parfois le 2e tergite étroitement

Abdomen noir avec le 2º et souvent le 1ºº jaune-orangé.

lisérés de jaune pâle...... Mocsaryana Buyss.

..... cineta F.

496

16. Les 4er et 2e tergites abdominaux régulièrement zonés de

	jaune en avant, de brun foncé, puis de jaune; joues lon-
_	gues
17.	Pronotum ayant une carène transversale antérieurement 48.
_	Pronotum sans carène transversale
18.	Carène très distincte des le dessus du pronotum; dernier article du fouet des antennes conique
	Carène du pronotum n'existant que sur les côtés, près des hanches antérieures; dernier article du fouet des an- tennes tronqué; corps étroit, entièrement testacé rons- sàtre
19.	Thorax rétréci en avant; clypeus avec deux petits angles antérieurement; 2° tergite abdominal rétréci à la base; branches du forceps non tronquées en dessous à leur extrémité; croches se terminant par deux pièces le la contraction de la contracti
	gulaires conjuguées
20.	Antennes avec des tyloïdes étroits; carène du pronotum jaune media Degeer.
	Antennes sans tyloïdes; carène du pronotum noire 21.
21.	Clypeus régulièrement couvert de points épars devenant assez serrés près du bord antérieur silvestris Scop.
-	Clypeus avec quelques gros points épars, encore plus dis- persés en avant norwegica F.
22.	Septième tergite abdominal normal, régulièrement arrondi : le 1er avec deux taches étroites, transversales, jaunes ou blanches, sur le haut de la troncature antérieure rufa L. et ses variétés Septième tergite abdominal échancré sur les côtés, vers la
	base, déprimé dans sa partie postérieure qui est en forme
	de spatule; le 4er sans tache jaunes ni blanches sur le haut de la troncature antérieure

	plus ou moins interrompue au milieu; celle des 3°, 4° et 5° profondément échancrée ou divisée
	borealis Lewis (nec Kirby .
	Tous les segments abdominaux bordés de blanc-jaunâtre
	ou de blanc, sans interruption
	norwegica F. var. marginata Kirby.
6.	Marge des segments 1 et 2 fortement incisée, au point
	d'être interrompue au milieu, principalement sur le 1er.
	diabolica Sauss
_	Marge des segments entière ou très peu profondément in-
_	cisée
7.	Carène transversale du pronotum peu visible, faible en
	haut, noire norwegica F.
	Carène transversale du pronotum forte, très visible, jaune
61	au moins en partie
8.	Sexe femelle9.
-	Sexe mâle et ouvrière. — Carène transversale du prono-
0	tum toujours fortement colorée en jaune media Degeer.
9.	Thorax toujours avec des parties largement colorées de roux; les côtés de la tête, derrière les yeux, jaune roux
	sur toute la longueur des orbites externes media Degeer.
	Thorax noir et jaune clair, jamais de parties rousses; les
	côtés de la tête, derrière les yeux, tachés de jaune
	clair près des joues et au sommet des orbites externes;
	carène du pronotum colorée de jaune sur une faible
	partie seulement en haut
	norwegica F. var. adulterina Buyss.
10.	Ornementation du corps blanche
	Ornementation du corps jaune
11.	Premier et deuxième tergites de l'abdomen plus ou moins
	largement colorés de roux
	rufa L. var. intermedia Buyss.
_	Abdomen sans couleur rousse
12.	Premier segment tergite de l'abdomen très étroit, beau-
	coup plus étroit que le 2°
	rufa L. var. americana Buyss.
	Premier segment tergite de l'abdomen normal, presque
	aussi large que le 2º consobrina Sauss.

— Tache noire antérieure du 4<sup>er</sup> tergite abdominal en forme de losange ou de fer à cheval; thorax court, robuste, large en avant; ♂ 7<sup>e</sup> tergite abdominal insensiblement déprimé à la base du disque, ne formant pas de profil anguleux; les crochets sans appendices à la base de la spatule apicale...... pensylvanica Sauss.

forte dent unciforme dirigée du côté de la base......

20. Premier tergite abdominal avec la tache noire médiane antérieure transversale ou en forme de triangle. ♂ Cro-

- chets ayant de chaque côté de la base de la spatule apicale une forte dent unciforme dirigée vers la base des crochets.
- 21.
- Premier tergite abdominal avec la tache noire médiane antérieure en forme de losange. ♂ Crochets ayant de chaque côté de la base de la spatule apicale une simple dilatation arrondie.....germanica F.
- 21. Premier tergite abdominal ayant une tache noire transversale sur le milieu. Disque du 7° tergite abdominal du mâle brusquement déprimé, ce qui donne un profil anguleux à la base de ce segment...... communis Sauss.

1er groupe.

#### LES FRELONS

V. crabro Linné.

Vespa crabro Linné, Systema naturae, édit. 10°, I, 1758, p. 572, n° 1.
 Editio 12°, I. 2, 1767, p. 948, n° 3.

Femelle. - Corps large, robuste, a pubescence roussatre, grosse, dressée, assez abondante. Tête normale, plutôt un peu moins large que le thorax, roux-ferrugineux. l'espace interantennaire et l'intérieur du sinus des veux jaunes; les côtés de la tête derrière les yeux distinctement dilatés; joues très courtes; clypeus jaune, le bord antérieur profondément sinué, les angles antérieurs arrondis, la ponctuation grosse, serrée, ruguleuse; mandibules jaunes, largement bordées de noir-brun du côté interne. Antennes roux-ferrugineux, plus claires en dessous, le scape jaune en avant. Thorax noir, avec le pronotum, deux taches allongées et longitudinales dans la moitié antérieure du mésonotum, l'écusson, le postécusson presque en entier, une tache sous les ailes et les lèvres des stigmates du segment médiaire, rouxferrugineux; pronotum avec une carène transversale. Écailles rousses; ailes ferrugineux clair, hyalines, une tache roux plus foncé sur toute la longueur de la cellule costale et toute la cellule brachiale. Pattes roux-ferrugineux, les hanches en partie noires, les cuisses intermédiaires et postérieures tachées de noir en dessous, principalement à leur base. Abdomen large, un peu plus étroit à la base qu'au milieu; le 4er segment tergite noir-brun au point d'attache, le reste de la troncature antérieure est roux plus ou moins ferrugineux, cette teinte remontant régulièrement sur le dessus du disque, qui est ensuite ceinturé de brun, puis enfin la bordure est étroite et jaune ; ce segment est donc tricolore : roux-ferrugineux, brun, puis jaune; la troncature antérieure est assez abrupte, mais le haut est arrondi; 2º segment largement coloré de brun dans sa moitié antérieure, cette coloration s'avançant en pointe dans la partie postérieure du segment qui est jaune, un point brun se trouve de chaque côté et touchant plus ou moins la coloration brune; les autres tergites sont jaunes avec deux points bruns, un de chaque côté, isolés ou s'étirant en avant pour rejoindre l'extrême base qui est brune et recouverte par le segment précédent et dès lors invisible au repos; le 3º segment porte le plus souvent une pointe médiane brune, comme le 2º. Une très fine pubescence soyeuse, couchée et jaunâtre se distingue principalement sur les deux premiers segments. Le 6° segment tergite est jaune. Le ventre est noir-brun, plus ou moins teinté de ferrugineux, avec une bordure jaune sur chaque segment, très large sur les deux premiers, réduite sur le 3° et le 4°; sur chaque côté des segments basilaires se trouve un point noir, rarement libre, ordinairement étiré en avant pour atteindre la partie noire de la base des segments; le 5° sternite est iaune presque en entier, la base brunâtre ou brun-ferrugineux. — Long. 28-31 mill.

La couleur roux-ferrugineux peut envahir presque tout le thorax et parfois aussi les parties brunes de l'abdomen.

Ouvrière. — Semblable à la femelle, mais de taille plus petite. — Long. 48-25 mill.

Mâle. — Même coloration que la femelle et l'ouvrière, sauf que les ocelles sont ordinairement entourés de noir et que le ventre est plus coloré de jaune. Antennes très longues, brunies en dessus du fouet, rousses en dessous, le devant du scape jaune : le 3° article avec un petit tyloïde à son extrémité, chacun des autres avec deux tyloïdes. Clypeus grand, convexe, régulièrement arrondi en avant, la ponctuation médiocre, peu serrée, devenant ruguleuse et irrégulière dans la partie antérieure. Les tibias antérieurs sont parfois rayés de jaune en dessus. Le 5° segment sternite ventral légèrement échancré au milieu du bord apical, le 6° subtronqué-arrondi à l'extrémité. L'ensemble de l'appareil copulateur est très volumineux. Les branches du forceps sont

brun foncé, largement sinuées-tronquées au sommet, l'extrémité inférieure de chaque branche se terminant par une spatule arrondie, subtransversale au sommet, le lobe se prolongeant en acumen sublinéaire, aigu à l'extrémité, ne dépassant pas la spatule inférieure. Tenettes des volsellas courtes. Crochets soudés en une pièce impaire assez large à la base, se terminant par deux lobes divariqués, séparés l'un de l'autre par une profonde incision. — Long. 25-27 mill. Pl. VII, fig. 5 et 6.

La V. crabvo L. est répandue dans toute la région paléarctique, principalement dans les pays tempérés, eù elle est alors très commune. Elle est rare dans les pays plus chauds, comme la Corse, la Sicile, la Crimée, la Grèce. Elle existe également dans l'Amérique du Nord. Il est difficile de dire si elle y a été importée ou bien si elle y est venue elle-même du continent asiatique. Elle a été capturée en Nouvelle-Hollande, mais cette localité est certainement accidentelle, car si cette Guèpe y était acclimatée, les voyageurs naturalistes l'auraient signalée.

Elle construit son nid dans les arbres creux où ses gâteaux sont à peu près dépourvus d'enveloppes externes. Les fissures de l'arbre donnant accès dans la cavité où la nichée est établie sont soigneusement closes avec des gaufrures de carton, de manière à ne laisser que un ou deux passages pour la circulation de la colonie. Ces trous de vol sont suffisamment étroits pour que les ouvrières puissent aisément reconnaître tout intrus qui voudrait y pénétrer. Rarement la nidification est aménagée dans les tertres et les rochers, mais on la rencontre assez souvent sous les hangars, dans les greniers, les kiosques, les maisons inhabitées, etc. C'est alors qu'elle devient une construction remarquable. Les gâteaux sont beaucoup plus grands et nombreux; les enveloppes externes décèlent toute l'habileté de l'insecte. Ces nids aériens sont énormes, peuvent mesurer jusqu'à 28 centimètres de diamètre sur 53 centimètres de longueur. Lorsqu'ils sont pendus dans un espace libre, ils sont d'un aspect saisissant par leur beauté étrange. Le carton est plus ou moins jaunâtre, zoné de blanchâtre et de brun, très fragile; les enveloppes sont couvertes de gaufrures et de feuillets. Les piliers qui relient les gâteaux les uns aux autres sont très irréguliers, plats, en forme de rubans ou même spiralés; les alvéoles qui entourent les piliers sont prolongés sur ceux-ci. Les alvéoles les plus externes des gâteaux sont très arqués. Ceux dans lesquels les femelles sont élevées se montrent nettement différenciés. L'ensemble de la construction est tantôt piriforme, tantôt ovoïde. Si le premier gâteau a été construit près d'une paroi quelconque, ou dans un angle, l'édifice sera asymétrique, modelé pour ainsi dire aux irrégularités du local.

l'ai souvent remarqué que l'on peut rencontrer un nid de V. crabro

plusieurs années de suite dans le même arbre ou sous la même toiture. Cette guêpe est une des plus industrieuses et elle sait modifier son travail suivant les nécessités. Lorsque certaines années elle devient très abondante, elle occasionne de réels dégâts aux raisins et aux prunes dont elle est très friande. Elle attaque également les pommes et les poires avant que celles-ci soient mûres ou en état d'être récoltées. C'est encore elle que l'on voit, l'été et l'automne, fixée sur l'écorce de certains arbres malades, les Ormes, les Chênes, plus rarement les Frênes, et lécher la sève qui en découle. Dans ces circonstances, elle devient injuste et méchante au point qu'elle se jette sur les personnes et les animaux qui viennent à passer trop près d'elle. Sa piqure est très douloureuse.

Patrie. - Europe (de l'Orza 1856, Muséum de Paris); France, environs de Paris : Versailles, St-Germain, le Vésinet (coll. Sichel 1867, Muséum de Paris); environ de Paris (Bagriot 1856, Muséum de Paris); environs de Paris ; St-Cloud, Chaville ; Hte-Vienne (coll. J. de Gaulle). Calvados : Lisieux (leg. A. Loiselle, coll. Gadeau de Kerville); Maineet-Loire: St-Rémy la-Varenne (R. du Buysson 1901, Muséum de Paris); France (coll. Lepeletier 1845, Muséum de Paris); Seine-et-Oise; St-Leu (Ch. Bronaniart 1896, Muséum de Paris); Fontainebleau (A. Finot 1897, Muséum de Paris); Eure : Bézu-St-Eloi (Ch. Brongniart 1888, Muséum de Paris); Loiret: forêt d'Orléans (H. Rouyer 1898, Muséum de Paris); Allier : Broût-Vernet (coll. R. du Buysson 1900, Muséum de Paris): Royan (Ch. Delval 1898, Muséum de Paris); Toulouse (Boisgiraud 1834, Muséum de Paris); Montauban (coll. Sichel 1867, Muséum de Paris); Saint-Séver (Léon Dufour 1834, Muséum de Paris); Aix (Boyer de Fonscolombe 1834, Muséum de Paris); Dax, Corse, Sicile, Piémont, Toscane (coll. Sichel 1867, Muséum de Paris); île del Giglio (leg. G. Doria VIII. 1901, Musée de Gênes), San-Rémo (leg. Kriechbaumer 1875, Musée de Munich); Brême (Musée de Brême); Bohême (A. Brullé 1835, Muséum de Paris); Crimée (Cotty 1856, Muséum de Paris); Morée (A. Brullé 1833, Muséum de Paris : Italie : Lombardie, Canonica d'Adda: Ligurie, Varazze, Albenga; Suisse : Kussnacht, près du lac de Zurich (coll. Magretti); Roumanie; Comana, Vlasca (A. Montandon, coll. Magretti).

Afrique : Alger (coll. J. de Gaulle) : Corse : Bastia (G. Degeorgis 1901). Asie : Mandchourie, région du lac Hanka (Bohnhof 1900, Muséum de Paris) : Chine, Kiang-si (A. David 1875, Muséum de Paris).

Amérique : États-Unis, New York (coll. J. de Gaulle: H. Edwards, Musée de Londres: A. von Schulthess Rechberg 1903. Muséum de Paris), New Orléans (coll. Sichel 1867, Muséum de Paris).

Nouvelle-Hollande (coll. Sichel 1867, Muséum de Paris).

# Var. borealis Radoszkowsky.

Vespa crabro L. var. borealis Radoszkowsky, Horae Soc. entom. Rossicae II, 1863, p. 128, pl. XVI, fig. 15.

Femelle, ouvrière et mâle. — Diffèrent du type par la couleur noir foncé qui remplace la couleur ferrugineuse sur certaines partie du corps, principalement le dessus de la tête, presque tout le thorax et la base du 2° tergite abdominal. — Long. \$\overline{2}\$ 26-28 mill.; \$\overline{\pi}\$ 25 mill.; \$\overline{\pi}\$

Cette variété semble particulière à la Sibérie et à la Chine. Elle fait le passage à la variété *crabroniformis* Smith.

Patrie. -- Sibérie (coll. O. Radoszkowsky); Mandchourie : région du lac Hauka (Bohnhof 1900, Muséum de Pavis).

Il m'est impossible de savoir quelle est la Guèpe rapportée par Potanin, de Kan-su en Mongolie. F. Morawitz l'a décrite Horae Societatis entom. Rossicae, t. XXIII, 4889, p. 161) sous le nom de V. crabro L. var. immaculata. Je crois que ce doit être une femelle de V. media Degeer.

Je ne connais pas non plus la Var. anglica Gribodo (Bullettino de la Societa entomologica Italiana, 1891, 33, p. 242) qui diffère du type par l'ornementation jaune du corps plus vive et par une teinte « flavo-glaucescente » sur une partie des 2°, 3°. 5° et 6° tergites abdominaux.

Les exemplaires décrits par M. J. Gribodo sont des femelles provenant d'Angleterre.

#### Var. crabroniformis Smith.

Vespa crabroniformis Smith, Trans. Entom. Soc. London II, 2, 1852. p. 40.

Vespa flavofasciala P. Cameron, The Entomologist XXXVI, 1903, p. 280.

Ouvrière et femelle. — Semblables au type, dont elles différent par la tête qui est de teinte jaune avec une large tache noir-brun autour des ocelles, le thorax noir-brun ferrugineux seulement sur le pronotum et la suture postérieure de l'écusson; les pattes noir-brun sur les hanches, les trochanters et la plus grande partie des cuisses. Sur l'abdomen la couleur brune envahit presque tout le 2º segment et se montre beaucoup plus abondante sur les autres segments, au point que le 3º et le 4º sont, au repos, largement colorés de brun à leur base; les points bruns latéraux des segments ont disparu sur le 1º et sou-

vent sur le  $2^c$  segment tergite; ils sont moins distincts et plus larges sur les autres segments; la bordure jaune du  $2^c$  segment est très irrègulière et réduite de moitié. Les segments ventraux sont comme les tergites, noirs marginés de jaune, les points latéraux plus gros et à moitié compris dans la partie brune; le  $6^c$  tergite et le  $3^c$  sternite sont entièrement jaunes. — Long.  $\mbox{$\mathbb{Z}$}$  20-26 mill.;  $\mbox{$\mathbb{Q}$}$  28-30 mill.

Mâle. — Le mâle m'est inconnu. D'après F. Smith (*Transactions of the Entomological Society of London*, 1852, p. 44) le mâle serait semblable à la femelle, mais avec les antennes plus longues, le 2° segment abdominal ayant de chaque côté une rayure pâle, oblique, peu distincte et aussi deux petits points pâles.

Il n'y a aucun caractère plastique permettant de séparer la *Vespa crabroniformis* Smith de la *Vespa crabro* Linné. La coloration seule les différencie et encore on trouve tous les passages entre ces deux formes. On est donc forcé de reconnaître dans la *V. crabroniformis* Sm., une variété du type européen spéciale à l'Asie Orientale. Dans les collections du Muséum de Paris il existe une ♀ et un ♂ de *V. crabro* L. de Mandchourie, région du lac llanka (*Bohnof 1900*) et une ♀ du Kiang-si (*A. David 1875*). Ces trois insectes font le passage du type européen à la *V. crabroniformis* de Smith.

Je ne connais pas la nidification de cette variété, mais je lis dans les Études sur la famille des Vespides, 2, 4853, p. xcv, de M. de Saussure, les lignes suivantes : « L'ai de même vu le guêpier de la V. crabroniformis qui n'offre rien de particulier et qu'on prendrait volontiers pour celui de la V. crabro. »

Patrie. — Japon (leg. Lewis 1869; 1884: Muséum de Paris: — Roretz 1879, Musée de Vienne; — Pipitz 1882, Musée de Gênes); Yokohama (Musée de Bupadest); environs de Tokio (J. Harmand 1901, Muséum de Paris); Kobe (Hon. E. Scarlett 1900, Musée de Londres); Chine: Haï-ning (coll. Walker, Musée de Londres); Corée: Séoul (Hon. Ella Scarlett VIII 1900 ⊊, Musée de Londres); Chine: Changhaï (Musée de Londres); Japon septentrional: Seso (Faurie 1887, Muséum de Paris); Siao-lou (coll. Martinez Escalera).

#### Var. tartarea var. nov.

Femelle. — Diffère du type par le fouet des antennes plus ou moins bruni; une large tache noire entourant les ocelles; le thorax noir-brun avec le pronotum ferrugineux; les ailes plus enfumées, les pattes plus obscures; l'abdomen noir-brun, tous les segments étroitement marginés de jaune, excepté le 5° tergite qui l'est assez largement et le 6° qui est entièrement jaune, le 4° est plus ou moins ferrugineux à la base; les sternites sont noir-brun marginés de jaune, le 5° entièrement jaune. — Long. 25 mill.

Ouvrière. — Semblable à la femelle, mais de taille plus petite, la tête plus jaune, avec ou sans tache autour des ocelles, le pronotum teinte de jaune en avant, le mésonotum avec une bande ferrugineuse au milieu de la partie antérieure; l'abdomen avec tous les tergites étroitement lisérés de jaune, le 6° reste entièrement jaune; les sternites sont marginés de jaunàtre sur les côtés, le 5° entièrement jaune. Long. 49 mill.

Je n'ai pas vu de mâles ainsi colorés.

Cette variété est l'exagération arrivée à son maximum de la couleur brune déjà signalée chez la Var. crabroniformis Sm. Elle a beaucoup de ressemblance avec la V. Oberthuri Buyss.

Patrie. — Japon : Yokohama (Musée de Budapes!). Columbia (coll. Martinez Escalera). J'ignore où se trouve cette localité du nom de Columbia; je suppose que c'est le nom d'une plantation des Indes anglaises.

### V. orientalis Linne.

Vespa orientalis Linné, Mantissa plantarum II, 1771, p. 340. Vespa turcica Drury, Illustr. Nat. hist. II, 1773, p. 74, t. 39, fig. 1. Vespa fusca Christ, Naturg. d. Insect. 1791, p. 216.

Femelle. - Corps robuste, de grande taille, à pubescence courte. peu abondante, rousse; tout le corps brun-ferrugineux plus ou moins clair, avec le clypeus, l'espace interantennaire, deux petites taches transversales sur le milieu du bord du premier segment abdominal. une très large bordure apicale sur les 3° et 4° segments tergites et sur le 2º segment sternite ventral, jaunes. Tête normale, joues à peu près nulles; clypeus allongé, ferrugineux sur les angles près des joues, le disque assez convexe, la ponctuation grosse, espacée, ruguleuse, devenant plus grosse antérieurement, le bord antérieur profondément échancré, assez fortement déprimé au bord du sinus, les angles antérieurs arrondis; une tache noire au-dessus du triangle interantennaire touchant les ocelles; antennes rousses; thorax large; pronotum fortement caréné antérieurement; écailles ferrugineuses; ailes hyalines, à teinte ferrugineuse; pattes ferrugineuses, couvertes d'un fin duvet couché, doré, le côté interne garni d'un feutre serré à reflets dorés. Abdomen large, brun plus ou moins ferrugineux, couvert d'un fin duvet soyeux, couché, à reflets changeants: 4° tergite à troncature antérieure arrondie en dessus, les deux petites taches apicales jaunes pouvant disparaître. 3° et 4° tergites jaunes avec la base roux-ferrugineux, cette dernière couleur s'avançant en une petite pointe au milieu, et formant de chaque côté une petite échancrure arrondie, qui est rarement séparée complètement de la partie ferrugineuse de la base; les 5° et 6° tergites entièrement roux-ferrugineux. Parfois le 4° segment tergite est plus ou moins largement taché de brun-ferrugineux sur tout le milieu seulement, avec les angles postérieurs jaunes. Ventre concolore, avec le 4° et le 3° segment tachés de jaune aux angles postérieurs. le 2° avec la base roux-ferrugineux, cette dernière couleur s'avançant plus ou moins en pointe au milieu et formant de chaque côté une échancrure arrondie. — Long. 23-26 mill.

Ouvrière. — Semblable à la femelle, mais de taille plus petite; les deux petites taches apicales jaunes du 4° segment tergite de l'abdomen pouvant se réunir et former une bordure jaune n'atteignant pas les côtés du segment; les échancrures roux-ferrugineux, qui se trouvent dans la partie jaune du 3° et du 4° segment plus souvent séparées sous forme de points isolés. — Long. 48-23 mill.

Mâle. — Corps étroit, coloré comme chez la femelle. Le clypeus est tronqué droit en avant, avec deux petits points allongés, déprimés, souvent colorés en ferrugineux; parfois aussi les côtés touchant les orbites internes sont marginés de ferrugineux. Les antennes sont très grandes, le scape très court, jaune en avant; le 3º article porte à son sommet un petit tyloïde, les autres articles en portent deux très développés. Le 6° tergite abdominal brun-ferrugineux, largement subtronqué au sommet, l'apex subsinué; le 5° sternite ventral est plus ou moins échancré au sommet, le 6° fortement déprimé à sa base et plus ou moins sinué au sommet, les angles apicaux larges et arrondis. Appareil copulateur relativement peu volumineux, brun en dessus. roussâtre en dessous; les branches du forceps rappelant beaucoup celles de la V. crabro L.; les tenettes courtes, avec une expansion lamelleuse triangulaire en dessus; crochets se terminant par deux lobes anguleux latéralement, arrondis à l'extrémité et séparés l'un de l'autre par une petite incision. - Long. 19-22 mill.

La *V. orientalis* L. possède une aire de dispersion des plus étendues dans les pays chauds; elle n'existe pas au nord du 46° degré de latitude nord. Elle habite tout le bassin de la Méditerranée, celui de la mer Rouge, l'Arabie, la Perse, l'Asie Mineure, le Turkestan et l'Indoustan. Elle a été capturée à Madagascar, de mème qu'au Brésil et dans la

Guyane française, A. Brullé l'indique comme beaucoup plus abondante que la V. crabro, en juin, dans toutes les parties de la Morée qu'il a visitées pendant son séjour en Grèce. Elle est très familière et recherche le voisinage des habitations. Elle aime beaucoup les fruits, et, certaines années, elle ferait, paraît-il, de réels dégâts aux raisins, M. M. Maindron qui a beaucoup voyagé dans les Indes, m'a dit avoir vu, à Mascate, les V. orientalis venir en nombre sur le bateau, avant même que celui-ci ait abordé au débarcadère. Elles se posaient sur les caisses de bois blanc pour en emporter les fibres sous forme de boulettes. Ces guèpes sont d'une abondance extraordinaire dans l'intérieur de la ville de Mascate, principalement sur le marché aux provisions. Elles sont d'humeur très douce. Il n'est point rare de voir des indigènes acheter du poisson que les Guépes continuent à dévorer, sans souci de se voir emporter. Leur vol est lent et bien différent de celui des espèces de nos pays. Leur belle couleur orangée, transparente, leur donne un aspect qui attire de suite l'attention du naturaliste, D'après M. M. Maindron également, elles affectionnent, aux environs de Mascate, le voisinage des puits où elles rongent les têtes et les queues de poissons que l'on pend aux arbres pour nourrir les bœufs servant à faire fonctionner les norias.

La *V. orientalis* établit son nid dans les arbres creux, comme le fait la *V. crabro*. M. Th. de Stéfani-Pérez a constaté qu'elle le construit aussi dans les fissures des rochers ou des murailles épaisses et même dans des cavités souterraines, en pleine campagne, où les gâteaux sont dépourvus d'enveloppes. Le carten est jaunâtre avec des rayures plus ou moins foncées, analogue à celui fabriqué par la *V. crabro*, et très fragile.

Les gâleaux sont toujours peu nombreux et les alvéoles où sont élevées les femelles sont nettement différenciés. D'après M. Neville Godman (Transactions of the entomological Society of London 1877, page XXXIII des Proceedings), la V. orientalis est « mimicked » par une Laphria qui en a la couleur, la forme, l'attitude et la manière de voler.

Patrie. — Europe: Grèce, Salonique, Chypre, Corfou, Syra, Dalmatie, Sicile (coll. Sichel 1867, Muséum de Paris; — coll. J. de Gaulle); Archipel (d'Urville, Muséum de Paris); Morée (A. Brullé 1833, Muséum de Paris); Kambos, Teygetos mai 1891 leg. Holtz, coll. A. Schulz'; Tarsus (Korb, Musée de Munich); île de Crète (Raulin 1845, Muséum de Paris); Malte (J. de Joannis 1904, Muséum de Paris); Sicile (Bibron 1834, Muséum de Paris); Palerme (E. Blanchard 1844, Muséum de Paris); Rhodes, Samos (coll. Bosc. 1828, Muséum de Paris; — coll. J. de Gaulle);

Chypre (Gaudry 1854, Muséum de Paris); Sicile: Acircale (J. de Joannis 1903, Muséum de Paris); Chypre (Miss Bates 1903, Musée de Londres); Athènes (A. S. Woodward 1901, Musée de Londres); Sicile (coll. Magretti); Taurus (coll. Magretti).

Afrique: Égypte (Bové 1833, de Castelnau 1837, Dejean 1837, Reiche 1855, Clot Bey 1850, Letourneux 1896, Vauloger de Beaupré 1897, Muséum de Paris); Le Caire (coll. R. du Buysson 1900, Muséum de Paris); Alexandrie (coll. J. de Gaulle); Alger (coll. Sichel 1867, Muséum de Paris); Port Saïd (Musée de Brême); Abyssinie (Ferret et Galinier 1892, Muséum de Paris); Madagascar (A. Grandidier, Muséum de Paris); Sahara, source dans l'Oued Samene, pays des Touaregs Azdjer (37 déc. 1898), (Dr Fournial, mission Foureau-Lamy, 1900, Muséum de Paris).

Asie: Syrie, bords de la mer (Mittre 1835, Muséum de Paris), Akbès (coll. J. de Gaulle); Palestine (Dr Roth, Musée de Munich); Euphrate et Jérusalem (coll. Sichel 1867, Museum de Paris).

Arabie: Raz Zélima (Boutan 1893, Muséum de Paris), Sinaï (Botta 1837, Muséum de Paris); Mascate (M. Maindron 1896, Muséum de Paris); Perse (Aucher 1840, Muséum de Paris; 1862 G. Doria, Musée de Gênes); Turkestan méridional, Djizak (Capus et Bonvalot 1881, Muséum de Paris); Bagdad (R. Oberthür 1898 et 1902, Muséum de Paris); Indes (coll. Sichel 1867, Muséum de Paris); Bengale (Duvaucel 1815, Muséum de Paris); Perse: Abushir (leg. Bostfeld, Musée de Brême).

Amérique : Guyane française : Mana (Rivoire 1837, Muséum de Paris), Cayenne (Barthélemy 1834, Muséum de Paris); Brésil (Gaudichaud 1833, Muséum de Paris).

# Var. aegyptiaca Edm. André.

Vespa orientalis L. var. aegyptiaca Edm. André, Species des Hyménoptères d'Europe, II, 1884, p. 584.

Femelle, ouvrière et mâle. — Se distinguent par la couleur brun foncé qui remplace sur l'abdomen les parties rousses ou ferrugineuses que l'on remarque chez le type, et par le 4° tergite abdominal qui est brun foncé présentant seulement deux taches latérales jaune clair. On trouve tous les passages possibles entre ces différentes colorations.

Même taille que le type.

Patrie. — Égypte (Clot Bey 1850, Boré 1833, coll. Sichel 1867, Letourneux 1896, Vauloger de Beaupré 1897, Muséum de Paris); Arabie, Abian (Percival et Dodson 1900, Musée de Londres); Aden (coll. P. Magretti).

# V. parallela Edm. André.

Vespa japonica F. Smith, The Entom. month. Magazine, IV, 1868, p. 279. — Transactions of the entom. Society of London 4873, p. 498 (nec II. de Saussure, nec Radoszkowsky).

Vespa parallela Edm. André, Bulletin de la Société entom. de France, 6°, IV. 1884, p. LXL

Vespa insularis C. G. von Dalla Torre. Catalogus Hymenopterorum hucusque descriptorum systematicus et synonymicus, vol. IX, Vespidae (Diploptera), p. 147, 1894.

Vespa tridentata P. Cameron, The Entomologist, vol. XXXVI, 1903, p. 278.

Femelle. — Corps subparallèle, noir-brun varié de jaune, à pubescence jaune-gris, dressée. Tête pas plus large que le thorax, jaunâtre. avec une tache noirâtre autour des ocelles; les côtés de la tête étroitement carénés en dessous; ponctuation fine, espacée, peu apparente; clypeus à gros points devenant ruguleux et serrés près du bord antérieur qui est fortement échancré avec une petite dent au fond du sinus, les angles antérieurs arrondis, la partie antérieure du clypeus garnie de soies raides, jaune-doré; joues nulles; mandibules normales, jaunâtres. Antennes jaunâtres, brunes sur le dessus du fouet et aussi parfois sur le dessus du scape. Thorax subparallèle, noir, avec le bord antérieur du pronotum jaune suivant la carène transversale: le bord postérieur de l'écusson brun-ferrugineux. Écailles et pattes brunferrugineux, excepté les tarses, les tibias et la moitié apicale des cuisses jaune-ferrugineux. Parfois les pattes postérieures et intermédiaires sont presque entièrement brun foncé à pubescence et feutre ferrugineux. Ailes assez obscurcies à teinte ferrugineuse. Abdomen allongé, noir-brun avec tous les segments largement marginés de jaune, la bordure jaune du 2º segment et des suivants légèrement échancrée en deux petits points, comme chez la V. crabro L.; le dernier tergite entièrement jaune; le 1er segment tergite avec la base noir-brun, le sommet de la troncature antérieure arrondie, jaune ferrugineux suivi d'une ligne transversale noir-brun; les segments ventraux sont tous noir-brun marginés de jaune. — Long. 27 mill.

Parfois le pronotum devient jaunâtre-ferrugineux sur les côtés qui touchent au mésonotum, les bandes jaunes de l'abdomen sont alors moins larges et non festonnées.

Ouvrière. — Semblable à la femelle dont elle ne diffère que par la taille moins grande. — Long. 20-23 mill.

Le type que j'ai vu est une ouvrière; il fait partie de la collection Radoszkowsky et provient de la Sibérie orientale, de Vladivostock.

Mâle. — Semblable à l'ouvrière, dont il diffère par la pubescence du front brun-clair, les joues longues comme l'avant-dernier article antennaire, le clypeus moins profondément sinué antérieurement, la petite dent du fond du sinus peu distincte, les angles antérieurs largement arrondis; une tache ferrugineuse sous les ailes; le thorax hérissé de soies fines, brunes; le pronotum entièrement jaune; deux petites lignes courtes jaunâtres sur le bord antérieur du mésonotum. Les deux derniers segments tergites de l'abdomen sont jaune clair: le 7º légèrement échancré à l'apex; les 5º et 6º sternites ventraux jaune clair, le 5° profondément échancré au milieu suivant une entaille semi-circulaire, le 6º profondément échancré, l'échancrure arrondie, les angles formés par elle subaigus, la base du disque du segment légèrement déprimée avec de gros points obsolètes. Appareil copulateur volumineux, testacé plus ou moins roussâtre; branches du forcens conformées comme chez la V. crabro L., l'acumen de la tenette linéaire, assez long, coudé du côté interne, avec une petite expansion lamelleuse auriculée sur le bord supérieur; crochets se terminant par deux lobes divarigués, séparés l'un de l'autre par une incision subcordiforme, les angles internes des lobes courts, très aigus, les angles externes très allongés et arrondis à l'extrémité; la tige des crochets est dilatée vers le milieu. - Long. 22 mill.

La V. parallela diffère de la V. crabro L. var. crabroniformis Sm., avec laquelle il est facile de la confondre, par les caractères suivants : le thorax carré antérieurement; le pronotum ayant les còtés subparallèles non convergents en avant; les bandes jaunes de l'abdomen mal limitées antérieurement, fondues avec la couleur brune de la base par une teinte roussâtre, et non échancrées ou très vaguement. La forme parallèle du thorax est très remarquable, ainsi que la petite dent que l'on trouve au fond du sinus de l'échancrure apicale du clypeus, chez la femelle et l'ouvrière.

Ayant eu l'avantage de voir les types de la *V. japonica* Smith, conservés dans le Musée d'Histoire naturelle de Londres, il m'est permis d'établir la synonymie indiquée plus haut, entre les *V. japonica* Smith et *parallela* André. Le nom de *japonica* a été employé en 4858 par M. H. de Saussure. M. von Dalla Torre ignorant que la *V. parallela* André est la même espèce que celle décrite par Smith en 4868 sous le nom de *japonica*, remplaca ce dernier par celui de *insularis*. Mais

le nom donné par Edm. André se trouve avoir la priorité sur celui de M. von Dalla Torre.

Nous savons que F. Smith (*The Entomologist's monthly Magazine*, vol. IV, 1868, p. 269) recut un nid de V. parallela André (japonica Sm.) qui lui fut envoyé par Georges Lewis du Japon, Hakodadi. Ce nid fixé à une branche d'arbre, mesure douze pouces anglais de longueur sur neuf dans son plus grand diamètre. L'enveloppe externe est rouge-brun. avec des zones brunes alternant avec d'autres blanchâtres; les fibres de bois employées à la confection du carton semblent avoir été recueillies sur du bois mort. Le gâteau le plus bas du nid est entièrement composé d'alvéoles garnis de guèpes mâles.

Patrie. — Sibérie orientale, Vladivostock (V. parallela André types! coll. Radoszkowsky); Japon: Hiogo (V. japonica Smith types! coll. F. Smith, Musée de Londres); Tshushima (sept.-oct. \$\pi\sigma\) leg. H. Fruhstorfer, Musée de Vienne; coll. von Schulthess Rechberg); Yokohama (Musée de Brême, un exemplaire a été déterminé par Morawitz sous le nom de V. japonica Rad.; Musée de Vienne); île Tsur (Holst, Musée de Londres); île [Nimrod (coll. Walker, Musée de Londres); Indes: Kasia Hills (Musée de Londres); Japon (F. Ancry, Musée de Leyde).

### Var. Biroi var. nov.

Ouvrière. — Diffère du type par sa tête noir profond, avec les côtés près des yeux, les orbites internes, le clypeus, l'espace interantennaire et les mandibules jaune-roux. Le pronotum est entièrement noir; les segments tergites abdominaux sont plus étroitement marginés de jaune, la marge plus nettement limitée antérieurement, avec une très petite entaille noire au milieu, le 4° tergite ne porte qu'un étroit liséré jaune, qui tend parfois à disparaître. — Long. 18-22 mill.

Je n'ai pas vu de femelles ni de mâles ainsi colorés.

Patrie. — Singapore (Biró 1898, Musée de Budapest; — II. N. Ridley, Musée de Londres).

# V. Oberthuri R. du Buysson.

Vespa Oberthuri R. du Buysson, Bull. Soc. entom. France 1902. p. 140. Femelle. — Femelle inconnue.

Ouvrière. — Corps de taille robuste, noir-brun avec la tête, le pronotum, la bordure apicale des segments abdominaux, une tache carrée sur le milieu du 5° segment tergite et tout le 6° tergite jaunes; la tranche antérieure du 1° segment tergite abdominal roux-ferrugineux. Pubes-

Ann. Soc. Ent. Fr., LXXIII [1904].

cence médiocre, brune sur le dorsulum, rousse sur la tête. Tête médiocre à ponctuation distincte, médiocre, très clair-semée : les ocelles très éloignés du bord postérieur de la tête; clypeus presque carré, les côtés subparallèles, émarginé en avant, les angles antérieurs arrondis. la ponctuation grosse, très serrée, fortement ruguleuse; les veux touchant la base des mandibules. Antennes marron, roussâtres en dessous. légèrement brunies en dessus, le scape ferrugineux, jaune en avant. Pronotum caréné; écaillettes ferrugineuses; ailes enfumées assez régulièrement; pattes brunes, les tibias antérieurs ferrugineux en avant. Abdomen brun-marron : le 1er segment tergite à marge jaune très étroite et régulière, la base du 2e segment marquée de deux taches soyeuses d'une teinte plus claire, pouvant par leur réunion former une large bande basilaire; les marges jaunes des autres segments tergites ordinairement beaucoup plus étroites au milieu que sur les côtés: ventre brun, tous les sternites largement bordés de jaune-ferrugineux, souvent avec une tache jaune de chaque côté, dans laquelle se trouve une échancrure noirâtre: le 5e segment sternite est entièrement jaune. - Long. 28-30 mill.

Màle. - Le mâle est inconnu.

La V. Oberthuri Buyss, diffère de la V. mandarinia Sm., par la tête normale, petite, par la forme du clypeus, les joues nulles, la ponctuation de la tête et le coloris. Elle diffère de la V. anàlis F. par la forme du clypeus, par le coloris et la forme générale beaucoup plus trapue.

On ne sait rien sur la nidification de cette espèce.

Patrie. — Chine: Se-tchouen, Siao-lou (R. Oberthür 1898. — Muséum de Paris); Ta-tsien-lou (R. Oberthür 1901; R. P. Grosjean 1902, Muséum de Paris).

### V. analis Fabricius.

Vespa analis Fabricius, Systema entom. 1775, p. 363, nº 5.

Femelle. — Corps étroit, subparallèle, de grande taille. Tête normale, pas plus large que le thorax, ferrugineux plus ou moins obscur, principalement sur le clypeus, l'espace interantennaire, les côtés de la tête près des mandibules et les mandibules elles-mèmes; joues presque nulles; clypeus profondément échancré, avec une petite dent au fond du sinus, la ponctuation grosse, profonde, très ruguleuse et serrée. Antennes brun-ferrugineux, rousses en dessous. Thorax ferrugineux, varié de noirâtre çà et là, principalement sur le mésonotum la carène du pronotum très distincte; écailles ferrugineuses; ailes

enfumées, à teinte jaune; pattes ferrugineux plus ou moins obscur. Abdomen allongé, avec une très fine pubescence, très courte, couchée, soyeuse, dorée sur les parties jaunes, noire sur les parties brunes, cette pubescence donnant des reflets changeants: Jer segment tergite long, arrondi en avant, ferrugineux sur la moitié antérieure, brun sur la moitié postérieure, le bord apical souvent un peu plus clair; 2º segment long, jaune plus ou moins ferrugineux dans la moitié antérieure, le reste brun avec un liséré jaune au bord postérieur, la couleur jaune de la base formant ordinairement deux échancrures dans la partie brune; les 3º, 4º et 5º tergites bruns, ordinairement avec le bord apical plus ou moins jaunâtre et avec deux vagues taches jaunâtres sur chacun d'eux; le 6º tergite jaune. Ventre brun ou plus ou moins ferrugineux, le bord apical des segments généralement un peu jaunâtre, le 5º segment sternite jaune. — Long. 31-32 mill.

Ouvrière. — L'ouvrière est semblable à la femelle, mais de taille plus petite. — Long. 17-28 mill.

Mâle. — Le mâle est semblable à l'ouvrière, dont il diffère seulement par les caractères habituels de son sexe. Clypeus subtronqué à à l'extrémité qui est marginée-déprimée, les angles latéraux arrondis, une carène médiane remplace la petite dent que l'on remarque chez la femelle et l'ouvrière. Antennes noir-brun; les tyloïdes se montrent à partir du 3° article, le 2° porte à son extrémité un petit tyloïde rudimentaire. Abdomen avec le 6e tergite allongé, jaune dans le tiers apical; le 7e tergite, jaune, arrondi au sommet, le bord apical finement frangé de poil roux-doré; le 5° sternite jaune avec une échancrure semicirculaire au milieu du bord apical; le 6° sternite profondément échancré, les angles formés par cette échancrure grands, légèrement arqués en dedans et garnis de poils courts, denses, roussatres. Branches du forceps se terminant en dessous par une pointe en forme de spatule arrondie, avec un léger angle obtus du côté interne, le lobe se prolonge en une baguette linéaire, atteignant l'extrémité de la spatule inférieure; tenette avec un acumen modérément long, linéaire; crochets soudés ensemble, élargis un peu au-dessous du sommet qui se divise en deux expansions divariquées. — Long, 23 mill.

La V. analis F. construit des nids aériens dans les branches des arbres ou bien sous des abris divers, comme sous l'avancement des toitures des maisons. Le carton dont ils sont faits est très fragile, de couleurs variées, le plus souvent avec des zones blanchâtres ou brun chocolat, alternant avec des bandes rousses. Les fragments de fibres, qui entrent dans sa composition, sont très courts et grossiers.

Au cours d'un voyage à Java, M. M. Maindron a peint d'après nature un jeune nid. Celui-ci est globuleux : une enveloppe externe enferme complètement le gâteau initial qui est pédicellé et comprend quelques alvéoles seulement. L'ouverture est aménagée dans la partie la plus inférieure. La figure schématique de la pl. IX a été faite d'après l'aquarelle que M. Maindron a bien voulu mettre à ma disposition.

M. Paul Serre, consul de France à Batavia, a eu l'amabilité de m'envoyer deux nids très jeunes de la mème Guèpe, avec toute leur population : reine, ouvrières, nymphes et larves. L'un et l'autre sont en forme de cloche. Il n'y a qu'une seule enveloppe, très largement ouverte inférieurement, au point de laisser à découvert le sommet des alvéoles. Voir la pl. IX.

Les larves ont les mandibules quadri-dentées: cinq gros mamelons seulement se voient sur les côtés des segments 5 à 9; le 8° et le 9° segments portent en dessus chacun une protubérance transversale, rugueuse, l'une et l'autre interrompues sur la ligne médiane; enfin sur le dessus du segment anal font saillie deux cornes protractiles, qui mesurent un millimètre et demi quand elles sont totalement déveoppées.

On doit également à M. P. Serre la découverte du mâle, qui était resté inconnu

Patrie. — Pondichéry (Leschenault, Muséum de Paris); Bengale (Diard et Duvaucel 1815, Muséum de Paris); Indes orientales (Marc 1836, Barthélemy 1834, Muséum de Paris); Cochinchine (Muséum de Paris); Chine (coll. Sichel 1867, Muséum de Paris). Java: (coll. Sichel 1867; M. Maindron 1885, Muséum de Paris); — O. Thienne, coll. A. Schulz: — Musée de Vienne: — Coll. J. de Gaulle); Buitenzorg (R. Oberthür 1898, Muséum de Paris: — G. B. Ferrari 1877, Musée de Gènes); Lawang (H. Fruhstorfer 1895, coll. A. Schulz); Mont Salak (R. Oberthür 1898, Muséum de Paris); Pontiak (R. Oberthür 1897, Muséum de Paris); Batavia (Sept. 1876, leg. M. Maindron 1892: P. Serre 1903, Muséum de Paris); Java (Musée de Londres: \$\rightarrow\$ Musée de Brème); Buitenzorg (Dr Spire 1901, Muséum de Paris); Java (coll. Martinez Escalera).

## Var. tenebrosa var. nov.

Femelle. — La femelle m'est inconnue.

Ouvrière. — Semblable au type dont elle diffère par la tête noirâtre ou ferrugineux obscur, le thorax et les pattes noir-brun. l'écusson ordinairement taché de ferrugineux. l'abdomen brun avec le 4° segment

517

tergite ferrugineux obscur antérieurement, la partie jaune du 2º segment devenant ferrugineux obscur gardant des tons chatovants. La bordure apicale du 2º segment peut disparaître, mais le 6º tergite reste jaune vif d'une manière constante. On trouve du reste tous les passages reliant cette variété sombre avec le type.

Mâle. — Le mâle m'est inconnu.

Patrie. — Java (Musée de Budapest); Java, Goban (R. Oberthür 1898, Muséum de Paris); Java, Gondang (juillet 1898 A. Duchaussoy).

## V. ducalis Smith.

Vespa ducalis Smith, Trans. entom. Soc. London, II, 2, 1852, p. 39.

Femelle. — Corps étroit, subparallèle, robuste, de grande taille, à pubescence longue, roussâtre sur la tête et les segments jaunes de l'abdomen, noirâtre sur le reste du corps. Tête normale, de la largeur du thorax, jaune clair ou plus ou moins teintée de ferrugineux; souvent une petite tache noirâtre autour des ocelles; joues médiocres clypeus largement émarginé en avant, les angles antérieurs longs, tout le clypeus fortement et densément ponctué, ruguleux. Antennes brun-ferrugineux, le scape plus clair, parfois jaune en avant. Thorax noir-brun, muni, en outre de la pubescence, d'un fin duvet soyeux, couché, à reflets changeants. Pronotum avec une forte carène transversale en avant, jaune; parfois les lobes latéraux sont tachés de jaune ou de ferrugineux. L'écusson et le postécusson sont souvent plus ou moins tachés de jaune ou de ferrugineux, parfois même ils sont en entier de l'une ou de l'autre de ces couleurs. Écailles brun-ferrugineux, veloutées. Ailes à teinte jaune-ferrugineux, les cellules costales et brachiales des supérieures plus foncées. Pattes noir-brun ou brunroussâtre, les tibias et les tarses recouverts en dessous d'un duvet soveux, doré. Abdomen allongé, subparallèle, noir, avec les trois ou quatre premiers segments largement marginés de jaune, la marge irrégulière à son bord antérieur : le 4er et le 2e segment ferrugineux à la base, de sorte qu'ils sont tricolores transversalement; la marge jaune du 1er entière et plus large au milieu, celle du 2e avec deux échancrures antérieurement. Ventre noir avec les deux ou trois premiers segments plus ou moins largement marginés de jaune : le 4ec segment sternite plus largement que les suivants, parfois avec une tache noire de chaque côté, libre dans la partie jaune ou bien attenant à la base noire. - Long. 30-36 mill.

On trouve des individus dont le mésonotum est largement taché de ferrugineux, ainsi que les pleures et les hanches. Très souvent aussi

la partie ferrugineuse des segments tergites 1 et 2 de l'abdomen est recouverte d'un fin duvet soyeux, à reflets dorés. Quelquefois la bande noire de ces mêmes segments teud à disparaître.

Ouvrière. — L'ouvrière est semblable à la femelle, mais avec le thorax plus souvent taché de ferrugineux; parfois les tibias antérieurs sont jaunes en avant ou bien les tibias et les cuisses sont plus ou moins colorés de ferrugineux. — Long. 29-30 mill.

Male. — Semblable à la femelle pour la coloration, mais avec le corps plus étroit, la tête plus petite; le clypeus est simplement tronqué en avant; le 3° article antennaire sans tyloïdes, ceux du 4° très peu visibles, les autres articles munis de deux tyloïdes chacun comme de coutume; parfois les tyloïdes ne commencent qu'à partir du 5° article; le 7° segment tergite de l'abdomen tronqué au sommet et légèrement sinué, le 6° et le 7° garnis de gros points épars, irréguliers; le 5° segment sternite du ventre échancré largement, à sinus arrondi, le 6° profondément échancré, les lobes grands, conjugués, le disque déprimé, couvert de poils couchés jaunâtres. Appareil copulateur relativement petit; les branches du forceps testacées en dessus, brunies en dessous; le reste comme chez la V. crubro L. mais avec la spatule inférieure des branches du forceps plus longue, plus développée, ne dépassant pas l'extrémité du lobe, et la tenette des volsellas largement lancéolée, aiguë, pas plus longue que les crochets. — Long. 25-30 mill.

Je ne sais rien sur la nidification de cette belle espèce.

Patrie. — Siam (coll. Sichel 1867, Muséum de Paris); Tonkin: Monts Manon (avril-mai, 2-3000 m. leg. H. Fruhstorfer, coll. von Schulthess Rechberg); Yun-nan: Tsékou (R. Oberthür 1898, Muséum de Paris); Chine (Haas, Musée de Vienne); Chang-hai (de Montigny 1854, Muséum de Paris; — J. de Joannis 1898, Muséum de Paris); Tché-li (J. de Joannis 1898, Muséum de Paris); Kiang-si (A. David 1875, Muséum de Paris); Sud-est de Ngan-hoei (J. de Joannis 1901, Muséum de Paris); Yng-Chan (J. de Joannis 1902, Muséum de Paris); montagnes au nord de Pékin (A. David 1863, Muséum de Paris); Jéhol (A. David 1865, Muséum de Paris); Japon (Rans 1871, Musée de Vienne), Myadzu (leg. R. P. Relaves 1902, coll. Fr. Sébastien), Tokio (1878 Chiossone, Musée de Gênes); Chine, Chang-hai, Chin-hae (coll. Walker, Musée de Londres); Tamsin, sud de Formose (J. de la Touche, Musée de Londres); Chine, Ning-po (Felder, Musée de Leyde); Birmanie, Schwego-Myo (L. Fea, X,-1885, coll. Magretti).

## Var. pulchra var. nov.

Femelle et Ouvrière. — Différent du type par la bande noire des deux premiers segments tergites de l'abdomen plus foncée et plus large, principalement sur le 2°. Le thorax est noir avec la carène antérieure du pronotum jaune et l'écusson porte souvent deux taches ferrugineuses. Même taille.

Mâle. — Je n'ai jamais vu de mâle coloré de cette façon.

Il est conservé au Musée de Londres, un exemplaire venant de Corée, Séoul (Hon. Ella Scarlett, août 1900, \$\tilde{\pi}\$) qui est remarquable par sa petite taille. 19 mill., et par deux taches obliques, jaunâtres, qui se voient sur le deuxième tergite abdominal. Ces taches ne se touchent pas au milieu du disque, n'atteignent pas les côtés et ressortent d'autant mieux que le fond est noir-brun.

Patrie. — Japon (Boucard 1900, Muséum de Paris) : Yokohama (coll. Guérin-Méneville 1897, Muséum de Paris, déterminée par Guérin-Méneville sous le nom de Vespa japonica Rad.; Musée de Brême; Pipitz, Musée de Gènes; F. Ancey, Musée de Leyde).

## Var. soror var. nov.

Femelle et Ouvrière. — Diffèrent du type par la tête, l'écusson, le postécusson, deux taches sur le tergite du segment médiaire et souvent le bord antérieur du pronotum jaunes; par les angles antérieurs du clypeus arrondis; par les deux premiers segments tergites de l'ab domen jaunes avec un trait brun-ferrugineux transversal vers le milieu, pouvant devenir une bande transversale ferrugineuse, les segments tergites 3 à 6 entièrement noir foncé. — Mème taille.

Cette variété a beaucoup de ressemblance avec la V. cincta F. varaffinis F.

Màle. - Le mâle est inconnu.

Patrie. — Chine: Tchi-fu (1876, Musée de Vienne); Kiang-si (A. David 1875, Muséum de Paris); Bombay (Fontannier 1839, Muséum de Paris; Tonkin: Bac-Kan (M. Maindron 1902, Muséum de Paris), Than-Moï M. Fruhstorfer, coll. A. Schulz); Annam: Phuc-son (H. Fruhstorfer, coll. A. Schulz); sans localité d'origine (coll. Radoszkowsky); Indes: Kasia Hills (Musée de Londres).

#### V. mandarinia Smith.

Vespa mandarinia Smith, Trans. entom. Soc. London II, 1852, p. 38. t. 8, fig. 4.

Vespa japonica Radoszkowsky. Motschulsky, Étud. entom. VI, 4857. p. 40. (nec Smith, nec H. de Saussure).

Femelle. — Corps de grande taille, très robuste; pubescence courte. raide, dressée. Tète jaune-roux en entier, très grosse, aussi large que le thorax, très fortement dilatée postérieurement derrière les yeux; ponctuation presque nulle sur le vertex; le bord postérieur de la tête garni de gros poils roux; l'espace interantennaire élevé, très fortement caréné sur les côtés, avec une petite dépression au milieu: clypeus grand, convexe, le bord antérieur profondément échancré, les angles antérieurs très saillants, arrondis à l'extrémité, la ponctuation grosse. ruguleuse, devenant très serrée sur la partie antérieure; joues longues. Antennes noirâtres avec le scape, le 2º article, le dessus du 3º et l'extrémité des 41° et 42°, roux. Thorax noir-brun avec la carène transversale du pronotum, deux taches sur l'écusson et sur le postécusson. jaune-roux. Le pronotum peut être entièrement ou en partie rouxferrugineux et le mésonotum muni de lignes de cette couleur, deux en avant et une autre au-dessus de chaque aile antérieure. On distingue parfois aussi des taches rousses sur les mésopleures. Pubescence thoracique très grosse, courte, raide, dressée, clair-semée; ponctuation peu distincte, à peu près nulle; tout le dorsulum recouvert d'un duvet très court, couché, excessivement fin, jaunâtre. Écailles roux-ferrugineux, ailes enfumées, ferrugineuses, les cellules brachiales et costales fortement teintées. Pattes noir-brun, le dessous des tarses recouvert d'un épais duvet soveux doré-roux. Abdomen large, brun ou brun-marron avec les cinq premiers segments tergites largement et régulièrement marginés de jaune-orangé, le 4er et le 2e avant en plus une large bande transversale jaune-orangé à la base; troncature antérieure du 1er abrupte, le haut légèrement arrondi; le 6e tergite jaune. Les segments ventraux sont brun-marron avec une bordure jaune. rétrécie au milieu, élargie sur les côtés; le 5° sternite jaune. Pubescence abdominale courte, très grosse, raide, marron plus ou moins roussatre; les parties jaunes des tergites recouvertes d'un très fin duvet, couché, jaune-doré à reflets changeants. - Long, 36-46 mill.

Ouvrière. — Semblable à la femelle, mais souvent avec tout le dessous du fouet antennaire, le haut des cuisses et des tibias antérieurs roux, les tibias et les tarses plus ou moins roussâtre obscur; quelque-

fois les taches de l'écusson et du postécusson deviennent très grandes et les lèvres des stigmates du segment médiaires rousses. — Long. 27-33 mill

Mâle. — Coloré comme l'ouvrière, mais la tête moins grosse; le clypeus tronqué au sommet, à ponctuation très espacée mais ruguleuse; les antennes très longues, le 3° article sans tyloïdes, les articles suivants avec deux tyloïdes chacun; le thorax presque entièrement roux; les pattes de teinte plus claire; les segments tergites abdominaux 6 et 7 entièrement jaune-orangé, le 7º tronqué-arrondi, légèrement sinué au sommet; les segments sternites sont plus largement marginés de jaune-orangé, le 5e incisé triangulairement dans toute sa largeur, le 6º tronqué-sinué au sommet, les angles apicaux arrondis. le disque déprimé. Appareil copulateur très volumineux : branches du forceps ferrugineuses, le reste comme chez la V. crabro L. mais avec la spatule inférieure des branches du forceps plus développée, ne dépassant pas toutefois la longueur du lobe. La tenette est très courte. obtuse à l'extrémité et en dessus dilatée en une très grande expansion triangulaire lamelleuse. Crochets se terminant par deux lobes arrondis sur les côtés externes, anguleusement aigus à leur base et à leur sommet, séparés l'un de l'autre par une incision elliptique; la tige des crochets droite, à côtés subparallèles. — Long. 34 mill.

Selon M. Fortune (Transactions of the entomological Society of London 1852, p. 39), la V. mandarinia Sm., construit de larges nids globuleux dans les plus hautes branches des arbres, dans les montagnes de Teintung, près de Ning-po-foo, en Chine. Dans les collections du Muséum de Paris, il existe un gâteau terminal d'un nid de cette énorme Guèpe: il provient du Sé-tchuen et a été donné par M. R. Oberthür, qui le tenait de l'abbé A. David. Ce gâteau mesure treize centimètres de diamètre: le carton dont il est fabriqué est très résistant et épais, composé de libres ligneuses très courtes, assez fines, fortement enduites et reliées ensemble par un produit glandulaire; la couleur est brunchocolat et brun-roux, avec alternances de tons différents. Le pilier qui retenait ce gâteau au précédent est en forme de colonne, irrégulièrement cannelée, devenant triangulaire au sommet et très largement épatée au bas, c'est-à-dire sur le fond des alyéoles du gâteau en question; ce pilier mesure environ un centimètre de diamètre et près de deux centimètres de hauteur; le sommet devait prendre naissance entre trois alvéoles contigus. Sa résistance est extraordinaire et du reste nécessaire, car il était destiné à supporter un poids relativement énorme, vu la grosseur des larves et des adultes. Les alvéoles mesurent 4 centimètres de profondeur sur 13 millimètres de diamètre, ils

sont très grands, car ils ont servi à l'élevage de femelles et de màles; les parois très épaisses à la base vont en s'amincissant, de sorte que les ouvertures sont irrégulières et semblent inachevées. Ce sont les tarves qui perfectionnent le travail en prolongeant chacune leur celule par un cocon de soie blanche surmonté d'un dôme du même tissu, plus ou moins élevé, suivant les sexes.

Il existe dans les collections du Muséum de Paris une ouvrière portant dans l'abdomen une femelle énorme de *Xenos Moutoni* Buyss.; la Guèpe provient de Chine, Ngan-hoei, où elle a été récoltée par le R. P. Mouton, et elle a été donnée au Muséum par M. l'abbé J. de Joannis, en 4902.

La Guèpe que feu le général O. Radoszkowsky a décrite sous le nom de V. japonica, en 1857, dans les Études entomologiques de Motschulsky, est la V. mandarinia Sm. Elle provient du Japon, des environs de Simoda, où elle été capturée par Gaschkevitch.

Patrie. — Japon (leg. G. Lewis 1869; 1884, Muséum de Paris; Pipitz 1882, Musée de Gênes); Yokohama (coll. Guérin-Méneville 1897, Muséum de Paris; leg. H. Stichel, coll. A. Schulz; leg. D. Botto, Musée de Gênes; leg. Dr Haberer 1901, Musée de Munich); Tsushima (\$\xi\$ sept.-octobre leg. H. Fruhstorfer, Musée de Vienne, coll. A. Schulz); Kobe (Musée de Brème); Chine (coll. Sichel 1867, Muséum de Paris; Musée de Vienne); Zo-cé, près de Chang-haï (J. de Joannis 1900, Muséum de Paris); Kiang-si (A. David 1875, Muséum de Paris); Jéhol, au nord de Pékin (A. David 1863, Muséum de Paris); Sé-tchouen: Siao-lou (R. Oberthür 1898, Muséum de Paris); Hong-kong (Page et Leclancher 1844, Muséum de Paris); Tché-fou (coll. J. de Gaulle); Tsing-tan (Dr Haberer 1901, Musée de Munich); King-pogeb (Dr Haberer 1901, Musée de Munich); Ceylan (Deyrolle 1832, Muséum de Paris); Siao-lou (coll. Martinez Escalera); Sé-tchuen occidental. Ta-tsien-lou (R. P. Grosjean 1902, Muséum de Paris).

# V. variabilis spec. nov.

Femelle. — Corps de grande taille, robuste, large, couvert d'une pubescence longue, très abondante, dressée, noirâtre. Tête jaunâtre assez forte, de la largeur du pronotum, modérément dilatée derrière les yeux, l'espace interantennaire large, subarrondi en avant, caréné sur les côtés, sillonné au milieu; joues courtes; clypeus modérément convexe, fortement déprimé en avant, le bord antérieur profondément échancré, les angles antérieurs forts, arrondis, la ponctuation fine, espacée, devenant plus grosse, serrée et ruguleuse en avant; antennes

noir-brun avec le scape ferrugineux. Thorax large, court, noir-brun, parfois avec le pronotum plus ou moins coloré de jaune-roussâtre; pronotum caréné transversalement en avant. Écailles noir-brun, ailes assez enfumées, à teinte ferrugineuse. Pattes antérieures en majeure partie rousses, les autres noir-brun avec le dernier article des tarses roux; toutes les pattes recouvertes en dessous d'un feutre épais. soyeux, roux sur les antérieures, brun-roussàtre sur les autres. Abdomen large, court, ovale, largement tronqué à la base : 1er segment tergite court, à troncature antérieure abrupte, nullement arrondie en haut: les cinq premiers tergites munis d'un fin duvet velouté, soveux. variant de couleur avec celle du tégument ; la coloration de l'abdomen est très variable, celui-ci est noir-brun avec un petit liséré jaune, interrompu au milieu, sur le bord du 1er tergite, des taches indécises sur les autres segments, le 6° tergite est jaune, le duvet couché est brun à reflets jaune sombre, le ventre noir avec le 3° sternite jaune. L'abdomen peut passer au jaune-ferrugineux obscur, avec des bandes irrégulières, indécises, transversales sur le milieu de tous les tergites. le duvet soveux est alors jaune un peu doré, le ventre noir-brun à la base des segments; le 6e tergite et le 5e sternite sont jaune plus ou moins obscur. - Long. 30-33 mill.

Ouvrière. — L'ouvrière est semblable à la femelle, mais le corps est de taille plus petite. L'abdomen est moins large, ordinairement noir avec ou sans traces de liséré jaune au bord du 1<sup>cr</sup> segment tergite, le 6<sup>c</sup> tergite et le 5<sup>c</sup> sternite sont toujours jaunes. — Long. 24 mill.

Måle. - Le måle est inconnu.

Cette espèce se distingue par sa forme large et trapue, sa tête sans dilatation particulière, l'espace interantennaire large, subarrondi en avant, et l'abdomen nullement rétréci à sa base, qui est largement tronquée.

Patrie. — Chine: Mou-pin (A. David 1870, Muséum de Paris); Bornéo (coll. Sichel 1867, Muséum de Paris); Indes orientales Musée de Budapest); Indes (Plason 1872, Musée de Vienne).

# V. Binghami spec. nov.

Femelle. — Corps de grande taille, étroit, couvert d'une abondante pubescence très fine, roussâtre, dressée. Tête jaunâtre ou jaune-roussâtre, de la largeur du thorax, peu dilatée derrière les yeux, l'espace interantennaire triangulaire, caréné sur les côtés; joues nulles; clypeus distinctement sinué antérieurement, les angles antérieurs courts, arrondis, ponctuation fine, espacée, devenant plus grosse, ruguleuse et

serrée en avant. Antennes roussàtres, brunies sur le dessus du fouet. Thorax étroit, roux-ferrugineux ou brun-roux, parfois taché de roux-ferrugineux sur le pronotum, les pleures et le milieu du mésonotum; écailles rousses; ailes modérément enfumées, hyalines, les cellules brachiales et costales plus colorées que les autres. Pattes roux-brun, le feutre du dessous un peu plus clair. Abdomen elliptique, allongé, entièrement roux-ferrugineux ou brun-roux, avec le 6° tergite jaune ou plus ou moins brun-roux, le 1° tergite long, très étroit antérieurement avec la troncature antérieure subarrondie en dessus; on distingue de chaque côté des tergites 2-5 des traces de points plus foncés. Le ventre est brun-roux plus ou moins ferrugineux, avec une petite tache brun-foncé sur chaque côté des quatre premiers sternites. le 5° est jaune ou plus ou moins brun-roux. — Long. 30 mill.

Ouvrière. — Semblable à la femelle, mais de taille un peu plus petite, et ordinairement de couleur plus foncée. — Long. 24-25 mill.

Mâle. - Le mâle est inconnu.

Je me fais un plaisir de dédier cette espèce à M. le colonel Ch. T. Bingham, qui a en découvert la femelle.

On distingue la *V. Binghami* de la *V. variabilis* principalement par sa forme étroite, la pubescence plus fine, le 1<sup>er</sup> tergite abdominal étroit, long, ayant la troncature antérieure distinctement subarrondie en dessus.

Patrie. — Yun-nan, Tsé-kou (leg. R. P. Dubernard 1895, R. Oberthür 1901, Muséum de Paris); Indes orientales (Musée de Budapest); Tenasserim, Taungoo Hills (3, 1898, coll. Ch. T. Bingham).

# V. Dybowskii Edm. André.

Vespa Dybowskii Edm. André, Spec. Hymén. Europe II, 1884, p. 582.

Ouvrière? — Corps de grande taille, robuste, entièrement noir-brun, brillant, hérissé de gros poils roux; la tête ferrugineuse ainsi que les lobes latéraux du pronotum, les écailles et l'écusson. Tête normale, de la largeur du thorax, une large tache noir-brun sur le front qui est couvert d'une ponctuation très irrégulière et ruguleuse; joues courtes; clypeus brun-ferrugineux, assez convexe, couvert de points médiocres, espacés, devenant plus gros, ruguleux et rapprochés en avant, le bord antérieur profondément sinué, les angles antérieurs arrondis, larges et parallèles. Antennes ferrugineuses, brunies sur le dessus du fouet. Pronotum noirâtre en avant de la carène transversale antérieure. Ailes hyalines à teinte ambrée, la base ferrugineuse. Pattes ferrugineuses,

la base des intermédiaires et des postérieures noire; le tomentum du dessous et la pubescence ferrugineux-subdoré. Abdomen unicolore, brillant : le 1<sup>er</sup> segment tergite médiocrement long, la troncature antérieure abrupte, la partie supérieure arrondie; les côtés de l'abdomen garnis de gros points irréguliers, ruguleux. — Long. 25 mill.

Je n'ai pu retrouver les types de cette espèce, de sorte qu'il me reste quelques doutes au sujet de l'identification que j'ai faite. La description qui se trouve dans le *Species des Hyménoptères* ne fait point mention de la forme du premier segment tergite de l'abdomen.

Patrie : Japon : Yokohama (Musée de Budapest).

# V. magnifica Smith.

Vespa magnifica Smith, Trans. entom. Soc. London, II. 2, 1852. p. 45.
 Vespa bellona Smith. Proc. Zool. Soc. London, 4874, p. 248, nº 1.
 t. XVIII, fig. 6.

Femelle. - Corps très robuste, de grande taille, entièrement noirbrun avec la tête jaune-orangé, le 6° segment tergite abdominal et le 5º sternite ventral jaunes, un liséré jaune-orangé au bord de tous les autres segments abdominaux. Pubescence grosse, raide, dressée, noire. Tête très grosse, fortement dilatée postérieurement derrière les veux où la ponctuation est presque nulle et très espacée, le bord postérieur garni d'une série de gros poils noirs, dressés; joues longues; clypeus profondément échancré au bord antérieur, les angles formés par l'incision forts, arrondis, la ponetuation grosse, ruguleuse, irrègulière, devenant encore plus forte et plus ruguleuse dans la partie antérieure qui est fortement déprimée. Mandibules fortement ponctuéesruguleuses, les points confluents pour former des stries. Antennes brunes, le scape ferrugineux en avant. Thorax ayant, en outre de gros poils noirs, un fin duvet soyeux à reflets un peu fauves. Pronotum fortement caréné transversalement en avant. Écailles noires, roussâtres sur les bords. Ailes très fortement enfumées, entièrement noires à reflets violacés. Pattes noir-brun, les tibias et les tarses recouverts d'un fin duvet soyeux, à reflets dorés. Abdomen large; le 1er segment tergite avant la troncature antérieure assez abrupte. Ventre concolore, avec l'extrême bord des segments roussàtre. — Long. 36-42 mill. Pl. V. fig. 5.

On rencontre des individus avec deux petites taches jaunâtres ou ferrugineuses au bord antérieur du mésonotum. J'en ai vu ayant l'abdomen brun plus ou moins ferrugineux à la base des deux premiers tergites et deux taches de la même couleur sur l'écusson et le premier

segment ventral. Parfois la couleur rousse envahit tout le thorax et la troncature antérieure du premier tergite abdominal (*Vespa bellona* Smith).

Ouvrière. — Semblable à la femelle, mais de taille plus petite, la tête un peu moins dilatée postérieurement, les joues moins longues, la ponctuation du clypeus et des mandibules moins forte et moins ruguleuse, les angles antérieurs du clypeus moins grands. L'abdomen est le plus souvent brun-noirâtre plus ou moins teinté de ferrugineux, souvent taché de ferrugineux-jaunâtre sur la troncature antérieure du le tergite. Le pronotum et le mésonotum ont parfois de petites taches ferrugineuses. Les tarses, les tibias et l'extrémité des cuisses des pattes antérieures peuvent être ferrugineux. — Long, 30-35 mill.

Mâle. — Semblable à l'ouvrière, mais de taille un peu plus forte; le clypeus tronqué au sommet avec une petite carène médiane; les antennes noir-brun avec le scape et le dessous de la base du fouet jaune-ferrugineux, le 3° article avec un très petit tyloïde à son sommet, les articles suivants munis chacun de deux tyloïdes; le 6° segment tergite abdominal presque entièrement jaune ou très largement marginé de jaune, le 7° tergite long, avec une petite échancrure à sinus aigu à l'extrémité; le 5° segment sternite presque entièrement jaune, légèrement sinué au sommet; le 6° sternite simplement [tronqué-sinué, de sorte que les angles formés par la sinuosité sont courts et arrondis, le disque est plan. L'appareil copulateur est à très peu de chose près semblable à celui de la V. mandarinia Sm. — Long. 29-32 mill. Pl. VII fig. 4.

Dans les collections du Muséum de Paris, il existe une ouvrière de Chine, et un mâle du Yun-nan portant chacun un *Xenos Moutoni* Buyss.; la première, une femelle, entre le 5° et le 6° tergite abdominal, le second une pupe de mâle, entre le 4° et le 5° sternite de l'abdomen.

Nous savons par le R. P. J. Soulié, missionnaire au Thibet, que la V. magnifica Sm., très venimeuse, établit son nid dans la terre et dans le tronc des arbres creux. Nous tenons également de Mª Biet, qui habita pendant vingt-huit ans les régions presque inconnués du Thibet, que les indigènes de la tribu des Lyssous, font des gâteaux avec les larves et les nymphes de cette Guèpe, qu'ils pilent et laissent fermenter au soleil. « Ces gâteaux, nous disait-il, ne sont pas précisément une nourriture exquise, mais pour les Lyssous, c'est une médecine précieuse, comme la kola pour les nègres d'Afrique, c'est plutôt un stimulant énergique. Un de mes missionnaires, en ayant mangé, gros comme une noisette, a été deux jours sans dormir. » En Thibétain, la Vespa magnifica Sm., s'appelle Naju.

Patrie: Indes (coll. Sichel 1867, Muséum de Paris); Dardjiling [J. Harmand 1890, Muséum de Paris]; Bhoutan anglais R. Oberthür 1900, Muséum de Paris); Assam (coll. A. von Schulthess Rechberg); Burma: Carin Cheba (leg. L. Fea, 900-1100 m. et 1200-1300 m. V. XII. 1887 et 1888, coll. J. de Gaulle); Chine: Yun-nan, Tsé-kou (R. Oberthür 1898 et 1901, Muséum de Paris); Ngan-hoei, Yng-chan (J. de Jounnis 1898, Muséum de Paris); Khasia Hills; Tenasserim, Jhaungyen Valley: Caren Hills (Coll. C.-T. Bingham, Musée de Londres); Bhoutan anglais, Maria Basti;? Columbia (coll. Martinez Escalera): Carin Checu (1300 à 1300 m. L. Fea 1888, coll. P. Magretti.

# V. nigrans R. du Buysson.

Vespa nigrans R. du Buysson, Bull. Soc. ent. de France, 1903, p. 173.

Femelle? — Copie exactement la livrée de la V. magnifica Sm. : la tête est un peu dilatée postérieurement; les joues très courtes; le elypeus muni d'une dent au fond du sinus de l'échancrure du bord antérieur, convexe sur le disque puis brusquement infléchi en avant où la ponctuation est très serrée et très ruguleuse; l'espace interantennaire est légèrement concave avec les côtés arqués et fortement carénés; les ailes beaucoup moins enfumées, à teinte noire mais transparente, hyalines, sans reflets violacés; les tibias et la moitié apicale des cuisses des pattes antérieures sont jaune ferrugineux : le dernier article de tous les tarses et le dessous du fouet des antennes ferrugineux, ainsi que la partie antérieure et souvent aussi les lobes latéraux du pronotum. Le plus souvent le 5° segment tergite abdominal a la marge apicale jaunâtre un peu élargie au milieu; il en est de même du 4º segment sternite; le 6º tergite est toujours jaune; tous les segments ventraux sont largement bordés d'une teinte décolorée plus ou moins ferrugineuse. - Long. 20-29 mill. Pl. V. fig. 6.

On rencontre des individus ayant le thorax presque entièrement roux, ainsi que le ventre, le 4e et le 2e tergite abdominal roux à la base. Coloration analogue à celle de la V. bellona Sm.

Mâle. — Semblable à la femelle (?), mais avec les antennes très longues, jaune-orangé en dessous du fouet, les tyloïdes très saillants mais très étroits, linéaires, le 3° article antennaire avec un petit tyloïde à son extrémité, les autres articles avec deux tyloïdes chacun. Pronotum en grande partie jaune. Abdomen avec les trois premiers segments en dessus et en dessous étroitement lisérés de jaune, le 6° tergite largement taché de jaune à l'extrémité, le 7° tergite entièrement jaune, arrondi, entier; le 5° sternite jaune transversalement,

avec une petite échancrure apicale semicirculaire, abrupte; le 6° sternite profondément échancré, les angles formés par l'échancrure légèrement arqués intérieurement en regard l'un de l'autre. Appareil copulateur très volumineux, à peu de chose près semblable à celui de la V, analis F. — Long. 25 mill.

Le mâle de la *V. nigrans* se distingue de celui de la *V. analis* par le corps moins étroit, par la couleur jaune-orangé de la tête, du scape, des pattes antérieures, par l'abdomen moins cylindrique, le 2° tergite sans tache de couleur claire à sa base.

La V. nigrans porte la livrée de la V. magnifica Sm., mais c'est avec la V. analis F. qu'elle a le plus d'affinité.

Patrie. — Yun-nan: Tsé-Kou (leg. Mª Soulié, R. Oberthür 1898; leg. R. P. Dubernard 1895, R. Oberthür 1901, Muséum de Paris); Sikkim (mars-avril, leg. H. Fruhstorfer, coll. von Schulthess Rechberg); Assam (5, coll. P. Magretti); Carin Cheba (900 m. L. Fea, 1888, coll. Magretti).

# V. deusta Lepeletier.

Vespa deusta Lepeletier, Hist. nat. Insectes, Hymén. I, 1836, p. 506, nº 3.

Femelle. — Corps robuste, de grande taille, entièrement noir profond; la pubescence grosse, raide, courte, dressée, noire. Tête normale, moins large que le thorax; clypeus largement émarginé au sommet, les angles antérieurs allongés, la ponctuation grosse, irrégulière, profonde, ruguleuse, devenant plus grosse et plus serrée au bord antérieur qui porte des soies rousses: joues médiocres: antennes noir-brun, devenant roussàtres en dessous du fouet. Thorax recouvert en dessus, en outre des gros poils raides, d'un fin duvet couché à reflets roux; pronotum fortement caréné transversalement en avant; écailles noires, veloutées; ailes ferrugineuses, les cellules basilaires des ailes fortement enfumées. Pattes noires, la pubescence soyeuse à reflets fauves: souvent les gros poils raides des tibias sont roux. Abdomen large, entièrement recouvert d'un fin duvet velouté, noir profond, les gros poils clair-semés peuvent aussi être roux sur le bord des segments : 4er segment tergite long, plus étroit que le 2c. arrondi en avant; souvent on trouve des traces d'un liséré jaune d'or sur le bord apical du 2°, rarement sur celui du 4°; parfois le liséré est complet sur le 2º: la couleur jaune d'or n'atteint pas l'extrémité du segment, elle en est séparée par une bordure noire très étroite. Ventre concolore. - Long. 29-34 mill.

Ouvrière. — Semblable à la femelle, mais avec les joues plus courtes. — Long. 24-26 mill.

Mâle. - Le mâle m'est inconnu.

La V. deusta Lep., est très voisine des V. philippinensis Sauss. et cincta F.

Patrie. — Manille (1861; Laporte 1834; A. Marche 1884, Muséum de Paris: — Musée de Brême; — legit Baer, coll. J. de Gaulle); Mindanao (Montano et Rey 1880, Muséum de Paris); Philippines: Lucon (A. Marche 1880 et 1884, Muséum de Paris); Palawan (Musée de Budapest; coll. J. de Gaulle: — 1898 leg. H. Fruhstorfer, coll. A. Schulz et Musée Senckenberg de Francfort-sur-Main; Sumatra (coll. A. Schulz; Buru (leg. H. Fruhstorfer, coll. A. Schulz; Sud-est de Lucon, Albay; centre de Lucon, mont Arajat (Musée de Londres); Lucon. Dolores, Sibul, Camarines; îles Palaouan, Puerto Princesa (Musée de Madrid); île Bourou (De Bermstein, Musée de Leyde).

# V. philippinensis II. de Saussure.

Vespa philippinensis II, de Saussure, Étud. fam. Vesp. II, 1853, p. 448.

Femelle. - Semblable à la V. cincta F. dont elle diffère par les caractères suivants : thorax avec un fin duvet couché à reflets fauves ; ailes ferrugineuses, nullement noires à la base; pubescence rousse; tibias et tarses ayant les épines, les poils et la pubescence couchée roux-fauve : abdomen recouvert de nombreux poils courts, épineux : les trois premiers segments tergites noirs à la base, la moitié postérieure jaune vif, tirant un peu sur le jaune-orange, l'extrème bord apical de ces trois segments noir ou brun, les parties noires recouvertes d'une fine pubescence couchée roux-doré, les parties jaunes ont la pubescence dorée; 1er segment tergite avec la troncature antérieure arrondie, comme chez la V. cineta F., la bande jaune apicale régulière; la bande jaune du 2º et du 3° segment tergite portant chacune antérieurement deux échancrures noires; les autres segments sont noirs, le 5e porte des traces jaunes ou taches irrégulières; ventre noir avec une petite tache jaune sur l'angle postérieur de chaque côté du 4er segment sternite. - Long. 23-28 mill.

Ouvrière. - L'ouvrière est inconnue.

Mâle. — Je ne connais pas le mâle, mais d'après M. H. de Saussure il aurait la même coloration que la femelle que je viens de décrire.

Patrie. — Iles Philippines : Mindanao (Musée de Budapest)...
Ann. Soc. Ent. Fr., LXXII [1904].

### V. eulemoides spec. nov.

Ouvrière? — Corps de taille grande, allongé, étroit, subparallèle; pubescence de l'avant-corps courte, dressée, noire, serrée; on distingue une fine pubescence veloutée, noire, sur le dessus du thorax. Tête de la largeur du thorax, roux-ferrugineux, les côtés derrière les veux dilatés: joues médiocres: clypeus long, le bord antérieur marginé de noir, assez profondément sinué, les angles formés par la sinuosité longs, subaigus; l'espace interantennaire caréné sur les côtés; mandibules ferrugineux obscur; antennes roux-ferrugineux brunies sur le dessus du fouet. Thorax noir taché de ferrugineux sur les lobes latéraux du pronotum et le disque de l'écusson; il y a deux petits points roux-ferrugineux sur la partie antérieure du mésonotum; écailles noires, tachées de roux-ferrugineux; ailes fortement enfumées, à teinte jaune-ferrugineux, devenant plus claires dans leur moitié apicale: pattes noires, les tibias légèrement teintés de roux-ferrugineux en dessus principalement ceux de la paire antérieure. Abdomen d'un beau jaune, recouvert d'une fine pubescence couchée à reflets dorés : le 1er segment tergite noir-brun, avec un liséré jaune au bord postérieur, la troncature est assez arrondie; le 1er segment sternite porte une tache noir-brun au milieu touchant la base. — Long. 27 mill.

Mâle. — Le mâle est inconnu.

Cette espèce ressemble beaucoup à une *V. cincta* F. ayant des parties du thorax ferrugineuses, mais elle s'en distingue par le thorax velouté de noir sur le mésonotum, par l'abdomen moins étroit et tout différemment coloré. En somme il y a peu de différence, mais la coloration du 6° tergite abdominal est tellement constante chez les espèces du groupe des *V. cincta, ducalis, analis,* etc., que je suis porté à croire qu'il s'agit bien d'une espèce distincte. Malheureusement je ne connais qu'un seul exemplaire de cette Guèpe, qui rappelle par sa livrée l'*Eulema surinamensis* L.

Patrie. — Île Andaman : port de Blair (leg. Giglioli 1891, Masée de Gènes).

#### V. cincta Fabricius.

Vespa cineta Fabricius, Systema entom., 1775, p. 362, nº 1.

Vespa tenebrionis Christ, Naturg. d. Insect. 4791, p. 216, t. XVIII, tig. 4.

Vespa unifasciata Olivier, Encycl. méth. Insectes, VI. 4791, p. 677, nº 39.

Femelle. — Corps étroit, subparallèle, de grande taille, entièrement noir fonce, avec le 2º segment tergite abdominal et deux taches apicales sur le 2º segment ventral jaune-orangé; pubescence noire, dressée, raide. Tête normale, moins large que le thorax; joues courtes, les veux ne touchant pas la base des mandibules, qui sont noires; clypeus noir, largement émarginé au sommet, les angles antérieurs longs, légèrement divariqués, obtus à l'extrémité ou plus rarement courts et arrondis, le disque à ponctuation grosse, irrégulière, profonde, ruguleuse, devenant plus grosse et très serrée sur la partie antérieure qui est déprimée. Antennes noires, roussatres sur le dessous du fouet. Pronotum fortement caréné transversalement en avant; dessus du thorax couvert, en plus de la pubescence, d'un très fin duvet soyeux, couché, à reflets roux ou fauves. Écailles noires, roussatres sur les bords; ailes enfumées, à teinte jaune-roux, toutes les cellules basilaires fortement obscurcies ou même noires. Pattes concolores, le duvet soyeux du dessous doré. Abdomen long, recouvert, en plus des gros poils hérissés, d'un très fin duvet couché, peu apparent, noir profond, excepté sur les parties jaunes du 2º segment tergite où il est doré; la troncature antérieure du 1er tergite arrondie. - Long. 29-32 mill.

Le coloris est très variable : une couleur ferrugineuse plus ou moins obscure peut couvrir la tête, les antennes, les côtés du pronotum, l'écusson, le postécusson, les tibias antérieurs et parfois aussi tout le 4º segment tergite abdominal, qui peut également avoir le bord apical liséré de jaune. On rencontre des individus dont le 2º segment tergite abdominal est plus ou moins noir à la base et sur les côtés, la couleur noire s'avançant en pointe au milieu de la partie jaune, rarement se prolongeant sous la forme d'une ligne médiane sur presque toute le longueur du segment, exceptionnellement avec un point noir de chaque côté sur le disque. J'ai vu un exemplaire dont tous les segments tergites abdominaux étaient garnis d'un liséré jaune très étroit, le 2º segment entièrement jaune-orangé, le 3º avec une tache irrégulière de même couleur près du bord apical.

Ouvrière. — Semblable à la femelle, mais plus petite, les joues un peu plus courtes. — Long. 20-30 mill.

On retrouve chez l'ouvrière la même variabilité de coloris que chez la femelle. J'ai vu un exemplaire ayant deux points jaune-orangé sur le disque du 1<sup>er</sup> segment tergite abdominal très noir.

Mâle. — Même forme et même coloration variable que chez la femelle et l'ouvrière. Les joues sont cependant plus longues, le clypeus

est tronqué au sommet; le 3º article antennaire n'a pas de tyloïdes, les suivants en portent deux chacun; le 7° tergite abdominal allongé, tronqué au sommet qui est en outre vaguement sinué, le disque faiblement caréné dans toute sa longueur et couvert de gros points épars irréguliers; le 5° sternite ventral porte à son sommet une échancrure demi-circulaire, le 6° déprimé, fortement échancré au sommet, les angles formés par l'échancrure subarrondis, courts, légèrement convergents, entièrement couverts de poils fins, couchés, jaunatres, L'appareil copulateur est relativement peu volumineux, roux-ferrugineux; les branches du forceps rappelant beaucoup celles de la V. crabro L.; les tenettes courtes avec une légère dilatation lamelleuse sur le bord supérieur; les crochets se terminant par deux lobes arrondis en avant. ayant un angle obtus postérieurement et se terminant en angle aigu et s'incurvant au-dessus d'une incision subcordiforme qui sépare les deux lobes: la tige des crochets dilatée légèrement au milieu. — Long. 23-29 mill

La *V. cincta* F. forme avec les *V. deusta* Lep., et *philippinensis* Sauss., un groupe des plus homogènes. En dehors de la couleur, il y a très peu de différences entre ces trois espèces. La *V. philippinensis* Sauss., a le clypeus avec les angles antérieurs plus longs, plus aigus, et l'abdomen garni de très gros poils courts et dressés. La *V. deusta* Lep., a le clypeus un peu comme la *V. cincta* F., les angles antérieurs moins longs que chez la *V. philippinensis*, et elle a, comme cette dernière, de très gros poils courts et dressés sur l'abdomen. La *V. cincta* F. n'a pas de gros poils dispersés sur l'abdomen, excepté sur le bord apical des segments. Le màle des *V. deusta* et *philippinensis* me sont inconnus; l'examen de leur appareil copulateur nous renseignerait certainement sur la valeur de ces deux dernières espèces.

D'après M. M. Maindron et quelques autres voyageurs, la V. cincta F. construit des nids aériens, énormes, suspendus aux grosses branches des arbres, généralement à une certaine jélévation au-dessus du sol. Dans les galeries de zoologie du Muséum d'Histoire naturelle de Paris, il est conservé des fragments de gâteaux rapportés, en 1877 par M. M. Maindron, de l'île de Mancinam dans le havre de Dorey, Nouvelle-Guinée. Le carton est très cassant, bien que plus épais que celui de la V. crabro L.; sa couleur est brun plus ou moins foncé, zoné de teintes plus claires. Le mode de construction est analogue à celui de nos espèces de France : les premières cellules ébauchées au sommet d'un pilier initial sont entourées d'une enveloppe simple.

M. Maindron a offert au Muséum de Paris un petit nid de rénovation qu'il a détaché du milieu d'un autre plus ancien et en grande partie détruit. Il provient également de la Nouvelle-Guinée, des environs de Dorey.

M. G. A. James Rothney (*The Entomologist's monthly Magazine 1877*, p. 92) nous apprend que la *V. cincta* ronge les poutres pour faire son carton et en particulier le bois si dur d'une Verbénacée, appelé bois de *Teck*. Bien plus encore, M. Horne (*Transactions of the zoological Society of London 1870*, p. 172 et 173) dit qu'il a vu souvent cette guêpe occupée à détacher la gomme de l'acacia *catéchu* qu'elle mélange avec des fibres végétales pour façonner son carton. Pour le même usage, elle recueillerait le suc coulant du *Peepul (Ficus elastica Roxb.)*. Suivant le même voyageur, elle fondrait sur les mouches posées, comme le font la plupart de nos espèces françaises; et elle aurait une grande prédilection pour les pèches, les raisins et les pommes.

Patrie. — Asie (Reynaud 1887; Godefroy 1834, Muséum de Paris); Indes (coll. Bosc 1828; Barthélemy 1834; coll. Sichel 1867; Mniszech 1859; Reynaud 1829, Museum de Paris); Tranquebar (Herrich Schaeffer, coll. Sichel 1867, Muséum de Paris); Bengale (Bellanger 1831, Muséum de Paris); Pondichéry (coll. Sichel 1867; Leschenault; Lépine 1854, Museum de Paris); Singapour (coll. Sichel 1867; M. Maindron 1885, Muséum de Paris); Maduré (coll. R. du Buysson 1900, Muséum de Paris); Dekkan, environs de Bellary (Chaper et de Morgan 1883, Museum de Paris); Bangkok (J. Harmand 1885, Muséum de Paris); Cambodge (A. Pavie 1886, Muséum de Paris); de Luang Prabang à Theng (A. Pavie 1888, Muséum de Paris); Burma (leg. F. L. Fea VI 1888, coll. J. de Gaulle); Carin Cheba (coll. J. de Gaulle); Birmanie, Bhamo (leg. F. L. Fea VII 1886, coll. J. de Gaulle); Lakhon (J. Harmand 1878, Museum de Paris); Bhoutan, Maria Basti (R. Oberthür 1898, Muséum de Paris); Siam (A. Pavie 1886; coll. Sichel 1867, Museum de Pavis); Cochinchine (Delestre 1891, Museum de Paris; coll. J. de Gaulle); Himalaya (De Martin, Musée de Munich'; Malacca, Pérak (leg. Mozer, coll. A. Schulz). Tapah-Pérak (G. D. Cerruti 1900, Muséum de Paris); presqu'île de Malacca (Errington de la Croix et P. Chapé 1899, Muséum de Paris); ile Poulo-pineng (Marche 1880, Muséum de Paris); P. Penang (600 à 800 m. II, 1889, Loria et Fea, Musée de Gênes); Tonkin, Cho-moi (Cel Roget 1896, Museum de Paris); Yen Baï (coll. J. de Gaulle); Chine (coll. Sichel 1867; Lesueur 1826; Casanova 1835, Muséum de Paris); Birmanie. Minla (D. Comotto 1883, Musée de Gênes); Kasia Hills; Ternate (Musée de Londres); Hong-kong (coll. Walker, Musée de Londres); Chine (Musée de Brême; Musée de Leyde); Assam; Tenasserim, Malewoon (L. Fea 1887, coll. Magretti); Pegu. Palon; Carin Cheba 900 à 1100 m. (L. Fea VI 1888, &, coll. Magretti): Sumatra, Siboga (E. Modigliani, 1890, coll.

Magretti). Annam, Nha-trang (G. Blin 1902, Muséum de Paris ;
Sumatra (Bruck 1880, Muséum de Paris ; D' Martin, Musée de Munich); Pangherang-Pisang (X 1890 leg. E. Modigliani, Musée de Gènes);
Padang (1890 leg. E. Modigliani, Musée de Gènes); Baliche (X 1890, leg. E. Modigliani, Musée de Gènes); Kaju Tanam (août et sept. 1873, O. Bercari, Musée de Gènes); Engano, Bua-Bua (V-VI 1891, leg. E. Modigliani, Musée de Gènes); Kifa-juc (V, 1891, leg. E. Modigliani, Musée de Gènes); ile Nias, Lelemboli (août 1886, E. Modigliani, 1887-88 U. Raap, Musée de Gènes); Java (coll. Sichel 1867; M. Maindron 1885; Vinder 1828, Muséum de Paris); Buitenzorg (G. B. Ferrari 1875, Musée de Gènes; R. Oberthür 1898, Muséum de Paris; leg. O. Thienne, coll. Schulz ; Lawang (1895 leg. Fruhstorfer, coll. A. Schulz); Monts Kawie, Pasaerorean (coll. J. de Gaulle); Dessa Tjikidang (R. Oberthür 1898, Muséum de Paris); Java, Batavia (P. Serre 1903, Muséum de Paris); Java et Bornéo (coll. Martinez Escalera).

Bornéo (coll. Sichel 1867: Allard 1897, Muséum de Paris); Pontianak (R. Oberthür 1898, Muséum de Paris); Sarawak (1865-66, coll. G. Doria, Musée de Gènes); Sandakan (Montano et Rey 1880, Muséum de Paris); Amboine (1873 O. Beccari, Musée de Gènes); Lombok, Sapit (2000, avril 1896 leg. H. Fruhstorfer, coll. A. Schulz).

Nouvelle-Hollande (coll, Sichel 1867).

Brésil: rives de l'Amazone (Stevens 1855, Muséum de Paris), Rio Janeiro (Muséum de Paris), Province de Goyaz, Iatahy (coll. J. de Gaulle); Pérou (coll. J. de Gaulle).

#### Var. affinis Fabricius.

Vespa affinis Fabricius, Mantissa Ins. I, 4787, p. 287, nº 2.

Femelle. — Semblable au type, mais avec le 1er segment tergite abdominal jaune-orangé comme le 2e; souvent la troncature antérieure du 1er segment est noire et cette couleur noire envahit parfois plus ou moins le dessus et les côtés du segment de manière à former tous les passages avec les V. Alduini Guérin et philippinensis Sauss. — Long. 30-35 mill.

Fai vu une femelle ayant le 4er segment abdominal noir, largement marginé de jaune, comme la Y. philippinensis Sauss.

Ouvrière. — Semblable à la femelle et variable comme elle. Il existe des individus à thorax entièrement roux, moins le mésonotum qui reste noir, d'autres ont la base du 3° segment tergite abdominal jaune-orangé ou même ferrugineux. Les angles antérieurs du clypeus sont, chez cette variété, très souvent arrondis et courts. — Long. 49-30 mill.

Mâle. — Semblable à la femelle et variable autant qu'elle. Le 3° article antennaire avec un ou deux tyloïdes, les suivants chacun avec deux tyloïdes. Le 1° segment tergite abdominal porte parfois une tache triangulaire noire sur le disque, près du bord apical, ou bien une bande transversale étroite, noirâtre, parallèle au bord apical. L'appareil copulateur est le mème que chez le type. — Long. 19-25 mill.

La variété affinis F. a la même dispersion géographique que le type. Je croirais même qu'elle est plus abondante que celui-ci au sud de l'équateur; c'est ce qui m'a semblé d'après les nombreuses collections que j'ai eu le loisir d'examiner.

Un très beau nid, construit par des insectes appartenant à cette variété, se trouve dans les galeries de zoologie du Muséum de Paris. Il a été envoyé de Penang par M. J. Claine en 1891. Sa forme générale est piriforme, sa hauteur est de 65 centimètres et sa plus grande largeur de 52 centimètres. Il y a douze gâteaux avec des avéoles très différenciés pour l'élevage des femelles. Les piliers qui réunissent les gâteaux sont à section transversale ovale ou elliptique, c'est-à-dire qu'ils ne sont point cylindriques. Le carton est cassant, brun, zoné de jaunâtre plus ou moins clair. L'enveloppe est à peu près simple, d'une épaisseur remarquable et très fragile en même temps; on trouve çà et là quelques gaufrures, principalement au sommet qui est de forme très irrégulière et entoure largement la branche d'arbre où il est établi.

Patrie. - Asie (Reich 1838, Muséum de Paris, Indes orientales (Reynaud 1829, Muséum de Paris); Colombo (Musée de Brème); Tranquebar (Herrich Schaeffer, coll. Sichel 1867, Museum de Paris); Poulopinang (Marche 1880, Museum de Paris : coll. J. de Gaulle); Singapour M. Maindron 1892, Museum de Paris; Musée de Brème; coll. J. de Gaulle); ile Bengkalis (M. Maindron 1880, Museum de Paris); Penang (Claine 1891, Muséum de Paris); Malacca. Perak (leg. Mozer, coll. Schulz); Birmanie, Bhamo (leg. L. Fea VII 1886, coll. J. de Gaulle); Carin-Chéba (900-1100 m. leg. L. Fea VI 1888, coll. J. de Gaulle); Cambodge (J. Harmand 1875, Muséum de Paris); de Luang Prabang à Theng (A. Pavie 1888, Muséum de Paris); Siam (coll. Sichel 1867, Museum de Paris); Cochinchine (1861, Museum de Paris; coll. J. de Gaulle); ile Poulo Condore (Germain 1869, Muséum de Paris); Himalava (De Martin, Musée de Munich); Tonkin (R. Oberthür 1898, Museum de Paris); Yen Baï (coll. J. de Gaulle, frontière de Chine, Ha Giang (A. Weiss 1901, Museum de Paris); Saïgon Germain 1864, Muséum de Paris); Singapour et Birmanie, Minha (Comotto, Musée de Génes); Haut Tonkin, Phuon-lom (leg. J. Laisi, R. Oberthür 1901, Museum de Paris) Tenasserim, Malewoon (L. Fea & VII 1887, coll. Magretti); Birmanie, Schwego myo (L. Fea \(\xi\) X 1885, coll. Magretti). Annam. Nha-trang (J. Blin 1902, Muséum de Paris).

Chine (coll. Bosc 1828; Callery 1846, Muséum de Paris; coll. J. de Gaulle): Kiang-yen (Callery 1846 et 1847, Museum de Paris); Mou-pin (A. David 1870, Muséum de Paris); Yng-chan (J. de Joannis 1901, Museum de Paris); Banghah (coll. J. de Gaulle); Hong-Kong (Musée de Brême); ile Morty (coll. D. Gribodo, Musée de Gênes); Sumatra. Benculen (IV 1891, leg. E. Modigliani, Musée de Gènes); Siboga (1886, 1890, 1891, E. Modigliani, Musée de Gènes; ♥ avril 1886, coll. Magretti); Archipel Bismark (coll. Magretti) NIIe-Guinée, Dilo (Loria, VI 1890, coll. Magretti); île Nias, G. Sitoli (E. Modigliani, Musée de Gênes); Java (1897-98 U. Raap, Musée de Gênes); Bornéo (Allard 1897, Muséum de Paris); Philippines, Lucon (Marche 1883-84, Muséum de Paris); Batian (août-sept. leg. H. Fruhstorfer, coll. A. Schulz); Java, Monts Kawie, Parocroéan (coll, J. de Gaulle): Célèbes (de la Savinière 1877, Muséum de Paris); Vréma (M. Maindron 1892, Muséum de Paris); Ménado (Riedel 1864, Muséum de Paris); Moluques (coll. Sichel 1867; Laglaize 1878, Muséum de Paris); Ceram Wahai (mars 1872 d'Albertis, Musée de Gênes); Amboine (coll. J. de Gaulle); Timor (Muséum de Paris); Nouvelle-Guinée, Amberbaki, Dorey (M. Maindron 1892, Muséum de Paris); Kapa-Kapa (mai-juin leg. L. Loria 1891, Musée de Gênes), Moroka (1300 m. VII-XI 1893 leg. L. Loria, Musée de Gênes), Dilo (1890, L. Loria, Musée de Gênes), île Yule (1875, L. M. d'Albertis, Musée de Gênes, Ansus (1875, O. Beccari); Dorf (Musée de Munich); Célèbes, Toli-Toli (leg. H. Fruhstorfer, coll. Schulz et coll. J. de Gaulle); Dorey (leg. H. Fruhstorfer, coll. Schulz); Ternate (1901, leg. H. Rouyer, coll. J. de Gaulle; M. Maindron 1892, Muséum de Paris); détroit de Torres, ile Thursday (Lix 1891, Muséum de Paris); nord-ouest de Bornéo (Musée de Londres); Bornéo; ile Palaouan, Puerto Princesa; Amboine (Musée de Madrid; coll. P. Magretti).

Amérique : Pérou (coll. J. de Gaulle); Brésil, province de Goyaz, Iatahy (coll. J. de Gaulle).

#### Var. Alduini Guérin.

Vespa (bimaculata) Alduini Guérin, Dupérey, Voy. Coquille, Zool. II, 2, 4830; pl. IX, fig. 6.

Femelle. — Je n'ai jamais rencontré de femelles appartenant à cette variété.

Ouvrière. — Taille plus petite que la var. affinis Fabr., dont elle diffère par la couleur de l'abdomen qui est noir, excepté le 2° segment

tergite. Celui-ci porte en dessus deux grandes taches jaune-orangé, allant toucher le bord postérieur, se réunissant au milieu en un point et ayant chacune une tache brune en arrière et au milieu. On trouve facilement tous les passages reliant cette variété à la var. affinis F. — Long. 22·25 mill.

Mâle. — Le type, décrit par Guérin-Méneville, et provenant de l'île Bourou, des Moluques, serait un mâle. J'ignore où il est conservé. Il ne figure pas dans les collections du Muséum de Paris.

Patric. — Amboine, Ternate (leg. H. Rouyer 1901, coll. J. de Gaulle): Archipel Bismark (coll. Magretti).

### Var. picea var. nov.

Femelle et mâle. — Je n'ai pas encore vu de femelles ni de mâle appartenant à cette variété.

Ouvrière. — Diffère du type par son coloris entièrement noir de poix, sauf les orbites internes légèrement ferrugineux et une tache de mème couleur près du vertex, derrière les yeux. L'abdomen est entièrement noir, excepté le 2° segment tergite qui porte de chaque côté et à sa base une tache ferrugineuse mal définie et peu visible. Le clypeus à les angles antérieurs arrondis, les ailes plus régulièrement enfumées que chez le type et les écailles sont ferrugineux clair sur la moitié externe. — Long. 22 mill.

Cette variété est le maximum du mélanisme chez la *V. cincta* F. Elle ressemble aux ouvrières de la *V. deusta* Lep., qui n'ont pas de liséré jaune sur l'abdomen. On la distingue cependant par l'abdomen sans duvet velouté, presque glabre, le 1<sup>ee</sup> segment tergite plus étroit, le 2<sup>ee</sup> plus rétréci à sa base et par les teintes ferrugineuses que l'on voit sur différents points de la tête, du 2<sup>ee</sup> segment abdominal et des écailles.

Patrie. — Nouvelle-Guinée, Tupuseleia (VII 1892, L. Loria, Musée de Gènes); lle Yule (VI, 1875 L. M. d'Albertis, Musée de Gènes); N¹¹º-Guinée, Kapa-Kapa (Loria, coll. Magretti), Tupuseleia (Loria ♀ VII, 1892, coll. Magretti).

# V. Mocsaryana spec. nov.

Femelle et ouvrière. — Corps de taille moyenne, assez robuste; pubescence tine, dressée, assez longue, testacé-roussàtre. Tête de la largeur du thorax, normale, roux-ferrugineux clair; clypeus roux un peu jaunâtre, à ponctuation irrégulière, subaciculée, assez grosse, modérément profonde, éparse, légèrement ruguleuse, le bord antérieur médiocrement sinué, plus distinctement jaune, toute la partie touchant le sinus fortement déprime, à gros points épars, non réticulés, les angles antérieurs arrondis; joues nulles; espace interantennaire caréné sur les côtés; antennes roux-ferrugineux ainsi que le thorax, celui-ci taché de noir sur la poitrine, les pleures, le devant du pronotum et trois bandes de même couleur, irrégulières, longitudinales sur le mésonotum. Pronotum fortement caréné antérieurement; en plus des poils dressés, il v a un fin duvet couché, soveux et doré sur tout le dessus du thorax; écailles ferrugineuses; ailes légèrement enfumées, ferrugineuses, avec l'extrémité plus ou moins légèrement obscurcie de noir. Pattes roux-ferrugineux, souvent tachées de noir sur les hanches, les trochanters et les cuisses ; tarses légèrement noircis en dessus. le dernier article jaune pâle, en totalité ou en partie. Abdomen noirbrun, à teinte terne, le 4er tergite et parfois le 2e étroitement et régulièrement lisérés de jaune pâle; le 1er étroit, subarrondi en avant, hérissé antérieurement de poils fins, testacés, couvert en dessus de la troncature antérieure d'un fin duvet soveux à reflets changeants et dorés; 2º segment s'élargissant postérieurement, le 6º noir en entier. Ventre noir, parfois avec les deux premiers segments marginés irrégulièrement de jaune pâle; le 5e noir. — Long. ♀ 23 à 25 mill.; ♀ 49 à 24 mill.

Mâle. — Semblable à l'ouvrière, mais le corps plus étroit, la tête, le thorax et les pattes plus colorés de roux; clypeus avec le bord antérieur subtronqué-arrondi, les antennes avec des tyloïdes dès le 3° article : le 7° tergite abdominal allongé, arrondi; le 5° sternite transversal avec une incision semicirculaire au milieu du bord apical; le 6° profondément échancré. Les branches du forceps avec l'extrémité inférieure carénée en dessous, puis dilatée en spatule tournée horizontalement, le lobe en forte pointe ne dépassant pas la spatule inférieure et couvert de poils abondants; les tenettes courtes, garnies de longs poils; les crochets conformés à peu de chose près comme chez la V. velutina Lep. — Long. 20 mill.

Je suis heureux de dédier cette remarquable espèce à M. le Dr A. Mocsary, en souvenir de nos anciennes et bien amicales relations.

Patrie. — Presqu'ile de Malacca : Pérak (Musée de Budapest) ; Sikkim (coll. Felder, Musée de Vienne) ; Assam : Khasia Hills (coll. C. T. Bingham, Musée de Londres) ; Tenasserim : Thagatà (Leg. Fea, avril 1887 3, coll. P. Magretti).

## V. Walkeri spec. nov.

Ouvrière. - Corps de taille movenne, robuste; tête, thorax et pattes ferrugineux assez foncé, avec une tache autour des ocelles, la plus grande partie de la face, le mésonotum en entier ou en partie. des taches variables sur la poitrine et souvent une tache sur les hanches et plus rarement sur les cuisses, noirs; pubescence de la tête et du thorax dressée, rousse. Clypeus ferrugineux, à ponctuation grosse. espacée, profonde, devenant très grosse, très ruguleuse et réticulée sur le bord antérieur qui est modérement sinué, les angles antérieurs arrondis, courts; joues nulles; antennes ferrugineuses, un peu obscurcies en dessus à l'extrémité : la carène antérieure du pronotum forte : écailles rousses; ailes hyalines, teintées de jaune; tarses ferrugineux. Abdomen noir-brun, couvert d'un très fin dûvet couché qui rend ternes les téguments : 4er tergite tronqué en ayant, non rétréci, la bordure apicale rousse, s'élargissant sur les côté; le 2º tergite parfois avec une petite tache rousse de chaque côtés. Ventre entièrement noir ou avec le 1er sternite plus ou moins taché de roux. - Long. 21 à 22 mill.

Mâle. - Semblable à l'ouvrière dont il diffère par son corps allongé, la face noire, sauf le fond de l'échancrure des veux qui est ferrugineux, les joues longues, le clypeus noir à la base, arrondi en avant: les antennes très longues, brunies en dessus du fouet, avec deux tyloides sur le 4º article et sur chacun des suivants; par la pubescence de la tête, du thorax et du ler segment abdominal beaucoup plus abondante; par le 1er segment tergite de l'abdomen taché de ferrugineux très irrégulièrement, le 2º taché de la même couleur sur les côtés; le 7º tergite allongé, sinuolé à l'apex; le 4er sternite ventral taché de jaune-roux sur le disque, le 5° sternite profondément échancré. l'échancrure triangulaire à sinus semi-circulaire; le 6° sternite tronquésinué, les angles apicaux arrondis; l'appareil copulateur assez volumineux, ferrugineux; les branches du forceps avant leur extrémité inférieure dilatée en spatule arrondie, horizontale, le lobe aussi long que la spatule inférieure, fort, large, à pointe convexe carénée en dessous. plane en dessus, l'extrémité subaigue; toute la troncature apicale des branches du forceps garnie de longs poils fauves; les volsellas très velues; les tenettes courtes, avec la dilatation basilaire ovale, obtuse; les crochets forment une tige sinuée sur les côtés, se terminant par deux dilatations arrondies extérieurement, ayant l'extrémité tournée en dedans et séparées l'une de l'autre par un profond sinus arrondi. - Long. 25 mill.

La V. Walkeri se distingue de la V. Mocsaryana par le bord antérieur du clypeus non déprimé, grossièrement réticulé, le thorax plus robuste. l'abdomen sans liséré jaune pâle, le dernier article des tarses ferrugineux. Le mâle diffère de celui de la V. Mocsaryana principalement par le dessus du fouet antennaire qui est brun, le 5° sternite abdominal dont l'échancrure est triangulaire, le 6° sternite simplement sinué, assez profondément, et enfin par la forme des crochets dont les dilatations apicales sont arrondies.

On reconnaîtra de suite la *V. basalis* par le clypeus qui est brillant, subimponctué et lisse.

Patrie. — Chine: Haï-ning (♂♀ coll. Walker, Musée de Londres).

#### V. bellicosa H. de Saussure.

Vespa bellicosa H. de Saussure, Étud. fam. Vesp. II, 4853, p. 446, n° 28, pl. XIV, fig. 40. ♀.

Femelle. — Corps de taille médiocre, robuste; pubescence dressée, noire en dessus, grise sur les côtés du thorax. Tête normale, de la largeur du thorax, noire avec les mandibules, une tache derrière les veux, une autre entre les antennes et un liséré au bas des orbites internes, jusqu'au fond du sinus, jaune pâle; joues nulles; clypeus jaune pâle avec une tache noire touchant la base, le bord antérieur sinué peu profondément, les angles antérieurs arrondis, la ponctuation médiocre, ruguleuse, devenant plus serrée dans la partie apicale. Antennes noirâtres, le devant du scape jaune pâle, le dessous du fouet roussâtre. Pronotum noir, caréné transversalement en avant, jaune pâle sur le bord supérieur, sur la carène et un peu en dessous près des hanches antérieures, les callus souvent tachés de jaune; mésonotum noir, avec un fin duvet soveux, à reflets légèrement dorés; les mésopleures parfois tachées de jaune sous les ailes, et aussi près des hanches intermédiaires; écusson portant deux taches jaune-clair; le postécusson toujours jaune-clair en entier, le reste du segment médiaire et souvent aussi les métapleures largement tachés de même couleur. Ponctuation de la tête et du thorax médiocre, profonde, assez serrée. Écailles noir-brun, bordées de jaunâtre ou de roussatre; ailes enfumées très modérément, à teinte jaunâtre avec un nuage noirâtre à l'extrémité des supérieures. Pattes noirâtres, les tarses antérieurs entièrement ferrugineux, les autres devenant ferrugineux à leur extrémité; les hanches tachées de jaune ainsi que les cuisses antérieures. Abdomen jaune clair, la base des segments étroitement noire, sauf sur le 2º tergite où la couleur noire occupe la moitié du segment; 1º segment tergite avec la troncature antérieure très modérément abrupte formant un angle très ouvert avec le dessus du segment, le plus souvent avec deux taches jaunes séparées par une ligne noire ou brune, le dessus du segment noir avec une large bordure jaune, la couleur noire faisant un angle rentrant au milieu de la partie jaune; 2°, 3° et 4° segments tergites ayant dans la partie jaune trois petites incisions noires, une au milieu et une de chaque côté; le 6° tergite jaune clair ou plus ou moins largement marginé de noir ou même parfois presque entièrement noir. Les segments ventraux noirs, plus ou moins largement marginés de jaune, la marge jaune ordinairement élargie sur les côtés enferme une petite tache noire de chaque côté; le 5° sternite est entièrement jaune ou taché de noir ou presque entièrement noir. On remarque quelques gros poils courts, raides, irréguliers, dressés, dispersés cà et là sur le dessus de l'abdomen.

Il existe en outre un fin duvet couché, soyeux, peu visible, qui donne, suivant l'incidence de la lumière, des reflets légèrement dorés; ponctuation abdominale distincte, fine, profonde, clair-semée. — Long. 20-23 mill.

Ouvrière. — Semblable à la femelle, mais de taille légèrement plus petite. — Long. 16-49 mill.

Mâle. — Même taille et même forme générale que l'ouvrière; clypeus tronqué-sinué, joues longues; antennes à peine plus longues que celles de l'ouvrière; tyloïdes très étroits, très peu saillants, le 4° article en porte deux aînsi que chacun des suivants; 7° tergite abdominal allongé, jaune, très légèrement sinué à l'apex; 5° sternite ventral ayant en son milieu apical une petite échancrure semicirculaire; 6° sternite profondément échancré, déprimé sur le disque, les angles formés par l'échancrure longs, subaigus; appareil copulateur assez volumineux, jaunàtre testacé; l'extrémité inférieure des branches du forceps dilatée en spatule arrondie, horizontale, le lobe fort, aigu, aussi long que la spatule inférieure; les volsellas garnies de longs poils gris, tenettes avec un acumen long, linéaire, aigu; les crochets formant une tige légèrement élargie au milieu et terminée par deux dilatations divariquées à pointe externe arrondie, séparées l'une de l'autre par une profonde échancrure, — Long. 19 mill. Pl. V, fig. 7.

La nidification de cette guèpe est inconnue. D'après M. M. Maindron, elle serait d'humeur très agressive.

Patrie. — Bangkalis (M. Maindron 1885, Muséum de Paris): Bornéo (R. Oberthür 1898, Muséum de Paris), Lohaban (R. Oberthür 1898, Muséum de Paris); Sumatra: Pangherang-Pisang (leg. E. Modigliani X

1890. III 1891, Musée de Gênes); Singapoore (S. S. Flower, Musée de Londres); Sarawak (Shelford, Musée de Londres).

## Var. annulata Smith.

Vespa annulata Smith, Journ. of. Proc. Lin. Soc. Zool. II, 4857, p. 116, nº 6.

Femelle et Ouvrière. — Différent du type par la couleur jaune clair qui envahit le dessous du corps et des pattes, par les bandes jaunes des segments tergites de l'abdomen réduites à une bordure étroite, ordinairement jaune vif, dilatée sur les côtés et faiblement échancrée au milieu. Le 6º tergite abdominal est noir étroitement liséré de jaune. — Long. 20-23 mill.

Je n'ai jamais rencontré d'exemplaires mâles ainsi colorés.

Patrie. — Bornéo (R. Oberthür 1898, Muséum de Paris), Sarawak (coll. G. Doria 1865-66, Musée de Génes); Himalaya (Dr Martin, Musée de Munich); Nord-ouest de Bornéo, Baram (Musée de Londres), mont Dulit (coll. Everett, Musée de Londres): Sumatra, Pangherang Pisang (E. Modigliani,  $\varphi$  et  $\varphi$  X 1890 et III 1891, coll. Magretti).

### Var. Semperi var. nov.

Ouvrière. — La couleur noire envahit la plus grande partie du corps. Diffère du type par le clypeus entièrement jaune, le thorax entièrement noir, sauf le bord supérieur du pronotum et le postécusson en entier. Les hanches restent tachées de jaunàtre, l'extrémité apicale des cuisses, les tibias et les tarses sont jaune-roussâtre ou ferrugineux. Le 1<sup>er</sup> segment tergite abdominal n'a pas de tache sur la troncature antérieure et ne porte qu'une étroite bordure jaunàtre, les autres segments tergites sont bordés de jaunàtre, le 6<sup>e</sup> est entièrement jaunàtre. Sur le ventre, les trois premiers segments sont noirs bordés de jaunàtre, les deux suivants noirâtres ou plus ou moins brun-ferrugineux, parfois bordé aussi de jaunàtre. — Long. 16-20 mill.

Je ne connais que des ouvrières appartenant à cette variété bien remarquable.

On rencontre de nombreux passages reliant le type aux deux variétés ci-dessus, ainsi que les variétés ensemble. La V. bellicosa Sauss., est remarquable par la constance qu'elle montre dans le coloris du postécusson entièrement jaune et des hanches tachées de la même couleur. Avec la V. fervida Sm., elle se distingue des autres Guèpes par la ponctuation du corps profonde et bien nette. Patrie. — Comigu (Semper 1867, Musée de Vienne): Philippines, Mindanao (Musée de Budapest); Philippines: Lubang, Lucon, Tayabas (Musée de Madrid).

#### V. fervida Smith.

Vespa fervida Smith. Journ. of Proc. Linn. Soc. Zool. III, 1858, p. 23, n° 2.

Femelle. - Corps robuste, de taille moyenne, entièrement noir foncé, avec une tache près du bord interne des mandibules, la partie antérieure du clypeus, une ligne transversale entre les antennes, le bord inférieur du sinus des veux, le postécusson en entier et une tache sur le segment médiaire, jaune vif. Pubescence raide, courte, noire, grosse, sur l'avant-corps, plus abondante sur l'abdomen, les poils devenant roux sur le bord apical des segments. Ponctuation médiocre, irrégulière, profonde, très distincte, même sur l'abdomen. Tête normale, plus étroite que le thorax; clypeus modérément sinué au bord antérieur, les angles antérieurs arrondis, la ponctuation assez grosse. profonde, devenant serrée, ruguleuse antérieurement; joues nulles: antennes noires, devenant rousses en dessous, surtout vers l'extrémité. Pronotum fortement caréné transversalement en ayant : écailles noires, les bords roux; ailes enfumées, à teinte ambrée; les cellules costales et brachiales beaucoup plus obscurcies; pattes noires, la pubescence soveuse du dessous roussâtre, les tarses roussâtres. Abdomen large : le 1er segment tergite avec la troncature antérieure assez abrupte, mais la partie supérieure arrondie. Ventre concolore. — Long. 26 mill.

Ouvrière. — Semblable à la femelle, mais avec la couleur jaune beaucoup plus abondante sur les mandibules, le clypeus jaune taché de noir-brun sur le disque, une tache jaune derrière les yeux, une autre sous les ailes, le 4° segment tergite abdominal étroitement et très régulièrement bordé de jaune; parfois aussi on trouve des traces d'un liséré jaune sur le bord apical du 3° tergite abdominal. — Long. 46 mill.

Måle. - Le måle est inconnu.

La V. fervida Sm., est très voisine de la V. bellicosa Sauss.

Patrie. — Célèbes: Vréma (M. Maindron 1892, Muséum de Paris), Toli-Toli (H. Fruhstorfer 1898, Muséum de Paris: Musée Senckenberg: nov.-déc. coll. Schulz: coll. de Gaulle, Kandari (leg. O. Beccari IV, 1874, Musée de Gênes). Dougala (leg. H. Rouyer VII 1901, coll. de Gaulle); Tombugu (Musée de Dresde); Timor, Koepang (Musée de Londres).

### V. bicolor Fabricius.

Vespa bicolor Fabricius, Mant. Insect. I, 1787, p. 288, nº 44. ? Vespa lutea Coquebert, Illustratio iconographica Insectorum, tab. XXI, fig. 40:

Femelle. — Corps de taille médiocre, entièrement jaune pâle avec le dessus de la tête et le mésonotum noirs; pubescence dressée, médiocre, jaune clair ou testacée, devenant noire sur le dessus de la tête et du thorax. Tête normale, un peu moins large que le thorax; joues presque nulles; clypeus faiblement échancré au sommet, les angles antérieurs peu saillants, arrondis, le disque peu ponctué, les points très petits, effacés, épars, devenant plus gros et plus serrés en avant; espace interantennaire faiblement caréné sur les côtés; antennes brunnoir en dessus. Pronotum fortement caréné transversalement en avant : une ligne brun-ferrugineux partage longitudinalement l'écusson, les sutures du thorax de même couleur; écailles jaunes; ailes légèrement enfumées, à teinte jaune: pattes concolores. Abdomen recouvert d'un tin duvet soyeux, couché, en plus de la pubescence dressée; 4er tergite court, la troncature antérieure très abrupte; le 2º et le 3º tergites ayant la partie basilaire invaginée noire; 6º tergite jaune. Ventre concolore. - Long. 19-23 mill.

Ouvrière. — Semblable à la femelle, mais avec les joues complètement nulles. — Long. 48-49 mill.

Mâle. — Coloré comme la femelle. Joues longues; 3<sup>e</sup> article antennaire avec des traces d'un tyloïde à son extrémité, les articles suivants munis chacun de deux tyloïdes; 7° tergite abdominal légèrement sinué au sommet, le 8° ou couvercle génital ovale; 5° sternite ventral ayant une échancrure semicirculaire à son sommet, le 6e profondément échancré, les angles de cette échancrure formant deux lobes arrondis au sommet, le disque du segment déprimé. Appareil copulateur noir : branches du forceps avec la partie apicale tronquée et creusée, garnie de longs poils serrés, la pointe inférieure de chaque branche longue, élargie en forme de spatule, le lobe en forme de large lancette un peu plus longue que la spatule. Tenettes des volsellas linéaires, ne dépassant pas les branches du forceps, le lobe basilaire des tenettes large, ovale. Crochets petits, réunis en une pièce impaire, l'extrémité se terminant en deux lobes étroits, divariqués, arrondis à l'extrémité, séparés l'un de l'autre par une échancrure peu profonde. -- Long. 48 mill. Pl. VII. fig. 2.

Nidification inconnue.

La V. bicolor F. fait le passage du groupe des Frelons à celui des Guèpes ou Vespula; les ocelles sont beaucoup moins éloignés du bord postérieur de la tête. Chez le mâle principalement, les ocelles sont éloignés du bord postérieur de la tête de trois fois la longueur de l'espace qui les sépare entre eux; de plus, le triangle interantennaire est très faiblement caréné sur les côtés.

La Vespa lutea Coquebert, a été prise à Marseille, sur un bateau venant de l'Inde.

Patrie. — Japon (Musée de Brème); Chine (Lesueur 1826; coll. Sichet 1867; coll. Lepeletier 1845; Pictet 1833, Muséum de Paris; coll. J. Cochin 1902; coll. J. de Gaulle; Kiang si (A. David 1875, Muséum de Paris); Nord de Pékin (A. David 1865, Muséum de Paris); Cochinchine (coll. J. de Gaulle); Assam; Khasia Hills (Musée de Munich); Indes orientales (Barthélemy 1834, Muséum de Paris); Chine? (Herrich Schaeffer, coll. Sichel 1867, Muséum de Paris); Indes. Khasia Hills (Musée de Londres); Assam? Margherita (Musée de Londres); Chine? (Musée de Brème); Chine; Assam (coll. Magretti).

#### V. basalis Smith.

Vespa basalis Smith, Trans. Entom. Soc. London, H. 2, 1852, p. 46. ♀. Vespa obliterata Smith, Trans. Entom. Soc. London, H. 2, 1852, p. 47. ♀.

Femelle. — Corps de grande taille, étroit, allongé, subparallèle ; tête ferrugineuse, pas plus large que le thorax, assez fortement dilatée-arrondie derrière les yeux, le vertex distinctement et profondément échancré; ponctuation de la tête et du thorax très fine, espacée, de sorte que les téguments sont brillants; mandibules brillantes, avec quelques points épars: clypeus convexe, brillant, subimponctué, assez profondément échancré à son sommet, les angles antérieurs arrondis; joues courtes; les côtés de la tête derrière les yeux fortement rebordéscarénés; parfois une tache noire autour des ocelles; pronotum ferrugineux, le cou noir, la carène transversale très accusée et descendant insqu'aux hanches antérieures; mésonotum noir, taché de ferrugineux près de l'écusson, ou noir avec une large bande médiane ferrugineuse sur toute sa longueur; écusson, postécusson, une tache sous les ailes et sur le segment médiaire ferrugineux. Tout l'avant-corps recouvert d'une fine pubescence soyeuse, couchée, dorée, entremèlée de longs poils roux, dressés. Écailles ferrugineuses; ailes légèrement enfumées, à reflets bleu-violacé. Pattes noir-brun ; les articulations, tous les tarses

et les tibias antérieurs ferrugineux, les cuisses antérieures de même couleur, mais tachées de noir en dessous. Parfois tous les tibias sont ferrugineux, tachés de noir en dessous; les hanches et l'extrémité des cuisses peuvent également être ferrugineuses. Abdomen hérissé de longs poils noirs, fins : 4er segment tergite petit, étroit, arrondi en avant, couvert en plus d'une fine pubescence soyeuse, couchée, dorée, la troncature antérieure brune, le reste du segment ferrugineux avec une bande brune transversale au milieu et une petite de même couleur de chaque côté; la bordure du segment jaunâtre, étroite et régulière, le reste de l'abdomen noir profond, recouvert d'une fine pubescence noire, couchée, entremêlée de poils noirs déjà indiqués: 2º segment long, élargi postérieurement; 6º tergite brillant, lisse, très finement alutacé, avec des points médiocres, espacés, irréguliers, très distincts. Ventre entièrement noir, brillant, lisse, couvert de points profonds, irréguliers, espacés, la bordure des segments roussatre. - Long. 25 27 mill.

Ouvrière. — Corps un peu plus étroit que la femelle, le vertex un peu moins profondément échancré; pattes plus ou moins ferrugineuses; antennes ferrugineuses comme chez la femelle; joues courtes; 4er segment tergite de l'abdomen entièrement brun, avec une étroite bordure jaunâtre, la pubescence soyeuse étant alors noire comme sur les autres segments. Long. 20–22 mill.

Mâle. — Coloré comme l'ouvrière ; 3° et 4° articles antennaires sans tyloïdes, le 5° avec des traces de tyloïdes, le 6° et les suivants munis de deux tyloïdes chacun; pubescence de l'avant-corps plus abondante; l'article terminal des tarses noir brillant; le 7º tergite de l'abdomen largement échancré à son bord apical et garni d'une frange très épaisse et courte de poils fauve clair; tout le ventre couvert d'un fin duvet couché, la ponctuation faible, le 5° sternite très largement et peu profondément sinué, le 6° subtronqué arrondi, déprimé, couvert de poils conchés. L'appareil copulateur est très volumineux, roussâtre; les branches du forceps très allongées, subparallèles, le sommet conformé d'une manière analogue à ce que l'on voit chez la V. crabro L., l'extrémité inférieure élargie, allongée et arrondie, brusquement recourbée du côté externe, le lobe médian largement lancéolé; l'acumen des tenettes court, avec une petite expansion anguleuse du côté supérieur, la dilatation basilaire très allongée, plus longue que l'acumen, la base épaissie et garnie du côté externe de fortes aspérités; les crochets ont une tige étroite, subcylindrique, se terminent en dessus par une sorte d'entonnoir à bords évasés, en dessous par deux lobes arrondis, s'élargissant extérieurement en une expansion anguleuse à pointe longue et divariquée. La conformation des crochets est très particulière. — Long. 24-26 mill. Pl. VII, fig. 4

Nidification inconnue.

Ainsi que Smith l'avait pensé (Catalogue of Hymenoptera Insects in the collection of the British Museum, Part V. Vespidue, p. 119, 1857), la Vespa obliterata Smith est l'ouvrière de la Vespa basalis Smith.

Patrie. — Assam (coll. von Schutthess; Musée de Budapest; coll. Fel der, Hügel, Musée de Vienne); Sumatra, mont Singalang (leg. O. Beccari juillet 1878, Musée de Génes); Balighe (leg. E. Modigliani X. 1890, et III, 1891, Musée de Génes); Indes, Kasia Hills (Musée de Londres); Tenasserim, Salwen valley (XI, 1893, \$\frac{1}{2}\$ coll. C. T. Bingham, Musée de Londres); Assam, Carin Cheba (L. Fea, 900 m., 1888, coll. Magretti); Khasia Hills (coll. C. T. Bingham, Musée de Londres); Ihaungyn valley. Lower (22, XI, 1892, \$\frac{1}{2}\$ coll. C. T. Bingham, Musée de Londres); Sadeya (Musée de Londres); Sikkim, Kalimpong (6000 f. V, 1894, coll. C. T. Bingham, Musée de Londres).

#### V. vivax Smith.

Vespa viva.v Smith, Trans. Zool. Soc. London VII, 3, 4870, p. 490, nº 1, pl. XXI, fig. 9.

Femelle. - Corps de taille moyenne, robuste; pubescence abondante, assez fine, noire, hérissée, très irrégulière. Tête petite, moins large que le thorax, jaune vif, avec le front noir; elypeus assez convexe, sinné modérément au sommet, les angles antérieurs arrondis, la ponctuation fine, obsolète, devenant grosse sur la partie apicale. Antennes rousses. Le triangle interantennaire faiblement caréné sur les côtés. Thorax noir foncé, velouté : pronotum avec la carène transversale très forte et jaunâtre; segment médiaire avec les poils roussatres: écailles rousses; ailes enfumées régulièrement, à teinte ferrugineuse; pattes noires avec les genoux, les tibias et les tarses jaune un peu ferrugineux, avec un fin duvet doré, le dernier article des tarses jaune clair. Abdomen large, couvert d'un duvet velouté noir foncé sur toutes les parties noires; 4er segment tergite noir, bordé de jaune vif, la couleur noire entrant légèrement en pointe dans la bordure jaune, la troncature antérieure très abrupte, le haut un peu déprimé et muni d'une bande jaune interrompue au milieu; 2º segment noir avec un liséré jaune vif s'élargissant sur les côtés; 3º segment noir à la base, avec une très large bordure jaune vif; 4º et 5º tergites noirs avec un petit liséré jaune sur le milieu du bord apical; 6° tergite entièrement jaune. Ventre noir-brun, les 4° et le 2° sternites largement bordés de jaune vif, la bordure rétrécie au milieu; les 3° et 4° sternites noir-brun, la bordure apicale roussatre, un peu décolorée, le 5° roussatre dans sa moitié apicale. — Long. 26 mill.

Ouvrière. — Semblable à la femelle, mais de taille plus petite. La bordure jaune du 4<sup>cr</sup> segment abdominal tergite peut s'élargir au milieu du disque et atteindre la partie jaune qui se trouve sur le haut de la troncature antérieure; celle du 3<sup>c</sup> tergite peut avoir une petite échancrure noire de chaque côté. — Long. 48-20 mill.

Chez la femelle comme chez l'ouvrière, les antennes sont parfois brunies en dessus, principalement à l'extrémité; parfois aussi les taches jaunes du haut de la troncature antérieure du 4<sup>cr</sup> tergite abdominal sont à peine visibles.

Mâle. — Le mâle m'est inconnu.

La  $V.\ riva.r$  Sm., est une des plus jolies Guèpes, grâce à la vivacité de son coloris.

D'après Charles Horne (Transactions of the zoological Society of London, vol. VII, 4870 (4872) p. 472), la V. vivax Sm., ferait un nid très volumineux, fixé aux rameaux des arbres, ordinairement à une grande hauteur au-dessus du sol. La population de chaque guèpier est fort nombreuse et il serait dangereux d'en approcher de trop près.

Patrie. — Sikkim, de Padamtsin a Lingtou (R. Oberthür 1901, Muséum de Paris); Sé-tchouen, Ta-tsien-lou (R. Oberthür 1901, Muséum de Paris); Siam: Muok-lek (1000/Januar., leg. H. Fruhstorfer, coll. con Schulthess); Sikkim, Runjet valley (V, 1894, J. Möller, coll. C. T. Bingham, Musée de Londres); Sikkim (coll. Martinez Escalera).

### V. velutina Lepeletier.

Vespa velutina Lepeletier, Histoire nat. Insectes, Hyménoptères, I, 4836, p. 507, nº 4.

Vespa Fruhstorferi Stadelmann, Sitzb. der Ges. naturf. Freunde zu Berlin, 1894, p. 89.

Femelle. — Corps de taille médiocre; pubescence médiocre, noire, dressée. Tête normale, moins large que le thorax, jaune-orangé tachée de noir vers les ocelles et derrière le sommet des yeux; joues presque nulles; clypeus modérément échancré au sommet, les angles antérieurs très arrondis, le disque assez convexe, à ponctuation fine et obsolète, devenant plus grosse, ruguleuse et un peu serrée près du bord anté-

rieur qui est déprimé; espace interantennaire faiblement caréné sur les côtés; antennes orangées, plus ou moins brun foncé en dessus. Thorax noir; pronotum ferrugineux orangé, noir sur les côtés, les callus latéraux ordinairement ferrugineux, la carène transversale très distincte; mésonotum avec un fin duvet couché, à reflets changeants, dorés; écusson parfois taché de deux macules ferrugineuses; écailles noires, bordées de ferrugineux; ailes enfumées à teinte jaunâtre. Pattes noires, les tarses jaune-blanchâtre, les tibias antérieurs tachés de jaune en avant, les cuisses antérieures tachées de ferrugineux en dessous. Abdomen noir velouté, recouvert d'un fin duvet couché à reflets changeants, dorés par places; 4er tergite court, sensiblement plus étroit en avant, la troncature antérieure coupée franchement, le bord apical liséré de jaune plus ou moins clair: 2º et 3º tergites lisérés de jaune-orangé, le liséré jaune s'élargissant brusquement sur les côtés près de l'angle externe; le 2º tergite avant principalement à sa base des reflets dorés par la fine vestiture qui le recouvre; 4º et 5º tergites jaune-orangé, chacun avec une tache discoïdale rectangulaire noire, touchant le bord apical qui est liséré de jaune; 6° tergite jauneorangé. Ventre noir, tous les segments très largement marginés de jaune. - Long. 22 mill.

Ouvrière. — L'ouvrière est semblable à la femelle, mais avec le thorax moins large, le corps plus parallèle. Le dessus de la tête est ordinairement plus largement taché de noir, le pronotum souvent orné d'une simple ligne jaune-orangé sur la carène transversale et le bord supérieur. — Long. 18-19 mill.

Mâle. — Le mâle est coloré comme les ouvrières. Le 3° article antennaire porte un petit tyloïde à son sommet, le 4° article et les suivants en portent deux chacun. Le 5° sternite ventral est échancré semicirculairement au milieu de son bord postérieur; le 6° est profondément échancré, déprimé, les lobes formés par l'échancrure arrondis, légèrement incurvés en dedans. L'appareil copulateur est volumineux, brun-roussâtre; les branches du forceps conformées comme chez la *V. crabro* L.; le lobe largement lancéolé, aussi long que la spatule inférieure; les tenettes courtes avec une expansion lamelleuse, assez large, auriculée, sur le bord supérieur; les crochets formant deux lobes divariqués, arrondis aux extrémités externes, séparés l'un de l'autre par une incision subcordiforme; la tige des crochets dilatée vers le milieu. — Long. 19-20 mill.

La V. velutina Lep., est intimement alliée à la V. auraria Sm., au point que je me demande si elles ne sont pas deux races d'une même

espèce La V. Frahstorferi II. Stadelmann est certainement une simple variété de la V. velutina Lep. L'excellente description de l'auteur ne laisse aucun doute à ce sujet.

On sait, d'après Charles Horne (Transactions of the zoological Society of London 1870), que le nid de la V. velutina Lep. est très gros, suspendu aux rameaux des arbres, ordinairement à une grande hauteur au-dessus du sol. La population serait très nombreuse dans ces constructions et il serait dangereux d'y toucher. Le British Museum en posséderait deux beaux spécimens. La V. velutina Lep., attaquerait les pèches, les raisins, les pommes et particulièrement les « hill-apricots ».

M. H. de Saussure dit dans ses Études sur la famille des Vespides, 2. 1853, p. XCV, qu'il a vu un nid de V. velutina « rapporté des Indes orientales et qui avait une longueur de trois pieds sur une largeur d'un et demi. Il était pendu à une branche de Cyprès et son enveloppe celluleuse et grossière était d'un papier brun qui ressemble beaucoup à l'écorce des arbres. »

Patrie. - Indes orientales (Marc 1836, Muséum de Paris): Tonkin: Than-moi (juin-juillet, leg. H. Fruhstorfer, coll. J. de Gaulle et coll. A. Schulz); Java (coll. Sichel 1867 : Ploem 1880, Muséum de Paris : -O. Thienne, coll. A. Schulz: - Musée de Brême); Pontiak (R. Oberthür 1897, Muséum de Paris); Garoet (R. Oberthür 1896, 1897, Muséum de Paris): Buitenzorg (leg. J. B. Ledru, R. Oberthür 1898, Museum de Paris: Tjibogo-Préanger (leg. J. B. Ledru, R. Oberthür 1898, Muséum de Paris): montagnes de Préanger (M. Maindron 1892, Muséum de Paris): mont Salak (leg. J. B. Ledru, R. Oberthür 1898, Muséum de Paris): Dessa-ijikidang (leg. J. B. Ledru, R. Oberthür 1898, Muséum de Paris): Pandennas, mont Oker (R. Oberthür 1899, Museum de Paris): Teibodas (1874, O. Beccari, Musée de Gênes); Buitenzorg (G. B. Ferrari 1875, Musée de Gènes); mont Kawie, Pasocrocan (coll. J. de Gaulle); Sumatra, mont Singalang (juillet 1878, O. Beccuri, Musée de Gènes); Si-rambe (XII, 90 et III, 1891, E. Mogdigliani, Musée de Génes'; D. Toi M. 1890, E. Mondigliani, Musée de Génes); Lombok (H. Fruhstorfer 1898, Muséum de Paris); Java (Musée de Brême)

Égypte (Douc 1855, Museum de Paris) provenance accidentelle!

#### Var. ardens var. nov.

Femelle, ouvrière et mâle. — Différent du type par son coloris : tête et écailles entierement jaunes, pronotum et écusson presque en-

tièrement jaunes également, mésonotum avec deux lignes longitudinales jaunes se réunissant vers l'écusson. — Même trille.

Patrie. — Lombok, Sapit (2000', avril 1896, leg. II. Fruhstorfer, Musée de Vienne; Musée de Budapest; mai-juin ♀♀♂, coll. A. Schulz); 1. Sumbawa, près Java (Musée de Budapest).

#### V. auraria Smith.

Vespa auraria Smith, Trans. of the entom. Soc. of London, II, 2, 4852, p. 46, (nec Tab. VIII, fig. 8).

Vespa simillima Smith, Entom. monthly Magazine, IV, 1867-8, p. 280.

- Corps de taille médiocre; pubescence dressée, noire, peu abondante. Tête moins large que le thorax, normale, jaune-orangé; joues à peu près nulles; clypeus modérément échancré au sommet, les angles autérieurs très arrondis, le disque assez convexe, à ponctuation line, effacée, devenant plus grosse, ruguleuse, un peu serrée près du bord antérieur qui est déprimé. Espace interantennaire faiblement caréné sur les côtés. Antennes orangé-jaunatre, légèrement brunies en dessus. La carène transversale du pronotum très distincte. Thorax noir-brun avec le pronotum, deux lignes médianes sur le mésonotum, l'écusson et une tache sous les ailes jaune-orangé; mésonotum recouvert d'un fin duvet couché à reflets changeants, dorés. Ailes enfumées à teinte brun-jaunâtre; pattes noir-brun, les antérieures et les tarses jaune-orangé. Abdomen recouvert d'un fin duvet couche à reflets dorés, changeants : 1er segment tergite assez court, sensiblement plus étroit en avant, la troncature antérieure coupée franchement. presque tout le segment noir-brun devenant roux-jaunâtre avec une étroite bordure jaune-clair : 2° tergite médiocrement long, à base brune, la bordure jaune-orangé toujours large, quelquefois occupant la moitié postérieure du segment; les segments 3 à 6 jaune-orangé, la base du 3º parfois brunie. Ventre brun-roussatre ou plus ou moins ferrugineux, les deux premiers sternites largement tachés de jaune-orangé latéralement, le plus souvent avec un petit point noir au milieu de chaque tache; le 1er sternite largement noir à sa base. — Long. 26 mill.

Ouvrière. — Semblable à la femelle, mais avec le thorax moins large, le corps plus parallèle. Assez variable de couleur. La base du 1<sup>er</sup> tergite abdominal peut être jaune-orangé au sommet de la troncature antérieure. L'ai vu également des individus ayant sur la base du 2<sup>er</sup> segment tergite de l'abdomen une tache jaune-orangé de chaque côté. — Long. 16-20 mill.

Mâle. — Semblable à l'ouvrière. Antennes robustes; les tyloides à partir du 4° article, le 3° u'en possède qu'un à son sommet. Le 5° segment ventral est légèrement échancré à l'apex, le 6° porte à son sommet une profonde échancrure, le disque est déprimé, les lobes formés par l'échancrure apicale arrondis, légèrement incurvés en dedans. L'appareil copulateur assez volumineux, est à peu de chose près semblable à celui de la V. velutina Lep. — Long. 23-24 mill.

F. Smith (Transactions of the entomological Society of London 1873, p. 497) dit que la Guèpe décrite par lui (The Entomologist's monthly Magazine IV, 1867-68, p. 280), sous le nom de V. simillima est une variété d'ouvrière de la V. auraria Smith. D'après la description de cet auteur la chose est probable. Mais la Guèpe qui a été figurée (Transactions of the entomological Society of London 1852, pl. VIII, fig. 8) comme V. auraria, est l'insecte que Edmond André a décrit, en 4884, sous le nom de V. mongolica. L'insecte décrit par Smith comme V. auraria n'est point le même que celui qu'il a figuré sous le même nom.

La *V. auraria* Sm., diffère de la *V. relutina* Lep., uniquement par la couleur; principalement par le 4º tergite de l'abdomen sans échancrure noire rectangulaire sur le disque, et par le duvet soyeux a reflets fauves qui orne toujours le dessus de l'abdomen.

Je ne sais rien sur la nidification ni sur les habitudes de la V. auraria Smith.

Patrie. — Indes (coll. J. de Gaulle); Malacca, Pérak (Musée de Budapest); Sikkim (coll Felder, Musée de Vienne); Assam, Khasia Hills (Musée de Munich); Laos, Lakhon (J. Harmand 1878, Muséum de Paris); Yun-nan, Tsékou (leg. Mª Soulié, R. Oberthür, 1898 et 1901, Muséum de Paris); Himalaya (Musée de Budapest);? Columbia (coll. Martinez Escalera); Tenasserim: Kaw Kareet. Taguta (L. Fea, & H et III, 1887, coll. Magretti).

#### Var. citriventris var. nov.

Femelle. — Diffère du type par la couleur foncière du jaune qui est couleur citron, les antennes noires en dessus ainsi que la partie supérieure de la tête, le pronotum jaune clair avec une tache brune près des callus latéraux, l'écusson, le postécusson et le segment médiaire marqués chacun de deux grandes taches jaune clair, séparées par un trait noir ou se touchant; tout le dessous du corps jaune clair, le dessus des tibias postérieurs et intermédiaires brunis; écaillettes jaune clair; abdomen avec tous les segments bruns à la base avec le bord postérieur plus ou moins largement marginés de jaune clair, les marges

jaunes ayant trois échancrures, la médiane plus large que les autres: le 6° tergite abdominal est jaune; le duvet doré à reflets changeants existe comme chez le type. — Long. 25 mill.

Ouvrière. — Semblable à la femelle, mais souvent avec les côtés des segments tergites de l'abdomen très largement colorés de jaune; la troncature antérieure du 4es segment tergite peut être marquée de jaune. — Long. 17-21 mill.

Je ne connais pas le mâle de cette variété.

Patrie. — Sikkim, de Padamtsin à Lingtou (R. Oberthür 1901, Muséum de Paris), Dardjiling (J. Harmand 1890, Muséum de Paris); Yunnan, Tsékou (leg. M<sup>2</sup> Soulié, R. Oberthür 1898, Muséum de Paris).

#### Var. nigrithorax var. nov.

Femelle. — Semblable au type dont elle diffère par la couleur noire qui envahit tout le dessus de la tète, des antennes, le thorax, les écailles, les pattes sauf les tarses, et le ventre moins les deux taches jaunes des segments sternites 1 et 2 qui sont plus petites. La base des trois premiers segments tergites de l'abdomen est noir foncé; le duvet doré existe toujours. La pubescence est plus longue que chez le type. — Long. 25-26 mill.

Ouvrière. — Semblable à la femelle; le noir est même parfois plus distinct sur les deux premiers tergites abdominaux. Le pronotum est quelquefois liséré de jaune-orangé sur le bord supérieur et sur la carène transversale. — Long. 16-20 mill.

Mâle. — Il est coloré comme l'ouvrière. Le 3° article antennaire porte un petit tyloïde, les articles suivants en ont deux chacun. Le 5° segment ventral porte une petite échancrure semicirculaire, le 6° est profondément échancré, déprimé, les lobes formés par l'échancrure arrondis, légèrement incurvés en dedans. L'appareil copulateur est à peu près semblable à celui de la *V. velutina* Lep. — Long. 24 mill.

La variété nigrithorax est plus répandue que le type.

Patrie. — Dardjiling (J. Harmand 1890, Muséum de Paris; — Musée de Budapest), Sikkim (coll. Felder, Musée de Vienne); Bhoutan anglais R. Oberthür 1900, Muséum de Paris); Maria Basti (leg. Ms. Durel, R. Oberthür 1898, Muséum de Paris); Chine, Kiang-si, Sé-tchouen (A. David 1875, Muséum de Paris); Mou-pin (A. David 1870, Muséum de Paris); Ta-tsien-lou R. Oberthür 1901, Muséum de Paris , Chang-hri Musée de Budapest; Célèbes méridional (leg. H. Fruhstorfer 1898, coll. von Schulthess Rechberg); Sud Célèbes: Bua-Kraeng (3000' Févr.

991

1896, leg. H. Fruhstorfer, Musée de Budapest et colt. A. Schultz', Bantimurang (leg. G. Ribbe 1882, Musée de Budapest); Chusan (colt. Walker, Musée de Londres); Chine (colt. Walker, Musée de Londres); Dazeh près Tychaw (colt. Walker, Musée de Londres); Hanoï (de la Touche, Musée de Londres); Foo chow (de la Touche; G. B. Rickett, Musée de Londres); Sikkim (colt. Martinez Escalera); Chine, Ning-po (Felder, Musée de Leyde). Sumatra, D. Tolong (E. Modigliani, ♥, XI, 1891, colt. Magretti); Sumatra, M¹s Singalang (O. Beccari, ♥, VII, 1878, colt. Magretti).

# V. mongolica Edm. André.

Vespa mongolica Edm. André, Ann. Soc. ent. de France, IV, 1884. Bulletin, p. LXI.

Vespu xanthoptera P. Cameron, The Entomologist, XXXVI, 1903. p. 278 et 279  $\circlearrowleft$ .

Femelle. - Corps de taille movenne, couvert d'une épaisse pubescence brune, dressée, longue, devenant jaune en dessous et sur la bordure des segments abdominaux. Tête petite, normale, jaunâtre avec le haut de l'espace interoculaire noir, avec une tache entre les antennes et l'échancrure des yeux jaunes. Clypeus pas plus long que large, couvert de points médiocres, devenant plus gros et ruguleux en avant, le bord antérieur sinué, les angles formés par le sinus peu saillants; joues très courtes; antennes jaune-ferrugineux, brunes en dessus. Pronotum rétréci en avant, brun avec une large tache jaune de chaque côté en dessus, la couleur jaune se réunissant sur le bord antérieur, la carène transversale bien distincte; écusson et postécusson tachés de jaune de chaque côté, une tache de même couleur sous les ailes, le reste du thorax brun; écailles jaunâtres, brunes à la base; ailes enfumées jaunâtres, la bordure apicale distinctement brunie; pattes brunes avec les genoux. les tibias et les tarses jaune-ferrugineux. ou bien jaune plus ou moins ferrugineux tachés de noir sur les hanches, les trochanters et la base des cuisses. Abdomen long, recouvert d'un fin duvet couché, soyeux, brun-doré à reflets changeants : 1er segment tergite plus velu que les autres, la troncature antérieure noirâtre, à bords arrondis, le haut de la troncature jaune-ferrugineux, au milieu une bande transversale brune, enfin la bordure apicale jaune, plus large au milieu que sur les côtés et faiblement échancrée au milieu : les autres tergites bruns largement bordés de jaune, les bordures irrégulières ou plus ou moins tri-échancrée antérieurement. Ventre

jaune avec la base du 1<sup>er</sup> sternite brune, chaque segment avec un point brun de chaque côté. — Long. 24-27 mill.

Ouvrière. — L'ouvrière est semblable à la femelle, mais de taille un peu plus petite. — Long. 20-24 mill.

Elle varie légèrement de coloration. Le pronotum peut être en grande partie brun. Le segment médiaire peut porter deux taches jaunes, ainsi que les métapleures; la troncature antérieure du 1er segment de tergite de l'abdomen peut devenir presque entièrement jaune, et sur la base brune du 2e tergite il peut y avoir de chaque côté une tache jaune, étroite, transversale, cunéiforme.

Mâle. — Semblable à la femelle, trapu, la pubescence encore plus longue; le clypeus simplement tronqué au sommet; les antennes sont brunies en dessus, le 4º article porte deux tyloïdes ainsi que les suivants, on distingue un très petit tyloïde au sommet du 3° article. Le 7º segment tergite de l'abdomen est sinué au sommet, frangé de poils jaune-doré : le 5º sternite ventral porte une incision arrondie et profonde au milieu de son bord postérieur; le 6° sternite fortement échancré, les angles formés par l'échancrure longs, arqués en dedans à pointe obtuse, le disque est déprimé. Appareil copulateur petit, jaunâtre en dessus, bruni en dessous; branches du forceps analogues à celles de la V. crabro L., la spatule inférieure beaucoup plus longue, le lobe très allongé, aigu, aussi long que la spatule; acumen de la tenette long, coudé en dedans, le bord supérieur dilaté anguleusement, la dilatation basilaire grande, large, arrondie à l'extrémité, la base de l'acumen épaissie et converte d'aspérités assez grosses; crochets se terminant par deux lobes divariqués, séparés l'un de l'autre par une incision subcordiforme, la tige élargie vers le milieu. - Long. 20-24 mill.

Il y a peu de différence de taille entre les ouvrières, les femelles et les mâles. Le nid de cette Guèpe a été rapporté par M. le Dr J. Harmand, ministre plénipotentiaire de la France au Japon. Il provient des environs de Tokio. Il était fixé à une poutrelle, sous l'avancement d'un toit de maison. Brièvement arrondi, il mesure à peine 25 centimètres de longueur, sur 20 centimètres dans sa plus grande largeur. Il est composé de neuf gâteaux, très rapprochés les uns des autres. Les alvéoles sont peu différenciés; cependant on reconnaît que les quatre derniers gâteaux sont formés de grands alvéoles où les femelles et les mâles sont placés côte à côte. Les larves des femelles filent un cocon de soie blanche s'élevant d'environ 5 à 6 mill. au-dessus du niveau général des alvéoles. Les cocons des mâles, comme chez les autres espèces.

sont beaucoup moins élevés. Les piliers reliant les gâteaux entre eux sont gros, subcylindriques, très élargis aux extrémités. Le carton dont les gâteaux sont faits semble identique à celui de l'enveloppe; il est brun chocolat, avec des veines transversales blanchâtres, fauves ou rousses; il est très cassant et fabriqué avec des fibres de bois plus ou moins décomposé coupées en morceaux assez grossiers. L'enveloppe est très rapprochée des gâteaux et, en beaucoup d'endroits, adhérente aux bords de ceux-ci; les gaufrures sont déprimées et assez régulières. Ce nid figure actuellement dans les galeries de zoologie du Muséum de Paris.

Patrie. — Vladivostock (type! coll. Radoszkowsky); Japon (leg. G. Lewis 1869, Muséum de Paris; — Rans 1871, Musée de Vienne; — Seebold 1874, Musée de Vienne; — Donitz, coll. A. Schulz); environs de Tokio (J. Harmand 1901, Muséum de Paris); Tsushima (sept.oct. leg. H. Fruhstorfer, coll. von Schulthess Rechberg; coll. A. Schulz; Musée de Vienne); Kohe (Musée de Brême); Myadzu (leg. R. P. Relaves, coll. Fr. Sébastien); Batjan (leg. H. Fruhstorfer, coll. A. Schulz; île Tsur (Holst, Musée de Londres).

# SUR UNE COCHENILLE NOUVELLE

(Amelococcus Alluaudi, nov. gen. nov. sp.)

RÉCOLTÉE PAR M. CH. ALLUAUD

#### SUR L'INTISY A CAOUTCHOUC DE MADAGASCAR

par le De Paul Marchal.

La Cochenille qui fait l'objet de cette note m'a été communiquée par notre collègue M. Alluaud, qui l'a recueillie à Madagascar sur l'Euphorbia Intisy.

L'attention a été dans ces dernières années attirée sur la valeur industrielle de cette Euphorbe arborescente, qui croît dans la brousse de la région sud-ouest de la grande île africaine et qui fournit, en quantité très grande, un caoutchouc d'excellente qualité (1).

L'insecte qui nous occupe peut se trouver en abondance, fixé sur les rameaux de l'Intisy.

La femelle, que seule j'ai eu l'occasion d'observer, répond à la description suivante faite d'après des échantillons conservés dans l'alcool.

Amelococcus Alluaudi nov. gen. nov. sp. — Long. 3,5 mill.; larg., 3 mill. Entourée d'un sac brun, testacé, recouvert d'un enduit blanchâtre granuleux; ce sac est piriforme, à pointe postérieure, présentant une face dorsale uniforme et convexe, et une face ventrale un peu aplatie; au centre de cette face ventrale qui se trouve en rapport avec la plante, se trouve un petit orifice allongé longitudinalement et semblable à une déchirure laissant à nu le mamelon buccal (fig. 2, a). Enfin on remarque quatre lignes blanchâtres, deux de chaque côté divergeant de la ligne médiane vers les bords latéraux et rappelant les lignes analogues que l'on trouve chez les Lecanium. L'extrémité postérieure est échancrée tégèrement et semble se terminer ainsi par deux pointes rapprochées; cette échancrure correspond à un orifice du sac qui se trouve à ce niveau. Les bords latéraux sont fortement convexes, tandis que le bord antérieur est court et à peu près rectiligne.

A l'intérieur du sac ainsi constitué se trouve logé l'Insecte lui-même.

<sup>(1)</sup> Voir : Drake del Castillo. — Note sur l'Intisy de Madagascar (Bull. du Muséum d'Hist. nat. 1900, nº 5, p. 257-260);

Fron (G). Note sur l'Euphorbia Inlisy (Journal de Botanique, XIV, 1900, p. 157).

qui peut être plus ou moins rétracté (fig. 1). Il présente une face dorsale convexe qui n'offre aucun caractère à noter et une face ventrale aplatie : celle-ci présente une segmentation très nette; les cinq derniers segments sont entièrement distincts et leurs lignes de démarcation se poursuivent jusqu'au contour externe; ils constituent une sorte de région caudale courte et conique prolongeant le corps en arrière, mais plus ou moins rétractée, suivant le degré de maturité des femelles.




Fig. 1. — Amelococcus Alluaudi;  $\mathbb{Q}$ , retirée de son sac et vue par la face ventrale. Gr. = 20.

Les segments antérieurs, qui forment la plus grande partie de l'animal, sont partiellement fusionnés et les plis qui les séparent ne se continuent pas jusqu'aux bords, mais s'interrompeut avant d'atteindre le bourrelet faiblement saillant qui borde la face ventrale.

Il n'y a ni antennes ni pattes, pas même à l'état de rudiments reconnaissables. Il se peut néanmoins que parmi les petites taches chitineuses symétriques que l'on trouve sur la face ventrale, il y en ait qui correspondent à l'emplacement de ces organes. Deux paires d'entre elles, placées de chaque côté de la région rostrale, et allongées transversalement, correspondent aux stigmates. Le rostre est tout à fait rudimentaire et sur les échantillons que j'ai examinés il n'y avait pas de soies saillantes à l'extérieur.

Le segment préanal se prolonge de chaque côté par un tubercule cylindrique bien développé et se terminant par une forte soie. Le segment anal présente lui-même 8 soies groupées en faisceau placé entre les deux tubercules du segment préanal et ne dépassant guère ces derniers. On distingue parmi elles une paire correspondant à un




Fig. 2. — Amelococcus Alluandi: a, insecte femelle entouré de son sac et vu par la face ventrale; Gr. = 5. — b, larve vue par la face dorsale; Gr. = 116. — c, extrémité postérieure de la larve, les deux longues soies n'étant représentées que par leurs parties basilaires; Gr. = 400. — d, antenne de la larve; Gr. = 400.

plan dorsal, une paire correspondant à un plan ventral, et deux paires latérales ayant une situation intermédiaire, ces dernières étant les plus longues.

Cette Cochenille est ovovivipare. A l'intérieur du corps on trouve de nombreux œufs ovoïdes, et chez les femelles un peu rétractées sur elles-mêmes, on trouve à l'intérieur du sac qui les entoure des larves dont il est important, au point de vue taxonomique, de noter les caractères.

Ces larves (fig. 2, b) ont une forme ovalaire allongée et sont nettement segmentées. Leurs pattes sont bien développées et présentent à leur extrémité une griffe et 4 digitules. Les antennes qui habituellement ne


présentent chez toutes les larves de Coccides que 6 articles, paraissent en offrir 8 ou 9 bien distincts; ce fait semble tenir au dédoublement d'articles primitifs et peut-être aussi à la présence de plis, accentués encore par l'action des réactifs. Le dernier article de l'antenne porte à son extrémité un petit bouton sphérique, deux longs poils et un poil cespité. On distingue sur les régions dorsale et latérale du corps des petits cercles chitineux légèrement saillants et très apparents qui correspondent à des orifices glandulaires. Ils sont disposés symétriquement, en 6 rangées parallèles, suivant la disposition indiquée par la figure. On remarque, en outre, sur les bords latéraux, quelques soies courtes et symétriquement placées, mais peu apparentes. La boucle des soies rostrales repliée à l'intérieur du corps s'étend très loin en arrière. Le segment préanal présente deux tubercules saillants terminés par une soie très forte et très longue (plus du tiers de la longueur du corps). Chacun de ces tubercules porte en outre, du côté interne, une soie courte assez forte, incurvée et insérée sur un petit mamelon. Le segment anal porte 8 soies disposées comme chez l'adulte et qui dépassent un peu les tubercules du segment préanal. En somme, la disposition de l'extrémité postérieure chez la larve est à peu près la même que celle que l'on rencontre chez l'adulte.

Il résulte des caractères qui ont été précédemment énumérés que l'Insecte qui nous occupe doit être classé dans la tribu des Coccinae. Le développement des tubercules préanaux et des soies qu'ils supportent, la présence de huit soies anales, celle d'un sac sécrété par l'Insecte et l'enveloppant tout entier, enfin les caractères larvaires et en particulier la présence de tubercules sécréteurs symétriques et distribués en rangées parallèles sur la région dorsale, me paraissent suffire pour justifier le classement de cet Insecte dans le groupe des Eriococcinae; mais des caractères distinctifs très spéciaux, tels que l'absence complète d'appendices chez l'adulte, la disposition des antennes chez la larve, celle des organes sécréteurs, etc., motivent la création d'un genre nouveau.

La diagnose du genre Amelococcus sera donc la suivante :

Femelle arrondie, nettement segmentée à la face ventrale, dépourvue de pattes et d'antennes; rostre rudimentaire; tubercules préanaux cylindriques et saillants pourvus d'une forte soie. Huit soies anales. Insecte enveloppé d'un sac ouvert seulement à l'extrémité postérieure et au niveau de la région rostrale. Larve pourvue de 4 rangées dorsales et de deux rangées latérales parallèles de tubercules sécréteurs.

Les échantillons d'Amelococcus Alluaudi qui m'ont été communiqués étaient accompagnés de Fourmis assez nombreuses capturées en même




R. au Bugsson del.

Imp L. Lafontaine Paris

A Benard lith






R. du Buysson del

Imp I Lafontaine Paris


- " in mand lath





Vespides.





h in Brysson del.

Imp 1 Lafontaine Paris.

A. Benara lith.

Vespides.






M. Maindron & R. a Buysson, del.

Imp. L. Lafontaine, Paris.

The second of





R. du Buysson, del

Imp. L. L. Intaine, Paris

Vespides



temps que les Cochenilles; ce fait indique que cette espèce doit sécréter du miellat.

Plusieurs exemplaires d'un Coccinellide, l'Exochomus flavipes Thunb. se trouvaient en outre, tant à l'état adulte qu'à l'état larvaire, dans le même flacon que les Cochenilles, et il n'est pas douteux que cet Exochomus se nourrisse aux dépens des Amelococcus, et doive être considéré comme un précieux auxiliaire pour enrayer sa multiplication.

#### LA CÉCIDOMYIE DES CAROUBES

Schizomyia Gennadii Marchal (1)

par le De Paul Marchal.

La Cécidomyie dont il va être question vit, à l'état larvaire, dans le fruit du Caroubier (*Ceratonia siliqua*). Elle a été découverte à Chypre par M. Gennadius, directeur de l'Agriculture, qui m'a fait parvenir à différentes époques de l'année des envois de Caroubes attaquées par la larve de cet Insecte, et m'a ainsi donné toute facilité pour en faire l'élevage et pour poursuivre l'étude des différents stades.

Dans un intéressant travail sur le Caroubier (²), M. Gennadius a déjà consacré quelques lignes à ce Diptère. « Un petit Insecte, dit-il, qui n'a pas encore été déterminé, mais qui doit être, suivant toute probabilité, une espèce de Cécidomyie, dépose ses œufs à l'automne sur le fruit encore tout jeune du Caroubier. Les larves qui éclosent de ces œufs pénètrent dans le fruit (1 à ½ par fruit) et commencent à se nourrir à ses dépens. La Caroube qui est ainsi attaquée se gonfle, cesse de s'accroître en longueur, et reste courte, on bien se dessèche sur l'arbre avant d'être arrivée à maturité. Lorsque les pluies d'automne tardent à venir, la maladie se trouve favorisée dans son développement, tandis que des pluies précoces et relativement abondantes paraissent l'enrayer. Je ne vois pas d'autre remède pratique contre ce fléau que la récolte et la destruction des fruits attaqués lorsqu'ils sont encore jeunes. »

Les caractères de la Cécidomyie des Caroubes aux différents stades de son existence sont les suivants :

<sup>(1)</sup> J'ai donné une courte diagnose de cet Insecte dans une note antérieure Bulletin Soc. ent. Fr., 1904, p. 272).

<sup>(2)</sup> Gennadius P.J. - The Carob-Tree, 1902 (Nicosia, Cyprus), 30 pages.

Aun. Soc. Ent. Fr., LAXIII [1904]. 36

IMAGO,  $\mathfrak{P}$ . — Long. 3 mill. 5. — Abdomen rouge avec bandes grises. Thorax brun gris et rougeâtre. Tête noire, antennes grisâtres. Yeux largement confluents. Antennes de 2+42 articles, plus longues que la tête et le thorax réunis, présentant outre la pubescence courte, des soies longues et nombreuses disséminées à leur surface sans former des verticilles bien distincts les uns des autres. Le  $4^{\rm cr}$  article du funicule plus long que chacun des suivants, les 3 ou 4 articles suivants, de longueur sensiblement égale, et les derniers allant en diminuant progressivement de longueur; l'avant-dernier presque aussi large que long et le terminal en forme de nodule arrondi. Palpes de 2 articles, le



Fig. 1. — Jeunes Caroubes dont les unes (a) sont saines et dont les autres (b) sont attaquées par la larve de Schizomyia Gennadii.

second conique à son extrémité et sensiblement plus long que le précédent. Ailes garnies de poils assez abondants. Nervure cubitale non réunie par la base à la nervure sous-costale, semblant naître par un petit crochet de la nervure posticale, atteignant par son extrémité opposée le sommet de l'aile. Pattes longues, les intermédiaires et les postérieures ayant à peu près le double de la longueur de l'abdomen, garnies de poils et d'écailles nombreuses. Crochets des tarses simples, dépassant un peu l'empodium. Ovipositeur en forme de long acicule chitineux, rétractile à l'intérieur d'une poche visible par transparence après compression, et qui occupe les  $\frac{2}{3}$  de la longueur de l'abdomen. Éclosion obtenue le 3 août 1904, de Caroubes reçues de Chypre le 25 juillet.

Nymphe. — Armure céphalique (aculei verticales) très forte et en

forme de rostre long et proéminent bidenté à son extrémité. Armure frontale (aculeus frontalis) formée d'une pointe aiguë impaire et médiane se dirigeant obliquement en haut. Armure sternale (aculei sternales) pourvue de 3 dents courtes et largement séparées les unes des autres.

Larve. — Larve jeune, d'une teinte orangée, présentant à l'extrémité postérieure du corps une plaque dorsale nettement bifide, chacune des pointes correspondant à une papille; abdomen se terminant par deux papilles anales crochues très développées (fig. 2, a).

Larve parvenue au terme de sa croissance, ne présentant plus les caractères précédents et portant une spatule sternale qui se termine par



Fig. 2. — a, extrémité postérieure de la larve jeune de Schizomyia Gennadii; Gr. = 220. — b, spatule sternale de la larve parvenue au terme de sa croissance; Gr. = 106.

4 pointes obtuses, dont les deux externes sont les plus larges et les plus saillantes; base de la spatule se prolongeant en un long manubrium divisé longitudinalement par une ligne médiaue (fig. 2, b).

Bien que l'espèce, qui vient d'être décrite à ses différents stades évolutifs, s'écarte du genre *Schizomyia*, tel qu'il est défini par Kieffer, par le nombre des articles des palpes (seulement 2 au lieu de 4), je pense, pour ne pas multiplier les coupes génériques, devoir la rapporter à ce genre. Les caractères de la larve jeune pourvue de crochets anaux et d'une plaque dorsale, ainsi que celui des antennes garnies de soies longues et nombreuses l'écartent en effet du genre *Asphondylia* H. Loew, et permettent de la rapporter au genre *Schizomyia* Kieffer.

Observations. — La larve opère sa nymphose sans faire de cocon, et cette transformation se fait, au moins pour les individus que j'ai observés, à l'intérieur de la Caroube; il est vraisemblable que l'armature de la nymphe lui sert pour se créer un passage dans les tissus durs et desséchés de la Caroube au moment de l'éclosion de l'Insecte

parfait. On peut trouver des Cécidomyies encore partiellement entourées de la dépouille nymphale et qui sont mortes sans avoir pu parvenir à se dégager. Celle qui a été utilisée pour la description de l'imago était éclose d'une Caroube ouverte quelques jours auparavant.

Ainsi que le pense M. Gennadius, il existe vraisemblablement deux générations annuelles, l'une attaquant à l'automne les Caroubes encore toutes jeunes, et une autre attaquant les Caroubes plus développées au printemps. Cette question de la succession des générations ne pourra être tranchée que par de nouvelles observations faites sur place. Pour contribuer à la résoudre, il est bon d'enregistrer les données suivantes : Dès le 45 avril, on trouve des jeunes larves à l'intérieur des Caroubes; peut-ètre ces larves donnent-elles naissance en mai ou juin à une génération d'adultes que je n'ai pas observée. À la fin de juin et en juil-let, on trouve des larves qui sont arrivées à maturité et d'autres larves encore très jeunes; ces dernières occupent souvent des Caroubes d'assez forte taille et ne présentant pas, ou présentant d'une façon incomplète, les déformations et l'arrêt de développement caractéristiques.

Les Caroubes attaquées et examinées au printemps (au milieu d'avril par exemple) (fig. 4) se distinguent par leur forme renflée, arrondie, au lieu d'être aplaties et allongées comme les jeunes Caroubes à cette époque. Le bord correspondant à l'insertion des graines est très convexe et l'ensemble présente l'aspect d'une cornue; les tissus de la paroi sont hypertrophiés et irrégulièrement mamelonnés. Le plus grand nombre des Caroubes d'une même grappe peuvent être attaquées.



Abbé Presne, del.

Imp. I Lafordaine Paris

11.58.28 34

L'éclosion des cenfs de Lestes viridis.



# 2º Groupe.

### LES GUÈPES

## V. media Degeer.

Vespa media Degeer, Mém. hist. Insectes II, 1, 1774, p. 791, Pl. XXVII, fig. 1-8.

Vespa Geerii Lepeletier, Hist. nat. Insectes. Hyménoptères 1, 4836. p. 510, nº 8.

Vespa crassa Herrich Schäffer, Faunae Insectorum Germaniae initia. Deutschlands Insecten herausgegeben von D<sup>e</sup> G. W. F. Panzer fortgesetzt von D<sup>e</sup> G. A. W. Herrich-Schäffer, 4841, p. 34.

Femelle. — Corps de taille médiocre, robuste, à pubescence abondante, fine, dressée, gris-roussâtre, devenant plus sombre sur le dorsulum. Tête normale, plus étroite que le thorax, jaune un peu roussatre, une tache noire sur le vertex entourant les ocelles; les cavités où prennent naissance les antennes sont noires, ainsi qu'un étroit liséré sur les côtés du clypeus et des joues; ces dernières longues, l'espace anterantennaire convexe, non caréné sur les côtés, souvent avec un petit point noir au centre; clypeus couvert de points gros et espacés, le bord antérieur tronqué, légèrement sinué, les angles antérieurs arrondis. l'extrème bord roux-ferrugineux; mandibules entièrement jaunes avec la bordure du tranchant roux-ferrugineux. Antennes jaune-roux, le scape noir en dessus, les articles du fonet noirâtres en dessus à partir du 3° ou du 4°. Thorax rétréci en avant, noir avec le pronotum plus ou moins coloré de jaune passant au ferrugineux, une tache sous les ailes, deux lignes longitudinales plus ou moins distinctes ou fondues ensemble sur le mésonotum, l'éensson et deux taches sur le postécusson jaune-ferrugineux. Pronotum avec une forte carène transversale jaune; souvent il existe deux taches rousses sur le tergite du segment médiaire. Écailles rousses; ailes hyalines, à teinte ferrugineuse; pattes ferrugineuses, jaunâtres sur les tibias antérieurs. l'extrémité des cuisses et des tibias; le feutre des tibias et des tarses ferrugineux vif; les hanches, les trochanters et souvent la base des cuisses sont tachés de noir. Abdomen large, noir avec tous les segments marginés de jaune un peu roussâtre : le 4er tergite court. la troncature antérieure très abrupte, plutôt concave, la marge jaune étroite. la couleur noire s'avançant en pointe, au milieu, dans le jaune, ce qui se voit également sur les autres segments: la couleur jaune est Ann. Soc. Ent. Fr., LXXIII 1907.

très large sur les autres segments, s'élargissant encore davantage sur les côtés du 2º tergite, presque toujours avec un point noir de chaque côté isolé dans le jaune; 6º tergite entièrement jaune. Les segments ventraux sont noirs et largement marginés de jaune avec une tache noire de chaque côté sur chacun d'eux, sauf sur le 5º qui est entièrement jaune. — Long. 48-20 mill.

Parfois le 2° tergite abdominal est largement coloré de noir, de telle sorte que les points noirs latéraux sont réduits à une échancrure noire dans le jaune.

Ouvrière. — L'ouvrière est semblable à la femelle, mais beaucoup plus petite, le plus souvent noir foncé et jaune sans trace de couleur rousse. Le noir envahit tout le dessus de la tête et une partie des côtés derrière les yeux; l'échancrure des yeux et l'orbite inférieure sont jaunes, ainsi qu'une tache sur l'espace interantennaire; le clypeus est ordinairement taché de noir sur le disque; le pronotum est noir avec la carène transversale et le bord supérieur des lobes latéraux jaunes, le mésonotum entièrement noir; l'écusson est taché de jaune de chaque côté à son bord antérieur, le bord postérieur des taches jaunes et la suture postérieure sont ferrugineux; les pattes ont davantage de jaune et de noir; les marges jaunes de l'abdomen beaucoup plus étroites et plus régulières, réduites parfois même à un simple liséré jaune, au moins sur les premiers segments. — Long. 15-48 mill.

Le coloris des ouvrières est très variable. On rencontre des individus ayant la troncature antérieure du 1er segment tergite abdominal plus ou moins jaune ou rousse; d'autres ont des taches roux vif sur le thorax et l'abdomen, cette couleur nullement fondue avec le jaune; c'est-à-dire que chez les premiers c'est le noir qui domine, et chez les seconds le noir est réduit et remplacé par le jaune et le ferrugineux.

Mâle. — Le mâle est coloré comme l'ouvrière. Le clypeus est simplement tronqué antérieurement, les antennes très longues noires en dessus, les articles légèrement renflés à l'extrémité; il existe des tyloïdes à partir du 5° article, mais ils sont linéaires, et peu apparents. Le 7° tergite abdominal est arrondi, jaune parfois taché de noir; le 5° sternite ventral est entier, transversal, le 6° cordiforme, l'extrémité échancrée, jaune avec la base noire; le couvercle génital soit le 8° tergite, est largement tronqué, ce qui le rend subcarré. Les branches du forceps sont brunes, leur bord supérieur porte une dilatation anguleuse au tiers apical. l'extrémité de chaque branche forme une très petite spatule, le lobe se termine en pointe très aiguê; les volsellas très réduites, couvertes d'aspérités serrées du côté interne, les tenettes

larges, sublancéolées, l'extrémité largement arrondie, la dilatation basilaire courte: les crochets sont soudés presque jusqu'à leur sommet, dont les extrémités sont en forme de croissants conjugués, leur base est large, et vers le tiers supérieur on distingue de chaque côté un fort épaississement dentiforme dirigé en dessous et couvert latéralement d'une série de grosses épines courtes, dont quelques-unes unciformes et dirigées en arrière. — Long. 14-20 mill. Pl. VII, fig. 9 et Pl. VIII, fig. 9.

La V. media Degeer est répandue dans toute l'Europe centrale. Elle est rare ou même absente sous le climat chaud du bassin de la Méditerranée; par contre, elle remonte assez haut dans le nord. J'ai vu un exemplaire femelle provenant de Mandchourie, ce qui prouve qu'elle habite également le continent asiatique. On l'a signalée du Canada et de l'île Vancouver. Son aire de dispersion serait donc sur tout le globe entre le 40° et le 65° degré de latitude nord.

Son nid est toujours aérien, ovoïde ou globuleux, en carton mince, gris plus ou moins zoné de blanchâtre, souple, non cassant, composé de fibres végétales longues. Il mesure de 18 à 22 centimètres de long sur 12 à 18 centimètres dans sa plus grande largeur. Les enveloppes sont nombreuses, 7 à 45 environ, simples, reliées entre elles par des gaufrures ou des feuillets supplémentaires. L'ouverture est étroite et réservée dans le bas. Le nid est fixé à une branche d'arbre ou à plusieurs rameaux enchevêtrés d'un arbuste. On le rencontre aussi sous un abri quelconque, comme l'encorbellement d'une toiture, le rebord d'un mur ou d'un portique, etc. Il peut être établi à un mêtre du sol comme à une branche d'arbre à cinq ou six mètres d'élévation. Plus la construction est grosse, plus il y a de gaufrures supplémentaires dans la partie supérieure. Les alvéoles sont très différenciés. Il y a six à sept gâteaux, reliés les uns aux autres par des piliers comprimés en forme de rubans plus ou moins larges. C'est de la V. media dont il s'agit dans une des brochures de M. Ch. Janet (Études sur les Fourmis, les Guèpes et les Abeilles, 40° note. Mémoires de la Société Académique de l'Oise, t. XVI, 4893, p. 40-41), lorsque le consciencieux historien des Guèpes nous apprend qu'il abandonna pendant dix-sept jours environ une colonie de ces Hyménoptères dont il faisait l'étude. Un cristallisoir de quatre centimètres de diamètre plein de miel servait de mangeoire à toufe la nichée. Un petit pont en carton reposant sur le verre et le miel « permettait aux Guèpes de se poser sans s'engluer. Par suite de l'abaissement du miel, ce petit morceau de carton finit par se placer verticalement; mais le prenant pour point de départ, les Guèpes construisirent, avec la même substance que celle qui forme leur nid, un petit plancher attaché à la paroi interne du cristallisoir et couvrant environ la moitié de sa surface. » Ce petit plancher servait aux Guèpes pour aller puiser le miel et était prolongé au fur et à mesure des besoins.

Les mâles et les jeunes femelles apparaissent de bonne heure, dès la fin de juillet et au commencement d'août. La population n'est jamais très nombreuse par colonie. La *V. media* Degeer, aime beaucoup les fruits; et, si elle était aussi abondante en ouvrières que les *V. germanica* et *rulgaris*, elle serait certainement nuisible.

Patrie. — Vosges (ley. A. Paton, coll. R. du Buysson 1900, Muséum de Paris); Calvados: Lisieux (ley. A. Loiselle, coll. H. Gadeau de Kerville); Eure: Bézu-St-Eloi (Ch. Brongniart 1883, Muséum de Paris); Villeneuve-le-Roi (1854, Muséum de Paris); Mesnil-le-Roi, St-Cloud (coll. J. de Gaulle); Le Vésinet, St-Germain, Versailles coll. Sichel 1867, Muséum de Paris); Màcon (ley. A. Flamary, coll. R. du Buysson 1900, Muséum de Paris); Allier: Broùt-Vernet, les Ramillons près Moulins (coll. R. du Buysson 1900, Muséum de Paris); Royat (coll. J. de Gaulle); Moscon, Montpellier, Montauban, Toulouse, Toscane, Turin (coll. Sichel 1867, Muséum de Paris); Thuringe, Ilmenau Musée de Brême); Mandchourie, région du lac Hanka (Bohnhof 1900, Muséum de Paris); ile Sakhaline (P. Labbé 1902, Muséum de Paris); Italie, Lombardie, Canonica Amata; col Aprica 900 m. à 1000 m. (§ IX 1880, coll. Mayretti).

Les exemplaires provenant de Sibérie et de l'île Sakhaline sont beaucoup plus longuement et abondamment velus; les pattes sont tachées de noir sous les tibias et les cuisses; le thorax et la tête sont de couleur beaucoup plus foncée, ce qui donne à ces insectes un aspect tout différent.

M. H.-W. Lewis a signalé la V. media du Canada et de l'île Vancouver. Personnellement je ne l'ai jamais recue d'Amérique.

Le Rév. Thomas W. Fyles en a trouvé un nid suspendu au plafond d'une écurie à chevaux, dans les environs de Québec. D'après ce même naturaliste, cette Guèpe bàtirait sous l'avancement des toitures et dans les cavités des sculptures des habitations. Elle aurait donc en Amérique des habitudes analogues à celles qu'elle possède en Europe. Elle porte au Canada le nom de « scalloped wasp ».

#### V. maculata Linné.

Vespa maculata Linné, Cent. Insect. rar. 4763, p. 30, nº 91. — Systema Naturae Ed. 42° I, 4767, p. 948, nº 2.

Femelle. — Corps de taille moyenne, robuste: pubescence grisroussâtre, dressée; noir profond avec les mandibules, le clypeus, le

devant du scape, les orbites internes, une tache transversale entre les antennes, le derrière des yeux, la carène transversale et le bord postérieur du pronotum, une tache sous les ailes, deux sur l'écusson et le postécusson, les articles des tarses, les tibias et le devant des cuisses des pattes antérieures et différentes taches et marges sur les segments de l'abdomen, blanc d'ivoire. Tête normale, joues longues; clypeus avec une tache discoidate noire, le bord antérieur sinué, liséré de roussatre, les angles antérieurs obtus, la ponctuation grosse, irrégulière, espacée. Antennes noires en dessus, roussatres sous le fouet, les articles du fouet resserrés à la base. Les côtés du pronotum sont plus ou moins colorés de blanc, rarement presque en entier, la carène transversale très accusée; écailles noires, tachées de blanc à la base; ailes enfumées, hyalines, la partie antérieure des ailes supérieures ferrugineuse; pattes noires avec quelques taches blanches sur les hanches antérieures, l'extrémité des cuisses, les tibias et le 4° article des tarses des deux premières paires; le feutre des tibias et des tarses gris-roussatre. Abdomen large, le 4er tergite assez court, la troncature antérieure abrupte, légèrement arrondie au sommet : 1er et 2e tergites entièrement noirs, le 3° avec une petite tache blanchâtre sur les côtés. le 4º et le 5º blancs avec la base noire, la couleur noire faisant une ligne étroite, longitudinale au milieu et une incision semi-punctiforme de chaque côté: l'extrême bord est roussatre isolant ainsi les parties blanchâtres; le 6° tergite noir avec deux taches blanches; les segments ventraux noirs avec une tache blanche de chaque côté aux angles postérieurs. - Long. 20-23 mill.

Ouvrière. — Semblable à la femelle, mais de plus petite taille; les taches blanches du thorax sont moins grandes. — Long. 14-19 mill.

Mâle. — Semblable à la femelle, dont il diffère par sa taille un peu plus petite, le bord antérieur du clypeus tronqué, rectiligne, nullement sinué, la ponctuation du clypeus faible; les antennes beaucoup plus longues avec des tyloïdes à partir du 4° article; le 1° tergite abdominal porte ordinairement deux taches blanches transversales le long du bord postérieur, mais ces taches peuvent se réduire et même disparaître complètement: le 7° tergite abdominal noir avec deux taches blanches apicales, séparées l'une de l'autre au milieu par une ligne noire, l'apex est légèrement sinué et garni d'une rangée de soies blanchâtres; le 5° sternite ventral est normal avec une très large marge blanchâtre, séparée au milieu par une ligne noire, le 6° est allongé, blanc, avec la bordure apicale noire, l'extrémité échancrée est garnie d'un feutre épais de poils gris. L'appareil copulateur volumineux,

roussàtre; branches du forceps avec l'extrémité inférieure brièvement aiguë, le lobe large à pointe relevée, finement aiguë, acuminée, teneties formant chacune un triangle, l'angle apical obtus ne dépassant pas les branches du forceps; crochets formant une large pièce dilatée légèrement avant l'extrémité, la partie antérieure des hords de cette dilatation garnie d'aspérités sur la ligne marginale, cette dilatation se réfléchissant en dessous de chaque côté anguleusement, l'extrémité des crochets se terminant en deux lames à pointe incurvée en dedans, se regardant. — Long. 48 mill. Pl. VII, tig. 7.

Cette espèce a beaucoup d'analogie avec la V. media Degeer, par ses caractères plastiques et ses mœurs. Ce sont les deux seules espèces du groupe des Vespula qui, chez le mâle, présentent des tyloïdes saillants aux antennes.

La V. maculata L. est appelée « the black Hornet » au Canada. Sa nidification est aérienne, suspendue aux branches des arbres. Le Rév. Thomas W. Fyles en a figuré deux dans le « Thirty third annual report of the entomological Society of Ontario, 1902, p. 69 »; I'un encore très peu avancé (fig. 47), le second en section (fig. 48). Ce dernier a six enveloppes at trois gâteaux complètement séparés des enveloppes et soutenus chacun par un seul pilier central très large. L'ouverture est au centre, en dessous. L'ensemble rappelle énormément les constructions de la V. media, D'après M. Fyles, les nids de la V. maculata peuvent atteindre des proportions assez grandes : 3 pieds et 2 pouces trois quarts (un peu plus d'un mètre) du point d'attache à l'ouverture inférieure, et 2 pieds et 9 pouces et demi (environ 85 centimètres) de circonférence au milieu dans sa partie la plus grosse. Il en existe un fort petit dans les collections du Muséum de Paris; il provient du Maryland et il a été offert par M. l'abbé J. de Joannis. Ce petit nid est oviforme, composé d'un gâteau initial de quelques cellules avec quatre enveloppes et le commencement de la cinquième à sa base. Il mesure quatre centimètres de long et vingt-sept millimètres dans sa partie la plus large. Le carton est souple, gris-clair uniforme, d'une texture làche, à fibres végétales longues. - Pl. X, fig. 3 et 4.

Patrie. — Amérique du nord (Musées de Brême et de Londres : Amérique septentrionale (Bastar 1837, Milbert, Muséum de Paris). Amérique boréale (Herrich-Schaeffer, coll. Sichel 1867, Muséum de Paris : Massachusetts, Lyun Musée de Brême), Massachusetts (Musée de Munich): New York, Toronto (coll. J. de Gaulle ; Philadelphie (Lesueur: Peale 1833, Muséum de Paris); Illinois, New York, Tenessee, Baltimore (coll. Sichel 1867, Muséum de Paris); Maryland (J. de Joannis 1903, Muséum

de Paris); Massachusetts. Amherst II. T. Fernald); Nouvelle-Écosse (coll. Sichel 1867, Muséum de Paris); Canada (coll. Bosc 1828, Muséum de Paris); Géorgie, Savannah Harper 1843, Muséum de Paris; Aufilles (Plee 1826, Muséum de Paris); Canada (ex coll. Rühl, coll. Magretti; Indiana, N.-Harmony (coll. Magretti).

### V. diabolica II. de Saussure.

- ? Vespa arenaria Fabricius, Systema entomologiae, 1775, p. 365, nº 12.
- Vespa arenaria Gmelin, Linné : Systema naturae Ed. 43<sup>a</sup> I, 5, 4790, p. 2749, nº 34.
- ? Vespa arenaria Olivier, Encyclopédie méthodique. Insectes, VI, 1791, p. 681, nº 55. Olivier n'a fait que copier Fabricius) — nec H, de Saussure, nec J. Mac Farland.

Vespa diabolica II. de Sanssure, Étud. fam. Vespides II, 4853, p. 138, nº 48.

Femelle. — Corps de taille petite, robuste : pubescence grise, longue. tine, modérément abondante, devenant noire sur le dessus du corps. Tête normale, petite, beaucoup moins large que le thorax, noire avec les mandibules, le clypeus, une tache entre les antennes, les orbites internes jusqu'au fond du sinus jaune soufre; joues longues, parallèles. noires; clypeus couvert de gros points irréguliers, épars, le bord antérieur peu profondément sinué, le sinus subtriangulaire, les angles formés par lui arrondis, tout l'extrême bord noir-brun, le disque ordinairement avec des taches ou points noirs; antennes noires, le devant du scape jaune, le dessous du fouet jaune-roux. Thorax noir avec le bord supérieur du pronotum et une carène transversale en avant de celui-ci, une tache sous les ailes, deux sur l'écusson et le postécusson, jaune soufre : écailles jaunes, tachées de roussatre : ailes hyalines, à teinte fumeuse un peu roussatre; pattes noires avec une tache en avant des hanches, l'extrémité des cuisses, les tibias et les tarses jaunes, les tibias antérieurs et intermédiaires ordinairement tachés de noir en dessous. Abdomen large, ovale, noir avec tous les segments largement margines de jaune soufre, la marge fortement échancrée triangulairement au milieu, avec un point noir de chaque côté isolé dans le jaune; parfois ces points se soudent à la partie noire de la base et forment dans le jaune de petites échancrures; 1er tergite sans points isolés ni échancrures sur les côtés de la marge jaune, mais l'échancrure médiane atteint le plus souvent le bord postérieur et sépare la couleur jaune, souvent aussi on remarque une très petite tache transversale jaune isolée dans le noir, près de la troncature antérieure qui est très abrupte, presque concave, le haut légèrement arrondi; le 6° tergite noir avec une tache triangulaire de chaque côté jaune soufre. Les segments sternites sont noirs largement marginés de jaune, le milieu du jaune plus ou moins profondément échancré avec un point noir isolé de chaque côté; ces points noirs peuvent être soudés à la partie noire de la base: 5° sternite jaune avec une figne noire médiane. — Long. 20-22 mill.

Ouvrière. — Diffère de la femelle par sa taille plus petite. Le mésonotum porte parfois deux petits traits jaunes parallèles, près de l'écusson. — Long. 40-44 mill.

Mâle. — Semblable à la femelle, mais avec les antennes très longues, les articles de l'extremité du fouet légèrement arqués, avec des traces linéaires de tyloïdes: le clypeus déprimé en avant, le bord antérieur tronqué droit; le 6º tergite abdominal jaune avec la base noire, parfois même presque entièrement noir : 6° sternite jaune avec l'extrême base noire, arrondi, le bord apical garni d'un feutre roux, l'apex très légèrement sinué. L'appareil copulateur de taille moyenne, roussatre: les branches du forceps tachées de jaune près du sommet et en dessus, le bord supérieur interne assez fortement anguleux, l'extrémité inférieure fortement carénée, élargie, divariquée, le lobe largement lancéolé. finement aigu, pas plus long que la dilatation apicale, garni de longs poils flexueux; tenettes larges, longues, infléchies en dessus, dépassant en longueur les branches du forceps et couvertes de nombreux poils longs et flexueux. Les crochets larges à la base, étroits à l'extrémité qui a la forme de deux lames dont le tranchant serait du côté interne, c'est-à-dire droites du côté interne et arrondies du côté externe; on distingue en dessus de la tige des crochets une forte carène formant un tube s'ouvrant à la base des deux lames de l'extrémité. — Long. 15-17 mill. Pl. VI, fig. 4.

La V. diabolica Sauss., est très voisine de la V. norwegica F. L'appareil copulateur des mâles est à peu près semblable chez ces deux Guèpes. On distingue la V. diabolica Sauss., de la V. norwegica F. principalement par son corps moins poilu, les côtés de la tête derrière les yeux jaunes jusqu'aux joues qui restent noires, par la carène du pronotum plus forte, jaune et enfin par la coloration de l'abdomen. La var. adulterina Buyss., en dehors de la forme du clypeus, relie ces deux Guèpes l'une à l'autre.

On rencontre assez souvent des individus portant sur le mésonotum deux raies jaunes parallèles commencant au bord postérieur près de

l'écusson et s'avancant jusqu'au milieu. Il est très probable que la V. arenaria décrite par Fabricius (Systema entomologiae 1775, p. 365, nº 42 est la même espèce que la V. diabolica Saussure, car l'illustre entomologiste indique la marge du les tergite abdominal comme étant linéaire, non dentée, interrompue au milieu. La V. diabolica Sauss. est la seule guêpe américaine qui réponde à ce caractère. MM. de Saussure et Mac Farland doivent se tromper en faisant de V. arenaria de Fabricius une espèce à ornements blancs, car l'auteur dit : « ... tharace flavo-maculato, abdomine fasciis sex dentatis, luteis... , tandis que sept lignes plus haut, dans le même ouvrage, il décrit ainsi la V. maculata L.: « V. nigra thorace albo, maculato, scutello quadrimaculato, abdomine postice albo. » La V. arenaria n'a donc pas les ornements blancs. Nous savons par Fabricius (l. c.) que la V. arenaria F. habite les lieux sablonneux, où elle construit des gâteaux plans, horizontaux, couchés; les cellules hexagonales, prismatiques, tournées vers le bas. Elle serait friande des fruits doux et du jus qu'on en exprime.

M. Th. W. Fyles nous écrit qu'elle place également son nid dans les cavités des boiseries sculptées des constructions.

Patrie. — Amérique du nord; Lyun, Massachusetts; New York Musée de Brème); Canada (coll. J. de Gaulle); Canada, Lévis près Québec (Rev. Th.-W. Fyles); Michigan; Colorado H.-W. Ashmead); Caroline (L'Herminier, Muséum de Paris; Philadelphie (Milbert, Muséum de Paris; États-Unis; New York (coll. Sichel 1867, Muséum de Paris); Essex, Keene Valley; Amherst, Massachusetts [H.-T. Fernald]; New-York H. Edwards, Musée de Londres; Hudson's bay (Musée de Londres).

### Var. Fernaldi Lewis.

Vespa Fernaldi H.-W. Lewis, Transactions of the American entomological Society, vol. XXIV, 1897, p. 173.

Vespa diabolica Sauss. var. Fernaldi Lewis, Th. Cockerell. Canadian Entomologist 1899, p. 255.

Ouvrière. — Semblable au type, dont elle ne diffère que par deux taches jaunes sur le segment médiaire; par la couleur jaune plus abondante sur le pronotum, les pattes et l'abdomen. — Long. 12 mill.

Je ne connais ni la femelle ni le mâle de cette jolie variété.

M. H.-T. Fernald a bien voulu-me donner une ouvrière déterminée par M. H.-W. Lewis.

Patrie. - Colorado H.-T. Fernald.).

### V. carolina Linné.

Vespa carolina Linné, Systema naturæ, Edit. 12°, I, pars 2. 4767, p. 948, n° 4  $\odot$ .

Vespa squamosa Drury, Illustrations of natural History, 4770, vol. I. Pl. XLIII, fig. 7, ♀.

Vespa cuncata Fabricius, Systema Piezatarum, 1804, p. 258, nº 21. O.
A. Lepeletier, Hist. nat. des Insectes, Hyménoptères, I, p. 514, \$\varphi\$.

Femelle. — Corps de taille médiocre, robuste: pubescence noirâtre, dressée, rare sur le dessus de la tête et du thorax, grise sur le reste du corps. Tête épaisse, aussi large que le thorax, jaune plus ou moins roux, avec la partie concave postérieure, une grande tache triangulaire reliant les yeux au bord postérieur et englobant les ocelles, une bande transversale à la base des antennes et l'articulation des mandibules noires: clypeus souvent avec un point noir sur le disque, le bord antérieur tronqué droit, les angles de la troncature à peu près droits. la ponctuation médiocre, espacée, devenant plus serrée et ruguleuse antérieurement, la pubescence longue, devenant roux-doré et plus abondante en avant; joues nulles; antennes noires avec le devant du scape jaune et la moitié apicale du fouet jaune roux en dessous. La tête et la moitié antérieure du thorax recouvertes, en plus de la pubescence, d'un fin duvet couché, roux-doré. Thorax large en avant. court, noir avec le bord supérieur du pronotum très largement coloré de jaune plus ou moins roux, deux lignes parallèles sur le mésonotum. une autre très petite au-dessus des écailles, une très grande tache sous les ailes antérieures descendant jusqu'aux hanches intermédiaires, une plus petite sous les ailes postérieures, deux grandes se touchant sur l'écusson; le postécusson presque en entier, deux grandes taches sur le segment médiaire et les écailles jaune plus ou moins roux: écailles tachées de roux sur le disque; ailes assez fortement enfumées. à teinte fumeuse, la troisième abscisse de la nervure cubitale de la 2º cellule cubitale beaucoup plus courte que la partie de la nervure cubitale aidant à former la 3° cellule cubitale; pattes jaunes, teintées de roux sur le dessus des cuisses, des tibias et les tarses, les hanches et les trochanters tachés de noir en dessus. Abdomen large, roux-jaunâtre : 4er tergite avec avec la troncature antérieure abrupte, tachée de noir à la base, la partie supérieure un peu renflée en bourrelet et ordinairement plus jaune; on distingue sur le milieu du 4er et du 2e tergite des traces d'une bande transversale, brune, se réunissant plus ou moins de chaque côté à un point brun-noirâtre transversal et oblique: parfois une petite ligne noire réunit la bande médiane transversale avec la partie noire de la base; les autres tergites ne montrent que les deux points latéraux qui peuvent disparaître même ou devenir roux; cette coloration est du reste des plus variables; le 6º tergite est entièrement roux-jaunâtre. Les segments sternites du ventre sont roux-jaunâtre avec des points latéraux comme les tergites : le 1º souvent noir sur le milieu de sa base avec une tache roux-ferrugineux sur le disque; tout le ventre est recouvert d'une fine pubescence couchée, épaisse, roux-doré. — Long. 19-23 mill. Pl. VI, fig. 9.

L'ornementation de la tête et du thorax est ordinairement plus distinctement jaune, tandis que l'abdomen est plutôt teinté de roux. Je n'ai jamais vu l'insecte vivant, qui est peut-être autrement coloré que lorsqu'il est desséché.

Ouvrière. — Diffère de la femelle par sa taille beaucoup plus petite, son ornementation jaune clair au lieu de jaune-roux et beaucoup moins abondante; par le dessus des cuisses et des hanches taché de noir; par la coloration de l'abdomen qui est la suivante : 1er tergite noir avec une bande transversale jaune au-dessus de la troncature antérieure, plus ou moins visiblement entaillée au milieu en avant et en arrière, le bord du segment régulièrement liséré de jaune; les autres tergites noirs avec une bordure jaune assez large, tri-échancrée antérieurement, le 2er tergite ayant en plus deux taches transversales, cunéiformes, se touchant presque au milieu; le 4er sternite jaune avec une tache noire, basilaire, médiane, lancéolée; les autres sternites noirs avec une large bordure jaune, sinuée au milieu antérieurement, avec un petit point noir transversal de chaque côté, relié le plus souvent à la partie noire; ces petits points noirs existent isolément dans le jaune du 1er sternite. — Long, 41-43 mill.

Parfois les taches du 2º tergite abdominal tendent à disparaître, alors l'insecte ressemble à la V. vidua Sauss. La V. carolina est une des espèces où les femelles et les ouvrières sont le plus différenciées comme taille et comme coloris.

Mâle. — Semblable à l'ouvrière ; le fouet des antennes roux en dessous ; le 6° tergite abdominal régulièrement marginé de jaune ; le 7° est arrondi, normal, régulièrement marginé de jaune ; le 6° sternite est allongé, arrondi, largement coloré de jaune dans sa partie apicale. L'appareil copulateur est testacé-roussàtre ; les branches du forceps allongées, subparallèles, fortement sillonnées au sommet : l'extrémite inférieure repliée en forme de gouttière dans laquelle vient se loger le lobe, lequel est linéaire, garni de nombreuses soies du côté interne

et lui-même fortement rebordé à sa base, sur la partie qui touche la tige des crochets: tout le bord inférieur des branches du forceps est garni de longs poils: tenettes courtes; crochets formant une tige plate, s'élargissant insensiblement jusqu'à l'extrémité qui est arrondie et légèrement sinuée au sommet; cette sorte de palette est flexueuse. — Long. 44-46 mill. Pl. VI, fig. 2 et 3.

Le type de Fabricius est un mâle. Il fait partie de la collection Bosc, qui est conservée au Muséum d'Histoire naturelle de Paris.

D'après les caractères plastiques, j'avais réuni en une seule espèce les V. carolina L. et cuneata Fabricius. Mais, c'est à M. W.-H. Ashmead, de Washington, que l'on doit la découverte de la V. carolina dans le nid de la V. cuneata. L'éminent entomologiste américain a pris les trois sexes dans le même nid. Il ne reste donc plus aucun doute à ce sujet. La V. carolina L. est la femelle de la V. cuneata F.

La remarque de Lepeletier (Hist. nat. des Insectes : Hyménoptères, I, p. 514 doit être considérée comme non avenue. Le nom de cuneata a été donné par Fabricius à cause des deux taches cunéiformes jaunes du 2º tergite abdominal. On retrouve chez la femelle les traces plus ou moins accentuées de ces deux taches.

L'annotation de M. H. de Saussure Études sur les Vespides, 2, p. 402 me semblerait plutôt fallacieuse, car il n'existe pas de Vespa carolina dans D. Drury Illustrations of natural History. Il est difficile de comprendre la note écrite par Linné: la figure 4 de la table 44 de Drury représente la Vespa jamaicensis, qui n'est certainement pas une Vespa, mais probablement un Sphex. Linné et M. H. de Saussure ont voulu sans doute parler de la Vespa squamosa, figurée par Drury à la table 43, figure 7.

Patrie. — Amérique (Musée de Brème; 1832 Muséum de Paris). Caroline collection Bosc, type 1828; Lherminier, Muséum de Paris); Caroline du sud (Zimmermann 1837, Muséum de Paris); New York (coll. J. de Gaulle); Savannah (Harper 1843, Muséum de Paris); Washington D. C., Jakoma D. C., H. W. Ashmead; Arkansas et Baltimore (coll. Sichel 1867, Muséum de Paris; Maryland, J. de Joannis 1903, Muséum de Paris; Texas, Musée de Budapest; H. W. Ashmead; Clifton, Musée de Gènes; Birkmann, Musée de Vienne; Mexique Sallé 1852, Muséum de Paris, Tahubaya (1871, Belimek, Musée de Vienne); Mexique (Musée de Madrid); Mexique coll. A. Duchaussoy).

Les taches cunéiformes transversales du 2º tergite abdominal se retrouvent isolées chez les *V. sulphurea* Sauss., *Schrencki* Rad., *rufa* L. et les variétés *sibirica* André et *austriaca* Panz., de cette dernière.

# V. sulphurea H. de Saussure.

Vespa sulphuvea II. de Saussure, Étude sur la famille des Vespides, 2, 4853-58, u° 47, p. 437.

Femelle. - Semblable à la V. carolina L. dont elle diffère par l'ornementation du corps qui est jaune clair au lieu d'être jaune-roux, la tête plus petite, à peine aussi large que le thorax; le clypeus ayant les angles antérieurs plus longs, la ponctuation fine, très espacée; par le fouet des antennes entièrement noir; le thorax plus étroit, plus long; par les ailes avant une teinte plus ambrée, la 3º abscisse de la nervure cubitale de la 2º cellule cubitale égale à la partie de la nervure cubitale aidant à former la 3º cellule cubitale; les cuisses, les trochanters et les hanches tachés de noir; l'abdomen plus étroit et autrement coloré comme il suit : 1er tergite plus étroit en avant, sans le léger bourrelet du dessus de la troncature antérieure, jaune avec la base de la troncature antérieure noire, ainsi qu'une bande transversale n'atteignant pas les côtés, élargie au milieu du disque et à chaque extrémité; le 2º tergite jaune avec la base étroitement colorée de noir. avec une tache transversale sublancéolée touchant à la partie noire de la base et un point isolé, noir, de chaque côté; les autres tergites jaunes, chacun avec un point noir de chaque côté; le 6º jaune avec une ligne noire, médiane, sur toute sa longueur; les sternites entièrement jaunes avec un étroit liséré noir à la base du 4er et du 2e. -Long. 48-20 mill. Pl. VI, fig. 8.

Ouvrière. — L'ouvrière est semblable à la femelle, mais de taille un pen plus petite, avec les taches cunéiformes du deuxième tergite abdominal plus distinctes. — Long. 11 mill.

Le male est encore inconnu, ainsi que le mode de nidification.

La longueur de la troisième abscisse de la nervure cubitale dans la 2º cellule cubitale semble un caractère constant pour distinguer la Vespa sulphurea Sauss., de la V. carolina L. tandis que chez d'autres espèces cette longueur est très variable et ne peut être utilisée.

Patrie. — Californie Musée de Londres, type ; Côtes de Californie, Los Angeles juillet, ley. Coquillet, W.-H. Ashmead. Elle a été signalée également par M. H.-W. Lewis comme habitant le Texas et la Nevada. Californie. Mariposa ; A. Fauvel, Musée de Leyde.

# V. orbata R. du Buysson.

Vespa orbata R. du Buysson, Bulletin de la Soc. entom. de France, 1902, p. 140.

Ouvrière. — Corps de taille médiocre, couvert de longs poils noirs, dressés, devenant jaunâtres sur les côtés et le dessous de l'abdomen: noir foncé avec les mandibules, la face, les côtés de la tête, les tarses. un fin liséré sur les segments tergites 1 et 2 de l'abdomen et tous les segments tergites suivants, jaunes ou jaune-roux. Tête petite ; les ocelles très rapprochés du bord postérieur du vertex; clypeus très large, le bord antérieur subtronqué, les angles antérieurs petits, obtus, la ponctuation médiocre, espacée sur toute sa surface; antennes longues, roussatres en dessous, brunes en dessus, le scape brun-noir, joues nulles, les yeux touchant la base des mandibules; pronotum noir, sans carène transversale: écusson avec un fin liséré roux au bord postérieur; écailles en partie rousses; ailes assez enfumées. Abdomen très peu velouté, la troncature antérieure du 1er tergite très abrupte. formant un angle subaigu avec la partie horizontale du segment. Ventre jaune, sauf la base des segments 1 et 2 qui est noire. — Long. 48-20 mill

Varie assez de couleur. Le jaune envahit toute la tête excepté la région des ocelles qui reste noire. Le pronotum peut être entièrement aune et le mésonotum avoir deux bandes jaunes parallèles. Les tibias sont parfois jaunes tachés de noir en dessus; quelquefois les segments tergites de l'abdomen qui sont jaunes portent de chaque côté une petite tache noire incluse dans la partie jaune. J'ai vu des individus ayant le bord postérieur du pronotum, une tache sous les ailes jaunes, le clypeus taché de noir sur le disque, le 2° tergite abdominal avec une large bordure jaune irrégulière et échancrée antérieurement. J'ai vu de petits exemplaires ayant le dessus de la tête, du mésonotum, le pronotum, l'écusson et le postécusson, roux; une marge jaune clair sur le bord postérieur du pronotum, ainsi que sur le bord antérieur de l'écusson et du postécusson; les deux premiers tergites abdominaux nettement marginés de jaunâtre.

L'absence de carène transversale au pronotum fait reconnaître de suite la *V. orbata* Buyss., des *V. auraria* Sm., et *velutina* Lep., avec lesquelles il serait facile de la confondre.

Le mâle et la femelle me sont inconnus, de même que la nidification.

Patrie — Chine, Shen-si (A. David, 1875, Muséum de Pavis), Se-

Patrie. — Chine, Shen-si (A. David, 1875, Muséum de Paris), Setchuen (A. David, 1875, Muséum de Paris); Dardjiling (J. Harmand,

1890, Muséum de Paris; Sikkim, de Padam-tsin à Lingtou (R. Oberthür, 1901, Muséum de Paris); Tamaon (coll. Walker, Musée de Londres); Sibérie orientale, Amur Musée de Leyde); Tenasserim, Mont Mooleyit, 1400m à 1900m (L. Fea, mars 1887, coll. P. Magretti).

#### Var aurulenta var. nov.

Ouvrière. — Diffère du type par la pubescence qui est roussatre sur tout le corps, le duvet soyeux à reflets dorés qui recouvre tout le dessus du corps, principalement tout l'abdomen, qui, sous un certain jour, semble entièrement jaune. Les bordures jaunes des segments abdominaux sont plus larges; les taches de l'écusson et du postécusson peuvent devenir confluentes; le segment médiaire porte également de grandes taches jaunes, de même que les mésopleures, le disque du mésonotum et le pronotum tout entier; le vertex et les pattes se montrent aussi entièrement jaunes. — Long. 18-20 mill.

Je n'ai vu que des ouvrières de cette couleur.

Patrie. — Chine, Mou-pin (A. David, 1870, Muséum de Paris ; Amur 1878, Musée de Vienne).

### V. lama R. du Buysson.

Vespa lama R. du Buysson, Bulletin de la Société entom. de France. 4903, p. 475.

Femelle. - Corps de taille petite, assez robuste; pubescence longue. noire, très clair-semée, hérissée, tout le dessus de la tête et du thorax recouvert en outre d'un fin duvet couché à reflets fauves. Tête très petite, beaucoup moins large que le thorax, jaune légèrement teintée de roux, avec le dessus noir; l'échancrure des yeux jaune, séparée de l'espace interantennaire par une ligne noire; joues très longues, aussi longues que le scape; clypeus très allongé, jaune avec un point noirâtre discoïdal, le milieu imponctué, la partie antérieure avec quelques points médiocres, épars, le bord antérieur tronqué, droit, sans sinus. Antennes jaune-roux en dessous, noires en dessus. Thorax fortement rétréci en avant; pronotum avec une forte carène transversale et le bord supérieur jaunes; prosternum jaune en partie; une tache sous les ailes, deux sur l'écusson, sur le postécusson, et sur les métapleures, jaunes; écailles et pattes jaune-roux, les hanches et les trochanters intermédiaires et postérieurs et toutes les cuisses tachés de roux. Ailes hyalines, à teinte ambrée assez prononcée. Abdomen large, entièrement jaune-roux, avec la partie antérieure du 1er tergite et la base du 2º noires, entièrement recouvert d'un duvet couché, doré sur les parties jaunes et noir sur les parties noires; 4º tergite très large et très court, la troncature antérieure concave, noire, cette couleur débordant en dessus et formant un petit angle médian dans le jaune; la base noire du 2º tergite formant un large sinus dans le jaune où l'on distingue de vagues traces de points noirs isolés. Le ventre est plus jaunatre, les trois premiers segments noirs à la base, chacun avec un point noir de chaque côté. — Long. 46 mill.

Ouvrière. — Semblable à la femelle, mais de taille plus petite, la tête proportionnellement moins petite, le fouet des antennes presque entierement noir. — Long. 42 mill.

L'exemplaire ouvrière décrit porte un Xenos dont le céphalothorax se montre à droite sous le  $S^c$  tergite de l'abdomen.

Måle. - Le måle m'est inconnu.

Je ne sais rien sur la nidification.

Patrie. — Sikkim, de Padam-tsin à Ling-tou [juillet 1901, \( \xi\), R. Oberthür 1901, Muséum de Paris'; Sikkim (12.500 pieds anglais, Molter, coll. C.-T. Bingham. Musée de Londres); Sikkim (coll. Martinez Escalera).

### V. structor Smith.

Vespa structor Smith, Trans. Zool. Society of London, VII, 3, 4870, p. 494, t. XXI, fig. 42.

Ouvrière. — Corps de petite taille, étroit, couvert d'une longue et fine pubescence, dressée, noire sur la tête et le thorax, fauve sur l'abdomen. Tête normale, de la largeur du thorax, jaune avec le vertex noir; sur les parties jaunes il existe un fin duvet doré, en plus des poils noirs; espace interantennaire non triangulaire, brièvement conique: clypeus large, le bord antérieur marginé de roux, légèrement sinué, les angles antérieurs arrondis, le disque couvert de points très fins, serrés, entremèlés de plus gros espacés, le bord antérieur imponctué; joues nulles; antennes épaisses, noires, scape jaune-roux noir en dessus, hérissé de longs poils fauves. Thorax étroit, très rétréci en avant, à ponctuation très fine et serrée; pronotum sans carène transversale antérieure, le bord supérieur marginé de jaune, les callus latéraux tachés de jaunatre; le reste du thorax noir foncé; parfois l'écusson avec deux petites lignes jaunes en avant. Écailles jaunâtre-testacé, scarieuses: ailes hyalines, un peu ferrugineuses; pattes jaune-roux avec les hanches, les trochanters et la base des cuisses noirs. Abdomen

allongé, réfréci en avant, jaune-roux fauve, couvert d'un fin duvet couché à reflets dorés : 1<sup>ce</sup> segment tergite très étroit, très court, la troncature antérieure très abrupte, noire ; 2<sup>ce</sup> segment tergite s'élargissant sensiblement en arrière ; les segments 2 à 5 avec la base étroitement colorée en noir velouté s'avançant en une petite pointe médiane ; le 6<sup>ce</sup> tergite entièrement noir velouté ou légèrement marginé de jauneroux sur les côtés. Ventre jaune-roux, garni de gros points épars, tous les segments largement tachés de noir à la base, avec une petite tache noire isolée de chaque côté ; le 5<sup>ce</sup> sternite entièrement jaune-roux. — Long, 12-13 mill.

Parfois on distingue sur les segments tergites de l'abdomen des traces de taches latérales isolées.

La femelle et le mâle me sont inconnus, ainsi que la manière de nidifier.

Patrie. -- Dardjiling J. Harmand 1890, Muséum de Paris); Sikkim, de Padam-tsin à Ling-tou R. Oberthür, 1901, Muséum de Paris; Sikkim (coll. Martinez Escalera).

# V. japonica H. de Saussure.

Vespa japonica H. de Saussure, Rev. et Mag. zool. X, 1858, p. 261 (nec Smith, nec Radoszkowsky).

Femelle. - Corps de petite taille robuste; pubescence fine, dressée, noirâtre, devenant blanche à la base des mandibules et sur le dessous du corps et des pattes. Tête petite, normale, beaucoup moins large que le thorax, noire avec une tache transversale sur l'espace interantennaire, les orbites internes jusqu'au sommet de l'échancrure, les côtés de la tête derrière les yeux jusqu'aux mandibules, blanc d'ivoire; joues nulles; clypeus blanc d'ivoire avec une tache noire longitudinale sur le disque, le bord antérieur tronqué, légèrement sinué, les angles antérieurs presque droits, la ponctuation médiocre, peu serrée, les intervalles très finement pointillés, chagrinés; mandibules blanc d'ivoire avec le bord interne noir-brun; antennes entièrement noires. Thorax noir avec le bord supérieur du pronotum, une tache sous les ailes, une bande transversale et rétrécie au milieu sur le bord antérieur de l'écusson et du postécusson, et parfois aussi une petite tache de chaque côté du segment médiaire, blanc d'ivoire; ponctuation excessivement fine et serrée, avec des points plus gros très épars. Pronotum sans carène transversale à son bord antérieur. Écailles blanc d'ivoire avec une large tache roux-testacé; ailes hyalines, les nervures rousses, les cellules brachiales, costales et le bord antérieur des radiales teintées de roux. Pattes noires avec une tache sur les hanches intermédiaires et postérieures, le sommet des cuisses, tout le dessus des tibias et des deux premiers articles des tarses blanc d'ivoire, le reste des tarses roux. Abdomen large, noir, avec tous les segments tergites étroitement et régulièrement marginés de blanc d'ivoire, l'extrème bord des segments 2 à 6 roussàtre; le 1<sup>cr</sup> court, à troncature antérieure très abrupte. Les segments sternites ventraux sont noirs, marginés de blanc d'ivoire, le noir s'avançant dans la marge blanche, en pointe au milieu, et en échancrure subarrondie de chaque côté l'extrème bord de chaque segment est roussàtre, le 5<sup>c</sup> sternite est entièrement noir.

— Long. 16-48 mill.

Ouvrière. — Semblable à la femelle, mais de taille plus petite. On rencontre des individus ayant une très petite échancrure en pointe dans le milieu du bord antérieur de la marge blanche du 4er tergite abdominal; d'autres fois ce sont les bordures blanches des segments ventraux qui disparaissent. C'est principalement chez les ouvrières que les taches blanches du segment médiaire sont le plus visibles. Les derniers articles des antennes peuvent être légèrement roussatres. C'est par exception que les ornements blancs prennent une teinte jaune.

Mâle. — Semblable à l'ouvrière, mais le corps plus étroit: le bord antérieur du clypeus plus transversal, les angles antérieurs droits: antennes très longues, le scape blanchâtre en avant; pubescence beaucoup plus longue et abondante. Le 7° tergite abdominal fortement déprimé, prolongé en lame arrondie, brièvement émarginée au sommet et fortement échancré latéralement à la naissance du prolongement; en distingue deux taches blanches sur le disque de ce segment. Les six premiers sternites ventraux sont lisérés de blanchâtre, le 5° et le 6° ont le liséré interrompu au milieu, le 7° est noir, tronqué largement au sommet. L'appareil copulateur est semblable à celui de la V. rulyaris L. dont il diffère par la spatule formée par les crochets, un peu plus grande, beaucoup plus large transversalement. — Long. 14 mill.

Je ne sais rien sur la nidification ni sur les habitudes de cette Guèpe, qui cependant est commune au Japon. M. H. de Saussure a eu l'amabilité de me communiquer un des types de sa collection

Patrie: Japon (coll. H. de Saussure, type!: — coll. Sichel 1867, Muséum de Paris); environs de Tokio (leg. J. Harmand, 1900, Muséum de Paris; Myadzu (leg. R. P. Relaves 1902, Muséum de Paris; Kobe. Yokohama (Musée de Brême); Tshushima (sept. oet. leg. H. Fruhstorfer, Musée de Vienne; Weltreise Evzh. Franz Ferd. 1893, Musée de Vienne); Kioto Roretz 1875, Musée de Vienne); Yokohama (Musée de

Budapest); Yamada août 1880 D. A. Isola, Musée de Gênes); Mandchourie, région du lac Hanka Bohnhof, 1900, Muséum de Paris); île Tsur (Holst, Musée de Londres).

## V. Schrencki Radoszkowsky.

Vespa Schrencki Radoszkowsky, Horae Soc. ent. Rossicae I, 4861, p. 84, Pt. II, fig. 4 et 5.

Femelle. — Corps robuste, de petite taille, hérissé de longs poils fins, noirs. Tête normale, un peu moins large que le thorax, noir foncé avec le disque des mandibules, le bord inférieur du sinus des yeux. une tache près des joues et une autre derrière les veux, jaune clair: clypeus large, jaune clair avec une tache médiane. l'extrème bord antérieur et les côtés de la base noirs, le bord antérieur sinué, les angles formés par le sinus assez forts, obtus, la ponctuation grosse, très clairsemée; l'extrémité des mandibules rousse; joues nulles; l'espace interantennaire taché de jaune-clair transversalement; le front très densément ponctué-coriacé; antennes entièrement noires, le dernier article roux à l'extrémité, le scape court. Thorax large, noir brillant, le bord postérieur du pronotum, une petite tache sous les ailes, deux taches sur l'écusson jaune clair : pronotum sans carène transversale ; ponctuation du dorsulum assez grosse, irrégulière, clair-semée; écailles jaune clair, tachées de testacé-roussatre; ailes hyalines, un peu ferrugineuses, la nervulation et le stigma roux; pattes jaune-clair passant au roux, avec la base des cuisses, les trochanters et les hanches noirs. Abdomen large, parallèle, à pubescence noire, tous les segments largement bordés de jaune clair : 1ee tergite court, la troncature antérieure très abrupte, presque concave, noir ou noir-roussatre, le dessus du disque noir plus ou moins roux sur les côtés, le bord supérieur de la troncature garni d'une ligne blanc-jaunàtre ou jaune-roux, étroite, interrompue au milieu; la bordure apicale toujours régulière et plus étroite que celle des autres segments; 2º tergite long, ordinairement avec deux taches rousses à peu près libres, parfois jaunâtres dans leur milieu, la bordure jaune échancrée ou sinuée après les taches latérales; les autres tergites ayant de chaque côté une échancrure noire dans la bordure jaune, et en avant de l'échancrure on voit souvent un petit point jaune, ou bien l'échancrure noire se formant antérieurement il se forme de chaque côté un point noir isolé dans la partie jaune ; le 6° tergite est noir marginé de jaune clair. l'extrémité teintée de roux. Les segments ventraux sont colorés comme les tergites, le 4er est plus

ou moins roux, le  $5^{\circ}$  est entièrement jaune légèrement teinté de roux. — Long, 45-46 mill.

La couleur jaune clair devient sur certains individus blanc-jaunâtre.

Ouvrière. — Semblable à la femelle mais de taille plus petite. Les taches rousses du 2º tergite abdominal manquent et les marges jaunes des segments suivants sont plus étroites et plus régulières. On trouve des exemplaires ayant deux taches jaunes sur le postécusson et sans traces de teinte rousse sur l'abdomen.

La V. Schrencki Rad., n'est probablement qu'une forme représentative de la V. rufu L. La femelle se distingue de cette dernière espèce seulement par la marge jaune clair ou blanc-jaunâtre des I<sup>cr</sup> et 2<sup>c</sup> segments tergites de l'abdomen qui est toujours très nettement limitée. Chez l'ouvrière la couleur rousse disparaît complètement sur l'abdomen, de sorte que le 2<sup>c</sup> tergite est entièrement noir avec une bordure jaune de moyenne largeur. L'examen du mâle, inconnu jusqu'à présent, permettra, par la conformation de l'appareil copulateur, de reconnaître la validité de l'espèce.

Patrie. — Sibérie orientale, territoire de l'Amur'coll. Radoszkowsky, types!): Chine, Jéhol, nord de Pékin (A. David 1863, Muséum de Paris); montagne au nord de Pékin (A. David 1865, Muséum de Paris: Amur (Musée de Leyde); Sibérie orientale. Gorbitza (Musée de Budapest).

#### V. consobrina II. de Saussure.

Vespa consobrina II. de Saussure, Étude sur la fam. des Vespides, 2, p. 444, nº 24 %.

Vespa scelesta J. Mac-Farland, Transactions of the american entomological Society, Vol. XV, 4888, p. 298, 2.

Femelle. — Corps de taille moyenne, robuste, d'un beau noir avec les mandibules, le clypeus, une tache entre les antennes, les orbites internes jusqu'au fond du sinus, deux taches derrière les yeux en haut et deux autres en bas près des mandibules, une large marge le long du bord postérieur des lobes du pronotum, une tache sous les aîles, deux sur l'écusson, le dessus des tibias et des tarses et différentes ornementations sur l'abdomen, blanc d'ivoire; pubescence noire, hérissée, très irrégulière, peu abondante. Tête normale, presque aussi large que le thorax; joues nulles; clypeus avec une tache discoïdale et un liséré sur tout le tour noirs, le bord antérieur sinué, les angles formés par ce sinus apical assez forts, obtus; antennes noires; palpes

roux; pronotum sans carène transversale; écailles noires à la base, la moitié externe blanc d'ivoire tachée de roux au milieu; ailes assez enfumées à teinte ambrée : pattes noires avec les genoux, le dessus des tibias et des tarses plus ou moins blanc d'ivoire, le dessous des tibias roux, tachés de noir, le dessons des tarses roux-testacé, le feutrage roux clair. Abdomen assez large: 4ct tergite court, entièrement noir. la troncature antérieure très abrupte, presque concave. l'extrême bord apical roussâtre; 2º tergite noir avec un liséré blanc interrompu au milieu et dilaté sur les côtés. l'extrème bord du milieu roussatre dans la partie où le liséré est interrompu: 3º tergite largement margine de blanc avec trois échancrures noires irrégulières dans la marge blanche; le 4° et le 5° largement marginés de blanc avec un point noir de chaque côté plus ou moins isolé dans la partie blanche; le 6° noir avec une tache blanche de chaque côté. Ventre noir avec les quatre premiers sternites tachés de blanc d'ivoire de chaque côté, chaque tache échancrée antérieurement. - Long, 15-17 mill.

Ouvrière. — Semblable à la femelle, mais de taille plus petite. La tache blanche, près des mandibules, ordinairement absente; le 1<sup>er</sup> tergite abdominal régulièrement liséré de blanc ou avec le liséré plus ou moins interrompu au milieu et sur les côtés; la marge du 2<sup>e</sup> tergite est plus large, non interrompue au milieu, trisinuée antérieurement; les quatre premiers sternites abdominaux sont largement marginés de blanc, les marges trisinuées antérieurement, parfois avec une échancrure médiane plus forte sur le 2<sup>e</sup>, le 3<sup>e</sup> et le 4<sup>e</sup>. — Long. 12-44 mill.

Mâle. — Semblable à la femelle, mais plus velu, plus étroit, l'abdomen plus cylindrique; le bord antérieur du clypeus tronqué droit, sans angles saillants; le devant du scape blanc d'ivoire: 1et tergite abdominal liséré de blanc sur son bord apical, avec deux petites lignes transversales, blanchâtres, au-dessus de la troncature antérieure; 2º tergite marginé de blanc sur tout le bord on bien avec une interruption plus ou moins forte au milieu, les autres segments avec une marge blanche plus ou moins nettement trisinuée antérieurement; le 7º tergite arrondi, allongé, entier; les sternites marginés de blanc, les marges ordinairement trisinuées ou triéchancrées antérieurement: l'échancrure médiane pouvant même atteindre le bord postérieur sur quelques segments; le 6° sternite noir-brun, ovale, le sommet subtronqué garni de poils roussâtres. L'appareil copulateur volumineux, noir brun: les branches du forceps tronquées, sinuées au sommet, l'extrémité s'allongeant en pointe courte et obtuse, le lobe large, se terminant par une dilatation arrondie du côté externe, presque droite du côté interne,

l'extrémité linement aigué, acuminée; les tenettes portent un acumen linéaire, très étroit, atteignant presque l'extrémité des branches du forceps; crochets soudés jusqu'à l'extrémité où ils forment une large spatule subovale, très légèrement sinuée à l'apex. la tige de cette spatule marginée sur les bords jusqu'au point le plus large des côtés de la spatule qui sont eux-mêmes réfléchis en dessous. — Long. 44-16 mill. Pl. VI. fig. 7, et Pl. VII, fig. 8.

D'après l'excellente description de M. J. Mac Farland, il est permis de reconnaître que la V. scelesta Mac Farland est la même espèce que la V. consobrina Sauss. La V. scelesta est basée sur l'absence de liséré blanc sur le 4<sup>cr</sup> tergite abdominal; mais on trouve facilement les passages à cette coloration noire. Ce sont généralement les femelles qui ont le 4<sup>cr</sup> tergite entièrement noir; parfois elles ont le bord apical de ce segment teinté de roussaire on avec des traces d'un liséré blanc interrompu au milieu. Le mâle et l'ouvrière ont le plus souvent une marge étroite blanchâtre sur le bord du 4<sup>cr</sup> segment.

La V. consobrina a des affinités considérables avec la V. rufa L. Les mâles sont très difficiles à distinguer de ceux de la V. rufa L. var. sibirica André et var. americana Buyss. Ils se distinguent de ceux-ci par le corps plus robuste, la taille un peu plus forte, le devant du scape blanc, le 4<sup>cr</sup> segment abdominal moins étroit; mais je n'ai pas pu découvrir de différence dans l'appareil copulateur.

L'ouvrière diffère de celle de la var. sibirica André par le thorax plus large; par l'andomen ovale, non subcylindrique, c'est-à-dire que le 2º tergite s'élargit sensiblement, les bordures blanches des 2-5 tergites plus larges, trisinuées antérieurement, celles des segments ventraux plus larges également; enfin par les tibias et les tarses à teinte rousse.

M. Th. W. Fyles a signalé un nid de cette Guèpe trouvé par lui dans les bois près de Lévis (Québec, Canada); il était proche de terre et supporté par quelques petites brindilles de balais. M. Fyles m'a écrit que cette guèpe construisait aussi sur les pierres.

M. P.-II. Gosse décrit ainsi ce dernier mode de construction (Canadian Naturalist, p. 269) : « Ces larges nids arrondis sont généralement attachés à une pierre, que souvent ils recouvrent, et il n'est pas aisé de les distinguer. Ils sont faits d'un papier souple et blanc. Ces nids consistent en plusieurs couches convexes en dessus et protégeant les rayons contre la pluie. »

D'après M. Fyles, on sait que cette guèpe est appelée « Guèpe cousine « dans le Canada français.

Patrie. — Amérique du Nord (Vernon, Musée de Londres); Colorado

Morrison I 1879 Q Z, Musée de Vienne; Terre-Neuve (La Pylaie, type; Révélière, coll. Sichel 1867, Muséum de Paris; Canada, Lévis près Québec (Th. Fyles 1903; Texas (coll. Belfrage, H.-W. Ashmead); British Columbia H.-W. Ashmead.

#### V. rufa Linne.

Vespa rufa Linné, Systema naturae, Ed. 10°, I, 1758, p. 572, n° 3; et Edit. 12°, I, 2, 1767, p. 948, n° 3.

Femelle. — Corps de petite taille, robuste; pubescence noire, fine, dressée, assez abondante. Tête normale, moins large que le thorax, noire, avec une tache derrière le haut de chaque œil, les orbites inférieurs internes, une tache transversale entre les antennes, les mandibules et le clypeus, jaunes; le clypeus toujours avec une tache sur le disque et l'extrème bord antérieur noirs, la partie antérieure sinuée assez profondément, les angles formés par ce sinus courts, subarrondis, la ponctuation du clypeus grosse, espacée, les intervalles finement ruguleux ; joues nulles ; antennes entièrement noires , l'extrémité du scape ordinairement rousse ou jaunâtre. Thorax noir avec le bord supérieur du pronotum, deux taches sur l'écusson, deux sur le postécusson. une sous les ailes, jaunes; écailles jaunes, tachées de roux-testacé; ailes hyalines, à teinte rousse principalement à la base, nervulation rousse. Pattes jaune-roussâtre, avec la base des cuisses, les trochanters et les hanches noirs. Abdomen large, noir, tous les segments très largement marginés de jaune : 1er segment tergite très court, la troncature antérieure concave, très abrupte, noire ou noir-roux, le haut avec deux taches jaunes transversales visibles en dessus, le reste du segment, entre la troncature et la marge jaune apicale, tantôt plus ou moins roussatre, tantôt noir ou bien jaune-roux avec trois points noirs disposés, un au milieu et un de chaque côté; 2º tergite ordinairement muni de deux larges taches jaunâtres ou plus ou moins rousses, libres ou encore touchant la marge apicale, le plus souvent on distingue un point noir de chaque côté: les autres tergites sont colorés comme le 2º ou bien sans couleur rousse, avec un point noir de chaque côté, le noir faisant ordinairement une incision plus ou moins profonde au milieu: le 6º tergite est jaune avec une incision noire plus ou moins large. Les segments ventraux sont jaunes ou jaune-roux avec la base noire ou seulement tachés latéralement de jaune avec un point noir de chaque côté isolé dans le jaune; le 1ee sternite est le plus souvent teinté de roux; le 5° est entièrement jaune; la ponctuation du ventre variolée. grosse, irregulière, subconfluente transversalement. — Long. 17-19 mill.

Ouvrière. — Semblable à la femelle, mais de taille beaucoup plus petite : les pattes sont plus jaunes, la couleur rousse est ordinairement très développée sur le 4<sup>cr</sup> et le 2<sup>c</sup> tergite de l'abdomen. La coloration de l'abdomen est du reste, comme chez la femelle, des plus variables. Par exception, le jaune envahit presque tout l'abdomen à l'exclusion du noir et du roux dont il ne reste que de petits points. — Long. 40-44 mill.

Mâle. — Coloration de l'ouvrière; mais le corps étroit, allongé, parallèle; le devant du scape ordinairement jaune; le bord antérieur du clypeus tronqué, les angles antérieurs droits et la ponctuation grosse. espacée; le 7º tergite abdominal jaune avec la base noire, arrondi postérieurement, le bord garni d'un fin duvet très serré, roussatre; le 3º sternite ventral largement sinué, le 6º semi-elliptique jaune ou jauneroux avec la base noire. Par exception, comme chez l'ouvrière, l'abdomen peut être presque entièrement jaune, seulement avec des traces de roux ou de noir. L'abdomen est aussi variable de couleur que chez la Q et l'4. Les branches du forceps sont noires, leur extrémité est brièvement lancéolée, obtuse, les lobes se prolongent au delà de l'extrémité inférieure des branches, se dilatent latéralement du côté externe et se terminent par un acumen très aigu, plus ou moins long; les tenettes sont linéaires, variables de longueur, leur dilatation basilaire triangulaire; les crochets sont soudés jusqu'au sommet où ils se dilatent en spatule légèrement sinuée à l'apex, réfléchie en dessous subparall'élement sur les côtés; les bords de la tige avant la dilatation apicale sont marginés-révolutés. - Long. 11-16 mill. Pl. VIII, fig. 40.

La V. rufa L. établit son nid dans le sol, à une faible profondeur; aussi quand arrive le maximum de sa grandeur, il est souvent en partie à découvert. Les gâteaux peu nombreux, 5 à 6, mesurent environ de 45 à 25 centimètres de diamètre; les piliers qui les relient entre eux sont très irréguliers, plus ou moins plats. Les alvéoles des femelles sont peu différenciés de ceux où sont élevées les ouvrières. Les larves des femelles se filent un dôme très élevé au-dessus du carton des alvéoles. Le carton est souple, gris, zoné de blanc, d'une texture particulière, ordinairement très làche, les fibres végétales étant très longues et laissant des jours. Les enveloppes sont nombreuses, une dizaine et plus, simples, reliées les unes aux autres par des points d'attaches et des feuillets supplémentaires. L'ai toujours rencontré ces guèpiers dans les tertres, les berges des rivières, le revers des fossés, etc..., constamment rapprochés des bois ou des lieux ombragés plus ou moins humides. Les ouvrières ne sont point frileuses : elles chassent même par la pluie les Diptères qu'elles prennent alors facilement sur les herbes et les feuillages. Elles affectionnent particulièrement les fleurs des Scrophulaires sur lesquelles elles butinent en compagnie des V. sitvestris Scop., germanica F. et vulgaris L. qui parlagent en ce point ses goûts. La V. rufa L. est d'humeur beaucoup plus douce que ses congénères. Il m'est arrivé de recueillir presque toute une nichée, sans qu'une ouvrière se jette sur moi pour me piquer. La population est toujours peu nombreuse: les mâles et les femelles se montrent tar-divement en août-septembre.

La V. rufu L. n'est point à redouter pour les fruits. Dans les collections du Muséum de Paris, il existe un nid offert, en 1897, par M. Ch. Janet. Il provient de Gueldre, Pritten, où il fut récolté par M. J. Th. Oudemans. Il était sous la mousse, dans un bois de pins. Il est remarquable par ses petites dimensions : 10.05 centimètres de large sur 4.05 centimètres d'épaisseur. Il n'y a que deux gâteaux, fort réduits : malgré cela, sa population était au complet, la reine, un petit nombre d'ouvrières, des mâles et quelques jeunes femelles.

Il existe dans les collections du Musée de Londres une ouvrière provenant du nord de l'Inde. Sa coloration est la même que chez la var. intermedia Buyss., mais avec les parties blanchâtres colorées en jaune.

Patrie. — Environs de Paris : Asnières, le Vésinet (coll. Sichel 1867, Musèum de Paris , Garches, Mesnil-le-Roi (coll. J. de Gaulle), Charenton R. du Buysson 1899, Musèum de Paris ; Eure : Vernon; Orléans; Meuse (coll. Sichel 1867, Musèum de Paris); Calvados : Ammeville (leg. A. Loiselle, coll. II. Gadeau de Kerville ; Ardennes Pigeot 1901, Musèum de Paris ; Allier : Broùt-Vernet (coll. R. du Buysson 1900, Musèum de Paris , Vichy; Montauban; Alpes coll. Sichel 1867, Musèum de Paris ; Maine-et-Loire : St-Rémy-la-Varenne R. du Buysson 1903, Musèum de Paris ; Il<sup>165</sup>-Pyrénées : St-Sauveur (coll. J. de Gaulle : Genève (Pictet 1833, Musèum de Paris ; Valais, St-Cergues M. Maindron 1899, Musèum de Paris ; Croatie (coll. Sichel 1867, Musèum de Paris : Suisse, vallée d'Engadine, Rosegthal près de Pontrésina (28 VII 1902, coll. A. Schulz ; Gueldre, Pritten Janel 1897, Musèum de Paris ; nord de l'Inde (Musèe de Londres); Grand St-Bernard (22 VII 1886, coll. Magretti : Lombardie, Canonica d'Adda: Zurich, jardin botanique coll. Magretti

#### Var. austriaca Panzer.

Vespa austriaca Panzer, Faun. Insect. Germ. VI, 1799, p. 63, t. 2. Vespa arborea Ross, Zoologist. III, 1845, p. 1156.

Vespa rufa L. var. austriaca Panz., Schenck, Progr. Gymnas. Weilburg 1853, p. 16.

Femelle. — Semblable au type dont il diffère uniquement par les caractères suivants : clypeus à ponctuation moins forte, le bord antérieur profondément sinué avec les angles antérieurs spinoïdes ; abdomen dépourvu de couleur rousse. Le devant du scape est ordinairement marqué de jaune. — Long. 47-49 mill.

L'ai vu un exemplaire dont le 2° tergite abdominal était complètement privé de taches jaunes sur la partie noire basilaire.

Mâle. — Semblable au mâle du type dont il ne diffère que par les caractères suivants : clypeus sans gros points distincts, simplement un peu ruguleux, le bord antérieur légèrement sinué, les angles antérieurs moins obtus; abdomen dépourvu de couleur rousse; cependant il arrive que les taches libres du 2° tergite abdominal soient jauneroux. Les branches du forceps sont de couleur rousse, l'extrémité des lobes est arrondie, sans aucun acumen aigu; les tenettes sont très courtes et leur dilatation basilaire sublinéaire. — Long. 11-13 mill. Pl. VIII, fig. 44.

La V. austriaca Panzer est pour moi une race de la V. rufa L., car il n'y a pas de caractères importants pour l'en séparer. Nous avons tronvé chez les V. cincta F. et ducalis Sm., des variations analogues dans le clypeus. Cette race me semble spéciale aux massifs de montagnes élevées ou aux régions froides. M. Charles Robson, de Newcastle on Tyne, a publié dans « Science Gossip », vol. V, p. 69-73, 1898, qu'il trouva en 4887 des mâles et des femelles de V. austriaca dans un nid de V. rufa. Il en trouva également de jeunes dans les cellules des derniers gâteaux. Si la chose est exacte, la V. austriaca Panz.. ne constituerait même pas une race. Je dois ajouter que j'ai vu des individus faisant le passage de la V. austriaca Panz.. à la V. sibirica André et d'autres reliant la V. rufa L. à la V. sibirica André également.

On ne connaît pas d'ouvrières exactement conformées comme la femelle.

Patrie. — Vosges, Splügen, Gavarnie voll. A. Puton', Vosges leg. A. Puton, voll. R. du Buysson 1900, Muséum de Paris : France voll. Sichel 1867, Muséum de Paris : Suisse, vallée d'Engadine, Rosegthal près de Pontrésina voll. A. Schulz : Valais, St-Cergues M. Maindron 1899, Muséum de Paris : Wallis et Weissenburg voll. A. von Schulthess 1903'; Russie boréale, île Waygate H.-W. Feilden, Musée de Londres ; Suisse. St-Gothard; Valteline, Santa Caterina voll. Magretti ; Zurich ex voll. Rühl, voll. Magretti ; Sibérie orientale, Raddefka Musée de Budapest ; Canada, Youkon T. Obalski 1903, Muséum de Paris.

### Var. sibirica Edmond André.

Vespa sibirica Edm. André, Species des Hym. d'Europe, II, 1884, p. 599.

Femelle et ouvrière. — Semblables à la V. rufu L. dont elles ne diffèrent que par la couleur : la couleur jaune est remplacée par la couleur blanche ou blanc d'ivoire; la couleur rousse n'existe qu'aux pattes et manque complètement sur le corps; pubescence plus longue et plus abondante; abdomen noir profond avec tous les segments abdominaux régulièrement et étroitement bordés de blanc d'ivoire, le haut de la troncature antérieure du 4º tergite marqué de deux taches étroites transversales; 6º tergite noir, marginé de blanc d'ivoire sur les côtés, l'extrémité un peu roussatre; les segments ventraux sont tous marginés de blanc d'ivoire, chaque marge trisinuée antérieurement et un peu dilatée sur les côtés, le 3º sternite ordinairement entièrement noir. Chez la femelle, le 2º tergite abdominal porte deux taches transversales, blanchâtres. — ♀ Long. 14-17 mill: ♀ long. 12-14 mill.

Mâle. — Semblable au mâle de la *V. rufa* L. dont il diffère par le coloris qui est celui de l'ouvrière décrite ci-dessus. Le 7º tergite abdominal est régulièrement marginé de blanc d'ivoire, le bord externe garni d'un épais duvet roussatre; le 6º sternite ventral est semi-elliptique, entier et noir. L'appareil copulateur est identique à celui du mâle de la *V. rufa* L. type. — Long. 45 mill.

Patrie. — Mandchourie, région du lac Hanka (Bohnhof 1900), Muséum de Paris); Transbaïkalia Tarakonow (Expédition Zichy, leg. Cziki, Musée de Budapest); Japon, environs de Tokio (J. Harmand 1900), Museum de Paris); Ele Sakhaline (P. Labbé 1902, Museum de Paris); Sibérie orientale, Gorbitza (Musée de Budapest).

### Var. intermedia var. nov.

Femelle. — Semblable à la var. sibirica André, mais avec la tête et le thorax beaucoup plus abondamment poilus, l'abdomen hérissé de longs poils tins, avec le 4<sup>cr</sup> et le 2<sup>c</sup> tergites ainsi que le 4<sup>cr</sup> sternite plus ou moins largement colorés de roux. Le deuxième tergite abdominal porte de chaque côté une large tache rousse. — Long. 16 mill.

Ouvrière. - L'ouvrière m'est inconnue.

Mâle. — Diffère de celui de la var. sibirica André par l'abdomen dont la couleur noire du 1<sup>er</sup> tergite est remplacée par du roux, le 2<sup>e</sup> porte de chaque côté une grande tache rousse. L'appareil copulateur

est identique à celui du màle de la *V. rufa* L. type, à l'exception de l'acumen aigu de l'extrémité des lobes des branches du forceps qui est très court, caractère qui rapproche cette variété rousse de la var. *austriaca* Panz. La couleur blanc d'ivoire de l'ornementation de cette variété *intermedia* est remarquable.

Patrie. — Mandchourie, région du lac Hanka ((Bohnhof, 1900), Museum de Paris); Amérique du Nord : Hudson's bay (Musée de Londres).

## Var. americana var. nov.

Mâle. — Semblable à celui de la var. sibirica André dont il diffère par l'ornementation du corps qui est jaune vif ou jaune-blanchâtre ; le ler tergite abdominal porte en avant deux petites lignes transversales jaunes, au-dessus de la troncature antérieure ou bien il en est privé ; les marges de couleur de l'abdomen sont beaucoup plus distinctement tri-sinuées antérieurement; les tarses sont à peine teintés de roux. — Long. 15-46 mill.

Il y a tellement d'affinité entre toutes les variétés de la V. rufa L., qu'il est peut-être superflu de les distinguer. Cependant si je leur ai donné un nom, c'est afin de les signaler davantage à l'attention, puisqu'elles se trouvent en partie disséminées sur tous les continents de l'hémisphère boréal.

Patrie. — Canada, Lévis près Québec (*Rév. Thomas W. Fyles*). D'après M. Fyles, la *V. rufa* construit un nid souterrain, au Canada, comme Europe.

### V. vidua II. de Saussure.

Vespa vidna II. de Saussure, Étud. fam. Vespides, II. 1853, p. 436, nº 46.

Femelle. — Corps de taille médiocre, allongé, subparallèle, d'un beau noir orné de jaune clair sur le disque des mandibules, le clypeus, l'espace interantennaire, les orbites internes jusqu'au sommet du sinus, les orbites externes ordinairement en entier, le bord supérieur du pronotum, une tache triangulaire sous les ailes, deux autres arrondies sur l'écusson et aussi sur les pattes et l'abdomen. Pubescence du thorax et de la tête dressée, noire, peu abondante. Tête normale: joues nulles; clypeus ordinairement avec trois points noirs sur le disque, la ponctuation médiocre, espacée, très irrégulière, le bord antérieur sinué peu profondément, les angles antérieurs courts, obtus; l'espace interantennaire nullement caréné; antennes noires avec le

scape jaune en avant. Pronotum sans carène transversale antérieure, Ponctuation du mésonotum très fine, serrée, entremêlée de points plus gros: celle du pronotum est semblable, mais les points fins sont confluents transversalement, de sorte qu'ils forment des stries. Écailles jaunes; ailes assez enfumées, à teinte brune. Pattes noires, avec les genoux, les tibias et les tarses jaunes en dessus, roux-ferrngineux en dessous, principalement les tarses. Abdomen allongé, les parties noires veloutées : 1er tergite tronqué très droit en avant, noir avec un liséré au bord postérieur et deux taches transversales jaunes touchant la troncature: 2º tergite noir, avec un lisére jaune s'élargissant sur les côtés, 3º tergite noir, très largement marginé de jaune, avec deux points noirs touchant le plus souvent la partie noire; les 4° et 5° tergites iaunes, chacun avec deux points noirs isolés dans le jaune; le 6º jaune avec un petit point noir de chaque côté et une ligne médiane longitudinale noir-roussatre. Les segments sternites du ventre sont noirs largement marginés de jaune, chacun avec deux points noirs isolés. sauf sur le 1er où ils sont confluents à la partie noire basilaire : la marge jaune est fortement rétrécie au milieu sur le 4er segment, la partie noire des autres segments s'avance en pointe au milieu, le 5° segment est entièrement jaune. - Long. 17 mill.

Ouvrière. — Semblable à la femelle dont elle diffère seulement par la taille plus petite. Le disque du clypéus porte également trois petites petites taches rayonnantes. — Long. 13 mill. (Sec. spec. typicum!).

Måle. -- Semblable à la femelle, dont il diffère par la taille plus grèle, plus allongée, les antennes très longues, sans tyloïdes; par le clypeus entièrement jaune dont le bord antérieur est tronqué transversalement sans sinus, ni angles saillants; par l'abdomen dont le 6º tergite a les points noirs confluents avec la partie noire basilaire; le 7º tergite noir, grand, entier, allongé, avec deux taches transversales : le 6º sternite grand, plan, déprimé, subtriangulaire. l'apex arrondi, le disque noir, le reste bordé de jaune. L'appareil copulateur volumineux roux-lestacé; branches du forceps tronquées, échancrées au sommet. la pointe inférieure arrondie, courte, entourant le lobe qui est assez long, large et se terminant par un léger élargissement subtronqué obliquement: tenettes linéaires, courtes, ne dépassant pas les branches du forceps; crochets formant une tige sublinéaire, fortement marginée en bourrelet sur les côtés, s'élargissant au sommet en une large snatule arrondie à l'extrémité, fortement comprimée sur les côtés, qui s'incurvent en dessous. - Long. 16 mill.

Fignore le mode de construction de cette Guèpe.

Patrie. -- Philadelphie (Lesueur, Muséum de Paris, type!); New York (Musée de Brême); Trémont, près New York (1884 V. © R. Sacconi-Musée de Gènes); Massachusetts, Amherst H.-T. Fernald).

## V. borealis II.-W. Lewis.

Vespa borealis II.-W. Lewis, Transact, of the american entomological Society vol. XXIV, 4897, p. 473 (nec Kirby).

Femelle. — Corps de petite taille, robuste, entièrement noir brillant. avec les mandibules, le clypeus, une tache entre les antennes, le devant du scape, les orbites internes sur la moitié inférieure presque jusqu'au fond du sinus des veux, deux taches derrière les veux l'une en haut l'autre près des joues, le bord postérieur du pronotum, une tache sous les ailes, deux sur l'écusson et deux sur le postècusson, blanchâtres; pubescence peu abondante, noire, fine. Tête petite, moins large que le thorax; joues longues: clypeus taché de noir, les angles antérieurs forts, aigus, le disque assez convexe avec quelques gros points très épars et profonds; fouet des antennes noir; pronotum avec une forte carène transversale dans la partie antérieure; écailles blanches, largement tachées de roux-scarieux; ailes assez enfumées, à teinte ambrée, légèrement roussatre; pattes noires avec l'extrémité des cuisses, le dessus des tibias et les tarses blanchâtres, le dessous des tarses et des tibias légèrement teinté de roux. Abdomen court, large, noir brillant : 4er tergite avec la troncature antérieure abrupte, mais le bord supérieur sensiblement arrondi, le bord apical avec un liséré blanchâtre largement interrompu au milieu; 2º tergite avec une marge blanchâtre, large sur les côtés devenant très étroite au milieu où elle disparaît complètement: les autres tergites munis d'une large marge blanche fortement incisée au milieu, pouvant même être interrompue sur un petit point médian; on remarque en outre une échancrure noire, arrondie, sur les côtés de chacun d'eux; 6° tergite noir avec une large tache blanchâtre de chaque côté près de la base. Tous les segments ventraux sont noirs et munis de chaque côté d'une large marge bianchâtre avec une échancrure noire dans chacune des parties blanches. - Long. 44-45,50 mill.

Les taches blanches qui se trouvent sur les côtés de la tête derrière les yeux peuvent devenir très grandes et se réunir sur un point de l'orbite externe. Les bordures blanches du pronotum sont parfois très élargies en avant.

Cette Guépe ressemble beaucoup à la V. consobrina Sauss., dont elle se distingue par les joues longues, la carène transversale du pronotum. le devant du scape blanc, les angles antérieurs du clypeus longs et aigus et enfin par le bord supérieur de la troncature antérieure du premier tergite abdominal qui est sensiblement arrondi au lieu d'être en angle presque aigu.

Ouvrière. — Semblable à la femelle mais de taille plus petite, et parfois avec les deux premiers tergites abdominaux plus distinctement et largement marginés de blanchâtre. — Long. 13-14 mill.

Mâle. — Semblable à la femelle, mais de taille beaucoup plus petite, les antennes très longues, le clypeus avec les angles antérieurs droits. faibles; les tergites abdominaux plus largement bordés de blanchâtre. la bordure blanche des deux premiers segments souvent très faiblement interrompue au milieu ou même nullement interrompue; le 7° tergite grand, arrondi, légèrement taché de blanchâtre à l'extrémité; tous les sternites largement marginés de blanc, le milieu antérieur de chaque marge sinué, les côtés avec un point noir isolé dans la partie blanche ou touchant à la partie noire de la base; 6e sternite allongé. légèrement sinué au sommet et garni de fins poils roussâtres très abondants. Appareil copulateur plus ou moins roux, de volume médiocre; l'extrémité des branches du forceps échancrée, la pointe inférieure élargie, déprimée en dessous, pliée latéralement pour loger le lobe qui est très développé, finement aigu: tenettes assez larges se terminant en acumens linéaires, arrondis à l'extrémité, ne dépassant pas les lobes des branches du forceps et garnis de longs poils flexueux. Les crochets forment une pièce large, noduleuse, renflée à la base, et comprimée sur le reste de sa longueur; l'extrémité se termine par deux lames arrondies sur les côtés externes, sinuées sur leur bord interne, terminées en pointe aiguê et séparées l'une de l'autre par une profonde incision. La disposition comprimée des crochets est très particulière. - Long. 12-14 mill. Pl. VI. fig. 5 et 6.

Les habitudes et la nidification de cette Guèpe me sont inconnues.

Patrie. — Amérique boréale (G. Mayr, Musée de Vienne): Canada (coll. J. de Gaulle): État de New Hampshire, Mº Washington (H.-T. Fernald): État de New York, Long lake (H.-T. Fernald): Côte de Californie, Mº Siskiyou (H.-W. Ashmead): New Hampshire (Musée de Leyde); Canada J. Pérez, Musée de Leyde): Amérique septentrionale (Marquet, Musée de Leyde).

### V. norwegica Fabricius.

Vespa norwegica Fabricius, Species Insectorum, t. I, 1781, p. 460, nº 12.

Vespa saxonica Fabricius, Entomologia systematica, t. H, 4793, p. 286, nº 42.

Vespa borealis W.-F. Kirby, Fauna boreali-americana, 1837, p. 264 365), nº 2. — (nec Lewis).

Vespa borealis J.-W. Zetterstedt, Insecta lapponica descripta, 1840, p. 454, nº 3. ♀.

Femelle. - Corps de petite taille, robuste, à pubescence longue. noire, dressée. Tête normale, moins large que le thorax, noire avec une tache derrière le haut des yeux, une autre transversale entre les antennes, le bas des orbites internes et le bord inférieur du sinus des yeux, le devant du scape, le disque des mandibules, jaunes; joues longues et parallèles; antennes noires, avec le devant du scape jaune. souvent le dessous du fouet jaune-roussatre en totalité ou en partie : clypeus jaune avec une tache médiane variable et toute la bordure extérieure noires, ponctuation grosse, très clairsemée, les angles antérieurs courts, arrondis. Thorax large, rétréci en avant, noir avec le bord supérieur du pronotum jaune; pronotum avec une carène transversale antérieurement, peu apparente. Parfois on voit une tache sous les ailes, deux autres sur le bord antérieur de l'écusson et une de chaque côté du postécusson, jaunes. Écailles roussâtres, la base noirâtre; ailes très légèrement enfumées, hyalines, les nervures légèrement limbées de roux. Pattes noires avec les genoux, les tibias et les tarses jaunes; les tibias souvent tachés de noir en dessous, les tarses ordinairement avec une teinte ferrugineuse. Abdomen large, très poilu, noir avec tous les segments marginés de jaune: 1er tergite très court. large, la troncature antérieure très abrupte, la marge jaune entière, rétrécie au milieu, la couleur noire entrant très largement en pointe dans le jaune; les autres marges jaunes irrégulières, élargies sur les côtés, le bord antérieur ordinairement avec deux échancrures et une petite incision médiane noires; le 6° tergite le plus souvent noir avec deux taches jaunes sur le disque; les marges jaunes des segments ventraux sont très rétrécies ou même interrompues sur le milieu : le 5° sternite est largement coloré de jaune. — Long. 14-17 mill.

Il est rare de trouver des femelles ayant des traces de couleur rousse sur le 2° tergite abdominal. Chez les individus provenant de la partie la plus horéale de l'Europe et de l'Amérique, la couleur jaune est très pâle ou presque blanchâtre.

Ouvrière. — Semblable à la femelle, dont elle diffère par la taille plus petite, par une tache jaune près de la base des mandibules, par le jaune des orbites internes qui peut atteindre le fond du sinus des veux, par deux taches jaunes sur l'écusson et parfois aussi sur le postécusson; par une teinte plus ou moins rousse qui occupe les côtés du 4º et du 2º tergite de l'abdomen, formant une tache nettement limitée ou bien se fondant plus ou moins avec le jaune; cette couleur rousse est plus ou moins abondante et vive et même disparaît parfois complètement; la couleur noire de la base du 2º tergite abdominal peut se réduire à une tache discoïdale; il existe le plus souvent des points noirs libres sur tous les tergites sauf sur le 4cr, mais ils peuvent aussi se souder à la partie noire de la base des segments et ne former que de petites échancrures noires dans les marges jaunes. La nervulation des ailes est plus ou moins rousse, sauf les nervures souscostales et médianes qui sont toujours de couleur foncée. Les segments ventraux sont beaucoup plus largement marginés de jaune que chez la femelle, et le plus souvent on v voit des points noirs isolés. - Long. 12-14.50 mill.

Mâle. - Semblable à l'ouvrière, dont il diffère par son corps étroit, la tête plus petite, les antennes très longues, le bord antérieur du clypeus droit. L'abdomen est coloré d'une manière analogue, aussi variable, avec ou sans taches rousses, et tous les intermédiaires possibles. Le 7º tergite abdominal est jaune avec deux points noirs isolés. ou bien avec la base noire et deux échancrures noires dans la marge jaune, l'apex très légèrement sinué, le bord apical couvert de fins poils roux, très épais; le 6° sternite est arrondi avec un léger sinus à l'apex et le bord apical feutré de duvet roux. L'appareil copulateur est brun, modérément volumineux; les branches du forceps anguleuses sur leur bord interne en dessus, près du tiers apical. l'extrémité inférieure dilatée transversalement en une courte spatule, le lobe largement lancéolé, finement aigu : les tenettes très longues, largement arrondies, infléchies en dessus et garnies de longs poils flexueux; les crochets forment une pièce large à la base, devenant peu à peu étroite jusqu'à l'extrémité où chacun des crochets prend la forme d'une lame arrondie du côté externe, droite du côté interne avec la pointe aigué: la soudure des crochets forme en dessus, sur la moitié de l'ensemble, une carène sous laquelle est réservée une sorte de tube s'ouvrant entre les petites lames apicales. — Long. 43-45 mill. Pl. VI. fig. 1.

Comme on vient de le voir, la *V. saxonica* F. ne peut se séparer de la *V. norwegica* F. Ce sont les ouvrières qui ont l'abdomen taché de roux, et on les trouve dans le même nid que les femelles qui peuvent être seulement noir et jaune. Il n'y a même pas lieu de la laisser comme variété. C'est le nom de *norwegica* qui a la priorité. La nidifiann. soc. Ent. Fr., exem 1904.

cation de la *V. norwegica* est aérienne, parfois assez volumineuse. fixée à une poutre sous la toiture dans les maisons, sous l'encorbellement des toits et des hangars, ou encore pendue à une branche d'arbre. Elle ressemble beaucoup à celle de la *V. media* Degeer : quatre à six gâteaux reliés entre eux par des piliers très irréguliers, en forme de rubans, les alvéoles des femelles et des mâles peu différenciés de ceux où sont élevées les ouvrières; les enveloppes très nombreuses, douze à quinze, entourant complètement les gâteaux et les soutenant même en certains points sur les côtés par des feuillets additionnels. L'ensemble est obové ou piriforme; l'ouverture est en bas et parfois prolongée en goulot, quand le nid est peu avancé.

J'ai vu un nid recueilli dans la Vienne, à Iteuil, par M. P. Marchal. Il mesure 22 cent. de long, sur 18 cent. dans sa plus grande largeur. Le carton est souple, gris, léger, analogue à celui fabriqué par les Vespa media et germanica, c'est-à-dire que les fibres dont il est composé sont relativement longues et minces. M. Ch. Janet cite deux nids qu'il a trouvés : l'un dans un jardin, à Beauvais, fixé à une branche de groseiller à cassis (Ribes nigrum L.) à 75 cent. environ au-dessus du sol; l'autre à Mouy (Oise), encore fort petit, mais construit sur la face extérieure d'un store en toile, resté baissé depuis six semaines.

La V. norwegica F, est surtout répandue dans le nord des continents de l'hémisphère boréal. Elle se montre aussi dans l'Europe moyenne, abondante même dans les pays montagneux, et on la retrouve dans les Pyrénées espagnoles, à Ponticosa, province de Huesca, qui est, je crois, le point le plus méridional où on l'a rencontrée. Les matériaux me manquent pour pouvoir donner des indications sur son aire de dispersion en Amérique, d'où elle n'a jamais été signalée, mais où elle habite, d'après les exemplaires que m'a envoyés M. H.-W. Ashmead, Du reste il est à peu près certain que la V. borealis décrite par W.-F. Kirby dans la Fauna boreali-americana est la V. norwegica F. Presque tous les auteurs ont négligé de se rapporter à la description du célèbre entomologiste anglais. C'est pourquoi la guèpe appelée borealis par MM. II. de Saussure et II.-W. Lewis, est une autre espèce très distincte. Sir George Hampson m'a informé que les Hyménoptères décrits par W.-F. Kirby dans sa Fauna boreali-americana, ne se trouvent pas conservés dans le Musée de Londres. J'ignore où ils se trouvent: aussi n'ai-je pas pu les examiner, et m'assurer davantage de la synonymie dont je viens de parler.

Patrie. — Europe : Suède (Gaimard 1839, Muséum de Paris); Norwège, Strand, Tysfjorden (Musée de Brême); Finmark, Sydvaranger (G. Pouchet 1896, Muséum de Paris); Angleterre, Bradforth (coll. Sichel 1867, Muséum de Paris; Harz (coll. E. Mocquerys. H. Gadeau de Kerville 1903, Muséum de Paris; Thuringe, Ilmenau. Pehren Musée de Brème; Innspruck ley, F.-D. Morice, coll. R. du Buysson 1900, Muséum de Paris; Suisse: Berisal (ley. A. Puton, coll. R. du Buysson 1900, Muséum de Paris); vallée d'Engadine, Rosegthal, près de Pontrésina (coll. A. Schulz); Simplon (coll. J. de Gaulle); France: Montauban: Alpes; Vichy (coll. Sichel 1867, Muséum de Paris); Le Mont-Dore (coll. R. du Buysson 1900, Muséum de Paris); Vienne, Iteuil (coll. P. Marchal; Espagne, Ponticosa coll. J. M. Dusmet); Belfort D' Sicard); Pie S'-Bernard. (124 VII 1886, coll. Mayretti); Tessin, Airolo; vallée du Simplon, S'-Lorenzo (526 VII 1897, coll. P. Mayretti); Suisse, Bérisal; S'-Moritz (519 VIII 1903, coll. P. Mayretti).

Asie: Sibérie, région du Baïkal, environ d'Irkoutsk (J. Chaffanjon 1896, P. Labbé 1902, Museum de Paris...

Amérique : Sitka Alaska (Juin 1899, Q, Expedition Harriman, leg. T. Kincaid, H.-W. Ashmead.

# Var. marginata Kirby.

Vespa marginata W.-F. Kirby, Fauna boreali-americana, IV. 1837, p. 265–366 ', 3\*, ♀ Pl, Vl, fig. 2.

Vespa peruana II. de Saussure, Reise der Oster, freg. Novara Zoolog, II, 1, A. Hyménoptères 1868, §.

Femelle. — Diffère du type par l'ornementation du corps qui est blanche ou blanc-jaunàtre; la marge des segments abdominaux plus régulière, plus étroite, à peine sinuolée en avant, celle du 1<sup>er</sup> tergite avec une légère incision au milieu du bord antérieur, les autres de mème, mais en outre avec une légère échancrure arrondie de chaque côté; les tarses teintés de roux, ainsi que le bord antérieur des ailes supérieures. — Long. 45-47 mill.

Ouvrière. — Semblable à la femelle mais de taille plus petite, parfois la marge des segments abdominaux encore plus étroite et plus régulière. — Long. 12-13 mill.

Mâle. — Semblable à l'ouvrière, mais avec le thorax plus velu que chez les individus d'Europe; les tarses antérieurs sont en grande partie noirs, les tarses intermédiaires et postérieurs sont noirs à l'extrémité de chaque article. — Long. 15 mill.

Patrie. — Sikkim (& coll. Martinez Escalera); Ile Sakhaline (P. Labbé 1902, Muséum de Paris): Japon. environs de Tokio (J. Harmand 1900, Muséum de Paris): Koyuku R. Alaska Lat. 67-69, Long. 151, coll.

W. J. Peters, été 1901 ♀, H.-W. Ashmead ; Pérou, Quito (H. de Saussure, V. peruana Sauss. type ♀); Sibérie occidentale, Altaï (Musée de Leyde); Canada, Youkon (T. Obalski 1903, Muséum de Paris).

### Var. adulterina var. nov.

Femelle. — Semblable au type dont elle diffère par son clypeus dont les angles antérieurs sont allongés, aigus; par la carène transversale du pronotum très saillante dès le haut et jaune au moins en partie. L'abdomen est un peu plus large et la ponctuation plus forte. — Long. 45-47 mill.

Ouvrière et mâle. — Je n'ai vu que des femelles présentant les caractères énoncés ci-dessus.

La variété adulterina est à la V. norwegica F. ce qu'est la variété austriaca Panz. à la V. rufa L.

Patrie. — Europe : Piémont (coll. Sichel 1867, Muséum de Paris); Vosges, Remiremont (coll. A. Puton); Suisse, Engadine, Rosegthal (coll. A. Schulz).

Amérique; Orégon. Corvallis (coll. H.-W. Ashmead).

# V. silvestris Scopoli.

Vespa silvestris Scopoli, Entom. Carn. 4763, p. 309 nº 826. Vespa holsatica Fabricius, Entom. system. II, 4793, p. 257, nº 44. Vespa frontalis Latreille, Annales du Mus. d'Hist. nat. I, 4802, p. 290, nº 3.

Vespa pilosella A. Costa, Richerche entomologiche sopra i monti Partenii 1858, p. 28 (36).

Femelle. — Corps de petite taille, assez robuste; pubescence abondante, fine, dressée, grise, devenant noire sur le dessus de la tête et du thorax. Tête petite, noire avec une tache entre les antennes, deux autres sur le haut de la tête derrière les yeux, le clypeus, les mandibules et les orbites internes, depuis la partie inférieure des sinus, jaunes; joues très longues et parallèles; clypeus entièrement jaune ou taché de noir, les côtés étroitement lisérés de noir, la ponctuation médiocre, profonde, devenant serrée dans la partie antérieure, le bord antérieur sinué, liséré de roux, les angles formés par ce sinus obtus, la pubescence longue, épaisse, jaune très pâle; antennes courtes, noires, le scape jaune en avant, les derniers articles du fouet roussatres en dessous. Thorax rétréci fortement en avant, noir avec le bord supérieur

des lobes du pronotum, une tache sous les ailes, deux sur l'écusson et parfois autant sur le postécusson, jaunes. Pronotum avec une forte carène transversale en avant. Écailles roussâtres, parfois tachées de jaune en arrière; ailes hyalines, faiblement enfumées; pattes noires avec l'extrémité des cuisses, les tibias et les tarses jaunes, par exception avec une tache noire sur les tibias antérieurs, les tarses lègérement teintés de ferrugineux; le feutre des tibias jaunâtre. Abdomen long, noir, avec tous les segments largement bordés de jaune : l'etergite court, sensiblement moins large que le 2°, la troncature antérieure très abrupte, un peu concave, la marge jaune rétrécie au milieu; les autres segments ayant une petite incision médiane, et une échancrure de chaque côté dans la couleur jaune; le 6° tergite presque entièrement jaune; les sternites du ventre étroitement bordés de jaune, la bordure jaune élargie brusquement sur les côtés; le 3° sternite entièrement jaune. — Long. 17-19 mill.

Ouvrière. — Semblable à la femelle, mais de taille plus petite et le fouet antennaire plus coloré de roussâtre en dessous. — Long. 12-15 mill.

Mâle. — Semblable à la femelle, mais plus petit, plus allongé; antennes très longues, le fouet entièrement noir; poils du clypeus noirâtres: marges jaunes des segments tergites de l'abdomen ordinairement plus régulières; le 7° tergite arrondi, transversal, entièrement jaune; le couvercle génital ou 8° tergite ovale, brièvement lancéolé, à pointe obtuse; le 3º sternite normal, transversal, entier; le 6º semielliptique entier ou tronqué, ou même légèrement sinué à l'apex, jaune, garni sur son bord apical d'un feutre roux, l'extrème base noire. L'appareil copulateur petit, ramassé; branches du forceps fortement échancrées en dessus dans leur tiers apical, leur extrémité en spatule, le lobe très développé, se terminant en longue pointe aiguë; tenettes larges, arrondies; crochets formant une pièce étroite, subparallèle, garnie de longs poils flexueux sur les côtés. l'extrémité subarrondie; en dessous on remarque : 1º vers le milieu, deux lobules arrondis, garnis de longs poils et se réfléchissant l'un vers l'autre: 2°, à l'extrémité, deux difatations anguleuses se rejoignant presque et formant comme un tube pour la verge, qui est exsertile à l'extrémité des crochets. - Long. 43-45 mill. Pl. VIII. tig. 6, 7 et 8.

La V. silvestris Scop., établit son nid dans le sol au milieu des champs cultivés, sur le bord des chemins, et le revers des fossés. Il est modérément volumineux, fait de carton souple, gris, léger, semblable à celui de la V. yermanica F., avec des zones plus claires. Les

gâteaux mesurent de 18-24 centimètres de diamètre; les piliers qui les relient entre eux sont subcylindriques. Les enveloppes sont nombreuses, modérément gaufrées, reliées les unes aux autres par des feuillets supplémentaires protégeant complètement les gâteaux. La population est moins grande que dans les nids des *V. germanica* et vulgaris, mais elle est aussi irascible et agressive. Les mâles et les femelles se montrent de bonne heure, dès la fin de juillet et au commencement d'août. Les ouvrières volent moins tard le soir, sont frileuses et font peu de mal aux fruits.

M. Ch. Janet signale un nid de cette Guèpe dans le tronc creux d'un vieux pommier (Observations sur les Guèpes, fasc. 23, 4903, p. 50, à deux mètres au-dessus du sol. Il était entouré d'enveloppes que M. Janet enleva pour placer la colonie dans une cage d'observation. Dès leur installation, les Guèpes se hâtèrent de refaire les enveloppes, qui finalement atteignirent le nombre de dix.

Le même auteur Études sur les Fourmis, les Guêpes et les Abeilles, 10° note, 1895, p. 45) fait mention d'un autre guêpier de V. silvestris complètement aérien, fixé à une poutrelle, dans un jardin d'un faubourg de Beauvais (Oise). Les enveloppes étaient nombreuses, entourant complètement les gâteaux.

M. le D' P. Magretti, de Milan, a eu la complaisance d'examiner pour moi les types de la *Vespa pilosella* Costa, conservés à Naples. Ce sont des ouvrières de *Vespa silvestris* Scop. L'illustre conservateur du Musée de Naples avait écrit de sa main sur les étiquettes que portent ces insectes : « *V. silvestris pilosella*) ». Il avait reconnu la synonymie que nous indiquons.

La *V. silvestris* Scop., est commune dans le centre de la France où j'ai pu l'observer bien des fois. Elle manque, je crois, dans le nord de l'Europe où elle semble être remplacée par la *V. norvegica* F. Les matériaux me font défaut pour indiquer d'une manière précise son aire de dispersion.

Patrie. — Eure, Bézu Saint-Eloi (Ch. Brongniart 1888), Muséum de Paris ; Seine-et-Oise, Chamarande R. du Buysson 1898, Muséum de Paris ; environs de Paris, Meudon, Le Vésinet. Créteil (coll. Sichel 1867, Muséum de Paris); Mesnil-le-Roi. Issy, Meudon; Édimbourg; S'-Gingolph coll. J. de Gaulle); Calvados: Lisieux leg. A. Loiselle. coll. II. Gadeau de Kerville); Brest, Rouen. Auvergne. Montauban (coll. Sichel 1867, Muséum de Paris); Maine-et-Loire, Saint-Rémy la Varenne R. du Buysson 1902, Muséum de Paris ; Allier, Broût-Vernet (coll. R. du Buysson 1900, Muséum de Paris); Aix. Piémont, Naples, Galicie (coll. Sichel 1867, Muséum de Paris); Barcelone Pedro Antiqu 1901.

Muséum de Paris ; S'-Pétersbourg coll. Sichel 1867, Muséum de Paris ; Turkestan méridional Chapus et Bonvalot 1881, Muséum de Paris ; Asie Mineure, Bulgar Dagh 13-2500 m. leg. Holtz 1897, coll. A. Schulz ; Brussa VII 1900 leg. D' Werner, Musée de Vienne : Tauride, Cilicie : Kar Boghaz leg. Holtz 1897, coll. A. Schulz ; Morée coll. A. Schulz ; Allemagne. Brandebourg, Clausdorf 15 VII 1898, leg. Moser, coll. A. Schulz : Duché de Bade : Fribourg en Brisgau (Musée de Brème ; Caucase, Achaldzik (Musée de Munich ; Calabre Vespa pilosella Costa, A. Costa, Musée de Naples : Alpes du Piémont, Brigatenda, Orsiera 900 m. \$\mathref{z}\$ 22 VII 1886, coll. P. Magretti ; Mont-Cenis, Moloretto (\$\mathref{y}\$ 27 VII 1886, coll. Magretti ; Limone ; vallée du Simplon. Bognanco. Toscane. Vallombrosa (coll. P. Magretti); Zurich (ex-coll. Rühl, coll. P. Magretti).

### Var. sumptuosa var. nov.

Ouvrière. — Diffère du type par les côtés de la tête qui sont colorés de jaune; la carène transversale du pronotum nettement jaune sur la portion qui coupe les marges qui sont très larges; les taches pleurales beaucoup plus grandes; les cuisses presque entièrement jaunes et les hanches tachées de cette couleur: l'abdomen jaune avec les segments étroitement colorés de noir à la base, la couleur noire faisant trois entailles dans la couleur jaune des segments tergites deux, trois et quatre; le 1<sup>ste</sup> tergite noir seulement sur la troncature antérieure, le reste jaune avec une petite incision noire au milieu touchant la troncature et de chaque côté un petit sinus. — Long. 13 mill.

Il est à remarquer que l'exagération de la couleur jaune se montre principalement chez les individus provenant des pays chauds. Une ouvrière à peu près semblable à celle décrite ci-dessus se trouve au Musée de Munich. Elle provient d'Anatolie, Akchehir (leg. Korb 1900).

Je n'ai jamais vu de femelles, ni de mâles ainsi colorés.

Patrie. — Perse centrale (ley. Rodler, Musée de Vienne.

# V. vulgaris Linné.

Vespa vulgaris Linné, Systema naturae, Edit. 40° I, 1758, p. 572, nº 2. — Edit. 42°, I, 1767, p. 949, nº 4.

? Vespa sexsincta Panzer, Faunae insectorum germanicae initia, oder Deutschlands Insecten gefammelt und herausgegeben von D. Georg Wolffgang Franz Panzer, VI, 1799, p. 63, t. 1.

Femelle. — Corps de petite taille, robuste: pubescence longue, assez abondante, fine, dressée, grise, devenant noire sur le dessus du thorax, de la tête et sur le clypeus. Tête large, normale, un peu moins large que le thorax, noire avec deux taches derrière les yeux Tune en haut, l'autre près des joues, ces deux taches pouvant se réunir , tout le sinus et la partie inférieure des orbites internes, une tache transver sale entre les antennes, les mandibules et le clypeus jaunes; joues nulles : clypeus taché de noir au milieu et bordé de noir tout le tour. le bord antérieur distinctement sinué, les angles antérieurs distincts. arrondis, la ponctuation grosse, espacée, les intervalles finement pointillés; antennes entièrement noires. Thorax large, noir avec une bordure régulière sur les lobes latéraux du pronotum, une tache sous les ailes, deux autres sur l'écusson et le postécusson, jaunes; pronotum sans carène transversale; écailles jaunes; ailes hyalines, faiblement teintées de gris-ferrugineux; pattes noires avec les tarses, les tibias et l'extrémité des cuisses jaunes, les tibias tachés de noir en dessous. Abdomen ovale, noir, tous les segments très largement marginés de iaune, la marge portant une petite incision au milieu du côté antérieur: 1er segment tergite ayant la troncature antérieure abrupte, subconcave. le bord supérieur brièvement arrondi; les autres tergites avec un point noir transversal, de chaque côté, isolé dans le jaune; ces points se soudent parfois avec la base noire; les segments sternites tous marginés de jaune avec trois incisions noires dans le jaune, le 3º jaune plus ou moins taché de noir sur les côtés. - Long. 16-18 mill.

Ouvrière. — Semblable à la femelle, mais avec des taches jaunes sur les lobes du pronotum, sur le tergite du segment médiaire, et la marge jaune des segments abdominaux moins large. — Long. 10-15 mill.

Chez les ouvrières, il arrive parfois que la partie noire de la base du 1<sup>cr</sup> segment abdominal se divise en dessus sur les côtés, de telle sorte que l'ornementation noire devient identique à celle de la *V. germanica* F. On trouve cette variété dans le même nid que la forme typique; mais je ne l'ai jamais rencontrée que dans les colonies très populeuses en été ou en automne.

Mâle. — Semblable à la femelle, mais très étroit de corps, très allongé, subcylindrique, subparallèle, le thorax beaucoup plus fortement pubescent, le scape jaune en avant, le clypeus tronqué-subsinué antérieurement, les pattes beaucoup plus grèles et plus colorées de jaune, les segments tergites de l'abdomen beaucoup plus régulièrement marginés de jaune, les points latéraux presque toujours soudés à la

base noire des segments; le 7º tergite coloré comme les autres, fortement entaillé de chaque côté en angle droit, le milieu fortement déprimé et prolongé en une lame semi-elliptique, émarginée à l'apex : le 8°, ou converçle génital, largement lancéolé, à pointe arrondie, muni d'un faisceau de longs poils en dessous, avant l'extrémité; le 5e sternite ventral coloré comme les précédents, entier, transversal; le 6° jaune avec deux petits points noirs pouvant disparaître, l'apex largement émarginé. L'appareil copulateur est très volumineux, noirâtre; le sommet des branches du forceps est tronqué, brusquement déprimé en dedans; au commencement de cette troncature se montre une dent très étroite et dirigée du côté interne en face de celle de l'autre branche du forceps; tout le bord interne de la troncature est garni d'une frange de poils ; le lobe est testacé, peu chitinisé, assez large. muni de poils très abondants et flexueux; les tenettes se terminent par un acumen long, linéaire, l'extrémité s'élargissant en une palette arrordie et densément velue de longs poils; la dilatation basilaire des tenettes triangulaire. A la base des volsellas, du côté inférieur, se trouve un petite pièce mobile, transversale et poilne. Les crochets, soudés jusqu'à leur sommet, forment une pièce étroite, noueuse dans le milieu, puis largement dilatée en spatule arrondie, légèrement concave en dessus, aussi large que longue, portant en dessous et de chaque côté de sa base, un lobule en forme de crochet dirigé en avant. Tout l'ensemble de crochets forme un tube se terminant à la naissance de la spatule apicale et c'est là également entre les deux crochets soudés que se montre la verge, exsertile au moment de la copulation. - Long. 44-45 mill. Pl. V. fig. 10 et Pl. VIII, fig. 5.

La forme de l'appareil copulateur permet de distinguer les mâles de la V. vulgaris L. de ceux de la V. germanica F. La troncature du sommet des branches du forceps, très distincte et fortement déprimée en dedans; la dent qui se trouve à la naissance de cette troncature très étroite et sublinéaire; le lobe du sommet des branches du forceps testacé, peu chitinisé, beaucoup plus large, bien plus poilu; les dents unciformes qui se trouvent à la naissance de la spatule apicale des crochets, sont autant de caractères qui différencient la V. vulgaris L. de la V. germanica F. Ce sont ces différences qui sont cause que les mâles de V. vulgaris L. ne purent s'accoupler avec les femelles de V. germanica F. dans l'expérience de M. le professeur P. Marchal.

Dans les collections du Muséum de Paris îl existe des exemplaires femelles provenant de la Mandchourie : la couleur jaune principalement de leur abdomen est très pâle, presque blanchâtre.

La V. rulgaris est très commune dans toute l'Europe centrale; elle

est moins abondante sous les climats plus chauds du bassin de la Méditerranée, mais elle se rencontre assez haut dans le Nord. Je ne l'ai jamais vue d'Afrique. Je puis la signaler de Perse, de Sibérie, de Mandchourie et de la Colombie anglaise, dans l'Amérique du Nord. Il est probable qu'elle a une aire de dispersion bien plus considérable, mais les matériaux me manquent. Sa nidification est souterraine, absolument semblable à celle de la V. germanica, mais très souvent le carton est cassant, fait de fragments de fibres courts et recueillis sur du bois pourri. Ce n'est que par exception que le nid de cette Guèpe est complètement aérien ou fixé sous un abri. Ses habitudes sont les mêmes que celles de la V. germanica L.

Les jeunes femelles et les mâles se montrent en août et septembre, et les colonies persistent jusqu'aux gelées d'octobre.

Patrie. — France: environs de Paris, Le Vésinet, Asnières, Versailles (coll. Sichel 1867, Muséum de Paris), Paris (coll. Bosc 1828, R. du Buysson 1901, Muséum de Paris; Maisons-Laffitte; Rouen coll. J. de Gaulle); Seine-et-Oise: St-Léger-en-Yvelines (M° Goupi 1903, Muséum de Paris); Allier: Broùt-Vernet (coll. R. du Buysson 1900, Muséum de Paris); Maine-et-Loire: St-Rémy-la-Varenne (R. du Buysson 1903, Muséum de Paris); His-Vienne: Nieul; Cantal, Lioran (coll. Noualhier 1898, Muséum de Paris); Corse, Piémont, Turin, St-Pétersbourg (coll. Sichel 1867, Muséum de Paris); Suisse: Valais, St-Cergues (M. Maindron 1899, Muséum de Paris); vallée d'Engadine. Rosegthal (\$\to\$ 28 VII 1902, coll. A. Schulz: Belgique (leg. de Bormans, coll. Magretti); Valteline (coll. Magretti).

Asie: Perse (Aucher 1840, Muséum de Paris); Sibérie, environs d'Irkoutsk (P. Labbé 1902, Muséum de Paris); région du Baïkal (Chaffanjon 1896, Muséum de Paris); Mandchourie, région du lac Hanka (Bohnhof 1909, Muséum de Paris; Sibérie orientale, Gorbitza (Musée de Budapest).

Amérique du Nord : British Columbia, Slecey station (septembre § 1859, Musée de Londres); Canada, Montréal (coll. Magretti).

#### V. communis II. de Saussure.

Vespa communis II. de Saussure, Entomologische Zeitung herausgegeben von dem entomologischen Vereine zu Stettin, XVIII. 1857, p. 417.

Femelle. — Diffère de la V. germanica F. par l'ensemble du corps moins robuste, moins large, plus cylindrique; par la tête beaucoup plus étroite, le thorax moins large, rétréci en avant; par la coloration de l'abdomen : le 4<sup>cc</sup> tergite rétréei en avant, noir avec une bordure jaune incisée de noir au milieu et deux taches étroites, linéaires, transversales sur le haut de la troncature antérieure : ces taches transversales peuvent se souder sur les côtés à la marge jaune, quand celle-ci devient très large, mais la tache noire médiane reste toujours transversale ; le 2<sup>c</sup> tergite est jaune avec la base noire formant un large triangle noir laissant toujours la marge jaune assez large au milieu, les points noirs latéraux isolés, sont de même que chez la *V. germanica* F.; les autres tergites ont la couleur jaune très brièvement incisée au milieu; le 6<sup>c</sup> tergite est toujours entièrement jaune. — Même taille.

Ouvrière. — Semblable à la V. germanica F. dont elle se distingue par le thorax plus étroit, rétréci-en avant; par le 1<sup>er</sup> segment tergite de l'abdomen qui porte toujours au sommet de la troncature les traces des deux raies transversales jaunes, très régulières; la tache médiane noire est transversale.

Mâle. — Se distingue de celui de la *V. germanica* F. par son thorax beaucoup moins large, très grêle, rétréci en avant: par la coloration du 1<sup>cr</sup> tergite abdominal qui est comme chez la femelle et l'ouvrière; par les bandes jaumes des autres tergites beaucoup moins larges; par le 7<sup>c</sup> tergite profondément et très brusquement déprimé sur le disque, la base de ce segment, vue de profil, est comme anguleuse; par le 6<sup>c</sup> sternite qui est ovale avec une petite échancrure au sommet; par les branches du forceps dont la dent supérieure interne est sensiblement plus grêle, étroite et plus courte, par le lobe dont l'extrémité est beaucoup plus large, testacée, moins chitinisée et garnie de poils beaucoup plus épais et longs; par les tenetles plus larges au sommet de l'acumen et plus longuement velues; enfin par les crochets qui présentent à la base de la spatule apicale, de chaque côté et en dessous, une forte dent unciforme dirigée en avant, c'est-à-dire du côté de la base des crochets. — Même taille. Pl. V, fig. 9.

Bien que par son coloris, la *V. communis* Sauss, soit très voisine et confondue généralement avec la *V. germanica* F., elle a cependant beaucoup plus d'affinités avec la *V. vulgaris* L. On la distingue de cette dernière par son thorax plus étroit, la tête moins large, le 1<sup>cr</sup> segment tergite abdominal plus rétréci en avant et coloré différemment. Le mâle différe de celui de la *V. vulgaris* L. par le 7<sup>c</sup> tergite abdominal qui est très brusquement déprimé sur le disque, au point d'avoir un profil anguleux vers la base, et par le 6<sup>c</sup> sternite qui est ovale avec une petite échancrure au sommet. Il n'y a presque pas de différences dans les pièces qui composent l'appareil copulateur.

C'est généralement la *V. communis* Sauss., qui est signalée par les Américains sous le nom de *V. germanica* F. D'après M. Fyles, de Lévis. près Québec, cette Guèpe ferait un nid souterrain comme la *V. germanica* F. « dans une chambre, profitant d'une cavité naturelle ou élargissant le conduit de quelque petit animal. »

Patrie. — Amérique septentrionale (Peale 1833, Muséum de Paris; Musée de Brême); New-York (H. de Saussure 1858, co-type: coll. Sichel 1867, Muséum de Paris; H. Edwards, Musée de Londres; Baltimore (coll. Sichel 1867, Muséum de Paris); Maryland (J. de Joannis 1903, Muséum de Paris); Savannah (Harper 1843, Museum de Paris; Musée de Vienne); Massachusetts, Lyun (J.-D. Alfken 1903); Amherst (H.-T. Fernald 1903); Philadelphie (Musée de Brême): Delaware, Wilmington (E. Doubleday, sous le nom de V. maculifrons H., Musée de Londres: Canada, île d'Orléans (T.-W. Fyles 1903); Colorado (Morrison & I. 1879, Musée de Vienne); Cayenne, Surinam (coll. P. Magretti).

# V. koreensis Radoszkowsky.

Vespa korcensis Radoszkowsky, Horae Societ, entom. Rossicae XXI, 1887. p. 432.

Femelle. — La femelle est inconnue.

Ouvrière. — Se distingue de la *V. vulgaris* L. par la ponctuation du clypeus, du vertex et du dorsulum plus serrée, un peu plus grosse, celle des mésopleures assez serrée, ruguleuse; par la bordure jaune du 4<sup>cr</sup> segment tergite de l'abdomen qui est régulière, parallèle au bord du segment, sauf au milieu où il se trouve une petite incision noire dans la partie jaune (chez la *V. vulgaris* L. la couleur noire forme un triangle dans la partie jaune), par la bordure jaune des autres segments tergites plus large, le 5<sup>cr</sup> garni de points distincts. La troncature antérieure du 4<sup>cr</sup> segment tergite de l'abdomen est en angle droit comme chez la *V. germanica* F., les bandes noires de la base des segments sont plus larges que chez la *V. vulgaris* L. et les bandes jaunes plus régulières, étant très peu élargies sur les côtés. — Long. 12 mill.

Mâle. — Semblable au mâle de la *V. vulgaris* L. dont il diffère par les joues un peu plus courtes, fortement convergentes en avant, les tibias antérieurs tachés de noir en avant; par l'abdomen dont les bordures jaunes sont étroites et régulières, celle du 1<sup>cr</sup> tergite seule porte une petite incision au milieu du bord antérieur: par le 6<sup>c</sup> segment sternite un peu plus long. — Long. 13 mill.

N'ayant vu que trois ouvrières et un mâle, il m'est bien difficile de me prononcer sur la valeur de cette espèce. Je serais porté à croire qu'il ne s'agit que d'une simple race de la V. vulgaris L. Je n'ai pu voir l'appareil copulateur du mâle.

Patrie: Korée (coll. Radoszkowsky, types!).

## V. germanica Fabricius.

Vespa germanica Fabricius, Entom. system. II, 1793, p. 256, nº 41.

Femelle. — Semblable à la V. vulgaris L. dont elle diffère par la couleur jaune plus abondante du sinus des yeux, entre les antennes, de telle sorte que la tache interantennaire peut être confluente avec celles des sinus oculaires; par la pubescence de l'avant-corps un peu moins abondante; par le thorax plus large antérieurement, la marge jaune du bord supérieur du pronotum le plus souvent fortement élargie; par l'abdomen plus large, coloré différemment : le 4er segment tergite avec la troncature antérieure noire, toute la partie horizontale du segment jaune avec une tache noire en forme de losange en dessus. les deux pointes du losange touchant l'une la troncature antérieure. l'autre le bord apical; sur les côtés du 1er segment, il se trouve une tache noire touchant la troncature antérieure et formant une échancrure dans la partie jaune; ces taches latérales sont très variables de grandeur et de forme, la tache médiane varie également au point de devenir triangulaire: les autres segments tergites sont comme chez la V. rulgaris L. sauf l'échancrure médiane noire qui est plus profonde et atteint le bord apical des segments ou en approche beaucoun; les segments sternites ventraux portent également une entaille noire ani atteint le bord apical des segments. - Long. 46-20 mill.

Ouvrière. — L'ouvrière ne diffère de la femelle que par sa taille. Le segment médiaire porte très souvent de chaque côté une large tache jaune. Il arrive aussi que le 2º segment tergite abdominal est très largement coloré de noir à la base, les taches latérales s'unissant à la médiane. On rencontre également certains individus de petite taille dont les taches du 1º segment tergite de l'abdomen se réunissent et forment une coloration très voisine de celle de la V. vulgaris L. — Long. 9-14 mill.

Mâle. — Semblable à la femelle, dont il diffère par sa forme tres allongée, subparallèle; l'avant-corps très garni de poils; le bord antérieur du clypeus simplement tronqué, non sinué. Les antennes sont très longues, le scape jaune en avant, le reste noir, les articles légérement arqués sans tyloïdes apparents. La bordure jaune du pronotum est à peu près régulière, très peu élargie. Le 7° tergite abdominal est conformé comme chez le mâle de la V. vulgaris L. le couvercle génital ou 8º tergite est largement lancéolé, obtus: le 6º sternite est transversal, largement tronqué-subsinué à l'apex. L'appareil copulateur est volumineux et ressemble beaucoup à celui du mâle de la V. vulgaris L. Le sommet des branches du forceps est tronqué d'une manière très peu sensible; toute la partie supérieure de cette troncature est arrondie, convexe, se prolongeant transversalement en une dent triangulaire, forte, assez large, subtronquée à l'extrémité et dirigée en dedans vis-à-vis l'une de l'autre, tout le bord de la troncature garni en dessous d'une longue frange de poils; l'extrémité inférieure est obtuse, de médiocre longueur; le lobe du sommet des branches du forceps est long, très étroit, linéaire, finement aigu, brun-marron. fortement chitinisé, garni de quelques longs poils. Les volsellas sont courtes, transversales: les tenettes avec un acumen testacé, faiblement chitinisé, linéaire, l'extrémité légèrement dilatée et couverte de longs poils flexueux. A la base de chaque tenette se présente une petite pièce mobile, transversale, couverte de longs poils. Les crochets sont soudés jusqu'au sommet en une pièce dont les côtés sont repliés en dessous et l'extrémité dilatée brusquement en une spatule arrondie. légèrement concave en dessus: de chaque côté en dessous, à la base de la spatule apicale se trouve un petit lobe arrondi. — Long. 43-45 mill. Pl. VIII, fig. 4, 2, 3 et 4.

La V. germanica F, est répandue sur tout l'hémisphère septentrional entre le 25° et le 65° degré de latitude nord. Elle s'accommode fort bien du froid comme de la chaleur. Dans les pays au sud de la Méditerranée, les colonies persistent beaucoup plus longtemps que dans l'Europe centrale. Au commencement de décembre, on peut encore trouver des guépiers renfermant des jeunes femelles et des mâles encore à l'état larvaire.

M. P. Lesne, assistant au Muséum d'Histoire naturelle de Paris, ayant fait un séjour assez long aux îles Canaries, captura le 17 mars et le 24 avril 1903 quelques ouvrières de V. germanica, dans la Grande Canarie, soit à Tafira, à une altitude de 373 mètres, soit un peu plus bas, dans le Baranquiflo, à l'est de la Montañeta. Ces ouvrières pourraient provenir de colonies fondées l'année précédente et vivotant encore tout l'hiver, puisque j'ai reçu d'Algérie des gâteaux renfermant encore au mois de décembre des larves de femelles, de mâles et d'ouvrières. Il est permis également de croire que ces individus pris au mois d'avril sont les premières ouvrières de jeunes guépiers, car

M. P. Lesne n'en captura pas d'autres avant cette saison, dans la même région où il passa une grande partie de l'hiver.

La nidification de la V. germanica F. est le plus souvent souterraine, même en Algérie; mais elle peut être construite dans un espace limité comme aussi parfaitement aérienne. Les alvéoles sont assez différenciés; les piliers qui relient les gâteaux sont plus ou moins cylindriques. Les enveloppes sont très variables de formes, simples ou plus ou moins gaufrées, feuilletées et entourent presque entièrement les gâteaux. Le carton est souple, mince, non cassant, gris avec des zones plus ou moins claires. Les gâteaux sont au nombre de 6 à 42: leur dimension la plus commune est de 22 centimètres dans la plus grande largeur du nid. Mais j'ai vu des nids de taille beaucoup plus grande.

Au Muséum d'Histoire naturelle de Paris, il en existe un qui était complètement aérien, très régulier de forme, suspendu à une poutrelle. Il mesure 40 centimètres de diamètre sur 27 centimètres d'épaisseur, pl. XV. Dans le même Musée il en est conservé plusieurs autres de forme très particulière. Je vais les énumérer. L'un, celui qui a été figuré dans la planche XVI (fig. 1) de l'Atlas des Guèpes sociales de M. de Saussure, occupe l'angle inférieur d'une grande cage de verre. Sa largeur basilaire est de 50 centimètres et sa hauteur de 49 centimètres: l'ensemble affecte la forme d'un triangle. Il renferme 5 ou 6 gâteaux seulement; tout le reste de la construction est en feuillets et gaufrures qui donnent une épaisseur considérable à la partie supérieure. Un second est établi dans une musette de grosse toile qui était accrochée à un mur. Il provient des environs de Paris et a été offert par Mue Thérèse Chavanne, artiste peintre. Les gâteaux, au nombre de douze, mesurent 20 centimètres de long sur 5 de large: les enveloppes très gaufrées et feuilletées forment une épaisseur de 5 à 10 centimètres.

Un troisième a été recueilli par M. A. Boudarel, en 1902, à Chaville (Seine-et-Oise). Il occupait le haut d'une ruche fixe, sans hausse, dans laquelle se trouvait un faible essaim d'Abeilles. Les Guèpes chassèrent ces dernières et construisirent un nid globuleux, ayant son ouverture latéralement, parce qu'il était resserré entre deux des parois de bois de la ruche et les rayons de cire des Abeilles. Le carton des enveloppes est très fragile, brun, avec des rayures blanchâtres. Les fibres végétales dont il est composé sont très courtes, grossières et ont été certainement récoltées sur du bois pourri, ce qui est rare chez la V. germanica.

Un quatrième, offert par M. A.-L. Clément en 4898, est analogue

au précédent. Il remplit la hausse d'une ruche provenant du rucher de la Société centrale d'Apiculture et d'Insectologie agricole du parc de Montsouris (Bulletin du Museum d'Histoire naturelle de Paris, t. IV. 4898, p. 482-483). Au printemps de 4897, M. Saint-Pée, professeur d'Apiculture, remarquant une Guèpe qui pénétrait dans une ruche habitée par un essaim, souleva la hausse et trouva l'intruse occupée à la construction d'un nid qui n'était alors qu'ébauché. Sur la demande de M. Clément, le nid de Guèpe ne fut pas détruit, et pendant toute la belle saison Abeilles et Guèpes vécu" nt côte à côte. Les Guèpes sortaient et rentraient habituellement par des joints disloqués de la ruche; cependant il n'était point rare d'en voir quelques unes se servir du trou de vol et traverser la partie occupée par les Abeilles. Certains jours le sol autour de la ruche était jonché de cadavres d'Abeilles, tandis que d'autres fois il était couvert de Guèpes mortes. Ces hécatombes étaient sans doute le résultat de combats entre les deux colonies. La hausse mesure 44 centimètres de long sur 35 centimètres de large et seulement 43 centimètres d'épaisseur : aussi les Guèpes ne construisirent que trois gâteaux très développés : le plus grand, qui est le supérieur, occupe presque toute la longueur et la largeur de la hausse; le second est un peu moindre et le troisième de moitié plus petit. La chose la plus curieuse, c'est que les grands alvéoles des femelles, qui sont très nombreuses, se voient sur les côtés des trois gâteaux, c'est-à-dire dans les parties qui furent construites en dernier, pl. XV.

Les ouvrières de la *V. germanica* sont très carnassières et hardies : elles viennent prendre les Diptères jusque dans les maisons; elles se jettent sur les viandes fraîches dans les boucheries et les cuisines. Je les ai vues attaquer les poissons à peine jetés hors de l'eau et se débattant encore dans l'herbe. Elles ne dédaignent point le gibier venant d'être tué. On s'est plaint très souvent qu'elles détruisent les chenilles des Lépidoptères séricigènes, parfois énormes, dont elles dévorent les meilleures parties, ne laissant que le tube digestif et la peau. Il serait trop long d'énumérer toutes les déprédations qu'elles font, en compagnie des ouvrières de la *V. vulgaris* qui ont les mêmes habitudes et les mèmes goûts.

Ces deux Guèpes et la *V. crabro* sont les plus à redouter pour les fruits, sous nos climats. Certaines années, les dégâts qu'elles causent sont considérables.

Les V. germanica et vulgaris volent très tard au crépuscule pour surprendre les Diptères et les Lépidoptères diurnes reposant sur les herbes basses. J'en ai remarqué en juillet pratiquant cette chasse à huit heures et demie du soir, heure à laquelle on ne les distinguait qu'avec peine.

Patrie. - Europe : Environs de Paris (coll. Lepeletier 1845, coll. Bose 1828, Muséum de Paris), Le Vésinet, Créteil, Passy, Versailles (coll. Sichel 1867, Muséum de Paris), Meudon R. du Buysson 1901, Museum de Paris), S'-Cloud, Bellevue, Sceaux; Rouen; Gisors; Angers; He-Vienne: Pyrénées-Orientales (coll. J. de Gaulle); Pantin (A. Lecœur 1901, Muséum de Paris); Champrosay (coll. J. Fallon 1893, Muséum de Paris); ile d'Yea (R. Courteaux 1903, Muséum de Paris); Toulouse; Montpellier: Brest: Dax; Aix; Corse (coll. Sichel 1867, Museum de Paris'; Calvados; Lisieux (leg. A. Loiselle, coll. H. Gadeau de Kerrille); Lyon (Audouin 1834, J. Künckel d'Herculais, Muséum de Paris'; Loiret (H. Rouger 1898, Muséum de Paris); Maine-et-Loire, St-Rémy-la-Varenne (R. du Buysson 1902, Muséum de Paris): Allier, Broût-Vernet (coll. R. du Buysson 1900, Museum de Paris); Vienne et Malaga (coll. Sichel 1867, Museum de Paris); Bohème (A. Brulle 1837, Museum de Paris : royaume de Naples A. Costa 1853, Muséum de Paris : Lugano et Piémont (coll. Sichel 1867, Muséum de Paris'; Crimée (Cotty 1856, Muséum de Paris; Caucase, province d'Elisabethpol, Geok-Tapa (L. Mesmin 1903; Morée et Westphalie (coll. A. Schulz 1901; San Remo (legit Kriechbaumer, Musée de Munich); Sicile (leg. Kranz. Musée de Munich): Hongrie (Musée de Munich); Espagne : L'Escorial; Palerme (coll. J. de Gaulle). Italie: Lombardie, Canonica d'Adda, Sondrio, Pavie: Suisse, Saint-Gothard, Airolo (coll. P. Magretti .

Asie: lle Sakhaline (P. Labbé 1912, Muséum de Paris); Chine, Cheli (J. de Joannis 1903, Muséum de Paris); Mandchourie, région du lac Hanka (Bohnhof 1909, Muséum de Paris): Syrie, bords de la Mer (Mittre 1835, Muséum de Paris); Turkestan méridional (Capus et Bonvalot, 1881, Muséum de Paris); Kohistan (id. 1882); environs de Pékin (A. David 1872, Muséum de Paris); Jéhol (id. 1863); Perse (Aucher 1840, Muséum de Paris); Manille (Gaudichaud 1837, Muséum de Paris); Palestine (leg. Dr Roth, Musée de Munich); Anatolie, Ak-Chehir (Musée de Munich); Chine, Tien-tsin (Musée de Brème); Syrie: Akbès (coll. J. de Gaulle); Perse (coll. F. Smith: R. Günther 1899, Musée de Londres); Chine (coll. A. Duchaussoy).

Afrique: Algérie (J. Künckel d'Herculais 1895, Muséum de Paris),
Alger (coll. Noualhier 1898 et L. Trabut 1901, Muséum de Paris);
Barbarie (Guyon 1839, Muséum de Paris): prov. d'Alger, Chellala (Vauloger de Beaupré 1897, Muséum de Paris): Oran (coll. Sichel 1867, Muséum de Paris); Maroc, environs de Tanger (Farier 1857, Muséum de Paris); lles Canaries (Webb et Berthelot 1841, Muséum de Paris);
Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII (1904).

Algérie: Mustapha et Alger (H. Lucas 1849, Muséum de Paris): Algérie: Alger, Oran. Teniet-el-Haad (coll. J. de Gaulle); Grande Canarie, Tatira (P. Lesne); Tunisie, Zagouan (\$\to\$ 28 II 4899, coll. P. Mayretti). Nouvelle-Calédonie (coll. R. du Buyson 1900, Muséum de Paris).

Amérique : Amérique du Nord (§ Musée de Brême); États-Unis, Massachusetts, Amherst (H. T. Fernald 1903, Muséum de Paris); ile Vancouver (Musée de Londres).

On trouve en Amérique la V. germanica F. et sa forme représentative la V. pensylvanica Sauss., ainsi que la V. vulgaris L. et la V. communis Sauss., qui dérive de cette dernière. Ce sont les mâles qui, comme en Europe, sont le mieux pourvus de caractères différentiels. Malheureusement je n'ai pu voir de provenance américaine des mâles typiques de V. germanica, ni de V. vulgaris. Il se pourrait donc que les ouvrières que j'ai vues, colorées comme la V. vulgaris, soient des ouvrières de V. communis avec le 4<sup>cr</sup> tergite abdominal noir sur toute sa base.

D'après M. Th. W. Fyles, la V. germanica montre au Canada les mêmes habitudes qu'en Europe. Elle établit son nid sous le sol.

# Var. flaviceps Smith.

Vespa flaviceps F. Smith, Trans. of the zoological Society of London, vol. VII. 1870 (1872), p. 174 et 191, pl. XXI, fig. 10 et 141.

Ouvrière. — Diffère du type par la couleur jaune qui est beaucoup plus abondante: le clypeus est entièrement jaune, le devant du scape est également de cette couleur, la bordure jaune du pronotum est beaucoup plus large, dilatée au milieu, celles des segments tergites de l'abdomen plus régulières, faiblement trisinuées; le 1<sup>cr</sup> tergite abdominal a sa bord re apicale étroite, presque régulière, avec une petite incision peu distincte au centre, le sommet de la troncature antérieure porte deux petites taches transversales, qui parfois peuvent se réunir à la marge apicale lorsque celle-ci s'élargit. — Long, 11-14 mill.

Cette variété se relie au type par de nombreux passages. Elle semble particulière à l'Asie méridionale et orientale. Il se trouve dans les collections du Muséum de Paris plusieurs exemplaires se rapprochant de cette variété; ils proviennent des environs de Pékin (A. David 1872) et de Mongolie, Tché-li (J. de Joannis 1903).

On sait d'après Horne (*Trans. of the zoot. Society of London, vol. VII* 1870 (1872), p. 173) que cette variété de la *V. germanica* F. vit sur les rivages, faisant un nid à deux pieds environs sous terre, recouvert d'enveloppes de papier en partie coloré. Il y a de 7 à 8 gâteaux à pi-

liers très simples, légers. Cette variélé fut découverte par Horne à Binsur, montagne située à douze milles d'Almorah et d'environ 7.500 pieds anglais au dessus du niveau de la mer. L'époque de la plus grande activité des colonies est en juillet, pendant les pluies, et c'est aussi à cette époque qu'elles sont le plus nombreuses. De même qu'en Europe, ces guèpes sont friandes de fruits et capturent des insectes sur les fleurs.

Patrie. — Indes: Manpur (leg. Horne, Indian Museum, Musee de Londres, Vespa flaviceps Sm., types!; Chine: Ngan-Kin (coll. J. de Gaulle); Nord de l'Inde (Musée de Londres).

M P. Cameron signale cette variété de l'Assam. Khasia Hills (coll. Rothney. — Zeitschrift für Hymenopterologie und Dipterologie. Heft V, 1903, p. 347.

## Var. stizoides var. nov.

Ouvrière. — Entièrement jaune avec le vertex, le mésonotum, le mésosternum, le segment médiaire moins deux taches jaunes, la base du 1<sup>er</sup> et du 2<sup>e</sup> tergite ainsi que celle du 1<sup>er</sup> sternite de l'abdomen noirs. Bord antérieur du clypeus tronqué, droit, sans sinus; antennes noires avec le scape et le dessous de l'extrémité du fouet jaune-roux; écailles et pattes entièrement jaunes. Abdomen avec le 1<sup>er</sup> tergite largement marginé de jaune, la troncature antérieure noire, la couleur noire s'avançant légèrement en pointe dans le jaune; 2<sup>e</sup> tergite avec la base noire, cette couleur n'atteignant pas les côtés et faisant deux sinuosités dans la partie jaune; on distingue quelques traces rousses sur les côtés de chacun des segments. Le ventre est jaune avec la base du 4<sup>er</sup> sternite noire; une petite tache rousse de chaque côté de tons les segments. — Long, 13,50 mill.

Je n'ai vu qu'un seul exemplaire de cette variété si curieuse par sa coloration jaune exagérée, qui donne à l'insecte l'aspect d'un Stizus.

Patrie. - Nord de l'Inde (Musée de Londres).

# V. pensylvanica II. de Saussure.

Vespa pensylvanica II. de Sausssure, Entomologische Zeitung herausgegeben von dem entomologischen Vereine zu Stettin, 48, 1857, p. 444.

Vespa occidentalis E.-T. Cresson, Transactions of the american entomological Society, Vol. V. 1874-76, p. 100.

Femelle et Ouvrière. — Différent de la V. germanica F. uniquement par le coloris : scape jaune en avant; tête entièrement jaune, excepté le vertex autour des ocelles et la partie postérieure noirs; thorax plus court et plus robuste, avec l'ornementation jaune plus abondante, avec deux larges taches sur la partie inférieure des mésopleures et sur le segment médiaire; pattes entièrement jaunes, avec les hanches, les trochanters et la base des cuisses tachés de noir; les segments ventraux très largement marginés de jaune. On rencontre des individus qui portent sur le mésonotum, près de l'écusson, deux petites raies jaunes parallèles. — Long. Q 18-20 mill.; § 12-14 mill.

Mâle. — Diffère uniquement de celui de la *V. germanica* par l'extrémité du scape et le dessus du 1<sup>er</sup> article du fouet également tachés de jaune; par l'appareil copulateur très visiblement plus court et plus large; les branches du forceps assez différentes dans leur conformation, principalement par la pointe transversale supérieure qui est très large, tronquée à l'extrémité, au lieu d'être étroitement linéaire, les côtés externes de la troncature portent une carène transversale; les crochets sont un peu plus larges, la spatule apicale plus transversale, sans aucun appendice au-dessous à sa naissance. — Long. 14-16 mill.

Les différences qui se montrent dans l'appareil copulateur du mâle permettent de reconnaître une véritable espèce dans la *V. pensylvanica* Sauss., qui se sépare ainsi très nettement de la *V. yermanica* F. dont elle est sans doute la forme représentative américaine.

Comme elle est confondue généralement avec la *V. germanica* F., on peut supposer que les indications biologiques indiquées pour cette dernière, peuvent aussi lui être appliquées. Il est donc permis de croire que la *V. pensylvanica* Sauss, établit son nid sous le sol.

Patrie. — Mexique (Sallé 1859, Muséum de Paris), Mexico (II. de Saussure 1858, Co-type! Muséum de Paris et Musée de Londres), Oaxaca, Californie (coll. Sichel 1867, Muséum de Paris : Colorado et New-Mexico (W. II. Ashmead): Mexico (coll. F. Smith, Musée de Londres), Oaxaca Musée de Londres): Californie (1872 Musée de Vienne); Californie, Mariposa (A. Fanvel, Musée de Leyde); Arizona (Musée de Leyde).

# V. doryloides II. de Saussure.

Vespa anomala II. de Saussure, Études fam. des Vespides 2, 1853, p. 412.

Vespa doryloides II. de Saussure, Études fam. des Vespides 2, 1853, rectif. p. 256, Pl. XIV, fig. 2. ♀.

Provespa dorylloides II.-W. Ashmead, Entomological News, 1903, p. 182.

Femelle. — Corps de taille médiocre, allongé, subparallèle, grêle, entièrement testacé-ferrugineux, la tête ordinairement un peu obs-

curcie; pubescence dressée, assez épaisse, testacée; tout le corps imponctué; tête très peu épaisse, un peu plus large que le thorax; joues nulles; clypeus imponctué, brillant, beaucoup plus long que large, le bord antérieur assez profondément sinué, les angles antérieurs arrondis: espace interoculaire du vertex très étroit et élevé; ocelles très saillants et très grands; la face ordinairement brun-noirâtre ainsi que le dessus de la tête, avec l'espace interantennaire testacé-jaunatre, le hord postérieur de la tête arrondi, nullement caréné, ni marginé. Antennes grêles, allongées. Thorax très rétréci en avant; pronotum étroit, légèrement caréné transversalement sur les côtés seulement. vers les hanches antérieures. Ailes très amples, hyalines, testacées avec une longue tache ferrugineuse couvrant les cellules brachiales et costales des ailes antérieures, plus légèrement sur les ailes postérieures; la cellule radiale est remarquablement grande. Pattes grèles. très allongées. Abdomen étroit, allongé : le 1er tergite assez long, arrondi antérieurement, beaucoup plus étroit que le 2º segment tergite, celui-ci très long, sensiblement rétréci à la base. - Long. 20-22 mill.

Ouvrière. — Semblable à la femelle, mais de taille un peu plus petite. Parfois une tache brune sur le mésonotum, touchant le bord antérieur de l'écusson. — Long. 45-48 mill.

Mâle. - Semblable à la femelle, mais plus allongé encore, les antennes très grèles, très longues, sans tyloïdes, ceux-ci sont remplacés par une bande de poils larges, lancéolés, courts, qui ont des reflets dorés sous une certaine incidence de la lumière, le dernier article du fouet est arqué, tronqué. Les yeux sont plus grands et plus convexes. le clypeus plus court, sinué modérément au bord antérieur, les mandibules très petites, pouvant se replier entièrement sous le clypeus. Le 7° segment tergite de l'abdomen allongé, légèrement sinué à l'extrémité; le 3º sternite ventral largement transversal, le 6º prolongé en triangle, arrondi à l'extrémité et recouvert d'une fine pubescence couchée, très serrée. Les branches du forceps vont en diminuant insensiblement de largeur, sans troncature en dessous; les volsellas garnies sur leur bord interne de fortes aspérités noirâtres; les crochets forment une pièce assez large à la base, allant en diminuant de largeur vers l'extrémité qui se termine par deux lobes triangulaires conjugués. - Long. 19-22 mill. Pl. V. tig. 1 et 2.

D'après M. Bouchard, ingénieur à Palembang. Sumatra, cette Guèpe aurait des habitudes crépusculaires, voltigerait le soir à la tombée de la nuit. Elle vient à la lumière pendant que l'on prend ses repas et s'empare de ce qu'elle peut ravir des aliments. Au grand jour, elle serait fortement incommodée par la lumière vive du soleil, aussi volet-elle alors comme si elle était privée de la vue, se heurtant à ce qui se trouve devant elle. Les indigènes lui ont donné un nom qui veut dire aveugle. Elle est fort irritable et sa piquère est assez douloureuse. Elle habite les vieilles forêts très épaisses où elle fait son nid dans le sol-

La V. doryloides Sauss., forme avec la V. Barthelemyi Buyss., un petit groupe complètement distinct des autres Guêpes, mais insuffisamment caractérisé pour en faire un genre, comme l'avait pensé M. W.-H. Ashmead.

Patrie. — Bornéo septentrional, Sandakan (Montano et Rey, 1880, Museum de Paris); Himalaya (Dr Martin, Musée de Munich); Birmanie, Minhla (1882, Dr Comotto, Musée de Gènes); presqu'île de Malacca (Errington de la Croix et P. Chapé 1899, Muséum de Paris ; Tapahpérak (G.-B. Cerruti 1900, Muséum de Paris); Bornéo (Chaper 1891, Muséum de Paris : — R. Oberthür 1898, Muséum de Paris ; Sarawak (1865-66, coll. G. Doria, Musée de Gènes ; Bengkalis (M. Maindron 1885, Muséum de Paris); Sumatra, Deli (L. Martin, coll. A. Schulz , Pangherang-pisang (X. 1890, HI 1891, leg. E. Moydigliani, Musée de Gènes); Sirambé, Pea-regia, Padang (1890-91, leg. E. Moydigliani, Musée de Gènes); Singapoore (Musée de Brême): Tenasserim, Malewoon (L. Fea \(\xi\), VII 1887, coll. Magretti); Sumatra, Pangherang Pisang (\(\xi\)) \(\xi\)

# V. Barthelemyi spec, nov.

Femelle. — Semblable à la femelle de la *V. doryloides* Sauss., dont elle diffère par le corps plus robuste, beaucoup plus pubescent de poils testacés; le clypéus à peine sinué à son bord antérieur, couvert de longs poils très abondants; le thorax plus large, très arrondi et non rétréci en avant; l'abdomen plus large, le 4<sup>cr</sup> segment tergite plus évasé postérieurement. la base du 2<sup>c</sup> nullement rétrécie. — Long. 22 mill.

Ouvrière. — L'ouvrière est semblable à la femelle, mais de taille un peu plus petite. — Long. 49-20 mill.

Mâle. — Semblable au mâle de la V. doryloides Sauss., dont il diffère, en plus des caractères qui séparent les femelles des deux espèces, par le clypeus dont le bord antérieur est tronqué, insensiblement sinué, les antennes plus épaisses; les branches du forceps munies d'une forte carène transversale sur les côtés et tronquées en dessous vers l'extrémité, les crochets formant une large pièce dilatée dans la moitié infé-

rieure et terminée par deux longues tiges parallèles et subcylindriques.

— Long. 21 mill. Pt. V, fig. 3 et 4.

La forme des crochets est remarquable et distingue la V. Barthelemyi de toutes les autres Guèpes. Les bords de la volsella sont, comme chez la V. dorytoides Sauss.. garnis du côté interne de fortes aspérités noirâtres. Les ocelles sont également très grands et la partie du vertex comprise entre les yeux très étroite et élevée.

On ignore ses habitudes et son mode de nidification.

Patrie. — Cambodge, Pnom-penh E. Fleutiaux 1888, Muséum de Paris); Bhoutan, Maria Basti (leg. Mª Durel, R. Oberthür 1898, Muséum de Paris); Cochinchine, cap S¹-Jacques (\(\neq\) avrit, Mis de Barthélemy 1900, Muséum de Paris); Birmanie, Bhamo L. Fea VI, VII et X 1886, coll. P. Magrett').

## Espèces restées inconnues en nature.

#### V. Jurinei II. de Saussure.

Vespa Jurinei II. de Saussure, Étude sur la fam. des Vespides 2. p. 433, nº 42.

Rufa; abdomine atro; alis flavis; apice cellae quartae cubitalis, fusco. — Long. 25 mill.; env. 56 mill.

Chaperon ayant ses angles avancés en deux lobes pointus, ciliés. Insecte presque lisse, velu. Tête et corselet roux; vertex un peu noirâtre; mandibules d'un beau roux. Antennes orangées; leur premier article jaune en devant; chaperon et un grand triangle sur le front, jaunes ou roux. Ces parties couvertes de poils fauves. Abdomen noir, couvert de poils bruns ou fauves (dans cet individu il est brunàtre. Pattes rousses. Ailes d'un jaune clair avec le cubitus noir et le radius roux; le bout de la quatrième cubitale, brun.

Habite : L'Albanie (Musée de Londres).

### V. luctuosa H. de Saussure.

Vespa luctuosa H. de Saussure, Étude sur la fam. des Vespides 2, p. 143, nº 24.

Carbonaria; fronte, postscutello abdominisque segmentorum marginibus, albis; alis grisco-ferrugineis. — Long. 20 mill.; env. 45 mill.

Mâle. — Taille de la *V. crabro* L. Insecte noir, très finement ponctué, couvert d'un duvet gris. Abdomen très cylindrique, le 2' segment très

court. Mandibules, chaperon, une tache sur le front, orbites dans leur moitié inférieure, d'un jaune pâle. Antennes noires, avec le dessous blanchâtre. Écailles brunes. Postécusson blanc. Les segments de l'abdomen régulièrement lisérés de blanc; le 5° incomplètement bordé; l'anus et le 6° segment, noirs. Pattes brunes, hanches et cuisses noires. Ailes layées de ferrugineux, le cubitus noir.

Cette espèce est la seule asiatique dans laquelle les yeux atteignent les mandibules. Les couleurs de cette Vespu la rapprocheraient des espèces noir et jaune de l'Europe et de l'Amérique, si sa taille ne l'en distinguait parfaitement.

Habite: Les Philippines (Musée de Londres).

# V. nigripennis H. de Saussure.

Vespa nigripennis II. de Saussure, Études sur la fam. des Vespides, 2, p. 456, nº 41.

Nigra; abdominis secundo segmento margineque primi, flavis; alis fuscis. — Long. 22 mill.; env. 54 mill.

Taille de la *V. cincta* F. et lui ressemblant beaucoup. Yeux n'atteignant pas les mandibules. Tête et corselet noirs, ponctués, velus. Antennes ferrugineuses en dessous. Abdomen noir, le 2º segment et la moitié postérieure du premier, jaunes ou fauves. Pattes noires, avec des poils bruns chatoyants. Ailes d'un brun foncé, surtout vers la base.

Comme on le voit, cette espèce ne diffère de certaines variétés de la *V. cincta* que par la couleur des ailes.

Habite : Les Philippines (Musée de Londres).

#### V. unicolor Smith.

Vespa univolor Smith, Journal of the Proceedings of the Linnean Society, Zoology, vol. VII, 4864, p. 44, nº 4.

V. nigra, velutina; alis flavis, basi rufo-piceis.

Q Long. 45 lignes. — Noire : le clypeus grossièrement rugueux, le reste
de la tête un peu plus finement ponctué. L'abdomen quelque peu
brillant vers la base, la base du second segment avec une fine pubescence cendrée changeante ; les ailes jaunàtres, hyalines, devenant d'un
brun-rougeàtre près de la base ; les nervures noires à la base des ailes
et roux-testacé à leur extrémité. — Bouru (leg. A. R. Wallave).

Cette espèce ressemble beaucoup à la V. deusta Lepeletier, mais elle est une espèce distincte. Chez la V. deusta, les yeux atteignent la base des mandibules, ce qui n'est pas le cas chez cette espèce, et le clypeus et le postécusson sont noirs.

#### V. tyrannica Smith.

Vespa tyrannica Smith, Catal. of Hymenopterous Insects in the coll. of the British Museum. Part V, Vespidae, 4857, p. 419 et 420, nº 21.

© ou ©. Long. 9 1/2 lignes. — Noire; la tête et le thorax avec une pubescence noire peu abondante, couverts d'un duvet velouté éclatant de changeant; le clypeus émarginé en avant, les angles de sou émarginature arrondis; les mandibules, les joues, le clypeus, une tache tritide au-dessus du clypeus et les orbites internes des yeux, orangés; la pointe des mandibules et leur bord interne noirs; les antennes fauves en dessous. Le bord externe des écaillettes testacé; les ailes jaunàtres, hyalines, avec une teinte foncée sur le bord antérieur de la paire supérieure, vers leur base; les nervures ferrugineux pâle, la nervure costale noire; tous les segments de l'abdomen, excepté la base du 4 ct. largement marginés de roux.

Habite: Singapore (coll. E. Wallace).

Cette espèce ressemble quelque peu à la V. relutina dont elle se distingue pour avoir la tête plus large que le thorax; le segment basal de l'abdomen est proportionnellement beaucoup plus long, avec son bord basilaire régulièrement arrondi; les antennes sont aussi plus courtes.

#### V. infernalis H. de Saussure.

Vespa infernalis II. de Saussure, Études sur la fam. des Vespides, 2. p. 439, nº 19.

Nigra, flavo variegata; antennis nigris, articulo primo antice flavo; abdominis segmentis flavo marginatis, primo maculis duabus flavis, ultimorum marginibus punctis duobus nigris. — 

↓ Long. 14 mill.; env. 36 mill

Taille de la *V. media*. Formes et couleurs de la *V. diabolica*, dont elle diffère par les caractères suivants : chaperon aussi large que long ; antennes noires; le premier article seul jaune en dessous; bordure antérieure du prothorax nulle, et la postérieure longuement interrompue au milieu ; taches du postécusson nulles ou très petites. Premier segment de l'abdomen portant sur son bord antérieur deux grandes taches jaunes transversales, les autres segments jaunes, avec la base et deux points noirs; les deuxième et troisième offrant une échancrure

noire, étroite en avant, fortement élargie en arrière, où elle envoie deux projections qui, en se séparant, forment les taches noires des suivants, tandis que dans la *V. diabolica* ce sont des échancrures du bord antérieur du jaune, indépendantes de l'échancrure médiane, qui se séparent du noir pour former ces points. Ailes ferrugineuses.

Variété. Le deuxième segment noir, avec un bord jaune régulier, insensiblement élargi au milieu.

Les deux taches sur le bord antérieur du premier segment, ne permettent de la confondre qu'avec les *V. cuneata* et *vidua*, lesquelles sont bien plus petites et n'ont pas de points noirs libres sur les bordures de l'abdomen.

Habite : L'Amérique du Nord, Philadelphie (Collection de M. le marquis Spinola).

#### V. bistriata Mac Farland.

Vespa bistriata J. Mac Farland, Trans. of the american entomological Society, vol. XV, 1888, p. 298.

Vespa Mac Farlandi H.-W. Lewis, Trans. of the american entomological Society, vol. XXIV, 1897, p. 180. (nom. nov. inutile).

Femelle. — Noire, marquée de jaune, très finement ponctuée, recouverte d'une pubescence noire, éparse. Tête noire, subtriangulaire, avec une tache quelque peu triangulaire — la pointe en bas — entre les antennes; une petite tache entre le dessus et les ocelles; une tache dans le sinus des yeux confluente avec une marge étroite orbitaire, les joues se réunissant au-dessus des orbites avec leur marge étroite orbitaire; clypeus, excepté une petite tache irrégulière noire, et les mandibules, excepté une étroite bordure, jaunes. Antennes noires, le scape marqué antérieurement avec une ligne jaune. Fouet noir. Thorax : col jaune, donnant naissance à un rameau antérieur, pointu, descendant. Mésonotum avec deux lignes jaunes longitudinales. Écusson marqué de deux larges taches jaunes latérales. Postécusson jaune, étroitement interrompu de noir. Métathorax noir, chaque côté avant une tache jaune supérieure petite et circulaire et une autre inférieure, large et subcarrée. Côtés du thorax, en dessous des ailes, marqués d'un raie oblique jaune et de deux taches jaunes. Écailles jaunes, avec une tache ferrugineuse. Ailes hyalines, nervures brunes. Pattes jaunes, les hanches, les fémurs marqués en dessus de noir : tarses ferrugineux. Abdomen: 4er segment noir, avec une bordure basale étroite, interrompue, jaune, confluente, avec deux taches basales latérales et, sur les côtés, avec une étroite bordure apicale jaune, presque interrompue. Deuxième segment noir, marqué vers le milieu de deux bandes larges. Brisées. Ce segment est plus ou moins largement bordé de jaune, avec deux entailles arrondies et confluentes latéralement avec la large bande brisée du milieu du segment. Troisième segment jaune, entaillé à sa base par du noir et ayant latéralement deux taches noires. Quatrième segment jaune, moins profondément entaillé de noir et ayant deux taches noires. Cinquième segment jaune, fortement incisé de noir antérieurement et ayant deux taches latérales; anus jaune, avec une raie noire longitudinale. Ventre jaune, avec une tache noire sur chaque côté du 2° segment. — Long. 9 lignes: envergure des ailes 45 lignes.

Habite: North America. Localité inconnue.

Une femelle, dans la collection de la Société entomologique américaine. Cette espèce se distingue de la *V. cuneata* F. par sa taille plus grande, et par les ornementations différentes de l'abdomen.

## V. Westwoodi Shipp.

Vespa Westwoodi J.-W. Shipp, Psyche, vol. VI, 4891-4893, p. 430.

Noire; tête, mandibules à l'exception des dents, une tache trapéziforme au-dessus du clypeus, le clypeus à l'exception d'une large marque longitudinale s'élargissant à l'apex, le sinus des yeux, une tache près des mandibules sur les joues, une autre plus longue en dessus derrière les yeux, rouges; antennes noir profond; une ligne sur la marge du mésothorax, sur les côtés du prothorax, les écailles, deux taches, une sur chaque côté de l'écusson, deux sur le postécusson et une tache sous les ailes antérieures, rouges. Abdomen noir, le 1er segment avec une large bande apicale rouge, se rétrécissant au centre : le 2º avec une large bande rouge irrégulière, s'élargissant grandement sur les côtés. donnant l'idée de trois taches réunies ensemble; segment apical rouge avec des reflets noirâtres, la bande continuée en dessous; hanches et trochanters entièrement noirs, fémurs noirs, genoux rouges, tibias rouges avec une partie noire dans le milieu du bord interne; tarses rouges avec une pubescence dorée; ailes avec une légère teinte jaune les nervures les plus larges avec une teinte rougeâtre vive. Les yeux atteignent la base des mandibules.

Habite: L'Amér, boréale, Le type au Musée de l'Université d'Oxford. Il est probable que la couleur naturelle primitive de l'insecte décrit par M. Shipp était le jaune, qui aura été changé en rouge par l'effet de l'acide cyanhydrique ou de la potasse. Les hyménoptères jaunes et

noirs subissent très souvent une semblable transformation de couleur, lorsqu'ils séjournent dans un flacon de chasse garni de cyanure de potassium.

#### V. micado P. Cameron.

Vespa micado P. Cameron, The Entomologist, XXXVI, 1903, p. 279.

Roux-fauve, la région ocellaire — le noir du front atteignant la plaque frontale et développé légèrement derrière les ocelles — le mésonotum, excepté deux lignes s'étendant depuis la base jusque un peu au delà du milieu, le sillon de l'écusson, la base et le centre du métanotum, la troncature basilaire du les segment, une ligne transversale interrompue près de son apex, noirs. Front densément couvert de longs poils noirs, la partie postérieure du vertex et le thorax densément recouverts de longs poils bruns. Ailes brun-violet, la côte noire, les nervures légèrement colorées, ç. — Long. 27 mill.

Habite : Le Japon, Nagazaki.

Clypeus couvert de points serrés, plus forts au-dessous du disque. l'apex avec une légère incision, large: les côtés légèrement arrondis. La plaque frontale presque aussi longue que sa largeur basilaire: elle devient graduellement étroite et arrondie à l'apex; la tache noire est incisée au milieu à sa base. Le clypeus et les mandibules ont une teinte jaunâtre, les dents des mandibules et l'apex noirs. Antennes colorées comme le corps, le scape d'une couleur légèrement plus foncée que le fouet. Tempes légèrement dilatées de la base à l'apex.

# TABLE ALPHABÉTIQUE DES ESPÈCES

Les noms précédés d'un 'appartiennent aux espèces qui me sont inconnues en nature.

var.), 600.

affinis F. [cineta F. var.], 534.

Alduini Guérin [cineta F. var.], 536.

americana Buyss, rufa L. var.), 592.

analis F. 514.

adulterina Buyss, norwegica F. annulata Sm. (bellicosa Sauss, var.), 600.

anomala Sauss. (dorylōides Sauss.). 616.

arborea Ross. (rufa F. var. austriaca Panz.). 589.

ardens Buyss. (velutina Lep. var.), 550.

arenaria L. (? diabolica Sauss.), 571.

auraria Sm., 551.

aurulenta Buyss, (orbata Buyss, var.), 579.

austriaca Panz. rufa L. var.), 589.

Barthelemyi Buyss., 618.

basalis Sm., 545.

bellicosa Sanss., 540.

bellona Sm. (magnifica Sm. var.), 525.

bicolor F. 544.

Binghami Buyss., 523.

Bivoi Buyss, parallela E. André, var. , 513.

\* bistriata Mac Farland, 622.

borealis Lewis, 594.

borealis Kirby (norwegica F.), 596. borealis Zett. (norwegica F.), 596.

carolina L. 574.

cineta F. 530.

citriventris Buyss. (auraria Sm. var.), 552.

communis Sauss., 606.

consobrina Sauss., 584.

erabro L., 501.

var.), 505.

crassa Herr.-Sch. (media Degeer), 565.

cuneata F. (carolina L.), 374.

deusta Lep., 528.

diabolica Sauss., 371.

doryloides Sauss., 616.

ducalis Sm., 517.

Dybowskii Edm. André, 324.

eulemoides Buyss., 530.

Fernaldi Lew. (diabolica Saussvar.), 573.

fervida Sm., 543.

flaviceps Sm. 'germanica F. var.', 614.

flavofasciata Cam. crabro L. var. crabroniformis Sm. var., 505. frontalis Latr. ? silvestris Scop., 600.

Fruhstorferi Stadel, (velutina Lep.), 548.

fusca Christ. (orientalis L.), 507.

Geerii Lep. (media Degeer), 565. germanica F., 609.

holsatica F. (silvestris Scop.), 600.

\* infernalis Sauss., 621.

insularis Dal.-Tor. 'parallela André', 511.

intermedia Buyss. (rufa L. var.), 591.

japonica Sauss., 581.

japonica Sm. (parallela André), 511.

japonica Rad. (mandarinia Sm.), 320.

\* Jurinei Sauss., 619.

koreensis Rad., 608

lama Buyss., 579.

\* luctuosa Sauss., 619.

luten Coque. (bicolor F.), 544.

Mac Farlandi Lewis (bistriata Mac F.), 622.

maculata L. 568.

magnifica Sm., 525.

mandarinia Sm., 520.

marginata Kirby (norwegica F. var.), 599.

media Degeer, 565.

\* micado Cam., 624.

Mocsaryana Buyss., 537.

mongolica Edm. André, 554.

nigrans Buyss., 527.

nigripennis Sauss., 620.

nigrithorax Buyss. (auraria Sm. var. , 553.

norwegica F., 595.

Oberthuri Buyss., 513.

obliterata Sm (basalis Sm.), 345. occidentalis Cresson (pensylvanica Sauss.), 645.

orbata Buyss., 578.

orientalis L. 507.

parallela Edm. André, 511.

pensylvanica Sauss., 615.

peruana Sauss. (norwegica F. var. marginata Kirby), 599.

philippinensis Sauss., 529.

picea Buyss. (cincta F. var.), 537. pilosella Costa (silvestris Scop. var.), 600.

pulchra Buyss. (ducalis Sm. var.), 549.

rufa L. 587

saxonica F. (norwegica F.), 596. scelesta Mac F. (consobrina Sauss.), 584.

Schrencki Rad., 583.

Semperi Buyss, (bellicosa Sauss, var.), 542.

sexcincta Panz. (? vulgaris L.), 603. sibirica Edm. André (rufa L. var.), 591.

silvestris Scop., 600.

simillima Sm. (auraria Sm. var.), 551. soror Buyss. (ducalis Sm. var.). 519.

squamosa Drury (carolina L.), 574. stizoides Buyss. (germanica F. var.), 615

structor Sm., 580.

sulphurea Sauss., 577.

sumptuosa Buyss. (silvestris Scop. var.), 603.

tartarea Buyss. (crabro L. var.), 506.

tenebrionis Christ. (cincta F.), 530. tenebrosa Buyss. (analis F. var.), 516.

tridentata Cam. (parallela André), 541.

tripunctata Schrenck (? silvestris Scop., ou media Degeer, ou norwegica F.).

turvica Drury (orientalis L.), 507. \* tyrannica Sm., 621.

unifusciata Oliv. (cineta F.), 530. \* unicolor Sm., 620.

variabilis Buyss., 522.

velutina Lep., 548.

vidua Sauss., 592.

vivax Sm., 547. vulgaris L. 603.

Walkeri Buyss., 539.

\* Westwoodi Shipp, 623.

xanthoptera Cam. (mongolica Edm. André), 554.

#### SUPPLÉMENT.

1º Depuis la publication de la première partie de ce travail, j'ai reçu en communication une importante collection provenant du Musée zoologique de l'Académie Impériale des Sciences de S'-Pétersbourg. J'adresse ici publiquement mes sincères remerciements à M. Nicolas von Adelung, directeur de ce Musée, car les Guèpes qu'il m'a soumises proviennent de localités les plus diverses de l'immense empire Russe, depuis les environs de S'-Pétersbourg, jusqu'à la Mandchourie et l'île Sakhaline. Je n'ai pu intercaler ces indications, c'est pourquoi je les ai réunies en supplément. Elles serviront à donner une idée exacte de la dispersion des Guèpes dans des régions dont on possède généralement peu de matériaux.

Vespa crabro L. — Bavière, Kissingen. Russie: Monts Ourals, Ekaterinbourg; gouvernement de Novgorod, montagnes de Voronia: gouv. de St-Pétersbourg, station de Preobrajenski, Peterhof (résidence Impériale); Bernovo; village de Lasévo, près de la station de Siversk: Raïvola, station du chemin de fer de Finlande; district de Grobine: Bodzentine, gouv. de Kieltzé; environs de Soum, gouv. de Kharkof: Crimée. Roslakovo, gouv. de Samarkand. Ile Sakhaline.

Var. craboniformis Sm. — Sibérie, Semipalatensk. Chine orientale, de Pékin à Mé-kh.

Vespa orientalis L. — Perse: Koouz, Mouzafyr, Namakzar Khoras: Gourmouk, entre la Perse, le Beloutchistan et l'Afganistan; Bareng. Nasratabad, Seistan; Kheïderabad, Mechkhed, Khorassan; Syrie, Jérusalem; Transcaucasie, Artwin; Transcaspienne, Askhabad; Samarkand; Afganistan; Chirabad, Bukharie du Sud.

Vespa parallela André. — Chine occidentale, Si-tchéou, Lu-ngan-fou, Khodsi-gou, 6.000 pieds (\$\vec{\varphi}\$, VII et VIII 1893".

Vespa ducalis Sm. - Chine occidentale, Gagnsou, Koïsiang.

Vespa mandarinia Sm. — Chine occidentale, Si-tchéou, Lu-ngan-fou. Khodsi-gou, 6.000 pieds (\$\phi\$, IV 1893 .

 $\it Vespa~variabilis$  Buyss. — Chine occidentale, Si-tchéou, Lu-nganfou, 6.000 pieds ( $\Breve{\varphi},$  VII et VIII, 1893 .

Vespa mongolica André. — Sibérie orientale, littoral, Sidémi, baie d'Oussouri du Sud; ile Sakhaline.

Vespa media Deg. - Russie : gouv. de Si-Pétersbourg. station de

Preobrajenski, Peterhof (résidence Impériale); village de Lasévo près de la station de Siversk: Schouvalovo, station du chemin de fer de Finlande; Levachovo, gouv. de S'-Pétersbourg. Sibérie, Semipalatensk; Vladivostok; Sidémi, baie d'Oussouri du Sud.

Vespa japonica Sauss. — Japon, Yokohama; Sibérie orientale, Sidémi, baie d'Oussouri du Sud.

Vespa Schrencki Rad. — Sibérie, Verkhneoulimsk (9, 30 VI 1891); ile Sakhaline.

Vespa rufa L. — Russie: gouv. de St-Pétersbourg; Bernovo: Seriojino, distr. de lambourg; village de Lasevo, près de la station de Siversk; Echouvalovo et Raïvola, stations du chemin de fer de Finlande: port d'Ekatérinine, gouv. de Kolsk; environs d'Arkangel: Korolevo, gouv. de Vitebsk; env. de Soum, gouv. de Karkof; station & Belbek, distr. de Sébastopol, Crimée. Sibérie, Semipalatensk; monts Ourals. Ekatérinbourg; Irkoutsk, Krasnojarsk.

- Var. austriaca Panz. Vladivostok. Russie: Kaïpolovo près de Gorskoï; Bernovo; gouv. de S'-Pétersbourg; Schouvalovo, station du chemin de fer de Finlande; port d'Ekatérinine, gouv. de Kolsk.
  - var. sibirica André. He Sakhaline.

Vespa norwegica F. — Russie: gouv. de Novgorod, montagnes de Voronia; gouv. de S'-Pétersbourg; Azérani. distr. de Rogatchef; Bernovo; Seriojino, distr. de Iambourg; village de Lasévo près de la station de Siversk; Schouvalovo, station du chemin de fer de Finlande; île Zaiatzki, archipel de Solowesk: Arkangel, bords de la Dvina; port d'Ekatérinine, gouv. de Kolsk; île d'Ekatérinine, baie de Kola; Koralevo, gouv. de Vitebsk; Serayschan, Bas Chara (Glasunov 4892). Sibérie Verkhneoulimsk: Aldanom: Krasnojarsk; Sibérie orientale, littoral, Sidémi, baie d'Oussouri du Sud. Mongolie. Ile Sakhaline.

- Var. adulterina Buyss. Mongolie (9, 7 VI 4894). Ile Sakhaline.
   Village de Lasevo, près de la station de Viterbsk, Russie.
- Var. marginata Kirby.
   Sibérie orientale, littoral, vallée du fleuve Sou tchan, baie d'Oussouri du sud. Kamtschatka (♀, 18 juin 1890. O. Herz).
   He Sakhaline.

Vespa silvestris Scop. — Russie: gouv. de Novgorod, montagnes de Voronia; distr. de Gdof, Khtiny; Seriojino, distr. de Iambourg; Schouvalovo et Raïvola, stations du chemin de fer de Finlande: Korolevo, gouv. de Vitebsk; Voltchikha, district de Gorbatoff. Transcaucasie, Borsham. Artwin; Turkestan, Tschinas, Artatok; Boucharie. Sibérie, Krasnojarsk; Semipalatensk; Gornizerentouï. Alta.

- Var. sumptuosa Buyss. - Bukharie, Charki.

Vespa vulgaris L. — Ile Sakhaline: Mongolie: Sibérie, Krasnojarsk; monts Ourals, Ekaterinbourg; Turkestan. Russie: gouv. de Novgorod. montagnes de Voronia; Bernovo; gouv. de S'-Pétersbourg; Seriojino. distr. de fambourg: Schouvalovo et Raïvola, stations du chemin de fer de Finlande; Levachovo, gouv. de S'-Pétersbourg: lac Onéga; port d'Ekatérinine, gouv. de Kolsk; gouv. d'Arkangel, rivière d'Emtza.

Vespa germanica F. — Russie: Bernovo; gouv. de St-Pétersbourg: Seriojino, distr. de Iambourg; village de Lasévo, près de la station de Siversk; Koralevo, gouv. de Vitebsk: Botzentine, gouv. de Kieltzé; Kozodoïeffka, distr. d'Ouchitsk, gouv. de Podol; environs de Soum. gouv. de Karkof; Crimée. Douroukh, Nekhbendan, Perse orientale; Perse, Keïdo abad: Mechkhed. Khorassan; Transcaspienne; Caucase septentrional; monts Ourals, Ekaterinbourg; Arvat; Askhabad; Bukharie; Tachkend, Keria (Przewaldsky 9.000 pieds), Scach-sara; Samarkand: Sibérie, Gornizerentouï, Altai; Krasnojarsk; Mongolie; ile Sakhaline.

- Var. flaviceps Sm. Japon, Ieso; Sibérie orientale, Sidémi, baie d'Oussouri du Sud.
- 2º M. Paul Serre, consul de France à Batavia, a eu l'amabilité de continuer ses recherches pour me procurer des nids de Vespides. Parmi les nombreux envois qu'il m'a faits, il se trouve une série de jeunes guépiers de Vespa analis F. les uns largement ouverts en forme de cloche, les autres plus ou moins globuleux ou piriformes avec une ouverture étroite. L'industrie de cette Guèpe est donc très variée. Un des guépiers a l'ouverture à l'extrémité d'un court goulot évasé, ce qui lui donne l'aspect d'une urne renversée. Un autre est complètement clos! Je me demande pour quel motif la jeune reine a bouché ainsi l'entrée de son nid. M. Serre pourra peut-ètre un jour nous en donner l'explication. En attendant je le prie de recevoir l'expression de ma vive gratitude. Son nom reviendra souvent sous ma plume lorsque j'écrirai l'histoire des Vespides de la Malaisie.
- 3º Le Muséum d'Histoire Naturelle de Paris a reçu de M. le D<sup>F</sup> J. Harmand, ministre plénipotentiaire de la France à Tokyo, deux autres nids de *Vespa mongolica* André. Ceux-ci sont de grande taille et bien plus complets que celui que j'ai décrit plus haut. Ils proviennent des environs de Tokyo. L'un est allongé, en carton gris clair, avec des feuillets complémentaires petits et très nombreux, entourant dix gàteaux; sa longueur est de 43 cent. et sa largeur de 28 cent. Le second Ann. Soc. Ent. Fr., txxii [1904].

est subsphérique, en carton couleur chocolat avec des zones blanchâtres. Il mesure 29 cent. de long sur 33 cent. dans sa plus grande largeur. Les particularités signalées plus haut se retrouvent sur ces grands guêpiers, qui sont installés dans les galeries de zoologie du Muséum de Paris; car, malgré leur grande fragilité, ces nids sont parvenus en état très satisfaisant. Je prie donc M. Harmand de croire à toute ma reconnaissance pour son précieux envoi.

## EXPLICATION DES PLANCHES.

## PLANCHE V

- Appareil copulateur du mâle de la Vespa doryloides Sauss., vu en dessus.
- 2. Le même vu de profil.
- Appareil copulateur du mâle de la Vespa Barthelemyi Buyss... vu de profil.
- 4. Le mème vu en dessus.
- 5. Clypeus et espace interantennaire de la Vespa magnifica Sm.
- 6. Clypeus et espace interantennaire de la Vespa nigrans Buyss.
- Cinquième et sixième sternites abdominaux du mâle de la Vespa bellicosa Sauss.
- 8. Jonetion de l'abdomen et du thorax de la Vespa cincta F.
  - a tergite du segment médiaire, vu de profil.
  - b sternite du segment médiaire, vu de profil.
  - c hanche postérieure droite.
  - d premier tergite abdominal, vu de profil, avec son stigmate droit.
  - On voit, en outre, le funicule supérieur et le funicule latéral droit qui relient l'abdomen au thorax.
- Extrémité de l'abdomen du mâle de la Vespa communis Sauss., vue de profil.
  - 7° t. Septième tergite vu de profil.
- Extrémité de l'abdomen du mâle de la Vespa vulgaris L. vue de profil.
  - 7º t. Septième tergite vu de profil.

#### PLANCHE VI

- Figure schématique de Γextrémité des crochets de l'appareil copulateur chez le mâle de la Vespa norwegica F, vue en dessus.
- 2. La même figure pour la Vespa carolina L. vue en dessus.
- 3. La même, vue de profil.
- 4. Figure schématique de l'extrémité des crochets de l'appareil copulateur chez le mâle de la Vespa diabolica Sauss., vue en dessus.
- Extrémité de la branche gauche du forceps vue de profil, chez le mâle de la Vespa borealis Sauss.
  - a lobe. b pointe inférieure de la branche du forceps.
- 6. Crochets de la même Guèpe, vus de profil.
- Extrémité des crochets du mâle de la Vespa consobrina Sauss., vus de profil.
- 8. Extrémité de l'aile de la Vespa sulphurea Sauss.
  - a 3º abscisse de la nervure cubitale, égale à la 4°.
  - b 4° abscisse de la nervure cubitale.
  - c 2º cellule cubitale.
  - d 3º cellule cubitale.
  - e Cellule radiale.
- 9. Extrémité de l'aile de la Vespa carolina L.
  - a 3º abscisse de la nervure cubitale, plus courte que la 4º.
  - b 4º abscisse de la nervure cubitale.
  - c 2º cellule cubitale.
  - d 3º cellule cubitale.
  - e Cellule radiale.

#### PLANCHE VII

- Figure schématique de l'extrémité des crochets de l'appareil copulateur chez le mâle de la Vespa basalis Sm., vue en dessus.
- 2. La même chose chez la Vespa bicolor F, vue en dessus.
- 3. La même chose chez la Vespa mocsaryana Buyss., vue en dessus.
- La même chose chez la Vespa magnifica Sm., moitié droite vue en dessus.
- 5. La même chose chez la Vespa crabro L. vue en dessous.

- 6. La même chose chez la Vespa crabro L. vue en dessus.
- 7. La même chose chez la Vespa maculata L. vue en dessus.
- 8. La même chose chez la Vespa consobrina Sauss., vue en dessus.
- 9. La même chose chez la Vespa media Degeer, vue de profil.

## PLANCHE VIII

- Branche droite du forceps du mâle de la Vespa germanica F. vue du côté de sa concavité.
  - a extrémité inférieure de la branche du forceps.
  - b lobe de la branche du forceps.
  - r r volsella.
  - 1.1 tenette.
- Branche gauche de la même Guêpe, vue du côté de sa convexité.
- 3. La même, vue du côté supérieur.
- 4. Crochets de la même Guêpe, vus en dessous.
- Extrémité des crochets du mâle de la Vespa vulgaris L. vue en dessous.
- 6. Crochets du mâle de la Vespa silvestris Scop., vus en dessus.
- 7. Les mêmes, vus en dessous.
- 8. Extrémité de la branche gauche du forceps de la même Guèpe, vue du côté de sa concavité.
- Extrémité de la branche gauche du forceps du mâle de la Vespa media Degeer, vue du côté de sa concavité.
- Extrémité de la branche droite du forceps du mâle de la Vespa rufa L. vue du côté supérieur.
- Extrémité de la branche droite du forceps du mâle de la Vespa rufa L. var. austriaca Panz., vue du côté supérieur.

## PLANCHE IX

 Figure schématique d'un nid très jeune de Vespa analis F. d'après une aquarelle faite sur place, à Java, par M. M. Maindron. L'enveloppe est simple et représentée en coupe; l'ouverture est au bas, un peu à droite. Le nid est fixé à une branche d'arbre.

- 2. Figure schématique d'un nid très jeune de Vespa analis F. L'enveloppe est simple, en forme de cloche, faite de matériaux de couleurs très vives et différentes, formant les zones indiquées par des pointillés. Le nid etait fixé à une pourrelle, sous l'avancement d'une toiture. Il a été récolté à Batavia par M. P. Serre, qui l'a offert au Muséum de Paris, 4904.
- Partie postérieure d'une larve de Vespa analis F, vue de profil, pour montrer les protubérances a a des segments 8 et 9, et les cornes b b du segment anal.
- 4. Segment anal vu de face; b b cornes protractiles; c fente anale.

#### PLANCHE X

- Figure schématique d'un jeune nid de Vespa media Degeer, fixé à une branche d'arbre. Il provient des environs de Paris.
- 2. Le même nid dont les trois enveloppes sont représentées en coupe.
- Figure schématique d'un jeune nid de Vespa maculata L. fixé à une branche d'arbre. Il provient du Maryland et a été offert au Muséum de Paris par M. l'abbé J. de Joannis, 4903.
- Le même nid dont les cinq enveloppes sont représentées en coupe.

## PLANCHE XI

Nid de Vespa crabro L. dans le tronc creux d'un hêtre. Les gâteaux sont sans enveloppes. Fontainebleau: Croisette Desnoyers 1888, Muséum de Paris.

#### PLANCHE XII

Nid aérien de Vespa crabro L. La base a été brisée par suite de la fragilité du carton. (Environs de Paris; Muséum de Paris.)

# PLANCHE XIII

Nid aérien de Vespa cincta F. var. affinis F. Quelques parties de l'enveloppe externe ont été brisées pendant le voyage. (Presqu'île de Malacca, Pénang; leg. J. Claine 1891, Muséum de Paris.)

#### PLANCHE XIV

- Fig. 4. Nid aérien de la Vespa mongolica André, vu par dessous. Les gâteaux que l'on voit, sont exclusivement composés d'alvéoles consacrés à l'élevage des femelles et des mâles. (Japon, environs de Tokyo; leg. D<sup>e</sup> J. Harmand 1901, Muséum de Paris.)
- Fig. 2. Nid aérien de *Vespa media* Degeer. Il est fixé à une branche de tilleul. On voit en bas, un peu de côté, l'entrée du nid. (*Environs de Paris*; *Muséam de Paris*.)

#### PLANCHE XV

- Fig. 1. Nid de Vespa germanica F. établi dans une hausse de ruche (Rucher de Montsouris; A.-L. Clément 1898, Muséum de Paris.)
- Fig. 2. Nid aérien de Vespa germanica vu en dessous. On distingue dans le bas l'entrée du nid, qui est large et laisse apercevoir quelques alvéoles des derniers gâteaux. (Environs de Paris; Muséum de Paris.)

# GENERA ET CATALOGUE DES PSÉLAPHIDES

par Ach. RAFFRAY (1).

#### ADDENDA

La pagination indiquée est celle qui est entre parenthèses.

Page 57, après le tableau du genre **Euplectus**, ajouler les notes suivantes :

Euplectus Easternbrookianus Leach, Vig. Zool. Journ. II, 1825. p. 445. (Angleterre).

Cette espèce est si brièvement caractérisée par l'auteur, qu'il est impossible de rien préciser sans avoir vu les types. Elle est certainement connue sous un autre nom, mais je ne sache pas que l'identification en ait jamais été faite.

Euplectus guatemalenus Sharp, Biol. Centr. Amer. II (4), 1887, p. 36. (Guatemala).

L'auteur dit que cette espèce est voisine de *E. signatus* Reichb., mais je ne serais pas surpris qu'elle dût rentrer dans le Groupe X. à côté de mes *E. illepidus et honestus*.

Page 69, ligne 15. ajouter : Amérique septentrionale.

- 70, Avant le genre MIRELLUS ajouter :

#### MORIES

Caser, Col. Not. V, 1893, p. 445.

occidens Cas. loc. cit. p. 446 . . . . . . . . . . . . Californie.

Page 106, ligne 27, après : Cette espèce est, ajouter : avec la suivante.

- 198. 28. après : Nunq. ot. ajouter : p. 285.
- 280, après la ligne 2, ajouter la description suivante :

Reichenbachia infossa n. sp. — Oblonga, sat convexa, castanea, antennis pedibusque testaveis, brevissime, sat dense pubescens. Caput elongato-quadratum, supra antennas minute nodosum, fronte

<sup>(1)</sup> Voyez Ann. Soc. ent. Fr. 1903, p. 484: 1904, p. 1.

medio late foveata, foveis duabus validis inter oculos. Antennae breves et graciles, articulis cylindricis, 3-6 latitudine sua vix dimidio longioribus, 7 fere quadrato, 8 minuto, paululum transverso, 9 et 10 quadratis, 10 vix majore, 11 multo majore, regulariter ovato-acuminato. Prothorax latus, fere transversus, lateribus valde rotundatus, foveis lateralibus validis, rotundatis et a latere distantibus, media punctiformi, profunda, basi punctulata. Elytra obsolete punctulata, subquadrato-elongata, humeris notatis, stria dorsali subintegra, leviter sinuata, apice perparum extuscurvata. Metasternum parum concavum. Segmentis ventralibus, 2 (primo apparente) basi transversim impresso et dense ciliato, medio deplanato et longe pubescente, ultimo late subtransversim impresso. Femoribus crassis, trochanteribus intermediis basi minute dentatis, tibiis apice acute calcaratis, posticis leviter incurvis et apice breviter calcaratis 5. — Long. 1.30 mill.

#### Sumatra: Palembang.

La massue antennaire n'est réellement composée que du dernier article. L'espèce est très voisine de *R. intuscurvata* Schauf., mais les antennes sont un peu plus longues, le prothorax est beaucoup plus large, la strie dorsale est légèrement recourbée en dehors : elle diffère de *R. Schaufussi* Reitt., du même groupe et du même pays par le  $40^{\circ}$  article des antennes à peine plus gros que le  $9^{\circ}$  et l'abdomen chez les  $\circlearrowleft$ . — Elle fait partie du Groupe VII.

Page 336, ligne 30, après : **crassicornis** n. sp. ajouter : Brésil : Theresopolis.

- 368, 6, après : **Isidorae** et cit. ajouter : Australie : Sydney, Melbourne, Victoria.
- 368, 23, après : **conjuncta** et cit. ajouter : Amérique septentrionale.
- 394, 30. avant la citation. ajouter : Peyerimnoff.
- 403, 12. après : Var. fluctuosa et cit. ajouter : Circassie.
- 407, 19, après la citation, ajouter : Allemagne.
- 407, 36, après la citation, ajouter : Patr. inc.
- 409, 35, après la citation, ajouter : Portugal.
- 444, après le tableau du genre Tyraphus, ajouter la description suivante :

Tyraphus vestitus n. sp. — Elongatus, subdeplanatus et subparalletus, castaneus, elytris fulvis, totus sat dense flavo-pubescens. Caput subdeplanatum, inter oculos fovea magna posterius producta, anterius sulco parum profundo et angusto. Antennae crassae, articulis 1 magno, 2 paulo angustiore, subquadrato, caeteris moniliformibus, 3-6 transversis, 7-8 paulo majoribus, multo minus transversis, 9-10 similibus sed paulo majoribus, 11 subgloboso, attamen leviter acuminato. Prothorax ovatus, utvinque fovea minuta, obsoleta et sulco transverso arcuato profundo. Elytra subquadrato-elongata, basi leviter attenuata, lateribus obliquis, humeris rotundatis, stria dorsali integra, arcuata. Abdomen elytris brevius, segmento primo dorsali magno, leviter convexo. Metasternum convexum, apice declive. Pedes, breves, crassi. — Long. 4.70 mill.

Sumatra nord.

Cette espèce est, par sa pubescence et son facies, très voisine de T. pilosus Raffr., du Tonkin, mais les articles 7-10 des antennes sont plus gros, moins transversaux, plus globuleux; la massue, peu tranchée d'ailleurs, est formée par les cinq derniers articles.

Page 471. après la ligne 30, ajouter :

Semenowi Reitter, Wien. Ent. Zeit. 1891, p. 196. Neu-Margelan.

Page 479, ligne 9, après : parvipalpis Raffray et citations, ajouter en synonymie :

Pici Croiss, Ann. Soc. ent. Fr. 1894, р. 106. — ВЕДЕL.
 Bull. Soc. ent. Fr. 1894, р. с.

**—** 483.

après la ligne 8, ajouter :

#### NARCODES

King, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales, I, 1863, p. 38. Edocranes Reitter.

1

483, ligne 6, après : deux ongles, ajouter : inégaux.

- = 307, = 32, après : 8 leriter transverso, ajouter : 9 majore, transverso.
- 507. 35. après : rotundato, ajouter .: infra.
- 548. 5, après la citation, ajouter : Californie.

#### DELENDA ET CORRIGENDA

- Page 8, lignes 6, 7 et 10, au lieu de : articles, lire : ongles.
  - 8. 14, au lieu de : après, lire : auprès.
  - 24. 21. au lieu de : p. 9, lire : pl. 9.
- 28, 13, au lieu de : aequali, lire : aequalis.
- 34, 6, au lieu de : elongata, lire : elongatus.
- 44. 6, au lieu de : arrondis ou orbiculaires, lire : arrondis, ou orbiculaire.
- 50. 14, au lieu de : Eleusomatus Raffray, lire : Eleusomatus n. gen.
- = 83. 4, an lieu de : trichonyformis, lire : trichonychiformis.
- 89. 31, au lieu de : difficillis, lire : difficilis.
- 95. 2, an tien de : Afr. occidal : Côte-d'Or, lire : Afr. occ<sup>ale</sup> : Côte de l'Or.
- 97. 23. an lieu de : Côte-d'Or : Addati, lire : Côte de l'Or : Addah.
- 414. 5, au lieu de : Euphratae, lire : Ephratae.
- 414. 18, homatiinus (Amauronyx) Fauv., appartient au genre Physoplectus Reitt. (pp. 234 et 338), de la tribu Brachyglutini.
- 417. 3, supprimer : **abdominalis** n. sp..... Brésil : Blumenau.
- 128. 25, au lieu de : Adiastulus Raffray, lire : Adiastulus n. gen.
- 137, 29, au lieu de : longitudine, lire : latitudine.
- 165, 32, an lieu de : angustius, lire : angustiore.
- 165, 33, au lieu de : brevius, lire : breviore.
- 207, 48, an lieu de : tuberculosus, lire : tuberculátus.
- 242. 15, au lieu de : Oberthüri n. sp., lire : incertus
  n. sp. (voy. p. 160).

- Page 222, ligne 22, an lieu de : 193, lire : 1893.
- 229. 27. au tieu de : distinctes, lire : distantes.
- 237, 15, au lieu de : Bryaxina, lire : Baraxina.
- = 237, = 23, an lieu de : Ryxabis, lire : Rybaxis
- 245, 28, au lieu de : ante, lire : antice.
- 261, la fig. 55 a été renversée à l'impression.
- 274. ligne 20, au tieu de : plus de 300, lire : près de 300.
- 276. 23, au lieu de : normaux, lire : anormaux
- 307. 24. au lieu de : spinosus, lire : spinosum.
- 311, 45, au lieu de : apicem, lire : medium
- 330, 40, au lieu de : clavicornis, lire : cavicornis.
- = 332. 27, an lieu de : xibaroides, lire : xybaridoides.
- 362, 46, au lieu de : GROUPE, lire : Groupe.
- 362. 31, supprimer: subfoveolata et citations.
- 369, 8, an lieu de : 180, lire : 1880.
- 376, 38, an lien de: Tychobythus, live: Tychobythinus.
- 395,
   22, an lieu de : PSELAPTRICUS, lire : PSELAPTRI-CHUS.
- 423 et 424, Anagonus fracticornis Fauv, ne fait pas partie de la tribu des Goniacerini, et devra prendre place dans celle des Tyrini, près du genre Leanymus Raffr. (pp. 484 et 342).
- 432, ligne 18, an lieu de : humatum, lire : hamatum.
- 439. 13, an lieu de : Pselaphopterus, lire : Pselaphoptrus.
- 465, 35, au tien de : arrondi; en arrière des yeux, lire : arrondi en arrière des yeux.
- 474. 6. au lieu de : Natal : Salisbury, lire : Natal : Frere. Rhodesia : Salisbury.
- 479. 44, supprimer : abyssinica n. sp.... Abyssinie : W Aladjië.
- 490, 37, an lieu de : Homatopsis, lire : Hamotopsis.

- Page 490, ligne 31, an lieu de : Horniella Raffray, lire : Horniella nom. nov.
- 491, 23, au lieu de : Sub. lire : Subg.
  - 507, 36, après : excavato, supprimer : supra.
- 515. 10. au lieu de : vesiculifer n. sp., lire : vesiculifer Raffray.
- 535. 31. an lieu de : punctatus n. sp., lire : punctatus nom. nov.
- 536, 24, au lieu de : puberulus n. sp., lire : puberulus nom. nov.
- 542, 14, au lieu de : CEOPHILLUS, lire : CEOPHYLLUS.
- 555, 45. supprimer : **sumatrensis** n. sp.... Sumatra : Palembang.

# TABLE GÉNÉRIQUE

### DES

#### PSELAPHIDAE

La pagination indiquée est celle entre parenthèses. Les synonymies sont en caractères italiques.

Abascantus Schauf. 489, 554.

Abatrisops Reitt. 337.

Abryris Raffr. 329.

Acamaldes Reitt. 236, 347.

Acetalius Sharp, 375.

Achillia Reitt. 234, 255, 334.

? Acmaeonotus Motsch. 593.

Acolonia Cas. 46, 93.

Acotreba Reitt. 36, 68.

Acrocomus Raffr. 378, 420.

Actiastes Cas. 75.

Actionoma Raffr. 40, 77.

Actium Cas. 40, 51, 75.

Acylopselaphus Raffr. 484, 541.

Adalmus Reitt. 105, 120.
Adiastulus Raffr. 128, 161, 212.
Adranes Lec. 569, 584.
Adrocerus Raffr. 424, 425.
Adrogaster Raffr. 42, 81.
Aloxomidus Raffr. 40, 80.
Amana Raffr. 129, 213.
Amauronyx Reitt. 103, 113.
Amaurops Fairm. 125, 136, 188.
Amblycerus Raffr. 567, 582.
Amicrops Saulcy, 190.
Aminosimus Raffr. 49, 101.
Amudrocerus Raffr. 42, 80.
Anaclasiger Raffr. 566, 579.

Anagonus Fauv. 423, 424. Anarmodius Raffr. 104, 117. Anarmoxys Raffr. 234, 337. Anasis Raffr. 237, 365. Anasopsis Raffr. 237, 300, 366. Anchylarthron Brend. 232, 331. Ancystrocerus Raffr. 486, 548. Anitra Cas. 456, 472. Anoplectus Raffr. 46, 97. Anops Brend. 490. Apharina Reitt. 430, 436. Apharinodes Raffr. 431, 436. Apharus Reitt. 491, 555. Aphilia Reitt. 39, 72. Aphiliops Reitt. 38, 70. Aplodea Reitt, 551. Aploderina Raffr. 490, 507, 555. Apobatrisus Raffr. 129, 213. Apoderiger Wasm. 568, 583. Apoplectus Raffr. 379, 422. Aporhexius Raffr. 104, 410, 417. Apoterus Raffr. 37, 70. Apothinus Sharp, 36, 68. Arachis Raffr. 230, 319. Arcopagus Leach, 396. Arctophysis Reitt. 25, 30. Arhytodes Reitt, 563, 565. Arhytodini Raffr. 8, 563, 565. Arianops Brend, 125, 490. Arnyllium Reitt, 134, 485, 225. Arthmius Lec. 125, 490. Arthmius (Lec. Raffr.) 425, 437, 192. Articerodes Raffr. 570, 586. Articeronomus Raffr. 570, 585. Articeropsis Wasm, 569, 585. Articerus Dalm. 566, 575, 580. Asymoplectus Raffr. 44, 83. Atenisodus Raffr. 230, 242, 322. Atherocolpus Raffr. 546. Atheropterus Raffr. 131, 222.

Atinus Horn, 456, 470. Atychodea Reitt, 377, 418. Aulaxus Raffr. 38, 70. Autoplectus Baffr, 37, 69, Balega Reitt. 26, 34. Barada Raffr. 238, 374. Baraxina Raffr. (vid. Bryaxina), 237, 366. Basolum Cas. 38, 70. Batoctenus Sharp, 128, 212. Batoxyla Raffr. 131, 223. Batraxis Reitt. 230, 238, 319. Batribolbus Raffr. 433, 481, 223. Batriplica Raffr. 124, 188. Batrisiella Raffr. 432, 180, 223. Batrisini Raffr. 7, 122, 186. Batrisinus Raffr. 434, 222. Batrisobryaxis Schauf. 420. Batrisocenus Raffr. 130, 461, 214. Batrisodema Raffr. 123, 187. Batrisodes Reitt. 427, 144, 201. Batrisodes Raffr. 214. Batrisomalus Raffr. 433, 481, 224. Batrisomina Raffr. 131, 222. Batrisomorpha Raffr. 319. Batrisophyma Raffr. 127, 211. Batrisoplatus Raffr. 124, 488. Batrisopsis Raffr. 132, 223. Batrisoschema Raffr. 122, 186. Batrisus Aubé, 127, 200. Batrybraxis Reitt. 378, 421. Berdura Reitt, 231, 323. Bergrothia Reitt, 190. Bergrothiella Reitt. 125, 190. Berlara Reitt. 231, 323. Biblomimus Raffr. 46, 62, 95. Bibloplectus Reitt. 46, 96. Bibloporus Thoms. 46, 95. Biotus Cas. 456, 470. Bironia Raffr. 574, 589. Bolbobythus Raffr. 376, 410.

Borneana Schauf, 133, 224. Brabaxis Raffr, 323. Brachygluta Thoms, 236, 271 339.

Brachyglutini (sub. Bryaxini)
Raffr. 7, 229, 319.
Braunsiella Raffr. 574, 589.
Braxyda Raffr. 234, 266, 337.
Briara Reitt. 234, 337.
Briaraxis Brend. 234, 334.
Brounia Raffr. 401.
Brouniella (sub Brounia) Raffr. 49, 101.
Bryaxella Raffr. 233, 333.
Bryaxina Raffr. 234, 261, 262, 336.

336. Bryaxina (leg. Baraxina), 237. Bryaxini Raffr. 229, 319. Bryaxis Kugel. 376, 380, 395. Bruaris Aubé, 339. Bruaxis auct. 348. Bryaxis Leach, 367. Bryaxonoma Raffr. 235, 338. Bunoderus Raffr. 236, 272, 347. Byraxis Reitt. 231, 328. Byraxis Reitt. 323. Byraxis Raffr. 334. Bythinini Raffr. 392. Bythinoderes Reitt. 377, 418. Bythinogaster Schauf, 230, 322. Bythinomorpha Schauf. 419. Bythinophanax Reitt. 377, 418. Bythinoplectus Reitt. 18, 24. Bythinus Leach, 395. Bythinus auct, 410. Bythoxenus Motsch, 376, 393. Caccoplectus Sharp, 437, 438. Calarus Raffr. 40, 80.

Camaldus Fairm, 538.

Canthoderus Motsch, 34.

Capnites Raffr. 43, 82.

Cedius Lec. 485, 542. Centrophthalmosis Raffr. 484, 497, 541.

Centrophthalmus Schmidt, 484, 493, 538.

Centrotoma Heyden, 457, 472. Ceophyllus Lec. 484, 542. Cercoceroides Raffr. 492, 530.

501. Cercoceropsis Raffr. 491, 508, 556. Cercocerulus Raffr. 492, 532, 561.

Cercocerus Lec. 494, 556. Ceroderma Raffr. 123, 187.

Chaetorhopalus Raffr. 39, 72. Chenniopsis Raffr. 456, 459, 472. Chennium Latr. 456, 471.

Clavifer Lap. 589.

Claviger Preyssl. 574, 578, 589. CLAVIGERINI Raffr. 5, 565. 579.

Clavigèrodes Raffr. 573, 587. Clavigeropsis Raffr. 574, 589. Cliarthrus Raffr. 126, 499. Comatopselaphus, 230, 322. Commatoceronus Wasm. 582. Commatocerodes Péring. 573, 587.

Commatoceropsis Raffr. 569, 584. Commatocerus Raffr. 567, 582. Connodontus Raffr. 124, 188. Conoplectus Brend. 413. Cratna Raffr. 130, 222. Cryptorhinula Schauf. 233, 332.

Ctenicellus Raffr. 458, 465, 478. Ctenisis Raffr. 458, 479. Ctenisodes Raffr. 458, 478.

Ctenisomimus Raffr. 457, 462, 475.

Ctenisomorphus Raffr. 437, 473.
- Ctenisophus Raffr. 438, 463, 477.
Ctenistes Reichenb. 437, 460, 473.

Ctenistini Raffr. 8, 436, 470. Ctenotillus Raffr. 484, 542. Cupila Cas. 39, 71. Curculionellus Westw. 439, 443, 453.

Cyathiger King, 425, 426, 428. Cyathigerini Raffr. 7, 425, 428. Cylindrarctus Schauf, 377, 417. Culindrembolus Schauf, 329. Cylindroma Raffr. 130, 214. Dalma Sharp, 48, 99. Dalmina Raffr. 405, 120. Dalmisus Sharp, 49, 99. Dalmodes Reitt. 378, 420. Dalmophysis Raffr. 378, 421. Dalmoplectus Raffr. 38, 71. Dalmosella Cas. 77. Decarthron Brend. 237, 306, 371. Decatocerus Saulcy, 375, 393. Delenda Croiss, 40, 47. Deroplectus Raffr. 50, 102. Desimia Reitt. 458, 467, 478. Diaposis Raffr. 124, 159, 212. Diarrogus Raffr. 43, 82. Diartiger Sharp, 570, 585. Diastictulus (sub. Singhala) Raffr. 45, 94. Diaugis Raffr. 124, 135, 187.

Dicrobia Thoms. 348.
Didymoprora Raffr. 487, 549.
Dionyx Serv. 473.
Diroptrus Motsch. 230, 321.
Disarthicerus Raffr. 366, 579.
Drasinus Raffr. 235, 269, 338.
Duciota Reitt. 34.
Durbos Sharp. 489, 552.
Eccoptobythus Dev. 376, 392.
Ectopocerus Raffr. 235, 270, 339.

Edocranes Reitt. 600. Elasmatus Raffr. 566, 581.

Dicentrius Reitt. 438, 452.

Eleusomatus Raffr. 50, 65, 403.
Enantius Schauf. 483, 538.
Endytocera Sharp, 26, 35.
Enoptostomus Schaum. 458, 467, 480.
Ephimia Reitt. 431, 437.
Ephymata Raffr. 236, 270, 339.
Epicaris Reitt. 459, 482.
Epicaris Schauf. 555.
Epiplectus Raffr. 48, 100.
Epithematus Raffr. 47, 98.
Eremonus Raffr. 236, 298, 365.

Eubatrisus Raffr. 432, 223. Eudranes Sharp, 492, 562. Euglyptus Broun, 36, 67.

Eulasinus Sharp, 485, 546. Euphalepsus Reitt, 134, 482, 224.

Eupinopsis Raffr. 232, 331.

Eupines King, 231, 323. Eupines s. str. Raffr. 231, 243,

Eupines s. str. Raffr. 231, 243, 323. Eupinoda Raffr. 233, 333.

Euplectina Raffr. 43, 82.

Euplectini Raffr. 6, 35, 66.

Euplectodina Raffr. 39, 71.

Euplectomorphus Motsch. 48 24.

Euplectops Reitt. 49, 401.

Euplectopsis Raffr. 44, 82. Euplectus Leach, 44, 56, 84. Euplectus s. str. Raffr. 85.

Eupsenius Lec. 238, 374. Eurhexius Sharp. 404, 403, 416.

Eusonoma Reitt, 17. Euteleia Raffr, 237, 304, 370. Eutrichites Lec. 232, 334.

Eutyphlus Lec. 48, 99. Exallus Raffr. 426, 139, 199.

Exedrus Raffr. 426, 499. Exeirarthra Broun, 9, 40, 42.

Facetus Schauf, 393. Faliscus Cas. 95. Faronidius Cas. 9, 12. Faronini Raffr. 6, 9, 12. Faronoma Raffr. 105, 120. Faronus Aubé, 9, 42. Filiger Schauf, 430, 435. Fusifer Raffr. 572, 588. Fustiger Brend, 568, 582. Fustigerodes Reitt. 570, 585. Fustigeropsis Raffr. 574, 586. Gabata Raffr. 44. 92. Gamba Schauf. 31. Gasola Reitt. 31. Gastrobothrus Broun, 236, 365. Gerallus Sharp, 489, 507, 552. Glapharsenus Raffr. 422. Glastus Raffr. 45, 94. Globa Raffr. 234, 322. Glyphobythus Raffr. 376, 395. ? Glyptosoma Mots. 595. Gnesion Raffr. 378, 421. Golasa Raffr. 40, 44, 46. Gonatocerus Schauf, 337. Goniacerini Raffr. 7, 423, 424. Goniacerus Motsch. 423, 425. Goniastes. Westw. 424, 425 Hadrophorus Fairm, 568, 583. Hamotoides Schauf. 491, 526, 559. Hamotopsis Raffr. (vid. Homatopsis), 490, 555. Hamotulus Schauf, 489, 553. Hamotus Aubé. 494, 509, 556. Hamotus, s. str. Raffr. 491, 509,

Harmonima Raffr. 378, 390, 449. Harmophola Raffr. 378, 449. Harmophorus Schauf. 378, 421. Heteronyx Saulcy, 414. Hologlyptus Fairm. 438. Holozodini Raffr. 8, 437, 438. Holozodus Fairm. 437, 438. Homatopsis (leg. Hamotopsis), 490. Hornia Raffr. 555. Horniella (sub Hornia) Raffr. 490. 555.

Hybocephalini Raffr. 8, 430. Hybocephalus Motsch, 437. Hybocephalus Reitt. 430, 435. Hubocephalus Schauf, 435. Hypochraeus Raffr. 423, 434, 487, Imerina Raffr. 572, 588. Intempus Reitt. 36, 67. Itamus Raffr. 238, 317, 374. Iteticus Raffr. 426, 440, 499. Jubini Raffr. 6, 24, 30. Jubomorphus Raffr. 25, 30. Jubus Schauf. 25, 26, 31. Kunzea Leach, 396. Labomimus Sharp, 485, 546. Laphidioderus Raffr. 458, 480. Lasinus Sharp. 486, 546. Leanymus Raffr. 484, 542. Lethenomus Raffr. 487, 550. Limoniates Raffr. 40, 75. Linderia Saulcy, 376, 394. Lioplectus Raffr. 47, 98. Listriophorus Schauf. 423, 425. Machaerites Mill. 376, 393. Machaerodes Brend. 377, 414. Macroplectus Raffr. 46. 94. Macta Raffr. 25, 30. Marellus Motsch, 487, 549. Margaris Schauf, 439, 453. Marnar Lap. 228. Mastiger Motsch. 566, 579. Mechanicus Schauf, 36, 66. ? Mecochelia Motsch. 595. Megarafonus Cas. 40, 17. Melba Cas. 41, 52, 77. Meliceria Raffr. 45, 93. Mentraphus Sharp, 439, 455.

Mesoplatus Raffr. 104, 117.

? Metaxis Motsch, 595. Metaxoides Schauf, 430, 435. Methorius Raffr. 43, 54, 82. Metopias Gory, 227, 228. Metopiini Raffr. 7, 227, 228. Metopioides Schauf, 425. Metopioxys Reitt, 227, 228. Microplectus Raffr. 48, 100. Microtyrus Broun, 67. Mina Raffr. 132, 223. Mirellus Raffr, 37, 70. Miroclaviger Wasm. 572, 587. Mirus Saulcy, 35, 66. Mitona Raffr. 232, 250, 332 Mitracephala Raffr. 105, 421. Morana Sharp. 226. Morius Cas. 37, 597. Namunia Reitt. 133, 224. Narcodes King, 459, 600 Nedarassus Raffr. 379, 422. Nenemeca Raffr. 127, 158, 211. Neocerus Wasm. 567, 582. Neodalmus Raffr. 38, 71. Neodeuterus Schauf, 35, 66. Neophamisus Reitt, 560. Neotyrus Raffr. 488, 550. Nicothaeus Cas. (leg. Nicotheus), 99. Nisa Cas. 339. Nisaxys Cas. (leg. Nisaxis), 233, 334. Nodulina Raffr. 236, 274, 347. Novoclariger Wasm. 585. Novofustiger Wasm. 568, 584. Obricala Raffr. 230, 319. Octomicrus Schauf, 46, 94, Odontalgus Raffr. 459, 468, 482. Ogmocerus Raffr. 423, 424. Omotimus Raffr. 41, 51, 77. Ophelius Raffr. 430, 457, 211. Oropodes Cas. 43, 82. Ann. Soc. Ent. Fr., LXXIII [1904].

Mestogaster Schmidt, 430, 334.

Oropus Cas. 104, 114. Oxarthrius Reitt. 125, 198. Oxyomera Raffr. 128, 212. Palimbolus Raffr. 487, 550. Panaphantus Kiesw. 36, 69. Panaphysis Reitt. 123, 187 Paraplectus Raffr. 49, 102. Parminaplus Broun, 342. Patranus Raffr. 323 Paussiger Wasm. 573, 587. Pedinopsis Raffr. 235, 338. Periplectus Raffr. 43, 81. Phalepsoides Raffr. 134, 225. Phalepsus Westw. 493, 563. Phalespoides Raffr. 225. Phalespus Raffr. 563. Phamisulus Reitt. 491, 560. Phamisus Aubé, 26, 34. Phamisus Schauf, 560. Philiopsis Raffr. 42, 80. Philus Sauley, 70 Phoberus Raffr. 236, 297, 365. Phtegnomus Raffr. 105, 121 Phtartomicrus Schauf. 35, 66. Physa Raffr. 237, 366. Physoplectus Reitt. 234, 338. Pilopius Cas. 475. Placodium Broun, 37, 69. Plagiophorus Motsch. 226. Plectomorphus Raffr. 48, 101. Plectophloeus Reitt. 56, 84. Plectusodes Raffr. 47, 98. Podus Raffr. 128, 212. Poroderus Sharp, 459, 481 Probatrisus Raffr. 129, 213. Prodalma Raffr. 42, 81. Prophilus Raffr. 38, 71. Proplectus Raffr. 75. Prorherius Raffr. 115. Prosagola Raffr. 10, 11, 16. Proterus Raffr. 36, 67. 12

Protoplectus Raffr. 47, 98.

Pselaphini Raffr. 7, 438, 445.

Pselaphini brachyscelidae Raffr. 5, 6.

Pselaphini gennini Raffr.

PSELAPHINI genuini Raffr. 4, 5.

Pselaphini macroscelidae Raffr. 5, 7.

Pselaphischnus Raffr. 438, 452. Pselaphocerus Raffr. 485, 543. Pselaphodes Westw. 485, 546. Pselaphodes Raffr. 547. Pselaphomorphus Motsch. 25, 30. Pselaphophus Raffr. 439, 452.

Pselaphopterus (leg. Pselaphoptrus), 439.

Pselaphoptrus Raffr. 439, 453. Pselaphoxys Raffr. 439, 452. Pselaphus Herbst, 438, 439, 445. Pselaptrichus Brend. 376, 395. Pselaptricus Brend. (leg. Pselatri-

chus), 395.

Pselaptus Lec. 232, 330. Pseudacerus Raffr, 575, 592. Pseudapharina Raffr, 430, 436. Pseudofustiger Reitt, 568, 584. Pseudohamotus Raffr, 491,530,560. Pseudophanias Raffr, 493, 532, 533,

Pseudoplectus Reitt. 47, 98.
Pseudoterus Raffr. 36, 68.
Pseudotrimium Raffr. 39, 72.
Pseudotychus Raffr. 492, 562.
Pseudotyrus Raffr. 547.
Psilocephalus Raffr. 439, 455.
Pteracmes Raffr. 48, 100.
Pteroplectus Raffr. 47, 97.
Pycnoplectus Cas. 37, 89.
Pycnoplectus Cas. 84.
Pygoxyon Reitt. 36, 67.
Pytna Cas. 547.

Pyxidicerini Raffr. 6, 17, 21.
Pyxidicerus Motsch. 47, 48, 21.
Rabyxis Raffr. 233, 333.
Radama Raffr. 571, 588.
Radamellus Raffr. 571, 577, 588.
Radamides Wasm. 572, 588.
Raffrayia Reitt. 404, 411, 418.
Rafonus Cas. 46.
Ramecia Cas. 47, 98.
Ranavala Raffr. 37, 69.
Raphitreus Sharp, 485, 545.
Reichenbachia Leach, 236, 274.
347.
Reitteronymus Raffr. 82.

(609)

Reitteronymus Raffr. 82.
Rhexidius Cas. 404, 415.
Rhexinia Raffr. 404, 417.
Rhexius Lec. 403, 415.
Rhinoscepsis Lec. 37, 69.
Rhinosceptis C. Schauf. 69.
Rhynchoclaviger Wasm. 569, 584.
Rhytus Westw. 565.
Rybaxis Sauley vid. Ryxabis).

Ryhaxis (Sauley vid. Ryxabis), 237, 300, 366. Rytus King, 492, 532, 561.

Ryxabis (leg. Rybaxis , 237, Ryxabis Westw. 493, 562.

Sagola Sharp, 9, 10, 13.
Sagolonus Raffr. 49, 104.

Salagosa Raffr. 10, 11, 16. Sampsa Raffr. 45, 94.

Sathytes Westw. 134, 226. Saulcyella Reitt. 38, 70.

Scalenarthrus Lec. 231, 246, 329. Schaufussia Raffr. 489, 552.

Schistodaetylini Raffr. 8, 563. Schistodaetylus Raffr. 563.

Scotoplectus Reitt. 44, 84. Sebaga Raffr. 25, 34.

Semiclaviger Wasm. 575, 592.

Simplona Cas. 39, 72.

Simus Raffr. 423, 424.

Singhala Raffr. 94. Sintectes Westw. 543. Sintectodes Reitt, 485, 543. Sognorus Reitt. 457, 462, 475. Somatipion Schauf. 483, 538. Sonoma Cas. 40, 46. Spilorhombus Raffr. 487, 550. Startes Broun, 237, 366. Stenoplectus Raffr. 42, 81. Stictus, Raffr. 128, 211. Stipesa Sharp, 431, 437. Stratus Schauf, 26, 34. Strombopsis Raffr. 223, 254, 333. Subulipalpus Schauf, 486, 548. Sunorfa Raffr. 378, 419. Syrbatus Reitt. 125, 136, 191. Surbatus Reitt. 214. Syrmocerus Raffr, 125, 198. Syrraphesina Raffr. 573, 587. Tanypleurus Raffr. 379, 422. Taphrophorus Schauf. 482. Taphrostethus Schauf, 490, 555. Tetracis Sharp, 478. Theocerus Raffr. 567, 582. Thesiastes Cas. 45, 60, 92. Thesium Cas. 68. Thysdarius Fairm, 571, 586. Thysdrus Fairm, 586. Tmesiphorus Lec. 485, 498, 543. Tomoplectus Raffr. 49, 101. Trabisus Raffr. 129, 212. Tribatus Motsch. 234, 337 Trichobythus Dodero, 375, 392. Trichonomorphus Raffr. 123, 187. Trichonychini Ganglb. 6, 403, 413.

Trichonyni Raffr. 113. Trichonyx Chaud. 103, 413. ? Trimierus Motsch. 595. Trimiodina Raffr. 40, 74. Trimiodytes Raffr. 43, 81.

Trimiomelba Cas. 40, 75. Trimiomorphus Raffr. 41, 80. Trimioplectus Brend. 42, 80. Trimiopsis Reitt. 41, 77 Trimiopsis Reitt. 77. Trimiosella Raffr. 41, 77. Trimium Aubé, 39, 50, 72 Triomicrus Sharp, 235, 338, Trisinus Raffr. 430, 214. Trogaster Sharp, 103, 114. Trychioplectus Raffr. 50, 402. Trymalius Fairm, 568, 583. Tychini (sub Bythinini) Raffr. 7. 375, 392 Tychobythinus Ganglb. 376, 395. Tychobythus (leg. Tychobythinus), 376 Tychotyrus Broun, 553. Tychus Leach, 377, 385, 412 Tyraphus Sharp, 439, 444, 454. Tyrini Raffr. 8, 483, 538. Tyrogetus Broun, 488, 550. Tyromorphus Raffr. 490, 507, 554, Tyropsis Saulcy, 488, 506, 350. Tyrus Aubé, 486, 547. Upoluna Schauf, 556. Valda Cas. 377, 418. Verticinotus Brend. 331. Vidamus Raffr. 45, 92. Xenobythus Peverim, 376, 394. Xenogyna Raffr. 48, 100. Xherius Raffr. 104, 117. Xybarida Raffr. 233, 333. Xybaris Reitt. 232, 332 Zeatyrus Sharp, 484, 542. Zelandius Raffr. 50, 402. Zethopsus Reitt. 18, 19, 22. Zethus Schauf. 22 Zibus Saulcy, 41, 79. Zolium Cas. 77.

Zozimus Schauf. 552.

647

#### BIBLIOGRAPHIE

## LISTE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUR LES PSÉLAPHIDES.

# AUBÉ (C.).

1833. Pselaphiorum monographia. Guérin Mag. Zool. ..

4844. Revision de la famille des Psélaphiens. Ann. Soc. ent. Fr.

# BAUDI (F.).

1869. Coleopterorum messis in insula Cypro et Asia minore ab Truqui congregatae recensitio. [Berl. Ent. Zeits.].

## BEDEL (L.).

1875. Liste des articulés cavernicoles. Journ. de Zool.

1884. Description de Claviger barbarus. Ann Soc. ent. Fr. ..

## BRENDEL (E.).

1865. On some new species of Pselaphidae. Bost. Journ. Nat. Hist. .

1866. Description of some new *Pselaphidae*. — Synopsis of the genera and species of the Family *Pselaphidae*. (Proc. Ent. Soc. Phil.).

1889, Description of new Soydmaenidae and Pselaphidae. [Ent. Amer. .

1890. The *Pselaphidae* of North America, A Monograph, (Bull, Lab., Nat. Hist. Univ. Iowa).

1892. On the Pselaphid genus Trimium. Trans. Amer. Ent. Soc.).

1893. Notes and descriptions of *Pselaphidae*. Trans. Amer. Ent. Soc.

1894. Corrections on Pselaphidae. Ent. News. Phil. .

1895. Synonymical and other notes on american *Pselaphidae*. (Ent. News, Phil.).

#### BROUN (TH.).

1886-1893. Manual of the New Zealand Coleoptera.

1895. New Coleoptera of New Zealand. Ann. Mag. Nat. Hist.).

#### CASEY (T.).

1884. Contributions to the descriptive and systematic Coleopterology of North America.

1886, Descriptive notice of north american Coleoptera, Bull, Cal. Ac. Sc.

4887. On some new north american Pselaphidae. (Bull. Cal. Ac. Sc.).

1893, Coleopterological Notices, V. Ann. (New-York Ac. Sc.).

CHAUDOIR (MAX. DE).

4845. Notices entomologiques sur le Gouvernement et la Ville de Kiew. Bull. S. I. Nat. Moscou .

CROISSANDEAU (J.).

1889. Note sur les *Bythinus Baudueri*, *latebrosus* et *blandus*. Rev. d'Ent. Caen .

4891. Description de *Bythinus Desbrochersi*. — Étude sur les *Bythinus* gallo-rhénans et corses. — Description de *Delenda Carthago*. Le Coléoptériste .

4893. Descriptions de plusieurs espèces nouvelles de Psélaphides circa-méditerranéens, (Miscell, Ent.).

1894. Description de Desimia Pici. Ann. Soc. ent. Fr.).

DALMAN (J.).

1826. Om Insekter innesluta i Kopal. Svenska Vetenskaps Akademien Handlingars .

DENNY H.).

4825. Monographia Pselaphidarum et Scydmaenidarum Britanniae.

DEVILLE (J. SAINTE-CLAIRE).

1901. Description d'un Psélaphide nouveau de France. Bull. Soc. ent. Fr.).

Dodero A.).

4892. Description de *Trogaster Doriae*. Ann. Mus. civ. Stor. Nat. Genova.

1900. Materiali per lo studio dei Coleotteri italiani.

ERICHSON (W.-F.).

1839. Die Käfer der Mark Brandenburg.

ESCHERICH (CARL).

4897, Zur Kentniss der Myrmecophilen Kleinasiens, (Wien, Ent. Zeit.).

FAIRMAIRE (L.).

1857. Description de Bythinus laevicollis. Ann. Soc. ent. Fr.).

1859. — Zibus Riedeli,

1898. Descriptions de Psélaphides myrmécophiles de Madagascar. [Ann. Soc. ent. Fr.],

FAIRMAIRE ET LABOULBÈNE.

1854. Faune entomologique française.

FAUVEL (A.).

1883. Description de Machaerites Falesiae. Rev. d'ent. Caen).

4886. — Bythinus Fauconneti.

4894. Description de Bythinus serripes. — Notes sur les Bythinus Gritati, Baudueri, Ravouxi. (Rev. d'Ent. Caeu).

FIORI (A.).

4894. Descrizione di un nuovo Pselaphus. Natur. Sicil. XIII.

1899. Nuove specie di Coleotteri. (Att. Soc. Nat. Mod. .

FLACH (K.).

Neue Pselaphen und Scydmaenen aus Italien. (Wien. Ent. Zeit. .

FRIVALDSKY (J.).

4877. Description de Pselaphus mehadiensis. (Termesz. Füzet. Bu-dapest).

GANGLBAUER (L.).

1895. Die Käfer Mitteleur. II: Pselaphidae.

1896. Description de *Tychobythinus Ottonis*. Verh. der. k. k. Zool-Bot. Ges. Wien.

1897. Description de Bythinus transsitvanicus. (Verh. der. k. k. Zool. Bot. Ges. Wien).

4897. Neue Pselaphiden aus Bosnien und Hercegovina. (Wissensch. (Mitt. aus Bosn. Herc.).

GORY (H.-L.).

1832. Description de Metopias curculionoides. (Mag. Zool.).

GRILAT (R.).

1889. Description de Bythinus Ravouxi. L'Échange).

GUILLEBEAU (FR.).

4888. Notes pour servir à l'étude des Psélaphiens. (Bev. d'Ent. Caen).

4890. Description de deux Coléoptères nouveaux. (Rev. d'Ent. Caen).

4892. — de deux Psélaphides nouveaux. (Bull. Soc. ent. Fr. ).

4893. Psélaphides d'Algérie. Bull. Soc. ent. Fr.).

HERBST (C.).

4792. Natursystem Käfer, IV. Berlin.

HEYDEN (C.-H.-G.).

4849. Beschreibung einer Käfergattung aus der Familie der Pselaphiden. (Stett. Ent. Zeit.).

HOLDHAUS (C.).

4902. Coleopterologischen Studien. (Verh. der k. k. Zool. Bot. Gesells. Wien).

ILLIGER (J.-C.-W.).

1804. Magazin für Insektenkunde.

KIESENWETTER (A. VON).

1858. Beitrag zur Käferfauna Griechenlands. Berl. Ent. Zeitschr.

KING (RÉV. R.-L.).

1862, 4863, 4864, 4865, 4873. On the *Pselaphidae* of Australia. Trans. Ent. Soc. New South Wales.

KRAUSS (HERM.).

1899. Coleopterologische Beiträge zur Fauna austriaca. Wien. Ent. Zeit. ...

KUGELANN (J.-G.).

4794. Verzeichniss der in einigen Gegenden Preussens bei jetzt entdekten Käfer-Arten. Neuest Mag. Schneider .

LATREILLE (P.).

4807. Genera Crustaceorum et Insectorum.

LEACH (W.-E.).

4814, 4815, 4817. The zoological Miscellany. London.

4826. On the Stirpes composing the Family Pselaphidae. (Vigor's zool. Journ.).

LECONTE (J.).

1848. On the *Pselaphidae* of the United States. Bost. Journ. Nat. Hist. .

1852. New species of Californian Coleoptera. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. Y.

1863. Smithsonian Miscellan. Coll.

1874. Descriptions of new Coleoptera chiefly from the Pacific Slopes of North America. Trans. Amer. Ent. Soc. J.

1878. Coleoptera of Florida and Michigan. Proc. Amer. Philos. Soc. ...

4880. Short studies of North American Colcoptera, Trans. Amer. Ent. Soc.

MAC LEAY (W.).

1873. The Insects of Gaindah. Trans. Ent. Soc. New South Wales. MILLER (L.).

1855. Gen. Machaerites Verh. d. k. k. Zool. Bot. Gesells, Wien. .

MOTSCHULSKY (V. DE).

1845. Remarques sur ma collection de Coléoptères russes. Bull. S. I. Nat. Moscou .

1851. Énumération de nouvelles espèces de Coléoptères. Bull. S. J. Nat. Moscou

1863. Essai d'un catalogue des insectes de l'Île de Ceylan. Bull. S. I. Nat. Moscou). 1853, 4855, 1856, 1859. Études entomologiques.

Müller (P.-W.-J.).

4843, 4847, 4818, 4821. (German, Mag. Ent. T. I-IV).

PANZER (G.-W.-E.).

1805. Fauna Insectorum germanicae initia (fasc. 89).

PAYKULL (G. VON).

4798, Fauna svecica: Insecta, Upsaliae.

PÉRINGUEY (L.).

4886. Second Contribution to the South African Coleopterous Fauna, Trans. S. Afr. Phil. Soc.).

PEYERIMHOFF (P. DE).

4899. Sur la pœcilandrie dans le genre Bythinus. Bull. Soc. ent. Fr.).

4901. Description d'un nouveau Psélaphide cavernicole des Alpes. (Bull. Soc. ent. Fr.).

1901. Notes sur les groupes Tychobythus, Bythoxenus, Xenobythus. (Bull. Soc. ent. Fr.).

PEYRON (ED.).

4858. Catalogue des Coléoptères des environs de Tarsous. Ann. Soc. ent. Fr. .

Pic (M.).

4892. Description de Bythinus Croissandeaui. Bull. Soc. ent. Fr. ..

4897. Observations sur divers Coléoptères d'Algérie, Bull. Soc. ent. Fr.).

PREYSSLER (J.-D.-E.).

4790. Verzeichniss böhmischer Insecten. Prague.

RAFFRAY (A.).

4873. Coléoptères du Nord de l'Afrique. Rev. Mag. Zool. .

4877. Voyage en Abyssinie et à Zanzibar : Psélaphides. [Rev. Mag. Zool.].

4882. Psélaphides nouveaux ou peu connus. 1<sup>cr</sup> mémoire. (Rev. d'Ent. Caen).

4883. Psélaphides nouveaux ou peu connus, 2º mémoire. Rev. d'Ent. Caen).

4887. Psélaphides nouveaux ou peu connus, 3º mémoire. (Rev. d'Ent. Caen).

4890. Étude sur les Psélaphides : Genera et descriptions d'espèces nouvelles. (Rev. d'Ent. Caen).

4891. Voyage de M. E. Simon au Venezuela : Psélaphides. (Aun. Soc. ent. Fr. .

- 1891. Voyage de M. E. Simon aux Philippines : Psélaphides, [Ann. Soc. ent. Fr. .
- 1893. Voyage de M. E. Simon à Ceylan : Psélaphides. Ann. Soc. ent. Fr. .
- 1893. Revision des Psélaphides de Sumatra. Ann. Soc. ent. Fr. ..
- 1893. Monographie des Faronini. Rev. d'Ent. Caen'.
- 1894-1895. Revision des Psélaphides de Penang et de Singapore. Rev. d'Ent. Caen .
- 1895. Voyage de M. E. Simon dans l'Afrique australe : Psélaphides. Ann. Soc. ent. Fr. .
- 1895. Revision du genre Tyropsis. (Ann. Soc. ent. Fr.).
- 1896. Psélaphides du Brésil méridional. Ann. Soc. ent. Fr.).
- 1896. Notes synonymiques sur les Psélaphides. Ann. Soc. Ent. Fr.).
- 4896. Nouvelles études sur les Psélaphides et les Clavigérides. (Ann. Soc. ent. Fr. .
- 1896. Notes sur les Bryaxides de l'Afrique orientale et de Madagascar. Rev. d'Ent. Caen).
- 1896. Psélaphides d'Océanie récoltés par M. Ph. François. Bull. Soc. ent. Fr. . .
- 1897. Psélaphides et Clavigérides récoltés à Diego-Suarez par M.Ch. Alluaud. Ann. Soc. ent. Fr. .
- 1897. Revision des Batrisus et genres voisins de l'Amérique centrale et méridionale. (Ann. Soc. ent. Fr.).
- 1897. Descriptive Catalogue of the Coleoptera of South Africa: Pselaphidae. Trans. South. Afr. Philos. Soc. .
- 1898. Descriptive Catalogue of the Coleoptera of South Africa: Psetaphidae (First supplement). (Trans. S. Afr. Philos. Soc.).
- 1898. Revision générique de la tribu des *Euplectini*, (Rev. d'Ent. Caen .
- 1898. Diagnoses de trois Psélaphides nouveaux. Bull. Soc. ent. Fr.).
- 4899. Psélaphides et Clavigérides de Madagascar. Ann. Soc. ent. Fr.).
- 4900. Description de deux Psélaphides nouveaux. Bull. Soc. ent-Fr. .
- 4900. Australian Pselaphidae. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales. Sydney.
- 1901. Description of new species of South Africa. *Pselaphidue*. (Ann. S. Afr. Mus.).
- 1901. Psélaphides nouveaux de Ceylan. Ann. Soc. ent. Fr.\.
- 1901. Description de Braunsiella pubicentris. Bull. Soc. ent. Fr.).
- 4903. Descriptions de Ctenisomorphus elaniticus, Sognorus Peyerimhoffi. Bull. Soc. ent. Fr. .

- 4903. Psélaphides recueillis dans le Sud de Madagascar par M. Ch. Alluaud. 'Ann. Soc. ent. Fr.).
- 4903. Voyage de M. Biró dans les possessions allemandes de la Nouvelle-Guinée. (Ann. Mus. Nation. Hungar, Budapest).

# REICHENBACH (H.-G.-L.).

4816. Monographia Pselaphorum. Lipsiae.

## REITTER (Edm.).

- 4879. Coleopterologische Ergebnisse einer Reise nach Croatien und Slavonien. (Verh. der. k. k. Zool. Bot. Gesells. Wien.).
- 4879. Beitrag zur Kenntniss europäischer *Pselaphidae* und *Scydmaenidae*. (Verh. der. k. k. Zool. Bot. Gesells. Wien.).
- 1879. Beitrag zur Kaukasischen K\u00e4fer-Fauna (in H. Leder). (Verh. der. k. k. Zool. Bot. Gesells, Wien.).
- 4879. Beitrag zur Käfer-Fauna von Neue-Zeeland. (Verh. d. naturf. Ver. Brünn).
- 1880. Entomologische Monalsblätter Kraatz. Berlin).
- 1880. Coleopterologische Ergebnisse einer Reise nach Croatien. Dalmatien und Herzegowina. (Verh. der k. k. Zool. Bot. Geselfs, Wien.
- 4880. Beitrag zur Kaukasischen Käfer-Fauna (in H. Leder). (Verh. der K. k. Zool. Bot. Gesells, Wien, .
- 1880. Coleopterologische Ergebnisse einer Reise nach Croatien, Dalmatien und Herzegowina. Verh. der k. k. Zool. Bot. Gesells. Wien.).
- 1884. Versuch einer systematischen Eintheilung der Clavigeriden und Pselaphiden. (Verh. naturf. Ver. Brünn).
- 1881. Zur Pselaphiden und Scydmaeniden Fauna Syriens. (Verh. naturf. Ver. Brünn.).
- 1881. Bestimmungs-Tabellen der europäischen Coleoptera: Paussidae, Clavigeridae, Pselaphidae und Scydmaenidae. (Verh. naturf. Ver. Brünn).
- 1884. Neue und seltene Coleopteren in Jahre 1880 in Süddalmatien und Montenegro gesammelt und beschrieben von Edm. Reitter. Deuts Ent. Zeits.
- 1882. Beitrag zur Pselaphiden und Scydmaeniden Fauna von Java und Borneo. (Verh. der k. k. Zool. Bot. Gesells. Wien.
- 1882. Neue Pselaphiden und Scydmaeniden aus Central und Süd-Amerika. (Verh. der k. k. Zool. Bot. Gesells. Wien.).
- 4882. Beitrag zur Kenntniss der Pselaphiden und Scydmaeniden von Westafrica. Deuts. Ent. Zeits. :

- 1882. Neue Pselaphiden und Scydmaeniden aus Brasilien. (Deuts. Ent. Zeits. .
- 1882, 1889. Neue Ost-Indien Coleoptera. (Notes Leyd. Mus.).
- 1883. Beitrag zur Pselaphiden und Scydmaeniden Fauna von Java und Borneo. Verh. der K. K. Zool. Bot. Gesells. Wien.
- 4883. Beitrag zur Kenntniss der Pselaphiden Fauna von Valdivia. (Deuts. Ent. Zeits.).
- 1883. Beitrag zur Kenntniss der Clavigeriden, Pselaphiden und Scydmaeniden von Westindien, Deuts, Ent. Zeits, ...
- 1884. Ueber die bekannten Clavigeriden-Gattungen. (Verh. der. k. k. Zool. Bot. Gesells. Wien. .
- 1884. Neuer Beitrag zur Käfer-Fauna Griechenlands. Deuts. Ent. Zeits.).
- 1884. Resultate einer coleopterologischen Sammel-Campagne während den monaten Februar bis Avril 1883, auf den Ionischen-Inseln. Deuts. Ent. Zeits.
- 1884. Coleopterologisches. (Wien. Ent. Zeit.).
- 1884. Sechs neue Coleopteren aus Italien. Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Gen. .
- 1884. Bestimmungs-Tabellen der europäischen Coleoptera: Chavigeridae, Pselaphidae und Scydmanidae. Verh. der. k. k. Zool. Bot. Gesells. Wien.
- 1885. Beitrag zur Kenntniss der Pselaphiden-Fauna von Valdivia. (Deuts. Ent. Zeits. .
- 4885. Abbildungen und Bemerkungen zu wenig gekannten Pselaphiden-Gattungen mit Beschriebungen neuer Arten. Deuts. Ent. Zeits.
- 4885, 4887, 4889, 4890, 4891. Neue Coleopteren aus Europa und den angrenzenden Ländern. (Deuts, Ent. Zeits.).
- 1887. Bemerkungen zur der Arbeit : « Beschreibung neuer Pselaphiden aus der Sammlung des Museums Ludwig Salvator, von L. W. Schaufuss. » (Tijds. voor Ent. .
- 1887, 1891, 1892. Coleopterologischen Notizen. (Wien, Ent. Zeit. .
- 1888. Coleopteren aus Circassien. (Wien. Ent. Zeit.).
- 1888. Neue von Herr, L. Hetschko um Blumenau in südlichen Brasilien gesammelt Pselaphiden. Deuts, Ent. Zeits.).
- 1889. Insecta a C.-G.-N. Potanin in China et Mongolia novissime lecta. (Hor. Soc. Ent. Ross.).
- 1889. Eine neue interessante *Rybaxis* aus Valdivia. Wien. Ent. Zeit.).
- 1890. Beschreibungen neuer Coleopteren aus Europa, dem Kauka-

- sus, Russich-Armenien und Turkestan. Wien. Ent. Zeit.).
- 1894. Erste und zweiter Beitrag zur Coleopteren-Fauna des russischen Reiches. (Wien. Ent. Zeit.).
- 1893. Dritter Beitrag zur Coleopteren-Fauna von Europa und den angrenzenden Ländern. (Wien. Ent. Zeit.).
- 1893. Neunter Beitrag zur Coleopteren-Fauna des russischen Reiches. Wien, Ent. Zeit.
- 4894. Fünfter Beitrag zur Coleopteren-Fauna von Europa und den angrenzenden Ländern. (Wien, Ent. Zeit.).
- 1894. Neue Pselaphiden und Scydmaeniden aus der europäischen Turkei. (Wien. Ent. Zeit.).
- 4898. Siebzehnter Beitrag zur Coleopteren-Fauna des russischen Reiches, (Wien, Eat. Zeit.).
- 1899. Neue Coleopteren aus Europa, den angrenzenden Ländern, Russich-Asien und Mongolia. (Wien. Ent. Zeit.).
- 4900. Beitrag zur Coleopteren-Fauna des russischen Reiches. Wien. Ent. Zeit.).
- 4901. Saulcyetta nov. gen. Amaurops leptoderina n. sp. (Wien. Ent. Zeit.).
- 1902. Neue und seltene Colcopteren gesammelt in Jahre 4901, in der Herzegowina, in Dalmatien und Bosnien. Wien. Ent. Zeit.).

## REY (CLAUDIUS).

1888. Description de Bythinus carinula. (L'Échange).

#### SAHLBERG (J.).

1889. Enumeratio Brachelytrorum et Clavicornium Fenniae : *Pselaphidae* et *Clavigeridae*. (Fauna et Flora fennica).

### SAULCY (F. DE).

- 4863. Descriptions de quatre nouvelles espèces de Coléoptères propres à la faune française. (Ann. Soc. ent. Fr.).
- 4863. Description d'une nouvelle espèce française de Coléoptères. (Ann. Soc. ent. Fr.).
- 1863 et 1867. Matériaux pour servir à la Faune des Coléoptères de France. Cat. Coléopt. de France par A. Grenier).
- 1864. Descriptions des espèces nouvelles de Coléoptères recueillis en Syrie, en Égypte et en Palestine. (Ann. Soc. ent. Fr.).
- 1865. Description d'une espèce nouvelle du genre Articerus propre à la faune méditerranéenne et d'une espèce nouvelle de Machaerites propre à la faune française. Ann. Soc. ent. Fr.).
- 1870. Descriptions de Psélaphides (in Entomologische Reise nach

- Südlichenspanien beschrieben von L. von Heyden). [Berl. Ent. Zeits.].
- 1872. Descriptions de Psélaphides. (Étude sur les Coléoptères cavernicoles par Elz. Abeille de Perrin).
- 1874 et 1876. Species des Paussides, Clavigérides. Psélaphides et Scydménides de l'Europe et des pays circonvoisins. (Bull. Soc. Hist. Natur. Metz).
- 1877. Description de *Mirus permirus*. Pet. nouv. ent. Paris . Schaufuss (C.).
  - 4888. Catalogus synonymicus Pselaphidarum adhuc descriptarum. (Tijds. voor Ent.).

### SCHAUFUSS (L.-W.).

- 1863. Monographie der Gattung *Machaerites*. Verh. der k. k. Zool. Bot. Gesell. Wien.\.
- 4872. Tabellen-Entwurf zur Bestimmung der Pselaphidengattungen-Beschreibung einiger Pselaphiden; ueber Pselaphidengattungen. (Nung. otio. Dresden).
- 1877. Pselaphiden Siam's. Dresden.
- 4879. Beschreibung sechzig neuer Pselaphiden. (Nunq. otio. Dresden
- 4882. Trois espèces nouvelles de Psélaphides. (Bull. Soc. ent. Fr.).
- 4882. Neue Pselaphiden. Pselaphidarum Monographiae. (Ann. Mus. civ. Stor. Nat. Genova .
- 1882. Pselaphiden und Scydmaeniden den Sunda-Inseln. (Tijds voor Ent.).
- 4887. Beschreibung neuer Pselaphiden. (Tijds. voor Ent.).
- 1887. Ueber Pselaphiden und Scydmaeniden des Königl, Zoologischen Museums zu Berlin. Berl. Ent. Zeits.].
- 1889. Entgegnung auf. E. Reitter's Bemerkungen. (Tijds. v. Ent.). Schaum (H.-R.).
  - 1859. Beiträge zur europäischen Käferfauna. (Berl. Ent. Zeits. .
- 1864. Descriptionde Enoptostomus Wollastoni ap. Woll. Cat. Col. Can. '. Schmidt-Goebel (G.-T.).
  - 4836. Dissertatio inauguralis de Pselaphis Faunae Pragensis.
- 4838. Beitrag zu einer Monographie der Pselaphen. Prag.

### SHARP (DAVID).

- 4874. Description of new genera and species of *Pselaphidae* and *Scydmaenidae* from Australia and New Zealand. Trans. Ent. Soc. Lond.).
- 4874. The *Psetaphidae* and *Scydmaenidae* of Japan. Trans. Ent. Soc. Lond. ...

4874. Descriptions of two new genera and species of Pselaphidae. (Ent. Month. Mag.).

1881. Some new species and genera of Coleoptera from New Zealand. (Ent. Monthl. Mag.)

1883. Revision of the Pselaphidae of Japan, Trans. (Ent. Soc. Lond.).

1883. Description de Mentraphus pselaphoides. Wien. Ent. Zeit.

1887. Pselaphidae and Scydmaenidae. (Biol. Centr. Amer. Ins. Col.).

1892. Descriptions of two new Pselaphidae found by J.-J. Walker in Australia and China. (Ent. Monthl. Magaz.).

STEPHENS (J.-F.).

1832. Illustrations of British Entomology, Vol. V.

THOMSON (C.-G.).

1861. Skandinaviens Coleoptera.

TOURNIER (H.).

1867. De quelques nouveaux Coléoptères d'Europe et d'Algérie. (Ann. Soc. ent. Fr.).

WASMANN (E.).

4891. Eine neue Clavigeride aus Madagaskar. (Stett. ent. Zeit.).

1893. Neue Myrmecophilen, (Deuts. Ent. Zeits.).

4893. Ueber Paussiger und Articeropsis. (Wien. Ent. Zeit.).

1894. Kritisches Verzeichniss der Myrmecophilen und Termitophilen Arthropoden, Berlin,

4897. Neue Myrmecophilen aus Madagaskar. (Deuts. Ent. Zeits.).

1897. Ein neuer Fustigerodes aus der Capkolonie. (Wien. Ent. Zeit.).

4898. Ueber Novoclaviger und Fustigerodes. Ein neuer Claviger aus Bosnien. (Wien. Ent. Zeit.).

Westwood (J.-O.).

1856. Descriptions of the various species of the Coleopterous Family natives of New South Wales and South America. (Trans. Ent. Soc. Lond.).

Descriptions of twelve new species of the Coleopterous Family Pselaphidae. (Trans. Ent. Soc. Lond.).

1874. Thesaurus Entomologicus Oxoniensis. Oxford.

WOLLASTON (T.-V.).

1865. Coleoptera Atlantidum. London: Enumeration of the Coleopterous Insects of the Madeiras, Salvages and Canaries.

XAMBEU (V.).

1889, Deux Coléoptères nouveaux des Pyrénées-Orientales. (Rev. d'Ent. Caen.).

# TABLE ALPHABETIQUE PAR NOMS D'AUTEURS

DES

### TRAVAUX CONTENUS DANS CE VOLUME

- Buysson (R. bu). Monographie des Guèpes ou *Vespa* (suite et fin) [pl. V à XV], 485 et 565.
- MARCHAL (Dr P.). Sur une Cochenille nouvelle : Amelococcus Alluaudi [fig.], 537.
- lp. La Cécidomyie des Caroubes : Schizomyia Gennadii Marchal [fig.], 361.
- Pierre (L'abbé). L'éclosion des œufs de Lestes vividis (Névr. [pl. IV], 477.
- RAFFRAY (ACH.). Genera et Catalogue des Psélaphides (suite et fin [fig.] [pl. I à HF, 4 et 635.

### TABLE

### DES GENRES, ESPÈCES ET VARIÉTÉS DÉCRITS DANS CE VOLUME.

Nota. — Les noms en caractères égyptiens désignent les genres nouveaux. — Les noms en caractères italiques désignent les espèces et variétés nouvelles.

### COLÉOPTÈRES

(sith, raldi- 1

riensis) Raffr., 138. brevicornis Baffr., 139. clavata Baffr., 137. convexicens Baffr., 435. cordicollis Raffr., 136. Elfridae Raffr., 139. latifrons Raffr., 138. picea Raffr., 436. quadraticeps Raffr., 137. Adiastulus Raffray, 40. Anasis impunctata Raffr., 478. Anasopsis Raffray, 179. Ancystrocerus carinatus Raffr., 383. Apharina armata Raffr., 312. nodula Raffr., 311. Aploderina Raffray, 386. sulcicornis Baffr., 386. Arhytodes boliviensis Raffr., 443. brevicornis Baffr., 443. Arthmius Edmundi (sub Reitteri) Raffr., 76. labiatus Raffr., 17. pedestrianus Raffe., 16. transversalis Raffr., 17. Atenisodus Raffray, 121. macrophthalmus Raffr., 121.

Baloctenus dimidiatus Raffr., 39.

incertus Raffr., 39.

Achillia Blanchardi

Batraxis indica Raffr., 149. obesa Raffr., 420. parvispina Raffr., 119. tumorosa Raffr., 118. Batribolbus Raffray, 60. Batrisiella Raffray, 59. Batrisinus elegans Raffr., 58. gravidus Raffr., 58. Batrisocenus annamita Raffr., 34. binodosus Raffr., 49. calcaratus Raffr., 50. cameratus Raffr., 48. capitatus Raffr., 56. carinatus Raffr., 46. carinicollis Baffr., 57. cultripes Raffr., 52. deformipes Raffr., 51. fornicatus Raffr., 49. furrifer Raffe., 43. immundus Raffr., 56. indecorus Raffr., 54. longipes Raffr., 47. major Raffr., 53. mitratus Raffr., 45. quadraticeps Raffr., 55. sauciipes Raffr., 50. siamensis Raffr., 43. sinensis Raffr., 53. triangulatus Raffr., 14. trigona Raffr., 47.

truncatus Raffr., 45. tumorosus Raffr., 44. rulneratus Raffr., 46.

Batrisodes acinosus Raffr., 26.

Beccarii (sub longipennis)
Raffr., 90.

demissus Raffr., 33.

aviatomalia Daffa 94

epistomalis Raffr., 34.

ferinus Raffr., 27.

Harmandi Raffr., 34.

indecorus Raffr., 31.

infandus Raffr., 29.

irritus Raffr., 32.

luteolus Raffr., 24. marortius Raffr., 31

multiforus Raffr., 28.

nodosus Raffr., 30.

obesus Raffr., 23.

patranus Raffr., 30.

sagar Raffr., 33.

tenuicornis Raffr., 28

tricarinatus Raffr., 25

tuberculatus Raffr., 25.

Batrisomalus Raffray, 181. infossus Raffr., 181.

Batrisophyma Raffray, 127.

Bolbobythus (sub Bythinus Raffray, 289.

Brachygluta elevata Raffr. var. . 151.

Pici Raffr. (var.), 150. simplicior Raffr. (var.), 154.

Braxyda Raffray, 145.

crassipes Raffr., 146. hamata Raffr., 145.

Bryaxina Raffray, 140.

armiceps Raffr., 142. clavata Raffr., 143.

crussicornis Raffr., 145

dimidiata Raffr., 143. foveifrons Raffr., 144.

Ann. Soc. Ent. Fr., LXXIII [1904].

lucida Raffr., 143.

Schaufussi Raffr., 144.

torticornis Raffr., 142.

Bryaxis Montandoni Raffr. var. .. 263.

Roumaniae Raffr. (var.), 263

Bunoderus Raffray, 151.

carinicollis Raffr., 152.

longipilis Raffr., 452.

Gentrophthalmosis Raffray, 376.

inexpectus Raffr., 376.

Reitteri Raffr., 377.

sulcatus Raffr., 377.

Centrophthalmus abyssinicus
Raffr., 373.

angustipalpus Raffr., 375.

bicarinatus Raffr., 375.

birmanus Raffr., 374.

guinaeensis Raffr., 373.

papuanus Raffr., 375. sinensis Raffr., 374.

Cercoceroides simplex Raffr., 410. tuberculatus Raffr., 410.

Cercoceropsis Raffray, 387.

longipes Raffr., 387.

Cercocerulus Raffr., 411.

Chenniopsis Raffray, 338.

madecassa Raffr., 339.

Claviger Montandoni Raffr., 457 Cliarthrus semirugosus Raffr., 18

Comatopselaphus parcepunctatus Raffr., 120.

Cryptorhinula *xybaridoides* Raffr.. 432.

Ctenicellus Raffray, 344. major Raffr., 345.

Ctenisomimus Raffray, 341.

Ctenisophus Bowringi Raffr., 343 irregularis Raffr., 344.

validicornis Raffr., 343.

Ctenistes crassicornis Raffr., 340. Curculionellus hirtus Raffr., 322, Cyathiger gracilis Raffr., 305. nodicornis Baffr., 306. patruelis Raffr., 306 truncatus Raffr., 307. Dalmodes gracilines Raffr., 270. Decarthron arthriticum Raffr.. 189. bicolor Raffr., 187. brasilianum Raffr., 193. frontale Raffr., 195 Hetschkoi Raffr., 187. insulare Raffr., 189 longicorne Raffr., 195. minutum Raffr., 193. planiceps Raffr., 490. planifrons Raffr., 194. quadraticeps Raffr., 190. Schaufussi Raffr., 194. Schmitti Raffr., 491. spinosum Raffr., 192. sulcipes Raffr., 188. tomentosum Raffr., 194. tritomum Raffr., 188. vulneratum Raffr., 192. Desimia caviceps Raffr., 346. Diaposis Raffray, 38. Diaugis Raffray, 14 granulosa Raffr., 45 Didymoprora semipunctata Raffr.. 384 Drasinus Raffray, 148. binodulus Raffr., 448. Ectopocerus Raffray, 149.

347 Ephimia subnitida Raffr., 312 Ephymata Raffray, 149 Eremomus Raffray, 177 crassicornis Raffr., 178 obesus Raffr., 177.

Enoptostomus crassicornis Raffr..

Euphalepsus dentines Raffr. 63. fasciculatus Raffr., 62. tibialis Raffr., 64. tricarinatus Raffr., 61. Eupines Blackburni (sub sternalis) Raffr., 205. longiceps Raffr., 124. minima Raffr., 123. Eupsenius avacilis Raffr., 497. Euteleia Raffray, 183. Lewisi Raffr., 483. nodosa Raffr., 184. trifoveata Raffr., 184. Exallus Raffray, 18. Filiger opacus Raffr., 311. validus Raffr., 310. Fustiger Smithi Raffr., 455. Fustigeropsis simplex Raffr., 455 Globa luevis Raffr., 122. Glyphobythus Raffray, 255. Hamotus bicolor Raffr., 399. boliviensis Raffr., 390. bulbifer Raffr., 395. caricornis Raffr., 398. decipiens Raffr., 404. Faureli Raffr., 399. globulifer Raffr., 392.

Grouvellei Raffr., 400. hirtus Raffr., 408. luctus Raffr., 397. longepilosus Raffr., 405. longiceps Raffr., 405. nigropilosus Raffr., 407 punctipennis Raffr., 393. rugosus Raffr., 398. simplex Raffr., 401. soror Raffr., 403 sternalis Raffr., 389. sulcipalpus Raffr., 400. tibialis Raffr., 393.

Harmomima Raffray, 269.

grandiceps Raffr., 269. impressicollis Raffr., 270.

Horniella sub Hornia Raffray. 434.

Hypochraeus Raffray, 13, granosus Raffr., 14.

Itamus Raffray, 196, laticens Raffr., 496,

Iteticus Raffray, 19.

Labomimus *Harmandi* Raffr., 382. Metopias *carinipes* Raffr., 106.

Mina nasuta Raffr., 59.

Mitona Raffray, 129.

bisulciceps Raffr., 130.
Mniszechi Raffe 130.

Mniszechi Raffr., 130. nigra Raffr., 434.

quadraticeps Raffr., 129.

Nenemeca Raffray, 37.

bidentata Baffr., 37. Nodulina Raffray, 153.

Odontalgus *gracilis* Raffr., 348. validus Raffr., 348.

Ophelius Raffray, 36. simplex Raffr., 36.

Phalepsus cavicornis Raffr., 416. vulgaris Raffr., 416.

Phoberus Raffray, 176. armatus Raffr., 476.

Pselaphus Fiorii (sub Reitteri) Raffr., 330.

laeviceps (sub longiceps) Raffr., 331.

pubescens Raffr., 321. squamosus Raffr., 321.

vestitus Raffr., 321.

Pselaptus politissimus Raffr., 128. sternalis Raffr., 128.

Pseudohamotus planiceps Raffr.. 409.

Pseudophanias claratus Raffr., 415.

elegans Raffr., 413. puberulus Raffr., 415. punctutus Raffr., 414. robustus Raffr., 413. tuberculatus Raffr., 414.

Radamellus Raffray, 456.

Reichenbachia *addahensis* Raffr., 156.

americana (sub albionica) Raffr., 241.

appendiculata Raffr., 174. arabica Raffr., 462.

arabica Rallr., 162. bengalensis Raffr., 458.

boliviensis Raffr., 159.

brevirentris Raffr., 457

Caseyi (sub articularis Raffr., 240).

Chevrolati Raffr., 164. chiricahuensis Raffr., 472. cicatricosa Raffr., 160.

compressipes Raffr., 166.

cultrata Raffr., 169. curvipes Raffr., 161.

diversula (sub diversa) Raffr.. 242.

falsa Raffr., 170.

fasciculata Raffr., 165.

globulosa Raffr., 171.

grenadensis Raffr., 168

Grouvellei Raffr., 158, illepida Raffr., 165.

immodica Raffr., 175

infelix Raffr., 157.

infossa Raffr., 635

irrita Raffr., 162.

tuteola Raffr., 163. maroccana Raffr., 168

mexicana Raffr., 173.

muscorum Raffr., 161.

nava Raffr., 456.

nitella Raffr., 159.

Oberthuri Raffr., 473. obnubila Raffr., 475. orientalis Raffr., 167. pilosa Raffr., 464. pygidialis Raffr., 160. vincentiana Raffr., 469. Rybaxis bicarinata Raffr., 182. convera Raffr., 481. rillosa Raffr., 181. Sathytes gracilis Raffr., 65. Scalenarthrus clavatus Raffr... obliquus Raffr., 126. pectinicornis Raffe., 127. Schaufussi Raffr., 125. simplex Raffr., 126. subcarinatus Raffr., 125. Schaufussia nasuta Raffr., 385. Strombopsis Raffray, 133. breviventris Raffr., 134.

Subulipalpus myrmecophilus Raffr., 383. Tanypleurus megacephalus Raffr... 271. Tmesiphorus Arrowi Raffr., 379. aspericollis Raffr., 384. bispina Raffr., 380. punctatus Raffr., 378. squamosus Raffr., 380. Westwoodi (sub) carinatus) Raffr., 423. Triomicrus cavernosus Raffr., 147 humilis Raffr., 147. Tychus bispina Raffr., 267. Poupillieri Raffr. (var.), 267 sternalis Raffr., 268. Tyraphus vestitus Raffr., 636. Xybarida punctulum Raffr., 133.

Xybaris atomaria Raffr., 132.

quadraticeps Raffr., 431.

### HYMÉNOPTÈRES

Vespa adulterina Buyss. (var.), 600.

americana Buyss. (var.), 592.

ardens Buyss. (var.), 550.

aurulenta Buyss. (var.), 579.

Barthelemyi Buyss., 648.

Binghami Buyss., 523.

Biroi Buyss. (var.), 513.

citriventris Buyss. (var.), 532.

enlemoides Buyss., 530.

intermedia Buyss., 537.

nigrithorax Buyss. (var.), 553.
picea Buyss. (var.), 537.
pulchra Buyss. (var.), 549.
Semperi Buyss. (var.), 542
soror Buyss. (var.), 519.
stizoides Buyss. (var.), 615.
sumptuosa Buyss. (var.), 603.
tartarea Buyss. (var.), 506
tenebrosa Buyss. (var.), 516.
variabilis Buyss., 522.
Walkeri Buyss., 539.

#### HÉMIPTÈRE

---

Amelococcus Marchal, 557.

Alluaudi March., 557.



G. Lepine, phot.

Imp. 1 Lafontaine, Paris

Hel Mauge





(i Lépine, phot

Imp 1 Lafontaine, Paris

Hel Mange





G. Lepine, phot.

Imp 1 Lafontaine, Paris.

Vespides.





Fig.



G. Lepine. phot.

F16. 1

Hel. Mange.

Vespides.





Fig. 2



(i. Lépine, phot.

Imp 1. Lafontaine, Paris

Hel Mange.



## Librairie de la Société entomologique de France (Suite)

Lampyrides (Monogr. des) et complément, par E. OLIVIER,				
2 pl. n		et		
Apionides (Monogr. des), par WENCKER	2	et	3	fr.
Oedemerides (Synopse des), par GANGLBAUER (traduction de			_	
Marseul)		et		
Ditomides (Monogr. des), par P. de la Brulerie	2	et	3	fr.
Eumolpides (Synopse des), par E. Lefèvre (Appendice par			0	
de Marseul)		et		
Histérides de l'Archipel Malais, par de MARSEUL				
Histérides nouveaux (Description d'), par de Marseul		et		
Magdalinus d'Europe et circa, p. Desbrochers des Loges		et		
Nanophyes (Monogr. du genre), par H. Br. de Barneville.		et		
Erotylides et Endomychides de l'Ancien Monde (Revision des)	50	et	Z	Ir.
Glaphyrus (Monogr. du genre), par Harold (traduction		0 8		NA
A. Preud'homme de Borre)		0 f		
Oxyporus (Tableau synopt. du genre), par A. FAUVEL		0 f	r.	50
Characters of undescribed Lepidoptera heterocera, par	0			
F. WALKER	3	et	4	Ir.
Tableaux unalytiques pour déterminer les Coléoptères				
d'Europe				20
I. Nécrophages (traduit de Reitter)		1 f		20
II. Colydiides, Rhysodides, Trogositides (traduit de		0 6		20
REITTER)		0 f		
To private de nort de cos current de la Faune	24 1	00	Ca	800

Le prix du port de ces ouvrages (sauf la Faune et les Catalogues syn. et pour étiquettes, envoyés franco) et celui des tirages à part est à la charge de l'acheteur.

L'Abeille, Journal d'Entomologie, fondé par S. DE MARSEUL, continué par la Société entomologique de France, publie spécialement des travaux sur les Coléoptères de l'Ancien Monde.

M. L. Bedel, 20, rue de l'Odéon, est chargé de la publication du Journal (examen et admission des mémoires et correspondance scientifique).

Le 10° fascicule du vol. XXX a été distribué.

Le montant des abonnements aux volumes de l'Abeille doit être adressé à M. V. VAUTIER, agent de la Société, 28, rue Serpente.

#### COLLECTIONS

1º Collection H. Sénac (Tenebrionidae); 2º Collection Ch. Brisout de Barneville (Coléoptères d'Europe); Chez M. L. Bedel, 20, rue de l'Odéon.

3º Collection Peyerimhoff (Microtépidoptères); c Collection H. Brisout de Barneville (Caléoptères d'Europe);

5" Collection Aubé (Coléoptères d'Europe);

6º Collection complète des Orthoptères de France donnée à la Société par M. A. Finot;
7º Collection entomologique française de tous les ordres;

8. Collection d'exemplaires typiques;

Au Siège social, 28, rue Serpente.

La « Commission des Collections » est chargée de créer ces deux dernières Collections. A cet effet, une vaste salle attenant à la Bibliotheque a été louée et est prête à recevoir les insectes français de tous ordres et les Types que les membres voudront bien envoyer, avec localités precises.





### Table des matières des 1er et 2e trimestres 1904

ACH.	RAI	FFRA	Υ.	-	Gene	era	et	ca	talog	gue	des	Psé	lapl	ride	s.	[Fig]	].
[P]	. I,	11,	III	].													

# Avis aux Libraires et aux personnes étrangères à la Société

Les ouvrages mis en vente par la Société entomologique de France sont livrés contre paiement, au siège social, Hôtel des Sociétés savantes (rue Serpente, 28), à la Bibliothèque, tous les jours, de 4 heures 1/2 à 6 heures 1/2 du soir, excepté les lundis et jours de fêtes.

On y prend des abonnements pour les **Annales** ou le **Bulletin** de la Société entomologique de France et pour l'Abeille, Journal d'Entomologie.

Pour la correspondance scientifique et les annonces, s'adresser au Secrétaire de la Société entomologique de France 28, rue Serpente, Paris, 6°.







# ANNALES



DE LA

# SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE

# DE FRANCE

FONDÉE LE 29 FÉVRIER 1832

RECONNUE COMME INSTITUTION D'UTILITÉ PUBLIQUE

PAR DÉCRET DU 23 AOUT 1878

Natura maxime miranda in minimis.

VOLUME LXXIII - ANNÉE 1904

3º TRIMESTRE

# PARIS

AU SIEGE DE LA SOCIÉTÉ
HOTEL DES SOCIÉTÉS SAVANTES
28, rue Serpente, 28

MARS 1905



Les Annales paraissent trimestriellement

# Librairie de la Société entomologique de France

Hôtel des Sociétés savantes, rue Serpente, 28

La	Société	disp	pose	des	ouvrages	suivants:
----	---------	------	------	-----	----------	-----------

(Le premier prix est pour les **membres** de la Société, le deuxième, pour les personnes étrangères à la Société.)

pour les personnes etrangères à la societe.)		
Annales de la Société entomologique de France, années		10.60
1843 à 1846 et 1859 à 1890	12 et	45 fr.
Les années 1847, 1848, 1850 et 1858, dont il		50 fr.
reste moins de 10 exemplaires	041 . 1	
Annales (années 1891 à 1903)	25 et	30 fr.
Tables générales alphabétiques et analytiques des An-		
nales de la Société entomologique de France (1832-	9 of	3 fr.
1860), par AS. Paris	2 61	9 II.
Tables générales des Annales de 1861 à 1880 inclusi-	AD at	12 fr.
vement, par E. Lefèvre	10 (4	14 II.
Tables générales des Annales de 1881 à 1890 inclusivement, par E. Lefèvre	50 of	10 fr.
	90 (4	
Bulletin (années 1895 à 1904) chaque		18 fr.
Bulletin (numéros isolés) chaque		1 fr.
Bulletin comptes rendus du Congrès (1 ou plus. Nos).		5 fr.
L'Abeille (série complète in-12, vol. 1 à 27	.50 et	175 fr.
L'Abeille (série in-12, la plupart des volumes) chacun	8 et	12 fr.
L'Abeille (série in-8°). Prix de l'abonnement par volume		
(port compris)	40 et	12 fr.
Faune des Coléoptères du bassin de la Seine, par L. BEDEL:		
T. I (Carnivora, Palpicornia) épuisé		8 fr.
T. V (Phytophaga)		10 fr.
T. VI (Rhynchophora)	8 et	40 fr.
Catalogue raisonné des Coléoptères du Nord de		
l'Afrique, par Louis Bedel, t. I, 4er fasc., pp. 4-208,	10 .	10 6
in-8°, 1895-1900	10 et	12 fr.
Catalogue syn. et géogr. des Coléoptères de l'Anc. Monde : Europe et contrées limitrophes en Afrique et en Asie.	5 at	7 fr.
Catalogue étiquettes, pour collections		12 fr.
Catalogus Coleopterorum Europae et confinium.		fr. 50
Id. avec Index (Suppl. au Catalogus)		fr. 25
Monographie de la famille des Eucnémides, par II. de		
Boxyouloir, in-8° avec 42 planches gravées	5 et	7 fr.
Monographie générale des Mylabres, 1872, 6 pl., dont		
2 col. — pl. noires		10 fr.
– pl. coloriées	10 et	12 fr.
Étude sur les Malachides d'Europe et du bassin de la Médi-		
terranée, par Peyron	4 (1	5 fr.
Mylabrides d'Europe (Monogr. des), par de Marseul, 2 pl.:	F	** C-1
- Noires	4 et 5 et	5 fr. 6 fr.
— Coloriées	011	U II.
SEUL, 4 pl. n	4 et	5 fr.
Silphides (Précis des genres et especes des), p. de Marseul.	3 et	4 fr.
Tableaux synoptiques des Paussides, Clavigérides, Pséla-		- "
phides et Scydménides, par Reitter (trad. E. Leprieur).	3 et	4 fr.
Nouveau Répertoire contenant les descriptions des espèces		
de l'Ancien Monde :		
Hydrocanthares, Palpicornes	3 et	4 fr.
Buprestides	1 et	2 fr.
(Voir la suite, page 3 de la couverture.)		

## Librairie de la Société entomologique de France (Suite)

Lampyrides (Monogr. des) et complément, par E. OLIVIER,	2 4 2 4
2 pl. n	2 et 3 fr. 2 et 3 fr.
Oedemerides (Synopse des), par Ganglbauen (traduction de	2 00 0 11.
Marseul)	1 et 2 fr.
Ditomides (Monogr. des), par P. de la Brulerie	2 et 3 fr.
Eumolpides (Synopse des), par E. LEFEVRE (Appendice par	1 106
de Marseul)	1 et 2 fr.
Historides de l'Archipel Malais, par de Marseul.	50 et 2 fr.
Histérides nouveaux (Description d'), par de Marseul	50 et 2 fr.
Nanophyes (Monogr. du genre), par II. Br. de Barneville 1	50 et 2 fr.
Erotylides et Endomychides de l'Ancien Monde (Revision des) 1	50 et 2 fr.
Glaphyrus (Monogr. du genre), par Harold (traduction	0.8. 80
A. Preud'homme de Borre)	0 fr. 50 0 fr. 50
Oxyporus (Tableau synopt. du genre), par A. FAUVEL	0 11. 30
Characters of undescribed Lepidoptera heterocera, par F. Walken	3 et 4 fr.
Tableaux analytiques pour déterminer les Coléoptères	
d'Europe	
I. Nécrophages (traduit de REITTER)	4 fr. 50
II. Colydiides, Rhysodides, Trogositides (traduit de	0 fr. 50
REITTER)	0 11. 50

Le prix du port de ces ouvrages (sauf la Faune et les Cataloques syn. et pour étiquettes, envoyés franco) et celui des tirages à part est à la charge de l'acheteur.

L'Abeille, Journal d'Entomologie, fondé par S. DE MARSEUL, continué par la Societé entomologique de France, publie spécialement des travaux sur les Coléoptères de l'Ancien Monde.

M. L. Bedel, 20, rue de l'Odéon, est chargé de la publication du Journal (examen et admission des mémoires et correspondance scientifique).

Le 11º fascicule du vol. XXX a été distribué.

Le montant des abonnements aux volumes de l'Abeille doit être adressé à M. V. VAUTIER, agent de la Société, 28, rue Serpente.

#### COLLECTIONS

1º Collection H. Sénac (Tenebrionidae):

2º Collection Ch. Brisout de Barneville (Coléoptères d'Europe); Chez M. L. Bedel, 20, rue de l'Odéon.

3ª Collection Peyerimhoff (Microlépidoptères); 4º Collection H. Brisout de Barneville (Coléoptères d'Europe);

5" Collection Aubé (Coléoptères d'Europe);
6" Collection complète des Orthoptères de France donnée a la Société par M. A. Finot;
7" Collection entomologique française de tous les ordres;

8 Collection d'exemplaires typiques;

Au Siège social, 28, rue Serpente.

La « Commission des Collections » est chargée de créer ces deux dernieres Collections. A cet effet, une vaste salle attenant à la Bibliotheque a été lonée et est prête à recevoir les insectes français de tous ordres et les Types que les membres voudront bien envoyer, avec localités precises.



### Table des matières du 3 trimestre 1904

Acu. Raffray. — Genera et catalogue des Psélaphides. [Fig].	101
PIERRE (l'abbé). L'éclosion des œufs de Lestes viridis (Névr.).  [Pl. IV]	477
ROBERT DU BUYSSON. — Monographie des Guèpes ou Vespa.  [Pl. V à X] (suite)	485
MARCHAL (Dr P.). — Sur une Cochenille nouvelle (Amelococcus Allumuli). (Fig.)	557
In. — La Cécidomyie des Caroubes, (Fig.).	562

# tvis aux Libraires et aux personnes étrangères à la Société

Les ouvrages mis en vente par la Société entomologique de France sont livrés contre paiement, au siège social, Hôtel des Sociétés savantes (rue Serpente, 28), à la **Bibliothèque**, tous les jours, de 4 heures 1,2 du soir, excepté les mercredis et jours de fêtes.

On y prend des abonnements pour les Annales ou le Bulletin de la Société entomologique de France et pour l'Abeille, Journal d'Entomologie.

Pour la correspondance scientifique et les annonces, s'adresser au Secrétaire de la Société entomologique de France 28, rue Serpente, Paris, 6°.







# ANNALES



DE LA

# SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE

# DE FRANCE

FONDÉE LE 29 FÉVRIER 1832

RECONNUE COMME INSTITUTION D'UTILITÉ PUBLIQUE


PAR DÉCRET DU 23 AOUT 1878

Natura maxime miranda in minimis.

VOLUME LXXIII. - ANNÉE 1904

4º TRIMESTRE





# PARIS

AU SIEGE DE LA SOCIÉTÉ
HOTEL DES SOCIÉTÉS SAVANTES
28, rue Serpente, 28

AVRIL 1905



Les Annales paraissent trimestriellement.

### Librairie de la Société entomologique de France Hôtel des Sociétés savantes, rue Serpente, 28

La Société dispose des ouvrages suivants :

(Le premier prix est pour les membres de la Société, le deuxième, pour les personnes étrangères à la Société.)

pour les personnes étrangères à la Société.)				
Annales de la Société entomologique de France, années				
1843 à 1846 et 1859 à 1890	12	et	15	fr
reste moins de 10 exemplaires			50	fr
Annales (années 1891 à 1903)	25	et	30	
Tables générales alphabétiques et analytiques des An-		00	90	11
nales de la Société entomologique de France (1832-				
<b>1860</b> ), par AS. Paris	2	et	3	fr
Tables générales des Annales de 1861 à 1880 inclusi-				
vement, par E. Lefèvre	10	et	12	fr
Tables générales des Annales de 1881 à 1890 inclusi-	m NO		- 20	-
vement, par E. Lefèvre	/ 50	et	10	
Bulletin (années 1895 à 1904) chaque				fr.
Bulletin (numéros isolés) chaque	1			fr.
Bulletin comptes rendus du Congrès (1 ou plus. Nos).		et		fr.
L'Abeille (série complète in-12, vol. 1 à 27				
L'Abeille (série in-12, la plupart des volumes) chacun	8	et	12	fr.
L'Abeille (série in-8°). Prix de l'abonnement par volume	10	o.f	10	fn
(port compris)	10	Gf	12	II.
Faune des Coléoptères du bassin de la Seine, par L. BEDEL: T. I (Carnivora, Palpicornia) épuisé	5	et	8	fr
T. V (Phytophaga)			10	
T. VI (Rhynchophora)			10	
Catalogue raisonné des Coléoptères du Nord de				
l'Afrique, par Louis Bedel, t. I, 1er fasc., pp. 1-208,				
in-8°, 1895-1900	10	et	12	fr.
Catalogue syn. et géogr. des Coléoptères de l'Anc. Monde :	IU.	et	7	fn
Europe et contrées limitrophes en Afrique et en Asie. Catalogue étiquettes, pour collections			12	fr.
Catalogus Coleopterorum Europae et confinium.	O		fr.	
Id. avec Index (Suppl. au Catalogus)			fr.	
Monographie de la famille des Eucnémides, par II. de				
Bonvouloir, in-8° avec 42 planches gravées	5	et	7	fr.
Monographie générale des Mylabres, 1872, 6 pl., dont	0	~ 4	10	£
2 col. — pl. noires	10		10	
Étude sur les Malachides d'Europe et du bassin de la Médi-	10	1. 0	144	34.
terranée, par Peyron	4	et	5	fr.
Mylabrides d'Europe (Monogr. des), par de MARSEUL, 2 pl. :				
- Noires	4			fr.
— Coloriées	5	et	0	fr.
Télephorides et Malthinides (Monogr. des), par de Mar- SEUL, 4 pl. n	4	et	8	ſr.
Silphides (Précis des genres et espèces des), p. de MARSEUL.	3			fr.
Tableaux synoptiques des Paussides, Clavigérides, Pséla-				
phides et Scydménides, par Reitter (trad. E. Leprieur).	3	et	4	ſr.
Nouveau Répertoire contenant les descriptions des espèces				
de l'Ancien Monde :	3	et	4	fr
Hydrocanthares, Palpicornes	1		9	
(Voir la suite, page 3 de la couverture.)				
( , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				

# Librairie de la Société entomologique de France

Lampyrides (Monogr. des) et complément, par E. OLIVIER,	2 et 3	fr.
2 pl. n	2 et 3 f	
Oedemerides (Synopse des), par GANGLBAUER (traduction de		
Marseul)	1 et 2 f	
Ditomides (Monogr. des), par P. de la Brulerie.	2 et 3 f	IF.
Eumolpides (Synopse des), par E. Lefèvre (Appendice par	1 -4 9 4	£
de Marseul)	1 et 2 1	
Histerides de l'Archipel Malais, par de MARSEUL	1 1	
Histérides nouveaux (Description d'), par de MARSEUL 1	50 et 2 !	
Magdalinus d'Europe et circa, p. Desbrochers des Loges 1	50 et 2 1	
Nanophyes (Monogr. du genre), par H. Br. de Barneville 1	50 et 2 1	
Erotylides et Endomychides de l'Ancien Monde (Revision des) 1	50 et 2 1	Ir.
Glaphyrus (Monogr. du genre), par Harold (traduction	0.5	A' O
A. Preud'homme de Borre)	0 fr.	
Oxyporus (Tableau synopt. du genre), par A. FAUVEL	0 fr.	00
Characters of undescribed Lepidoptera heterocera, par	0 1 1 1	,
F. WALKER	3 et 4 !	ir.
Tableaux unalytiques pour déterminer les Coléoptères		
d'Europe		~~
I. Nécrophages (traduit de Reitter)	1 fr.	50
II. Colydiides, Rhysodides, Trogositides (traduit de	0.5	NA
REITTER)	0 fr.	OU

Le prix du port de ces ouvrages (sauf la Faune et les Cataloques syn. et pour étiquettes, envoyés franco) et celui des tirages à part est à la charge de l'acheteur.

L'Abeille, Journal d'Entomotogie, fondé par S. DE MARSEUL, continué par la Société entomologique de France, public spécialement des travaux sur les Coléoptères de l'Ancien Monde.

M. L. Bedel, 20, rue de l'Odéon, est chargé de la publication du Journal (examen et admission des mémoires et correspondance scientifique).

Le 11e fascicule du vol. XXX a été distribué.

Le montant des abonnements aux volumes de l'Abeille doit être adressé à M. V. VAUTIER, agent de la Société, 28, rue Serpente.

#### COLLECTIONS

1º Collection H. Sénac (Tenebrionidae);

2º Collection Ch. Brisout de Barneville (Coléoptères d'Europe); Chez M. L. Bedel, 20, rue de l'Odéon.

3º Collection Peyerimhoff (Microlépidoptères);
4º Collection H. Brisout de Barneville (Coléoptères d'Europe);

5° Collection Aubé (Coléoptères d'Europe);

6º Collection complète des Orthoptères de France donnée à la Société par M. A. Finot; 7º Collection entomologique française de tous les ordres;

8. Collection d'exemplaires typiques;

Au Siège social, 28, rue Serpente.

La « Commission des Collections » est chargée de créer ces deux dernières Collections. A cet effet, une vaste salle attenant à la Bibliothèque a été louée et est prête à recevoir les insectes français de tous ordres et les Types que les membres voudront bien envoyer, avec localités précises.





### Table des matières du 4º trimestre 1904

ROBERT DU BUYSSON. — Monographie des Guépes ou Vesp	a.	
[Pl. XI å XV] (suite et fin).	. 50	65
Асн. Raffray. — Genera et catalogue des Psélaphides (sui	te	
et fin)	. 63	35
Tables par noms d'auteurs.	. 65	59
Table des genres, sous-genres, espèces, etc	. 66	50

# Avis aux Libraires et aux personnes étrangères à la Société

Les ouvrages mis en vente par la Société entomologique de France sont livrés contre paiement, au siège social, Hôtel des Sociétés savantes (rue Serpente, 28), à la **Bibliothèque**, tous les jours, de 4 heures 1,2 à 6 heures 1/2 du soir, excepté les mercredis et jours de fêtes.

On y prend des abonnements pour les Annales ou le Bulletin de la Société entomologique de France et pour l'Abeille, Journal d'Entomologie.

Pour la correspondance scientifique et les annonces, s'adresser au Secrétaire de la Société entomologique de France 28, rue Serpente, Paris, 6°.











